四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第四冊目次

唐王燾先生外臺秘要方四十卷（二）（唐）王燾撰 明崇禎程衍道經餘居刻本 〇〇一

類證普濟本事方十卷（宋）許叔微撰 清乾隆十五年芸暉堂鈔本 四八九

内外傷辨三卷（金）李杲撰 明刻本 五六三

脾胃論三卷（金）李杲撰 明刻本 五九六

唐王燾先生外臺秘要方四十卷（二）

（唐）王燾撰

明崇禎程衍道經餘居刻本

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷目録 癰疽發背九門

癰疽一十四首
癰腫方二十五首
石癰方五首
癤癰方一十四首
附骨疽方八首
瘭疽方一十六首
緩疽方四首
發背方四首
癰疽發背雜療方二十六首

唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

癰疽方一十四首

集驗癰疽論黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯荅曰榮衛稽留於經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之從之而不通壅遏不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然不能陷肌膚於骨髓骨髓不爲焦枯五藏不爲傷故命曰癰黃帝曰何謂疽岐伯荅曰熱氣純盛下陷肌

膚筋髓骨肉內連五藏血氣竭盡當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者其上皮夭瘀以堅亦如牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候黃帝曰善 出大素第十六卷中

經言五藏不調致疽六腑不和生癰一曰熛疽急者二三日殺人緩者十餘日殺人二曰癰疽急者十餘日殺人緩者一月死三曰緩疽急者一年殺人緩者數年四曰水疽所發多在手足數年猶可療疽者數十種要如此千氏法

癰之疾所發緩地不殺人所發若在險地宜令即外消若至小膿猶可療大膿致禍矣

一爲腦戶 二爲舌本 三爲玄癰 四爲喉節

謹按 瘆瘆一本作索

謹按 腷腷舉譜二音

五為胡脉　六為五藏俞　七為五藏紫
八為兩乳　九為心鳩尾　十為兩手魚
十一為腸屈之間　十二為小道之後　十三為九孔
十四為兩脇腸　十五為神主之舍一本云主客之舍
凡十五處不可傷而況於癰乎若癰發此地遇良醫能
不及大膿者可救至大膿害及矣范汪同
候賊風證但夜痛應骨不可按抑不得迴轉痛處不壯熱
體亦不乍寒乍熱但覺體瘆瘆然冷欲得熱熨痛處即
小寬時有汗此是賊風證也宜即得針灸服療風藥溫也方在療風侯上大法宜知二張如此也

又初得附骨疽即服漏蘆湯下之傅小豆薄得消也
又下利已腫處未消者可除大黃用生地黃及乾地黃隨
時也熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黃餘熱
未消可傅升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散如
療癰法又有腷疾喜著四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯
熱其發於脚者喜從腨踝起至踝赤如編繩謂之腷病也
又其發於臂者喜腋下起至掌也皆由四肢勞熱氣盛為
凉濕所折風結筋中成此疾也不即療取消潰去膿則筋
攣縮也其若但置不消復不潰其熱歇氣不散喜變作腷
也

又療之宜服漏蘆湯令下外以鋒針針去血氣針寫上結
脉處傅小豆薄則消也皆可依療丹法消之及潰成膿出
火針傅膏散如療癰法也
又亦用芭蕉根薄之差
又癰發腫高者病源淺腫下者病源深大熱者易療小熱
者難療初便大痛傷肌晚乃大痛傷骨都堅者未有膿半
堅半軟者有膿發腫都軟血瘤也非癰發腫以漸知長引
日月亦不大熱時時牽痛瘤也非癰吳普曰謂諸氣結亦
有癧久久不消成癰療之宜散氣氣已散若初腫處有浮
氣年衰皆發癰療之宜反年盛並折散熱可無此憂

于氏法夫癰疽脉洪麤難療脉微濇者易療諸浮數之脉
應當發熱而反惡寒者癰也此或附骨以有膿也
遂乃言無虛勞腹中疾或發血瘤瘠瘠狀墳起頭壘正爾
豈不當灸療療之火熨便焦爛剝刮去焦痂則血泄不可
禁必死癰起於節解遇頑醫不能即消令至大膿者皆膏
藥可得後生乎
又發癰堅如石走皮中無根瘰癧也久不消因得他熱之
疾時有發為癰也
又發癰至堅而有根者名為石癰療之法當服酒非酒即
藥勢不宜但當稍飲取令相得和散便止凡癰腫有患人

還按發於股胻數穴作發於股疽名曰股胻疽

用貼宜栝樓根和平體宜赤小豆貼方
以赤小豆五合內苦酒中熬之畢擣為散以苦酒和
之塗莪紙上貼癰從發腫兩頭以下 范汪同
又論少小有渴年四十以外多發癰疽有膈痰而渴者年
盛必作黃疸年衰必發癰疖也 范汪同
又黃帝曰願聞癰疽之形與其期日岐伯曰略說癰疽之
極者十八種
又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化為膿膿不寫塞
咽半日死其化膿者寫已則含豕膏無冷食三日而已一
去無食

又發於股胻名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿摶骨
小急療三十日死 髀內曰股股外曰髀膝上股下骨稱曰股胻也
又發於脇名曰敗訾敗訾者女子之疾也久之其狀大癰
膿其中乃有生肉大如赤小豆療之方
剉連翹草及根各一升以水一斗六升煮令竭取三
升即強飲厚衣坐釜上令汗出至足已
又發於尻者名曰銳疽其狀赤堅大急療之不療三十日
死
又發於脛者名曰兎嚙其狀赤至骨急療之不療害人
又發於足上下者名曰四淫其狀大如癰不急療百日死

還按疵疽質稱竹注癖此乃服衣當以而疑能醫

又發於肩及臑者名曰疵疽其狀赤黑急療之此令人汗
出至足不害五藏癰發四五日逆焫之
上灸百壯石子當碎出也不出可益壯 從癰發高下以後 范汪並同
又石癰者始發皮核相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸
自歇便堅如石故謂之石癰難消又不可得自熟瘀愈皆
百餘日也又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非
癰也發癰狀如蚯蚓極大此肉瘤非癰也腫一寸至二寸
瘡也三寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺
名曰竟體疽腫成膿九孔皆出諸氣憤鬱不遂志欲者多
發此疾癰及疽血瘤鼠乳石癰結筋瘤癰皆不可就針角

針角少不及誤者
凡癰疽之疾未見膿易療之當上灸三百壯四邊間子灸
各二百壯實者可下之虛者可補之有氣者下其氣服古
斯內塞散得愈絕房三年凡癰瘡者知膿者破之皆當逐
下逐膿出後當膏藥兌之常使開潤勿令燥合也若其人
瘡勿一頓盡膿徐徐令後稍出乃盡癰方潰其上皮薄入
喜當上破之此終不愈當下破之乃得膿耳勿要其皮厚
也凡癰有膿當破無膿但氣腫若有血慎不可破針灸也
按之四邊堅中軟此為有膿審也一邊軟亦有膿都堅者此
為潰核或但有氣也都軟者此為有血血瘤也當審堅軟

遠按初從靈樞作初如

又按背疽靈樞作井疽

虛實爲要若堅疽積久後若更變熱偏有軟處不可破者
疽當㬉裹置耳若灸刺破癱必暴劇不可救及結筋腨絕偽
切肉鼠乳皆不當療也又服內塞散不與他療相害晝夜
十餘度服散當以酒
又發於腋下堅赤者名曰米疽療之用砭石欲細而長疎
啓之塗以豕膏六日已勿裹其癰堅而不潰者爲馬刀挾
纓急療之太素經曰頸前已經
又發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之內不
可療一云六十日死
又發於膝者名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱如堅石勿

石石之死須其柔色異乃石之者生於石砭之柔乃破之準例之也
又諸癰腫之發於節而相應者不可療太素經云腦入節門故不可療也
又發於陽者百日死
又發於陰者三十日死丈夫陽名曰陽婦人陰器曰陰
又發於踝者名曰走緩其狀肉色不變數石其輸而止其
寒熱不死
又發於足傍者名曰厲疽其狀不大初從小指發急療之
去其黑者不消輙益不療百日死一云足側也
又發於胷者名曰背疽狀如大豆三四日起不早療下入
腹入腹不療十日死太素經云寒熱不去十日早死

遠按發於膺靈樞作於膺舌洞作甘疽

又發於足指者名曰脫疽其狀赤黑死不療不赤黑可療
療不衰急斬去之得活不去者死
又發於膺者名曰舌疽其狀如穀實瓜蔞常苦寒熱急療
之去其寒熱不療十歲死死後出膿
又發於頸者名曰夭疽其狀大而赤黑不急療則熱氣下
入淵腋前傷任脉內熏肝肺十餘日死太素經曰項日前日頭一云
發頭以前十八種並
千金論曰夫癰疽初發人皆不以爲急此實奇患唯宜速
療若療不速病成難救以此致禍者不一發皆外皮薄爲
癰皮厚爲疽宜急治之夫癰壞後有惡肉者以豬蹄湯洗

去穢次傅食肉膏散惡肉盡傅生肉膏散及摩四邊令善
肉速生當斷絕房室慎風冷勞煩待筋脉平復乃可任意
耳不爾新肉易傷傷則重潰發發則禍至慎之慎之
凡癰疽始發或似小節或復大痛或復小痛或發如米粒
大白膿子此皆微候宜善察之見有少異即須大驚忙須
急治之及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥即灸當
頭百壯其大重者灸四面及頭上二三百壯壯數不慮多
也復薄冷藥貼膏種種救療必差也
又其用藥貼法皆須當瘡中處開孔口令洩毒熱氣出亦
當頭以大針針入四分即差

身中忽有痛處似打撲名曰氣痛痛不可忍遊走不住發
作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬受溫風至春暴寒
風來折之不成溫病乃作氣痛也又宜先服五香連翹湯
摩丹參膏又以白酒煮楊柳皮及煖熨之有赤氣點點刺
出血也其連翹湯可服數劑及竹瀝湯勿以一劑未効便
謂癰也遂不服耳中間將白薇散佳
素問曰寒氣客於經絡血凝澀不行擁結爲癰疽也不
言熱之作也其後成癰又陽氣湊集寒化爲熱熱盛則肉
腐爲膿也又以酢和蜂蛤灰塗之乾即易差即止
凡腫根廣一寸以下名癤一寸以上名小癰如豆粒大者
名皰子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取差止 並出第二十三卷中

廣濟療癰疽排膿散方
黃耆十分膿多倍 青小豆一分熱口乾倍 芎藭三分肉不生倍
芍藥三分痛不止倍 白斂三分有膿不合倍 栝樓三分若渴小便利倍
甘草三分炙
右七味爲散酒服方寸匕日三服不利忌海藻菘菜熱麪魚蒜等 千金同一方無白斂甘草
又療發癰疽排膿散方
人參二兩 當歸二兩 桂心二兩 芎藭一兩
厚朴一兩炙 甘草一兩炙 防風二兩 白芷二兩
桔梗一兩
右九味擣篩爲散以酒服方寸匕日二服不利若瘡未
合常服之忌生冷菘菜海藻生葱蒜 並出第五卷中
劉涓子療癰疽先宜傅大黃食肉膏方在發背部千金方
食惡肉散後用大黃附子等十物者乃是次傅膏方
當歸 芎藭 白芷各二兩 烏頭一兩
巴豆二十枚去皮 松脂二兩 豬肪二分
右七味㕮咀內膏中微火合煎三沸巳內松脂攪令相
得以綿布絞去滓以膏著綿絮傅頭大瘡雖深傅之膿
自出就傅盡即生善肉瘡淺者不足傅著瘡中日三惡

肉盡即止
又療癰疽發壞出血生肉黃耆膏方
黃耆一兩 芍藥一兩 當歸一兩 大黃
芎藭 獨活 白芷 薤白
生地黃各一兩
右九味切豬膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傅兌
瘡中摩左右日三 文仲同 並出第四卷中
又療癰疽瘡生肉黃耆膏方
黃耆 細辛 生地黃 蜀椒

當歸　芍藥　薤白　白芷
芎藭　丹參各一兩　猪膏一升半臘月者　甘草
茯苓　獨活　黃芩各一兩
右十五味以苦酒一升二合夏月漬一宿冬月二宿微
火煎三沸煮酒氣盡成傳之
又療癰疽始作便壞熱毒發瘡膏方
羊髓一兩　甘草二兩　胡粉五分一法五兩　大黃一兩
猪膏二升
右五味切合膏髓煎二味烊內甘草大黃三上三下絞
去滓內胡粉絞令調和傳瘡上日五度

又療癰疽已潰白芷摩膏方
白芷　甘草各二分　烏頭三分　薤白十五莖
青竹茹雞子大一枚
右五味切以猪膏一升合煎白芷黃膏成絞去滓塗瘡
四邊勿著瘡中　並出第五卷中
深師內塞散療癰疽潰漏血脉空竭方
黃耆　細辛　芍藥　薏苡人
白芷　瞿麥各二兩　赤小豆七兩　乾地黃
人參　防風各二兩
右十味切先以新成白苦酒置新器中內赤小豆須臾
出銅器中熬令燥復須內苦酒中更熬凡五反止合擣
爲散酒服方寸匕日夜六七過腹痛甚倍芍藥口未閉
倍薏苡人膿多倍黃耆　出第二十八卷中
删繁療癰疽等毒潰爛猪蹄洗湯方
猪蹄一具治如食法　薔薇根一斤　甘草五兩炙　芍藥五兩
白芷五兩
右五味切以水二斗煮猪蹄取八升去滓下諸藥煮取
四升稍稍洗瘡　出第九卷中
千金翼黃帝問曰有疽死者柰何岐伯曰身有五部伏兎
一腨二一云膊背三五藏之腧四項五五部有疽死也　删繁同本出靈樞

又王不留行散主癰疽及諸雜腫潰皆服之亦療癰腫不
潰苦困無賴方
野葛皮半分　五色龍骨五兩　王不留行子二升千金方用三合翼云一升
桂心一兩　當歸二兩　乾薑一兩　栝樓未六合
右七味爲散食訖溫酒服方寸匕日三以四肢習習爲
度不知漸漸加之此浩仲堪方隨日濟開黎施行實爲
神散癰腫即消此方妙　千金同出第十四卷中
癰腫方二十五首
集驗療癰腫大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處

潰不復者無膿按之即復者有膿若當上破者膿出不盡不盡稍深蝕骨骨碎出當以魚導側際從下頭破令膿出盡出盡則骨生愈矣若惡肉不盡者食惡肉藥去之膏塗之即愈食肉藥方

取白荻灰水淋之煎令如膏此不宜預作作之十日則歇并可以去黑子黑子藥注便即拭去不時拭則傷肉又一方以桑皮灰亦妙

凡破諸病肉厚處當先廣封四面不爾瘡披裂氣泄便死不可救也以前范汪同

有久癰餘瘡敗爲深疽有歷閒暮生瘡中外惡瘡霜寒凍不差經年或骨疽亦名歷瘍深爛青

黑四邊堅強中央膿血惡汁出百藥療不差汁濱好肉處皆肪亦有碎骨從中出者可溫赤龍皮湯洗之夏月日日洗之冬日三日四日一洗潰肉多者可時傅白蔄茹散食去之可一日之中三四傅之止後長傅家猪屎散得差也

取猪矢燒作灰下絹篩以粉疽敗瘡中令滿汁出脫去便傅之長傅須差也若更生青肉復著白蔄茹散如前法也出第八卷中

千金翼凡五子日夜半　五丑日雞鳴　五寅日平旦

五卯日日出　五辰日食時　五巳日隅中

五午日日中　五未日日昳　五申日晡時

五酉日日入　五戌日黃昏　五亥日人定

右以此日時遇疾發者皆不起也出第二十三卷中

廣濟療癰腫瘡內服藥外宜貼膏方

松脂一斤鍊者　臘脂三合生　椒汞一兩　白蠟三兩

蛇銜一兩　黃耆一兩　芎藭一兩　白芷一兩

當歸一兩　細辛一兩　芍藥一兩

右十一味切以水先煎脂蠟烊盡內諸藥三上三下白芷色黃膏成用薄故帛可瘡大小塗膏貼上日夜各一

又療癰腫膿潰瘡中有紫肉硬不消以此散兌膿內蝕之方

石硫黃一分研　馬齒礬石二分熬令汁盡　漆頭蔄茹二分

麝香二分研　雄黃二分　雌黃一分研

白礬二分熬令汁盡　丹砂二分研

右八味擣篩爲散攪令調熟以傅瘡中惡肉上貼膏日二易千金并翼深師同並出第三十卷中

劉涓子療癰腫方

白歛　烏頭炮　黃芩各等分

右三味擣下篩和雞子白傅上即愈出第十卷中

療癰腫有熱黃者貼方數用神驗

甘草炙　大黃　白歛　黃耆

芎藭

右五味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨赤熱有堅處大小貼之燥易甚効

劉繁療癰腫白歛薄貼方

白歛　當歸　芍藥　大黃

莽草　芎藭

右六味各等分擣篩下雞子黃和如泥塗布隨大小貼之燥易

又療癰腫堅核不消白歛貼之方

白歛　大黃　赤石脂　芍藥

莽草　黃芩　黃連　茱萸

右八味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨核大小貼之燥易

又療癰腫黃耆貼之方腫一作疽

黃耆一兩半　黃芩一兩　芎藭一兩　黃連

白芷　芍藥各二兩　當歸一兩半

右七味擣篩以雞子白和如餈餻聚腫起處以塗著布上已貼燥易隨處不覺貼冷便愈熱勢毒者加白歛一兩尤佳

又療癰腫黃耆貼方

黃耆　大黃　白芷　牡蠣熬

白歛

右五味各等分擣篩和雞子貼燥易

又療癰腫已潰四物黃連薄貼方

黃連　黃蘗　地榆　白芷各一兩

右與擣篩雞子白和塗布薄癰上對瘡口穿布出癰氣令泄氣

又療癰腫一物栝樓薄貼方

以栝樓根隨多少止一物切五片內苦酒中熬燥擣篩之苦酒和塗紙上以貼癰腫上服散人宜用並出第九卷中

千金療癰腫松脂貼方

當歸　黃耆　黃連　芍藥

蠟　黃芩　芎藭　大黃各二兩切

松脂一斤半　豬脂一合半

右十味切以微火煎之三上三下綿布絞去滓向火炙塗生紙上隨大小貼之一日三度易之即差

又療腫疾莫散方

蕪菁子一升熬令黃

右一味擣篩以麻油和之如泥炒令焦黑以塗故布上

若女腫大勿開頭搨上無疾菜子用小豆和雞子如前
乾則易之甚妙
又搨湯方
大黃　黃芩　白歛各三兩　芒硝六分
右四味以水六升煮取三升以故帛四重內汁中以搨
腫上燥復易晝夜爲之（崔氏同）
又癰腫痛煩困方
以生楸葉十重貼之以布帛裹緩急得所日二易止
痛消腫食膿血良無比勝於衆貼冬以先收乾者鹽
湯沃潤用之亦可薄削楸皮用之（備急張文仲肘後同）

又癰癤牢堅諸藥不瘥方
削附子如碁子厚一指正著腫上以少唾濕附子火
灸附子令熱徹附子欲乾輒令更唾濕之常令附子
熱氣入腫中無不愈者此法絕妙（出第二十三卷中）
千金翼黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方
黃耆　升麻　栝樓　乾地黃各二兩
麥門冬去心　芍藥各二兩　黃芩一兩半　梔子二十枚擘
右八味切以水一斗煮取三升分三服（劉涓子用升麻一兩梔子十四枚無栝樓）
又白歛薄貼主癰腫方

白歛　大黃　黃芩各等分
右三味擣篩和雞子白如泥塗布上薄貼腫上乾則易
之可以三指撮藥末內二升水中煮三沸綿注汁拭腫
上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆之乾則易之
一易輒以煮汁拭之日夜三十度（劉涓子同）
又療癰腫方
伏龍肝以大酢和作泥塗布上貼之乾則易之消矣
又凡腫已潰未潰者方
以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上
開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未
有膿者腫當自消矣

又方
燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差爲度至良
又溫中湯主癰腫取冷過多寒中下利食完出方
甘草炙　乾薑　附子各大分炮　蜀椒二百四十枚汗
右四味切以水六升煮取二升分三服忌海藻菘菜豬
肉冷水（劉涓子同出第二十三卷中）
張文仲劉涓子療癰消膿木占斯散方
木占斯　朴心　人參　細辛
敗醬　乾薑　厚朴炙　甘草

防風 桔梗各一兩 栝樓一兩

右十一味擣爲散服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰及疽灸亦不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已壞發膿者內敗醬此藥時有化癰疽令成水爲妙

隱居必効方消癰腫

白斂二分 藜蘆一分

右二味擣爲末以苦酒和如泥貼腫上日三大良 備急同出第五卷中

石癰方五首

千金堅如石核復大色不變或作石癰瘀之鍊石散方

鹿角八兩作白灰 白斂二兩 礜理黃石一斤醋五升先燒石令赤內酢中復燒內之酢盡半止

右三味擣篩作細末以餘醋拌和如泥厚塗之乾即塗取消止盡更合諸漏瘰癧藥悉皆主之並須火針瘡上塗膏

又方

單磨鹿角半夏塗不如上方佳也 集驗文仲小品古今錄驗同

又療石癰堅如石不作膿方

以生商陸根爛擣傅之燥則易又治腩瘡及諸瘻瘡 古今錄驗同

又方

以蜀桑根白皮陰乾擣末消膠以酒和傅上即拔出 並出第十三卷中

備急療若發腫至堅而有根者名曰石癰也方

灸腫三百壯當石子破碎出如不出益壯乃出其癰疽石癰結筋瘰癧皆不可針角針角殺人 集驗文仲千金同出第四卷中

癰癤方一十四首

劉涓子療癰癤諸腫有熱方

地黃一斤擣細切

右一味以水一斗煮取三升去滓煎湯令小厚以塗紙當瘡中央貼之日再三易數用大良并療牛領上腫出第十卷中

集驗療癰及癤如結實赤熱者方

以水磨半夏塗之燥復更塗得流便消也出草中可自掘生半夏乃佳此療神驗勿不信也 出第八卷中

千金療凡癤無頭者方

吞葵子一枚即出勿多服頭多也

又方

燒葛蔓灰封上自消

又方
牛糞封之佳
又方
以鼠粘葉貼之
又方
用水和雀糞傅之
又方
狗頭骨　芸臺子
右二味等分為末和酢封之
又療癰癤潰後膿不斷及諸物刺傷不差方

石硫黃三兩粉之一味箸一片碓頭令碎少濕之
內石硫黃中刺瘡孔以瘥為度通夜箸半可服
又乾地黃丸主虛熱消癰癤方
乾地黃四兩　大黃六兩　桂心二兩　芍藥三兩
茯苓二兩　王不留行二兩　黃芩二兩　麥門冬二兩去心
遠志二兩　升麻二兩　人參二兩　甘草二兩炙
枳實二兩炙
右十二味擣篩蜜和丸如梧子大酒服十丸日三加至
二十丸長服令人肥健崔氏同
又地黃煎方補虛除熱可將和服取利也散石癰疽瘡疖
熱悉宜服百日癰疽永不發也
取生地黃隨多少三擣三押取汁令盡一味以新布
重絞其汁澄清置銅器中湯上煮之減半復下更新
布絞去麤滓結濁者滓穢盡復煎之濃鴻令如餳糖
置甆器中酒服如彈丸大日三勿加至百日服之有
驗
又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大
小便不利方
芒硝二兩　大黃四兩　梔子二七枚擘　黃芩二兩
知母二兩　甘草二兩炙

右六味切以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去
滓內芒硝二兩分三服忌海藻菘菜並出第十三卷中
千金翼論曰一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰之後膿汁
不止得冷即是鼠瘻是以病膿之大須急救之
馬齒草切五升　楸白皮一斤水五升煮取一升濃汁　麝香半兩乾之仍研作末
杏人半升熬令黑擣如膏
右四味以瓷器貯之合和以三兩重綿密裹口病已成
瘡者以泔清淨洗拭乾剪作貼子塗藥貼著瘡上日二
易若未作瘡如作瘰癧子者以艾一升熏黃如棗大乾
漆如棗大末之蚤月下土三味並末和艾作炷灸三七

壯本方癘鼠瘻出第二十三卷中

又主癧腫方

生椒末麴末釜月下土末之以大酢和傅之（並出第二十四卷中）

附骨疽方八首

千金論附骨疽法凡附骨疽者無故附骨成膿故名附骨疽喜著大節解中丈夫産婦喜著胯髀嬰兒亦著脊背丈夫急者先覺痛不得動揺按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒纔近便大啼呼即是肢節有痛候也大人緩者先覺肥洪洪然經日便覺痹痛不隨小兒則肢不能動揺亦如不隨狀看肢節解中有洪洪處不知是附骨疽令遍身成腫不至潰死體皆青黯大人亦有不別見附骨疽呼爲賊風風腫也

又凡人身體患熱當風取凉風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋夏露臥爲冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何意而有此疾由其血氣盛肌嫩漸爲風冷折之即腠理凝結故也

又凡骨疽者久瘡不差差而復發骨從孔中出名爲骨疽方

以猪脂和楸葉擣封之

又方

擣白楊葉下篩傅之

又方

穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎五升以艾及荆葉和之令可燃火令煙出內疽孔坑中以衣擁坑口勿洩煙半日許當有蟲出

又瘻疽敗及骨疽方

末龍骨粉瘡四面厚二分

又方

用白死蛾蠶一枚頭髮一把以猪膏一片中內一物煎之消盡下之欲冷內鹽一合攪和以膏著瘡中日一易蟲出如髮蟲盡愈

又骨疽百方療不差方

可瘡上以艾灸之三日三夜無不愈也（並出第二十二卷中）

備急若骨疽積年每一年一發汁出不差方

取膠熬擣末粉瘡上及破生鱧魚以搶之如食頃開視其小蟲出更傅蟲出盡止（備急文仲同）

又療疽瘡骨出方

黃連　牡蠣各二分熬

右二味末先以鹽湯洗以粉之文仲同出第四卷中

瘭疽方一十六首

集驗論胷中痛少氣急入闇中以手掩左眼竟視右眼見光者胷中結癰也若不見光瘭疽內發若吐膿血此不療之疾宜以灰掩膿血上不爾著傍人也又當聞臭熱血出是瘭疽也七日死療所不差宜以灰掩地血瘭疽喜著指與代指相似人不別者亦呼作代指不急療其毒逐脉上入心殺人也南方人得此疾皆斬去指恐其毒上攻藏故也瘭疽著指頭者其先作黯疱然後腫赤黑黯瘮痛入心是也出第八卷中

千金瘭疽論說曰瘭疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤黑青白不定一種其狀有根不浮腫痛瘮應心根深至肌少久便四面悉腫皰黯黕紫黑色能爛壞筋骨也毒散逐脉入藏殺人南方人名爲搨著毒著厚肉處即割去之亦燒鐵烙疱上令焦如炭亦灸疱上百壯爲佳單擣酸草葉傅腫四面防其長大飲葵子汁或藍青汁或犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸單療折其手耳其病亦毒著指故與代指相似人不識之呼作代指遂急療之亦逐脉上入五藏殺人南方人得之皆斬去指頭著指初指頭先作黯疱然後腫赤黑黯瘮痛入心是也復

有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不療自長出不止不痛痒此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾療之宜服漏蘆湯外燒鐵日烙之令焦盡竟以升麻膏傅之積日乃差備急同出第二十三卷中

劉涓子療瘭疽侵淫廣大羊髓膏方

羊髓二兩　大黃　甘草炙　胡粉各二兩

右四味㕮咀以豬膏二升半合煎微火三上三下絞去滓傅瘡日四五深師云兼療赤黑爛壞成瘡出第五卷中

千金療瘭疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈後發方

黃耆六分　款冬花二分　升麻四分　附子一分炮

苦參一分　赤小豆一分

右六味下篩酒服半錢匕漸增至一錢日三服范汪方無苦參有赤小豆

又方

虎糞白者以馬尿和之暴令乾燒灰粉之翼同

又方

胡粉　青木香　龍骨　滑石各一兩

右四味下篩以米粉一升和之稍以粉之日四五

又方

竈室塵　竈突中墨　竈釜底土各一升
右三味合研令勻以清水一斗煮三沸取汁洗瘡日二
三度
又凡瘡痘手足肩背忽𤺋𤺋如赤小豆剝之汁出者是𤺋
之方
剝却瘡皮溫泔清洗訖鷰窠和百日男子矢塗之
又方
蕪菁子熟擣綿裹傅之勿止文仲備急併後同
又方
熬麻子末摩上日五六度

又方
鹽和酒傅之
又方
鯽魚三寸長者亂髮如雞子大豬脂一斤煎以成膏
塗之
又麻瘡痘秘方世所不傳神良無比
射干　甘草炙　升麻　枳實炙各二兩
大黃十分　麝香二分研　乾地黃二兩　犀角六分屑
前胡三兩本方云三分
右九味切以水九升煮取三升分三服差止不限劑數

翼同深師加黃芩十分餘同
又瘡痘漏蘆湯方
漏蘆　白斂　黃芩　麻黃去節
白薇　枳實炙　升麻　芍藥
甘草炙各二兩　大黃三兩
右十味切以水一斗煮取三升分三服無藥單用大黃
下之良張文仲備急并翼並同
又升麻膏方
升麻　白薇　漏蘆　連翹
芒硝各二兩　黃芩　蛇銜　枳實炙各三兩

梔子二十枚　蒴藋四兩
右十味切擣破令細從以水三升漬半日以豬膏五升
煎水氣竭去滓傅諸丹毒皆用及熱瘡腫上並日三易
之
升麻搨湯方
升麻　漏蘆　芒硝各二兩　梔子二十枚
黃芩三兩
右九味切以水一斗合蒴藋五兩煮取七升冷搨諸丹
腫上常令濕內宜服漏蘆湯甚化
又搶𤺋痘使淫多汁日就浸大胡粉散方

胡粉三分熬 黃連二分 甘草二分炙 閭茹二分

右四味下篩以粉瘡上日三 範汪文仲備急深師同並出第二十三卷中

千金翼療癰疽侵淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤焮方

甘草炙 黃芩 大黃 黃芪

當歸 芎藭各一兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓鐺中下之消一沸攪之貼布帛中以搶腫上數百過 劉涓子千金翼同出第二十二卷中

緩疽方四首

集驗論有緩疽者初結腫形似癖回回無頭尾其色不異但痛深有根核又與皮肉相親著外耳一名肉癰其肉大者如拳小者如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑久即皮肉俱爛如牛領瘡狀但通體遍青黯色而不作頭穿潰出膿初作服五香連翹湯鑱去血以小豆薄塗之其間數針鑱去血又薄之取消也若不消色未發青黯者以練石薄之若失時不得療已潰者猶服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方也外以升麻湯搨洗之薄升麻膏若生臭惡肉者可以單行一物白閭茹散傳之青肉去盡便停也好肉既生但傳升麻膏良不生單傳一物黃耆散也若無白閭茹散積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮閭茹取半錢匕和三大錢匕白閭茹散中合和傳之惡肉去盡還以淳用白閭茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也黃耆散方白閭茹散方漆頭閭茹散方並一味單行隨多少擣篩為散 出第八卷中

范汪飛黃散療緩疽惡瘡食惡肉方

取丹砂著瓦盆南雌黃著中央磁石北曾青東白石英西礬石上石膏次鍾乳下雄黃覆雲母薄布下各二兩先擣篩瓦盆中以一盆覆上羊毛泥令厚作三隅竈燒之以陳葦一日成取其飛者使之甚妙

又療緩疽以飛黃散食惡肉令盡作土竈堊之方

雄黃一兩 雞白屎一兩 藜蘆一兩 丹砂一兩

乾鰻鱺魚一兩

右五味擣下篩青布裹之熨之三日乃止止畢要以蛇銜膏摩之良 備急范汪方蛇銜膏崔氏方附於後並出第二十一卷中

崔氏蛇銜膏療癰腫瘀血產後血積耳目暗等牛領馬鞍瘡方

蛇銜一兩 大黃 附子去黑皮 芍藥

當歸 細辛 黃芩 大戟

椒去目 莽草 獨活各一兩 薤白十四莖

右十二味並切之以苦酒漬之一宿以不中水成煉豬

膏二升龍銜藤一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似蛇銜而葉大耳亦有取其根合煎者亦名龍銜膏出第十一卷中

小品瘭疽初作即以小豆薄塗之亦消也出第十卷中

發背方四十一首 其孔石發背自有正方在第三十八卷中具述

千金論曰凡發背皆由服餌五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服諸石而自發背者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或痒仍作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂至不救其臨困時方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔之膿皆反出尋即失音不言所以養生者

小覺背上痛痒有異即取淨土冷水和泥捻作餅子徑一寸半厚二分以麤艾大作炷灸泥上貼著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅即差若榆莢大灸二七炷即差至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又常以冷水射之漬冷石熨之日夜勿止待差住手此病忌麵酒肉五辛等亦有當兩腎上發者

又論曰凡服石人皆須大勞役四體無得自安如其不爾多有發動亦不得遂便恣意取暖稱適已情必須遣欲以取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益終無發動之慮

又發背方

凡腫起於背胛中頭白如黍粟四面相連腫赤黑令人悶亂者名發背也禁房慎蒜麪不速灸治即入內殺人灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫療之皆死

又方

取亂髮灰酒服方寸匕差

又方

以三年酢滓微火煎令調和牛脂封上日一易

又方

取狗牙灰酢和傅之

又方

取豬羊脂封之亦療發乳

又方

以蛇頭灰水和傅之

又方

飲鐵漿三升下利為佳

又方

以鹿角灰酢和塗之古今錄驗同

又方

燒古蜂末之如粉雞子白和傅上日三即差止

又發背及癰疽潰漏并未潰毒腫方

栝樓　榆皮　胡鷰窠　鼠土

女人月水布洗取汁

右五味並須等分以月水汁和如泥封腫上乾即易之潰者四面封已覺即封從一日至五日令差（翼同）

又療癰疽潰漏發背及小小瘰癧李根散方

李根　半夏（洗）　栝樓（各一升）　甘草（二兩炙）

葛根（三兩）　桂心（四兩）　當歸（二兩）　通草（一兩）

芎藭（一兩半）　白斂（一兩）　桔梗（二兩）　厚朴（炙）

黃芩（各一兩）　芍藥（四兩）　附子（一兩炮）

右十五味為散酒服方寸匕日三瘥大困者夜再服有患發背骨出身有三十餘癰癤服此差忌羊肉餳海藻菘菜豬肉冷水生葱（范汪同）

又治諸虛不足發背癰疽經年瘥後復發或由大風聚結毒氣在內閉塞夏月已來出攻于背久不療積聚作膿血為瘡內漏大內塞排膿散方

山茱萸　五味子　茯苓　乾薑（各六分）

當歸（四分）　附子（二分炮）　肉蓯蓉（八分）　石斛（五分）

菟絲子（三分酒漬）　巴戟天（八分）　瞿麥（三分一云地麥地膚子也）

遠志（八分去心）　人參（五分）　甘草（五分炙）　麥門冬（八分去心）

石韋（四分）　芎藭（四分）　芍藥（五分）　乾地黃（八分）

桂心（五分）

右二十味為散酒服方寸匕日三夜一稍加至兩匕長服終身不發癰癤忌同前

又內補散療癰疥發背方

蜀升麻　黃芩　人參（各一分）　乾薑

白斂　桂心　甘草（炙）　附子（炮）

防風（各一兩）　芎藭（一兩）　赤小豆

右十一味為散酒服方寸匕日三夜再（一云蜀　救集）

又內補散主癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸　桂心　人參（各二兩）　芎藭

厚朴（炙）　桔梗　甘草（炙）　防風

白芷（各一兩）

右九味為散酒服方寸匕日三夜再瘥未合服勿停忌

范汪同

又瞿麥散主排膿止痛利小便方

瞿麥（二兩）　芍藥（二兩）　桂心（半兩）　赤小豆（半合）

芎藭（半兩）　白斂（半兩）　黃耆（一兩）　當歸（二兩）

麥門冬（二兩去心）

右九味爲散先食温酒服方寸匕日三忌生葱（翼深師同）

又薏苡人散主令癰自潰長肌肉方

薏苡人　桂心　乾薑　白歛

當歸　肉蓯蓉各一兩

右六味爲散先食温酒服方寸匕日三夜再（翼同）

又黄耆竹葉湯主胷背遊熱癰疽方

生地黄八兩　黄耆　甘草炙　芍藥

黄芩各三兩　人參　石膏碎　芎藭

當歸各一兩　生薑五兩　大棗二十枚擘　半夏四兩洗

淡竹葉切一升　麥門冬三兩去心

右十四味以水一斗二升煮竹葉取九升去滓内藥煮取三升分四服相去如人行五六里再服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳（古今錄驗同）

又排膿内塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虚疼痛方

防風　茯苓　白芷　桔梗

遠志去心　甘草炙　人參　芎藭

當歸　黄耆各一兩　桂心二分　附子炮二枚

厚朴二兩　赤小豆五合熬

右十四味擣散酒服方寸匕日三夜一忌同前

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背上惡肉方

麝香研　雄黄研　真珠研各一兩　礬石熬二兩

右四味細篩以猪膏攪令如泥塗惡肉盡止更傅生肉膏佳

又療癰疽敗壞生肉膏方

生地黄一斤　辛夷　獨活　當歸

黄耆　大黄　芎藭各一兩　薤白五兩

白芷　芍藥　黄芩　續斷各一兩

右十味切以臘月猪脂四升煎傅之佳

又方

大黄　附子炮　芎藭　雄黄

真珠各一兩　白歛　礬石燒　黄芩

藺茹各二兩　雌黄一兩　莽草一兩

右十一味先以猪膏一升半煎六沸去滓内藺茹礬石末攪之塗瘡上惡肉盡止（劉涓子同）

又方

藺茹漆頭者　礬石熬各二分　雄黄研二分　硫黄二分

右四味爲散内瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也

又發背上初欲作腫即服此方

梔子人一百枚　大黄　升麻　黄芩

甘草三兩炙各

右五味切以水九升煮取三升半分三服使利便止不下更進一服忌海藻菘菜從瞿麥散以下九方並療發背部中已次之文仲備急同並出第二十三卷中

范汪療癰腫發背虎牙散方

虎牙炙　乾薑　附子炮　當歸

甘草炙　防風　桂心　王不留行

茯苓各一兩

右九味擣下篩服方寸七日三忌同前出第三十一卷中

又療癰發背排膿內補鐵屑散方

當歸　人參　細辛　甘草炙

蓯蓉　黃耆　桂心　防風

黃芩　鐵屑　芎藭　芍藥

右十二味各等分合擣為散服方寸七忌同前

又療癰癧牢核發背成膿莽草膏方

莽草　芎藭　當歸　細辛

附子炮　黃芩　烏頭炮　牛膝

躑躅　野葛　茯苓　防風

杜蘅各一兩　豬脂二斤

右十四味切用豬肪合煎去滓傅瘡上日再忌同前

又韋氏白膏療癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸痛瘡惡瘡之方

當歸　附子炮　細辛　芎藭

續斷　牛膝　通草　甘草炙

白芷各二兩　蜀椒三合　芍藥　黃耆各一兩

右十二味㕮咀以豬膏二升煎之微火上以白芷色黃藥成絞去滓以傅瘡日三忌同前

又療發背發乳房及諸惡瘡膏方

黃連　當歸　馬齒　芎藭

薺苨各一兩　珍珠十四枚　礬石半兩燒　黃蘗半兩

石韋三分去毛　生竹皮三合　豬肪一斤

右十一味㕮咀細切肪美酒一升合煎石韋焦膏成去滓有痛稍稍傅上亦可酒服棗核大一枚忌同前並出第四十一卷中

救急療發背百無不差方

取豬羊脂切作片冷水浸取貼上暖徹易之五六十片卽差若初貼少許卽寒寒定好眠甚妙

又療發背若初覺赤腫腫上作小瘡疼不可近方

急用針刺上七八針取冷水用筒擊射腫上日夜不止疼歇腫消出第五卷中

又療發背方

取白麪按圍腫四畔令童子七人尿漬之

又方

以馬糞封之乾易婦人發孔亦差

又方

取蔚臭草擣取汁服一雞子許封上熱即易之

又方

擣地菘汁一升日再服以差止

又方

大黃 石灰熬 小豆

右三味等分末白酒和塗立效忌羊肉熱麪大酢 並出第六卷中

近効凡發背皆發出自腸胃流入五藏仕流多脈氣為主或有先服乳石并熱肉麪并失饑房室過度皆作此疾縱身不曾服乳石先代服亦有此病或有下里人服麪過度亦有患者請依後方萬不失一發背亦覺有腫即須審看根硬軟如硬頭一點白燒四邊紫黑色時掣痛悄爽不食狀若天行此石癰知是此狀即須當上灸一百壯艾炷大如鼠屎許大凡發背初亦一點白四邊赤色漸漸長大或盃盞并碗許大四邊生皰漿小小瘡如粟米許大亦時時掣痛此兩狀皆是死病一日內堪醫十日以外不療就中冬月得此病即延得三五日其發背初覺即須當頭灸二十一壯如盃許大即五花灸之各二十一壯即服牛蒡子梔樸藥粉第二服犀角湯瀉之不然服犀角丸亦得大効也忌梨鯉魚麪酒肉漿水粥 真鶴臆賈顯錄

凡發背候憎寒壯熱身如拘束或口乾不用食瘡初出如青紫色者毒重赤者輕膿如稀泔者極重膿稠白亦者輕 張道士用玄房殘口錄留

又療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫隱疹起方

消石三兩

右一味以渼水一斗和令消待冷取故青布疊三重可似欲赤處方圓濕布搨根熱即換之頻易差

又療發背及一切毒腫方

生麻油六合 黃丹二兩 地膽兩錢擣碎篩 生栗子四十九枚取大小中者熬作去皮碎篩

右四味和於銅器中盛用炭火重湯煎候沫溢出與器口欲平取小麥一合分二人嚼取筋急內藥中攪使與相和膏摩下安銅器冷水中成膏訖以故綿塗膏貼所苦處頻久換膏

又療前瘡定訖令生肌方 崔四貞外云極効

麝香兩炭 棗皮灰兩半 生麻油六合

右三味依法和用火重湯上煎十餘沸稀稠前藥相似取故綿塗膏貼瘡上膏漸取瘥減唯得喫白羊頭肉但是豆並不得喫餘如藥法

又療癰腫犀角丸主腸癰乳癰發背一切毒腫服之化爲水神驗方

犀角十二分 蜀升麻 黃芩各四分 大黃五分

防風四分 巴豆二十二枚去心皮熬令黃 人參四分

當歸四分 黃耆四分 乾藍 黃連

甘草炙 梔子人各四分

右十三味搗爲末別搗巴豆成膏內末和以杵研搗令相得練蜜和擣更搗二三百杵煖湯服三丸如梧子得利三兩行喫冷粥止即差不利加至四五丸初服取快利後漸減丸數取鴨溏微溏爲度老小以意增減腫消及和潤乃止利卻黃水即覺輕皮皺色變一切腫皆內消神驗不可論忌熱麪蒜猪肉蘆笋魚海藻菘菜生冷粘食以上並主發背

癰疽發背雜療方二十六首

劉涓子療發背發乳口已合皮上急痛生肉摩敷折丹參膏方

丹參 防風 白芷 細辛

芎藭 黃芩 芍藥 牛膝

大黃 梔子 獨活 當歸各一兩

右十二味切以臘月猪脂五升微火煎三上三下膏摩病日三四不須向火古今錄驗同出第五卷中

又療諸癰疽發背及乳方

熬粢粉令黑雞子白和之以塗練上貼癰小穿練上作小口以泄毒氣令散燥復易之此藥神効文仲備急同

又方

以釜底土擣取散以雞子中黃和塗之加少豉彌良

以五月葫及少鹽佳文仲備急同一本無下一法

又方

取茱萸一升擣之以苦酒和貼癰上乾易之佳

劉涓子療癰疽發背九物大黃薄貼方

大黃 黃芩各二兩 白芷二兩 寒水石五兩

白斂五兩 黃蘗二兩 石膏 赤石脂

黃連各三兩

右藥下篩以三合投粉糜二升中和之薄塗紙貼腫上燥易之賸下止不下厚傅之忌生冷熱麪大酢

又蝟皮散療諸瘻及浮核瘰敗并主男子發背女子發乳

等癰疽或膿血肉瘤方

蝟皮一具 杜仲八分炙 續斷五分 附子炮

地榆各五分 厚朴八分 藁本五分 當歸

桂心各五分 小露蜂房一具燒

右十味擣篩爲散服方寸匕日三服酒進取差止忌豬肉生葱冷水

又陵鯉甲散療發背乳房癰腫方

陵鯉甲一兩炙 桂心三分 當歸二分

右三味擣篩爲散服方寸匕日三服酒進 出第九卷中

千金療癰疽發背豬蹄湯方

豬蹄一具治如食法 黃耆 黃連 芍藥各三分

黃芩二兩 薔薇根 狼牙根各八兩

右七味以水三斗煮蹄令熟澄取二斗清切藥煮取一斗洗瘡一食頃以綿拭燥著生肉膏日二差止癰如當歸甘草各二兩

又療癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉方

豬蹄一具 當歸 大黃 芎藭

芍藥 黃芩 獨活 莽草各一兩

右八味蹄取膝下斯治如食法以水二斗煮取八升內藥煮取四升去滓漬瘡兩食頃拭令燥以麝香膏傅之其方在前發背部中只有四味者是也

又生肉膏主癰疽發背已潰令生肉方

甘草炙 當歸 白芷 蓯蓉

蜀椒 細辛各二兩 烏喙六枚 薤白二十莖

乾地黃二兩 續斷一兩無以茺蔚替之

右十味以好酢半升相和漬二宿豬膏三斤煎令三沸三上三下膏成使用 劉涓子同

又癰發腹背陰匿處通身有數十者方

取牛糞乾者燒擣下重絹以雞子白和以塗之乾復易 肘後深師文仲備急同

又若已結膿使聚長者方

以生栝樓根細擣苦酒和傅上燥復易之赤小豆亦佳

又凡發背爲癰疽已潰未潰者方

以香豉三升少與水和熟擣成強泥可腫作餅厚三分巳有孔勿覆孔可腫上布豉餅艾列其上炙其豉使溫溫熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當減便得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差 備急文仲并翼同

又癰腫發背並作及經十日以上腫勢焮熱毒氣猛盛日

夜疼痛百藥不治十也

夜疼痛百藥不治者方

蝦段雞子一枚　新出狗矢如雞子大

右二味攪令調和微火熬之令稀稠得所捻作餅子腫頭堅處貼之以紙貼上以綿抹之時時看之覺餅子熱即易勿令動轉及歇氣經一夜定其多日患者三日貼一度差止謹按千金翼曰此方穢惡不可施於貴勝然其愈疾一切諸方皆不及又自外諸方還復備員作儀注而已學者當可斟量斯以備諸急云耳出第二十三卷中

千金翼諸癰癤發背及癰癤已潰爛疼痛方

薔蘼穀更遞熨之當即愈一云薔薇穀更炙熨之

又連翹五香湯主一切惡核瘰癧方

連翹　射干　升麻　獨活各二兩

桑寄生二兩　通草二兩　大黃三兩　丁香一兩

青木香二兩　沈香二兩　薰陸香二兩　麝香二兩

右十二味㕮咀以水九升煮減半內竹瀝二升煮取三升分三服未差中間常服佳

又五香湯主惡氣毒腫方

沈香　青木香　丁香各一兩　薰陸香一兩

麝香半兩

右五味切以水五升煮取一升半分三服集驗方用雞舌香一兩不用丁香出第二十四卷中

崔氏療發背及諸瘡久不差有効方

先以甘草湯洗瘡拭極乾乃嚼胡麻傅上乾即易從旦至日西去胡麻乃取黃連末屑石末中半相和以傅瘡上數數易明日又依前傅胡麻及黃連等末更不須洗瘡不過六七日即差必効備急同

又連翹湯療患瘰腫而渴方

連翹　蜀升麻各二兩　黃芩三兩　枳實二兩炙

乾藍一兩　芍藥二兩　玄參二兩　白斂二兩

甘草一兩炙　羚羊角二兩屑　通草二兩　黃耆二兩

大黃三兩

右十三味切以水八升煮取二升半分三服利一兩行後更服去大黃乾藍即不利忌海藻菘菜

又犀角飲子方

犀角三兩屑　羚羊角三兩屑

右二味以水八升煮取三升渴即飲盡更作之時熱恐壞熟者并底甚妙

又五香連翹湯療惡瘡熱毒腫恐惡毒氣入腹裹取利以洩毒氣方

連翹二兩　蜀升麻二兩　薰陸香二兩　淡竹瀝一升

麝香一分研　青木香二兩　丁香一兩　獨活二兩

寄生二兩　射干二兩　甘草二兩　沉香一兩

大黃四兩水一升別漬　朴消二兩熬乾別內

右十四味切以水一斗煮取二升半絞去滓然後內大黃朴消竹瀝更煮一兩沸去滓內麝香分溫三服服別相去如人行十里久以得利一二行為度慎豬魚蒜生冷酢滑油膩麪食小豆五辛蕪荑等備急文仲同並出第五卷中

備急葛氏療始發諸癰疽發背及乳房方

皆灸上百壯半夏末雞子白和塗良姚云生者神驗以水和塗之肘後文仲古今錄驗小品並同

又方

以酢和莖上土柔萸搗並小蒜薄貼並良肘後文仲同並出第四卷中

救急療熱毒風丹并發背犀角膏方

犀角六分屑　升麻十六分　羚羊角六分　梔子人二七枚

薤白一升切　吳藍八分大青亦得　玄參六分　續斷

大黃　白歛　射干　白芷各六分

蛇銜一升切　寒水石十二分　黃芩六分　慎火草一升切

麻黃六分去節

右十七味切以竹瀝三升生地黃汁五合漬藥一宿內猪脂二升微火上煎十上十下候白芷黃膏成去滓塗瘡上出第五卷中

文仲療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散方

木占斯　厚朴炙　甘草炙　細辛

栝樓　防風　乾薑　人參

桔梗　敗醬草各一兩

右十味為散酒服方寸匕日七夜四以多為度病在上當吐病在下當下膿血此謂腸癰之屬凡癰疽即可服取療諸疽痔若瘡已潰便早愈發背無有不療長服去敗醬亦療婦人諸産癥瘕益良是劉涓子方千金范汪刪繁古今錄驗同出第五卷中

古今錄驗療諸癰瘡發背有膿血當歸貼方

當歸一分　蜥蜴一分　丹參一分　附子一分炮

蠟蜜分　梔子十枚　桂心一分　膠一分

右八味合煎以貼瘡上出第二十一卷中

宋右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十五卷目錄 痢三十三門

水穀痢方一十首
水痢方六首
久水痢不差腸垢方四首
冷痢方二十二首
冷痢食不消下方六首
白痢方八首
重下方六首
卒暴冷下部疼悶方二首
冷熱痢方七首

熱毒痢方三首
熱毒血痢方六首
赤痢方四首
久赤痢方二首
卒下血方七首
血痢方六首
久血痢方二首
蠱注痢方三首
腸蠱痢方一首
膿血痢方七首
赤白痢方六首
久赤白痢方四首
疳痢方六首
久疳痢及久痢成疳方九首
數十年痢方一十一首
休息痢方五首
腹肚不調痢方一首
泄痢不禁不斷及日數十行方三首
下焦虛寒及遠血近血方二首
下痢食完出及上入下出方一首

下痢腸滑方三首
大注痢及赤白困篤腸滑方二首
痢兼渴方二首
許仁則痢方七首

想誤頭多汗本作頭多汗

唐王燾先生外臺秘要方第二十五卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

水穀痢方一十首

病源水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌肉之間後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之府也為水穀之海脾者胃之藏也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化為榮衛以養其藏充實肌膚大腸肺之府也為傳道之

官化物出焉水穀之精化為血氣者行於經脈其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其候身之皮毛春傷氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則為風邪所傷客在肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能尅制水穀故糟粕不結聚而變為痢也又新食竟取風名為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹脹形瘦腹大失衣則旗滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絶則死診其脈小手足寒難療也脈大手足溫易療也下白沫脈沉則生浮則死身不熱脈不懸絶滑大者生懸濇者死以

𤸄期之也脈絶而手足寒晬時脈還手足溫者生脈不還者死脈緩時小結者生洪大數者死懸絶而濇者死細微而濇者生緊大而滑者死得代絶脈者不死養生方云秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬為飧洩又云五月勿食未成核果及桃李發癰癤不爾發寒熱變黃疸又為洩痢 出第十七卷中

廣濟療赤白水穀冷熱等痢方

地榆六分 白朮五分 赤石脂七分研 厚朴六分炙

乾薑六分 熟艾四分 龍骨七分 甘草四分炙

黃連十分 烏梅六分熬 人參六分 當歸五分

右十二味擣篩為末蜜丸以米飲汁服二十丸如梧桐子大日三服加至三十丸 出第四卷中

集驗論黃帝問曰人若溏洩下痢者何也對曰春傷於風夏生溏洩腸澼久風亦為溏洩也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方

黃連 阿膠各二兩炙 梔子三十枚 烏梅二十枚

黃蘗一兩

右五味切以水七升煮取二升半分為再服神良 備急同

痢後名烏梅湯療熱下痢

又方

黃連一升金色者　陳米五合

右二味以水七升煮取二升分再服（肘後文仲同並出第四卷中）

刪繁療中焦熱水穀下痢藍青丸方

藍青汁三升　黃連八兩　黃蘗四兩　阿膠五兩

白朮　地榆　地膚子　烏梅肉各三兩

右八味擣篩為散用藍汁和微火上煎取可為丸丸如杏子大飲進三丸（出第四卷中）

崔氏療水穀痢方

乾薑三分　雞子二枚　小豆二百粒炒令香　黃連三分

右四味擣篩三味內雞子黃白中熟攪令相得微火上炒令可丸一服五十丸如小豆大日以飲服差即停（出第三卷中）

文仲療因仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一瀉五六升水方

黃連去毛　厚朴各三兩

右二味切以水三升煮取一升頓服之（出第三卷中）

必效療水穀痢方

小豆一升煮　蠟二兩

右三味和頓服之即愈

又方

櫻蘭皮燒灰

右一味研以水和服三方寸匕（並出第二卷中）

古今錄驗療熱水穀下痢方

黃連　阿膠各二兩　梔子二十枚

右三味切以水七升煮取二升分為三服

又方

黃連　當歸　甘草各二兩炙　酸石榴皮三兩

右四味切以水三升煮取一升半分為三服（並出第十卷中）

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有白膿日夜無節度但疑是冷並主之方

白石脂　乾薑各八分

右二味擣篩為末以沸湯和少許麪薄糊和藥併手捻作丸如食法下不止加乾薑八兩忌如常法

又療水痢腹中氣方

茯苓八分　白龍骨八分研　訶梨勒皮八分

黃連八分　酸石榴皮八分

右五味擣篩為末蜜丸空心以飲服如梧子大三十丸

日二服差止 出第四卷中

文仲療水痢百起者馬藺散方

馬藺子 乾薑 黃連原無分兩

右三味為散熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神效不得輕之

又方

朽骨灰 牛骨灰亦得 神麴炒黃

右三味等分為散空腹飲服一方寸匕經六月六日麴時用常麴亦得御傳並出第三卷中

經心錄主水痢方

雞子二枚 黃蠟一兩

右二味熬熟食之宜空肚食之日三服佳

又方

黃連 倉朮各三兩

右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煮赤豆作漿粥服二十九日二服若渴但飲豆漿粥並出第二卷中

久水痢不差腸垢方四首

病源腸垢者腸間津液垢膩也由熱痢蘊積腸間虛滑所以因下痢而便腸垢也 出第十七卷中

肘後療久下痢久不差腸垢已出者方

烏梅二十枚

右二味以水二升煮取一升頓服之

又方

石榴一枚

右一味合皮擣絞取汁隨多少服之最良

備急療水下痢久不差腸垢已出者方

赤石脂 桂心 乾薑 附子炮

右四味等分擣篩蜜丸如小豆每服三丸日三服飲下肘後同出第六卷中

文仲治久水痢難斷方

黃連二兩 黃蘗二兩 阿膠炙一兩

右三味擣篩為散以苦酒蜜各半升煮肉阿膠令烊又內諸藥令可丸飲服三丸日四此是古方極要

冷痢方二十二首

病源冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故為冷痢也凡痢色青色白色黑皆為冷也色黃色赤並是熱也故痢色白食不消謂之寒中也診其脉沉則生浮則死 出第十七卷中

廣濟療冷痢青白色腹內常鳴其痢行數甚踈出大多此是冷痢宜服調中散方

龍骨　人參　黃連　阿膠炙

黃檗各一兩

右五味擣篩爲散煮米飲服兩方寸匕日兩服差停出第四卷中

肘後療水下痢色白食不消者爲寒下方

黃連　乾薑各三兩

右二味擣篩白酒一升半合煎令可丸飲服如梧桐子二十丸忌豬肉冷水

又方

黃連二兩　甘草炙半兩　附子炮半兩　阿膠炙半兩

右四味切以水三升煮取一升半分再服之

又方

半夏洗　烏頭炮　甘草炙各等分

右三味擣篩蜜和丸如梧桐子大飲服三丸日再服

又方

生薑汁二升　白蜜一升半

右二味相和分再服之

又方

腥二兩炒　乾薑三兩末

右二味以水六升半著米一合煮作糜糜熟內薑一合

令盡不差更作集驗同

又方

酸石榴皮燒灰

右一味爲末服方寸匕文仲同

又方

乾薑末二兩　雜麫一升

右二味爲燒餅熟食之盡更作不過三劑差文仲同

又療痢下白如鼻涕者方

龍骨　乾薑　附子炮

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子大飲下五丸漸至十

丸日一服文仲同

又方

黃連末　臘　阿膠各一兩

右三味先以酒半升令沸下膠臘合烊乃內黃連末頓服之本云姚氏療卒注下并痢血一日夕數十行

又方

灸臍下一寸五十壯良文仲同並出第二卷中

千金論曰凡五臟絕於內者下不自禁下甚者手足不仁也細詳取之萬不失一下病體例略如此耳素問曰春傷於風夏爲膿血夏多滯下也夏傷於風秋必洞泄秋下水

者患必是冷也

又療久冷痢下純白者此由積臥冷處經久病發遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍之凡白痢屬冷亦痢屬熱方

上好麴末 五升微炒令香

右一味溫清淳酒熱和麴末一升空腹一頓服之日三若至食時擣蒜一升令至熟下薑椒末調如常食法惟須稠勿加鹽以水和麪二升作索餠極熟爛煮之乾漉熱內蒜虀中相和一頓食之少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至差來少食餘食以此法療不過二日必差

又烏梅丸療冷痢久下方

烏梅 三百枚　當歸 四兩　乾薑 十兩　桂心 六兩

附子 六兩炮　黃連 十六兩　蜀椒 四兩汗　細辛 六兩

人參 六兩　黃蘗 六兩

右十味異擣篩合治之苦酒漬烏梅一宿去核蒸之如五斗米下擣如泥盤中揉合相得蜜和擣二千杵食前飲服如梧子大十丸日三稍增至二十丸 此本仲景傷寒論方

又𦲷療痢於貴勝用健脾丸多效今療積久冷痢先以溫脾湯下訖後以健脾丸補之未有不效者貧家雖以訖亦不可將息溫脾湯方療積久冷痢亦白者

大黃 三兩　桂心 三兩　附子 炮　乾薑

人參 各二兩

右五味切以水七升煮取二升半分為三服日再 並出第十五卷中

備急葛氏療痢色白食不消者為寒下方

豉 一升綿裹　薤白 一把

右二味以水三升煮取二升及熱頓服之肉苁方云療暴下大去血痢姚療赤白下痢并効 肘後同

又方

牛角䚡 燒灰

右一味擣篩白飲服方寸匕日三 肘後同

又方

好麪 炒

右一味擣篩煮米粥內麪方寸匕日四五云此療日百行師不救者 肘後同出第六卷中

古今錄驗白頭翁湯療寒急下及滯下方

白頭翁　乾薑 各二兩　甘草 一兩炙　當歸 一兩

黃連　秦皮 各一兩半　石榴皮 一兩生者二兩

右七味切以水八升煮取三升分為四服 出第十卷中

近効療冷痢方

肉豆蔻五顆合皮碎　甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升半頓服之戶部李尚書處得云療冷痢極者有効自用得力

又療久冷痢方

赤石脂擣作末和麪作餛飩空腹服一碗以下不過兩頓差老人尤佳體中先熱者不可服之以上二方新附

又仲治青下白下薑附散方

乾薑　附子炮　皂莢炙去子

右三味等分擣篩爲散飲服方寸匕不過再服即愈亦可丸服小品附後同

又治冷痢薑艾餛飩子方

乾薑末　熟艾

右二味等分作麪餛飩如酸棗大煮熟服四五十枚日二服腹脹者炙厚朴煮汁服藥此熱服訖即須食飯大效曾有產婦冷痢如白膏服之立差腹痛亦定

冷痢食不消下方六首

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷及微下痢方

白朮八兩　神麴末五兩炒　甘草炙

乾薑　枳實炙各二兩

右五味擣篩蜜和丸空腹以溫酒服如梧桐子大二十丸日二服漸加至三十丸腹中痛者加當歸出第四卷中

又仲華佗治老小下痢柴立不能食食不化入口即出命在旦夕久痢神驗方

黃連末半雞子殼　亂髮灰準上　淳苦酒準上

蜜準上　白蠟方寸匕　雞子黃一枚

右六味於銅器中炭火上先內苦酒蜜蠟雞子黃攪調乃內黃連末髮灰又攪煎視可摶出爲丸久困者一日一夜盡之可者二日盡之肘後同出第三卷中

延年增損黃連丸主腹內冷食不消及冷痢數痢方

黃連　黃耆各三分　龍骨三分　當歸

甘草炙五分　乾薑　厚朴炙各六分　地榆

白朮　人參各一分

右十味擣篩蜜丸如梧子大飲酒任下服十五丸日再服加至二十丸蔣仲璋處

又地榆丸主冷痢不消食腹中脹痛氣滿不能食方

地榆炙六兩　赤石脂七分　厚朴六分　白朮五分

乾薑六兩　龍骨七分　黃連十分　當歸五分

熟艾五分　烏梅肉六分　甘草炙八分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子大飲服二十丸日二服

加至二十五丸（並出第七卷中）

又深師療冷痢下膿血絞臍痛食不消腹脹方

吳茱萸　乾薑（各六分）　赤石脂　麴末（炒各八分）

厚朴（炙）　當歸（各四分）

右六味擣篩蜜和丸如梧子空腹以飲下四十丸日再

又療冷氣久痢臍下痛出白膿食不消方

吳茱萸　人參　芎藭　桔梗

甘草（炙各四分）　枳實（炙三枚）　乾薑（十二分）　附子（炮八分）

蜀椒（汗二十分）

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲下七丸日二服漸

加之（文仲云溫脾丸療久寒宿食不消化）

白痢方八首

病源白滯痢者腸虛而冷氣客之搏於腸間津液凝滯成白故為白滯痢（出第十七卷中）

廣濟療白膿痢方

甘草（炙六分）　厚朴（炙十二分）　乾薑　枳實

茯苓（各八分）

右五味切以水五升煮取一升六合絞去滓分為二服日再服

又療心腹脹滿不能下食及痢白膿方

厚朴（炙五兩）　豆蔻（五兩）　甘草（炙一兩）　乾薑（一兩）

右四味切以水五升煮取一升五合絞去滓分為二服日再（並出第四卷中）

千金大桃花湯主冷白滯痢腸痛方

赤石脂（八兩）　乾薑　當歸　龍骨（各三兩）

附子（炮）　牡蠣（熬各二兩）　芍藥　甘草（炙各一兩）

人參（一兩半）　白朮（一升）

右十味切以水一斗二升煮白朮取九升內藥煮取三升分為三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮二兩

又方

龍骨（六兩）　厚朴（炙三兩）　赤石脂（五兩）　當歸（一兩）

右四味切以水七升煮取二升半分為三服日再服熱

加白頭翁十分牡蠣三兩

延年烏梅肉丸主冷白膿痢食不消方

烏梅肉（熬）　熟艾　黃蘗　甘草（炙各八分）

右四味擣篩蜜丸如梧子以飲服十五丸日三服忌同前（出第七卷中）

必効白痢方

麻子汁

右一味以汁煮取菉豆空腹飽服極効

又方

黃連末

右一味以水和每服三匕即愈 並出第二卷中

古今錄驗療白滯下晝夜無復數龍骨湯方

龍骨 牡蠣各三兩熬 烏梅肉 熟艾

白頭翁 乾薑各一兩 女萎 黃連

當歸各二兩 甘草六兩炙

右十味切以水七升煮取三升二合分服日三夜一斷便止忌同前 並出第十卷中

重下方六首

病源此謂今赤白滯下也令人下部疼重故曰重下去膿血如雞子白日夜數十行繞臍痛也 出第十七卷中

肘後療重下方

黃連一升

右一味以酒五升煮取一升半分溫再服當小絞痛則差

又方

鼠尾草

右一味以濃煮煎如薄飴餹服五合至一升日三赤下用赤花者白下用白花者佳也 文仲備急同

文仲隱居効驗方主下部絞痛重下下赤白方

當歸 黃蘗 黃連 乾薑各二兩

右四味擣篩煮取烏梅汁服方寸匕日三若腹中絞痛加當歸下赤加黃連下白加乾薑大効神良秘之 備急同出第三卷中

備急療重下方此即赤白痢下也令人下部疼重故名重下 葛氏方

豉 熬令小焦

右一味擣服一合日再三服又熬豉令焦水一升淋取汁服冷則用酒淋日三服之 肘後文仲同出第六卷中

古今錄驗重下下赤者方

取獺赤糞 下白取白糞燒末

右一味以飲清旦空腹服一小杯三旦飲之即愈

又療得毒病後得重下赤白絞痛方

石鍾乳一兩研 黃連 防風 附子炮

黃蘗 蜀椒汗 當歸 乾薑各二兩

右八味切以水六升煮取二升半分三服適寒溫服並出第十卷中

卒暴冷下部疼悶方二首

千金療卒暴冷下部疼悶方

燒塼令熱大酢沃之三重布覆坐上取差

又方

黍米二升 臘 羊脂 膠二兩各炙

右四味合煮作粥一頓令盡即差 並出第十五卷中

冷熱痢方七首

病源夫冷熱利者由腸胃虛弱宿有寒而為客熱所傷冷熱相乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲腸間則變為血痢也而冷伏腸內搏津液則變凝白則成白滯亦變赤白痢也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云泄下有寒者微一作引氣以息內腹徐吹

息以鼻引氣氣足復前即愈其有熱者微呼以去之也 出第十七卷中

刪繁療下焦冷熱不調暴下赤白痢香豉湯方

香豉一升 白朮六兩 薤白一升切 升麻二兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服 出第四卷中

古今錄驗生舂石榴將療熱不調下或滯或水或赤白青黃者方

酸石榴五枚

右一味合殼舂絞取二升汁分服五合稍稍服二升盡即斷小兒以意服二三合佳 千金同出第十卷中

又深師無問冷熱新舊痢方

黃連 黃蘗 乾薑 甘草炙

艾 烏梅肉熬各八分 附子三枚 臘一雞子大

右八味擣篩以蜜和臘於鐺中鎔之其著蜜須候臘鎔盡加乾薑蜜丸空腹以飲服四十丸日二漸加至五六十丸

近効療痢無問冷熱神驗黃連丸方

黃連一兩 茯苓二兩 阿膠一兩炙

右三味先擣黃連茯苓為末以少許水鎔阿膠和為丸衆手丸之暴乾量患輕重空腹以飲下三四十丸漸漸

加至六十丸不過五六服必差常用之極效

又療苦下無問冷熱及膿血痢悉主之方

生犀角屑 黃蘗各一兩 黃連 苦參各三兩

右四味擣篩為散以糯米煮作飲或令生每日空腹服一方寸匕日再服使差勿輕之 此方於度支王郎中處得曾用極効附後有當時効庭傳服家方庵後殊佳

崔氏治痢無問冷熱赤白久新并痢溫 劉稷監積年患痢每服此即愈方

阿膠二兩一兩炙入藥一兩銷作清 黃連一兩 乾薑二兩

入黃無食子二枚久痢腸滑甚者量加至三四枚

右四味擣篩為末以醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服二

十五丸日再漸加至二十丸老小者以意斟酌禁如常法一云初冷痢以酒下熱痢以粥飲下出第三卷中

文仲治無問冷熱及五色痢入口即定方

黃連四分 黃蘗 當歸 黃芩各一兩

阿膠二兩炙 熟艾一兩

右六味擣篩爲散以醋二升煮膠烊下藥煮令可丸如大豆飲服七八十丸日二夜一服特宜老人若產婦痢加蒲黃一兩蜜和爲丸神驗出第三卷中

熱毒痢方三首

肘後若下色黃者協毒熱下也療之方

梔子十四枚去皮

右一味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日再服出第二卷中

千金療熱毒痢方

苦參 橘皮 獨活 阿膠炙

藍青 黃連 鬼箭羽一云鬼臼 黃蘗

甘草

右九味等分擣篩以蜜烊膠和併手丸如梧子乾以飲服十丸日三稍加之卒下疰痢者大良出第十五卷中

文仲治熱痢久不差者黃連丸方

黃連末以雞子白和丸如梧子飲服十丸至二十丸日三

熱毒血痢方六首

廣濟療熱毒痢血其痢行數甚數痢出不多腹中刺痛此是熱痢宜生犀角散方

生犀角末 酸石榴皮熬 枳實熬令黃各三兩

右三味各異擣篩爲散以飲服兩三寸七日再差停熱食物

又療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

升麻 地榆 茜根 黃芩各六分

犀角四分 生地黃八分 梔子七枚擘 薤白八分

香豉二合

右九味切以水六升煮取一升五合絞去滓分溫三服日再並出第四卷中

千金大熱毒純血痢瘥不可差者方

黃連六兩

右一味切以水七升煮取二升半夜露著星月下旦空腹頓服之臥將息不差加黃連二兩更作服之仍不差者以疳痢法療之佳忌如常

又療熱毒下黑血五內攪切痛日夜百行氣絕欲死方

黃連一斤 龍骨 白术各二兩 阿膠炙

乾薑　當歸　赤石脂各三兩　附子一兩炮
右八味切以水一斗煮取五升分爲五服余以正觀三年七月十二日忽得此痢至十五日將絕處此藥入口即定　並出第十五卷中
古今錄驗療熱毒下血及豆汁犀角煎方
犀角屑　人參　當歸各三兩　黃連四兩
蜜一合
右五味切以水五升煮取一升去滓內蜜煎三沸分爲三服日三忌同　出第十卷中
文仲治熱毒痢血犀角散方

生犀二兩　石榴皮二兩　黃連三兩　乾薑二兩
地榆二兩
右五味擣篩爲散以米飲服三方寸匕日二服　出第三卷中
赤痢方四首
病源此由腸胃虛弱爲風邪所傷則成痢挾熱熱乘于血則血流滲入腸與痢相雜下故爲赤痢也　出第十七卷中
集驗療下赤痢方
秫米一把　鯽魚鮓一臠細切　薤白一虎口細切
右三味合煮如作粥法啜之　古今錄驗同出第四卷中
千金療赤帶下方
成煎猪膏三合　清酒五合
右二味以緩火煎十沸適寒溫頓服之取差止
又論曰凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹食所食諸食皆須大熟爛爲佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖人不救也　並出第十五卷中
必效療赤痢方
香淡豉半升　黃連一兩
右二味以水一升半淡豉一日處取汁碎黃連薄綿裹豉汁中煎取強半升空腹頓服即止桑泉蘇尉云効　出第二卷中

張氏治赤痢黃連丸方
陳倉米四分　黃連四分　乾薑四分
右三味擣篩爲末緩火炒令色變以內二顆雞子白中和丸如梧子大空腹服五十丸以好無灰酒溫一盞下之至晚痢赤色當變白明旦即差　出第三卷中
久赤痢方二首
病源久赤痢者由體虛熱乘於血血滲腸間故痢赤腸胃虛不平復其熱不退故經久不差胃氣逆則變爲嘔噦也胃虛穀氣衰蟲動侵食則變爲䘌也　出第十七卷中
千金療下赤連年方

地榆 鼠尾草各一兩

右二味切以水二升煮取一升分爲二服如不差取屋塵水盡去滓服一升日二服古今錄驗服屋塵汁一小盃餘同此是徐平方療下血二十年者若不止重服即愈 肘後同

又方

鼠尾草 薔薇根 秦皮用樹皮亦得

右三味等分水淹煎去滓以銅器重釜煎成丸如梧子服五六丸日三稍增差止亦可濃汁服半升 出第十五卷中

卒下血方七首

深師治卒下血晝夜七八行方

黃連 黃蘗各四兩

右二味切以淳苦酒五升煮取一升半分爲二服亦療下痢

又療卒下血蒲黃散方

蒲黃三合 當歸一兩 鹿茸一枚炙

右三味擣篩爲散飲服方寸匕先食日三 並出第一十六卷中

集驗療卒下血不止方

草龍膽一握

右一味切以水五升煮取二升半分爲五服如不差更一服出第四卷中

葛氏療卒下血方

小豆二升

右一味擣碎水三升和絞取汁飲之姚云立止

又方

黃連半兩 黃蘗二兩 梔子二七枚

右三味切以酒二升漬一宿去滓煮三沸頓服之 並出第十六卷中

崔氏治卒下血不止方

竈突中塵一升 黃連五兩 地榆三兩

右三味擣篩爲散飲服方寸匕日再服重者夜一

近効治卒下血不問丈夫婦人立効牛角䚡灰散方

黃牛角䚡一具燒赤色出火細研

右一味爲細散食前濃煮豉汁和二錢匕重者日三服驗

血痢方六首

病源血痢者熱毒乘於血血滲入大腸故也血之隨氣循環經絡通行臟腑當無停積毒熱氣乘之遇腸虛者血滲入於腸腸虛則泄故爲血痢也身熱者死身寒者生診其關上脈芤大便去血暴下血數升也 出第十七卷中

廣濟療血痢黃連丸方

黃連　白龍骨炙　禹餘粮　伏龍肝各八分

代赭研　乾薑各六分

右六味擣篩蜜和丸飲服三十丸如梧子漸加至四十丸差止

又療痢鮮血方

茜根　黃連　地榆各八分　梔子十四枚

薤白切　香豉各八分　犀角屑六分

右七味切以水八升煮取二升分爲三服日再出第四卷中

必効療患熱血痢方

粳米一升研

右一味研碎令米盡取汁可一大升於新瓷瓶中盛取曲嵴密閉頭繫內著井水中令至明飲之傳與人無不差者出第二卷中

古今錄驗療血痢及膿血方

黃連三兩

右一味切以清水三升漬一宿旦煎取一升半去滓分爲二服服令須臾盡文仲同

又療下痢鮮血方

乾地黃　犀角屑　地榆各二兩

右三味擣篩蜜丸如彈子大飲服一丸水一升煎取五合去滓溫服之

又療下血痢地膚散方

地膚五兩　地榆根　黃芩各二兩

右三味擣篩爲散以水服方寸匕日三並出第二卷中

久血痢方三首

病源此由體虛受熱熱折於血血入腸故成血痢熱不歇胃虛不復故痢血久不差多變嘔噦及爲濕䘌出第十七卷中

崔氏療痢血數十年方

石灰三大升炒令黃

右一味以水一斗攪令澄清一服一升三服止出第二卷中

小品療下血連歲不愈方

黃連半斤

右一味擣末以雞子白和爲餅子微火炙令黃黑復擣篩服方寸匕日三有効下清血痿黃失色醫不能療者皆差肘後同

文仲治七八十老人患積痢不斷兼不能飲食方

人參四分　鹿角去皮取白作末炒令黃

右二味擣篩爲散平旦以粥清服方寸匕日再並出第三卷中

蠱注痢方三首

病源此由歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨經脉血氣漸至於藏腑大腸虛者毒氣乘之毒氣挾熱與血相搏則成血痢也毒氣侵食於藏腑如病蠱注之狀痢血雜膿瘀黑有片如雞肝與血雜下是也出第十七卷中

肘後療苦時歲蠱注毒下者方

礬石熬二兩　乾薑　附子炮　黃連各二兩

右四味擣篩爲散以酒服方寸匕日三不止更服

又方

黃連　黃蘗等分

右二味擣末蜜丸如梧子大飲服十丸日四服並出第二卷中

古今錄驗療純痢血如鷄鴨肝并協蠱毒方

苦根　升麻　犀角　桔梗

黃蘗　黃芩各三兩　地榆　蘘荷根各四兩

右八味切以酒三升漬一伏時服一升日一服千金同未差更作出第六卷中

腸蠱痢方一首

病源腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於藏腑下血雜白如病蠱之狀名爲腸蠱也出第十七卷中

肘後凡痢下應先下白後下赤若先下赤後下白爲腸蠱方

牛膝三兩擣碎以酒一升漬經宿每服一兩杯日二三服姚同出第二卷中

膿血痢方七首

病源夫春腸氣在表人運動勞役腠理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流散也其遇大腸虛而血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化爲膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏月多苦膿血痢者腸胃虛也秋冬診其脾脉微濇者爲內潰多下血膿又脉懸絕則死滑大則生脉微小者生實急者死脉沉細虛遲者生數疾大而有熱者死出第十七卷中

肘後療熱病久下痢膿血蘗皮湯方

黃蘗二兩　梔子二十枚　黃連四兩　阿膠炙二兩

右四味切以水六升煮取二升分爲三服又一方加烏梅二十枚文仲同出第二卷中

文仲治熱痢及下黃赤水及黃膿血四肢煩皮上冷者方

黃連八兩　熟艾一兩　黃蘗四兩　黃芩三兩

右四味搗篩爲末以黃臘二兩安一升蜜中煮令消及煖和藥白飲服六七十丸如小豆日二夜一節驗

又久下痢膿血方

赤石脂一斤　烏梅二十枚　乾薑四片　粳米一升

右四味切以水七升煮取令熟藥成服七合日三（肘後同並出第三卷中）

刪繁療下焦熱或痢下膿血赤石脂湯方

赤石脂八兩　烏梅二十枚　梔子十四枚　白朮

蜀椒汗　麻各三兩　乾薑二兩　粟米一升

右八味切以水一斗二升煮米熟去滓取七升下諸藥煮取五合服之（出第四卷中）

備急葛氏云若挾熱者多下赤膿雜血方

黃連　竈突中塵各半兩

右二味末之酒服方寸匕日三服（肘後云以東膏和分作三丸日服一丸姚氏同出第六卷中）

古今錄驗療腸澼溏便膿血乾薑散方

乾薑　黃連　桂心各一分

右三味擣篩服方寸匕若膿中食日三多膿加薑多血加桂有驗

又療中寒下痢膿血附子散方

蜀附子一枚炮　麴　乾薑各三分

右三味下篩為散先食以酒服方寸匕日二并療婦人漏下忌如前並出第三卷中

赤白痢方六首

病源凡痢皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛而入客於腸間腸虛則泄故為痢也然其痢而赤白者是熱乘於血血滲腸內則赤也冷氣入腸搏於腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚腦世謂之魚腦痢也（出第十七卷中）

文仲鹿茸散治青黃白黑魚腦痢日五十行方

鹿茸二分炙　石榴皮二兩　乾薑二分　棗核中人七枚

赤地利一兩燒作灰（肘後云赤葛加二指）

右五味擣篩為散先食飲服方寸匕日三夜一若下數者可五六服（肘後同）

小品卒久赤白不方

燒馬屎一丸作灰分服酒水隨意服巳試良（肘後同）

深師療赤白下者黃連湯方

黃連　黃蘗　乾薑　石榴皮

阿膠各二兩炙　甘草一兩炙

右六味切以水七升煮取二升為三服日再（出第二十六卷中）

延年駐車丸主赤白冷熱痢腹痛方

黃連六兩　乾薑二兩　當歸三兩　阿膠三兩炙

右四味擣篩三年酢八合消膠令鎔和併手丸如大豆以飲服三十丸日再 肘後同出第七卷中

救急療赤白痢無問新舊入口卽斷方

香豉心 豉心謂合豉其中心者熟而且好不是去皮取心勿浪用之

右一味以取豉擣令乾香擣爲末壯年者一大升豉心爲四服小兒量與之 出第九卷中

必効主赤白痢方

黃連二兩 阿膠四片

右二味以好酒二大升合黃連煎十五沸漉出滓然後內膠令烊溫分三服 出第二卷中

久赤白痢方四首

病源久赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不通故噦亦變爲䘌䘌蟲食人五藏也三月九蟲常居人腸胃腸胃虛則動上食於五藏則心懊憹而悶齒斷骨口並生瘡下食於腸則肛門傷爛而穀道開也輕者可治重者致死 出第十七卷中

崔氏馬藺子散療赤白痢腹內疞痛并久水穀痢色白如泔澱悉主之極重者不過三四日必差方

馬藺子一升熬 地榆根皮八分 厚朴八分炙 熟艾八分
赤石脂一升 龍骨十分 茯苓十分 當歸十分

右八味擣篩爲散一服方寸匕加至四五匕日再夜一白飲服 出第三卷中

文仲療赤白痢五六年者方

燒大荆

右一味取瀝服五六合卽差 肘後同

又卒腹痛下赤白數日不絕方

雞子一枚扣頭取黃去白 胡粉末令滿殼燒焦成劑

右二味以酒服之 肘後同並出第三卷中

近効療赤白痢日數十行無問老小方

甘草二兩炙

右一味切以漿水四升煮取一升去滓頓服之

冷痢方六首

必効療冷痢方

取莨菪子熬令變色

右一味擣爲末和臘月猪脂更擣令熟爲丸綿裹如棗許大以內下部因痢出卽更內新者不過三度卽差 出第二卷中

古今錄驗療五痢蒸下痢方

按山榆人通譌誤

苦參三兩　青葙　甘草炙各三兩

右三味切以水四升煮取二升半分三服即愈凡蒸但

服生地黃汁即差

又方

青黛　丁香　黃連各等分

右三味擣篩用消淀和爲丸口中有齋含之若下部有

瘡以綿裹內下部日服五六十丸含之令下差

又方

丁香　麝香別研　石黛　石鹽

山榆人　小蘗皮　桂心　乾薑

青礬石燒　頭髮灰

右十味擣爲散著瘡上乾者和臘月豬膏緩著瘡時行

病後食羊肉及肥膩或酒或房而得久蒸絡變爲痔必

須攻下部不可輕之

又療痔濕𤸶方

青葙　雄黃研　石硫黃研　蕪荑

雷丸各二兩　苦參　狼牙各三兩　藜蘆炮一兩

右八味搗篩爲散取如杏人大內下部中

又療痔濕𤸶神効方

黃連三兩　零陵香一兩半　犀角屑一分　丁香三十枚

麝香一大豆許　牛黃一大豆許

右六味以水洗黃連零陵香丁香澄取清水去滓更以

水添滿九升內黃連零陵丁香犀角煮兩沸然後著牛

黃麝香煎一沸取一升分作三服如一日服不盡二日

服又添師以九升先以一升煮添盡九升取一大升分爲三服並出第十卷中

久痔𤸶及久𤸶成痔方九首

廣濟療久患痔𤸶不差兀子礬散方

兀子礬燒八分　麝香研二分　吳白礬燒六分　雲母粉五分

桂心二分　龍骨六分　無食子燒七顆　黃連八分

右八味擣篩爲散空腹以生姜汁和三錢七服日再煮

蘗湯下

又療積年痔𤸶羸瘦面色痿黃方

石硫黃研　黃連各一兩　艾一兩　蜜一升

右四味以水二升先煮黃連艾取半升後內石硫黃末

更煮三五沸即絞去滓又內蜜更煮三五沸下分爲三

服並出第四卷中

必効療積久𤸶成痔灌方

楞根一握淨洗刮白皮擣絞取汁三合取時勿令見風　麻子脂二合燒如皁脂

酢泔淀一合　椒四分汗　豉二合

右五味以水大升取椒豉和煎絞取汁二升和楞汁麻

油泔淀等三味分為兩分用一分灌隔一日更取餘者
復灌其藥欲用時溫溫即得
又療痢初較後膿血或變純白或成魚腦五十日以上或
一二年不差變成𤸷所下如泔淀方
生羊肝一具
右一味取大酢一年以上者米麥並中年深者佳取羊
肝則去上膜柳葉切朝旦空腹取肝手拈取酢中出吞
之覺心悶則止不悶還服之一日之間能不食尚飯盡
一具羊肝者大佳不然除飽吞已外料理如生肝以韲
蒜下飯如常法食之日食一具所不過二三具即永差

後一月不得食熱麪油膩餳猪魚雞肉等
又療𤸷痢久不差羸瘦著床欲死方
新出羊糞一升
右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之極重者不
過三服
又療𤸷法丈夫婦人小兒久痢百方療不能差此方最効
丁香 麝香 黃連各等分
右三味擣篩為散以杏核大取竹筒吹入下部小兒取
棗子量力減之不過三四廻差積年久𤸷痢不差蔡光
州云常用奇効備急同並第三卷中

又療久痢變成𤸷下部瘡生惡瘡惡寒壯熱者方
桃白皮切一升 槐白皮一升 苦參切五合
艾 大棗十枚
右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽棗許大攪
令勻取二升灌下部餘三分服
近効新附療久痢及𤸷痢諸方不差者此方必効
楝樗根白皮不拘多少當取時不宜見雞及風
右一味細切擣如泥取細麪捻作餛飩如小棗勿令破
熟煮吞七枚重者不過七八服皆空腹服之
又𤸷痢晝夜無度者方

取樗根濃汁一雞子殼許
右一味以和粟米泔一雞子殼許灌下部再度即差其
驗若神小孩兒減半用之晉人稽珍錄上
數十年痢方一十一首
千金療下痢丸主數十年痢下下氣消穀令人能食夏月
長將服之令人不霍亂方
黃連 黃蘗 桂心 大麥蘗一升半
乾薑各三兩 吳茱萸四兩 蜀椒汗半兩 麴一升熬令
烏梅二升半
右九味擣篩蜜和食已飲服如梧子十丸日三服至二

十丸亦可至三十丸
又療數十年下痢消穀下氣補虛烏梅肉丸方
麴 好者一升炒　附子 炮二兩　大麥蘗 一升炒　當歸 三兩
桂心 三兩　黃連　吳茱萸　烏梅肉
乾薑 各四兩　蜀椒 一兩汗
右十味擣篩蜜和丸如梧子食已飲服十丸日三
又四續丸主三十年注痢骨立萎黃腸滑不瘥方
雲實 五合　蠟 五兩白者　附子 炮二兩　女萎 三兩
龍骨 二兩
右五味擣篩為末以蠟煎烊以丸藥如梧子飲服五丸

日三不過五六服必差其雲實熬令香 千金名腸熱丸
又療三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢沉
重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦轉筋起止須
人扶除冷無子椒艾丸方
赤石脂 二兩別末　熟艾 一升　乾薑 三兩　蜀椒 三百枚汗
烏梅 三百枚醋漬一宿取肉
右五味先擣篩薑椒為末將熟艾梅肉著一斛酒飯下
蒸令飯熟內乾薑椒末赤石脂末合擣三千杵蜜和丸
如梧子飲服十丸日三不差至二十丸加黃連一升艾
乙斤

又療三十年痢不止方
厚朴 炙　乾薑　阿膠 炙各二兩　黃連 五兩
石榴皮　艾葉 各三兩
右六味切以水七升煮取二升分再服
又療積久三十年常下神効方
赤松木皮 去上蒼皮二斗
右一味為散麪粥和一升服之日三即止不過服一斗
永差秘方三十年痢百日服差良 並出第十五卷中
古今錄驗療三十年寒下及霍亂諸藥所不能療并腸滑
若是蟲疰所中方

麥子　艾屑 各一升　龍膽　續斷
白朮 各三兩　蜀椒 汗　附子 炮　桂心
苦參　乾薑　甘草 炙　鼠尾草 各二兩
右十二味擣篩蜜和一歲兒服一丸如梧子三歲兒服
二丸五歲兒服三丸大人服五丸飲下療寒熱氣偏偏
在胸中卒氣痛繞臍神良
廩丘公療下痢三十年方
茯苓　乾薑　黃連 等分
右三味擣篩為散蜜和丸如梧子飲服之一日漸增至
百丸若痢劇者加龍骨附子炮等分一服十丸漸增之

以知爲度

又當歸湯療二十年下痢止諸痛方

當歸一兩 生薑八兩 大棗二十枚

右三味以水四升煮取一升半分作三服不差復作之

又云吾患痢三十餘年諸療無効唯服此方得愈也安石榴湯療大注痢及白滯困篤欲死腸已滑醫所不能療方

乾薑二兩生薑倍之 黃蘗一兩細切 石榴一枚小者二枚 阿膠二兩別研漬之

右四味切以水三升煮取一升二合去滓內膠令烊頓服不差復作療老小亦良人羸者稍稍服之不必頓盡須臾復服石榴須預取之 肘後同一方無黃蘗用黃連 並出第二卷中

又深師療久痢方

龍骨 赤石脂 蕪荑子各六分 地榆二分

熟艾三月者熬三分 橡子 黃蘗各五分

右七味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲服四十五十丸日二服稍加至六十丸

休息痢方五首

病源休息痢者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故爲痢也冷熱氣調其飲則靜而痢亦休也腸胃虛弱易爲冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍發乍止謂之休息痢也 出第十七卷中

謹按前有擣骨灰此云大棗不下行骨前云牛骨灰得或者數皆是可

肘後療休息痢方

黃連切 龍骨如鴨子大一枚 膠如掌大炙 熟艾一把

右四味水五升煮三物取二升去滓乃內膠膠烊分再服又煮乾艾葉亦佳又當煮恐冬米和作飲飲之

又方

乾地榆一斤 附子一兩炮

右二味以酒一斗漬五宿飲一升日三服盡更作

又方

龍骨四兩

右一味擣如小豆以水五升煮取二升半冷之分爲五服又以米飲和爲丸服十丸 文仲同並出第一卷中

文仲葛氏若久下經時不愈者此名爲休息下療之方

取大骨

右一味炙令黃焦擣篩飲服方寸匕日三愈 肘後備急同

胡洽麴蘗丸療數十年休息痢下不能食消穀下氣療虛羸方

麥蘗炒 麴炒各一升 附子炮 桂心

烏梅肉各二兩 人參 茯苓各四兩

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子食前飲服十丸日三稍稍增之 肘後備急同並出第三卷中

腹肚不調痢一首

廣濟療冷熱不調痢臘水方

人參　乾薑　枳實炙各四分　厚朴炙

龍骨　赤石脂　黃連　苦參各六分

黃芩五分

右九味擣篩蜜丸空腹以飲服如大豆十五丸日二漸加出第二卷中

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

集驗結腸丸療熱毒下不斷不問久新悉療之方

苦參　橘皮　獨活　阿膠炙

芍藥　乾薑　黃蘗　甘草炙

鬼臼各四分

右九味擣篩蜜與膠共烊以和丸併手捻作丸如梧子暴燥以飲服十九日三不知稍加此方亦療諸疰下及卒下悉効

又禪脾丸療脾滑胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞痛方

附子炮一兩　蜀椒汗一兩　桂心二兩　赤石脂

黃連　人參　乾薑　茯苓

大麥蘖　陳麴炒　石斛　當歸各二兩

鍾乳三兩研

右十三味擣篩蜜和以酒服十九如梧子日三稍稍加之出第四卷中

文仲療五勞及飽食房室傷胃令人大便數至溷而不能便日數十行劇者下血并婦人產後餘疾腹絞痛方

附子一枚炮

右一味以猪脂如雞子黃大煎附子裂爲候削去上黑皮擣篩蜜和丸先食服如大豆三丸日三稍加可至十丸當長服之永不痢出第三卷中

下焦虛寒及遠血近血方二首

崔氏療下焦寒損或先見血後便此爲遠血或痢不痢伏龍肝湯方

伏龍肝五合末　甘草一兩炙　乾地黃五兩　燒髮灰二合

黃芩　牛膝　乾薑　生榭皮

阿膠各二兩炙

右九味切以水七升煮七物取三升去滓下阿膠更煎取烊乃下髮分作三服

又療下焦虛寒損或前便轉後見血此爲近血或痢下或不痢好因勞冷而發續斷湯方

續斷　當歸　桔梗　阿膠炙

桂心三兩炙　乾薑　乾地黃　芎藭各四兩
蒲黃一升　甘草二兩炙
右十味切以水九升煑八物取三升五合去滓下阿膠更烊膠取沸下蒲黃分爲三服並出第四卷中
下痢食完出及上入下出方一首
范汪溫中湯療寒下食完出方
甘草炙　乾薑各三兩　蜀椒八十枚汗　附子一枚炮
右四味切以水二升煑取一升分爲再服若嘔內橘皮半兩小與老皆取服之良出第十五卷中
下痢腸滑方三首

范汪苦酒白丸療赤白滯下腸已滑日數十行者方
女萎　半夏各二兩洗　附子炮　藜蘆各一兩炙去頭
右四味擣合下篩和以十年苦酒頓丸如梧子若有下者飲服三丸日三不知稍稍增之出第十五卷中
集驗療下痢腸滑飲食及服藥皆完出猪肝丸方
猪肝一斤煑熬乾　黃連　阿膠炙　烏梅肉各二兩熬
胡粉七棊子
右五味擣下篩蜜和酒服十五丸如梧子日三稍加亦可散服中蜀氏文仲明務同肘後云亦可散服出第四卷中
千金療下痢絞痛腸滑不可差方

黃連六兩　阿膠　鼠尾草　當歸
乾薑各三兩
右五味切以酒七升煑取三升去滓溫分三服若熱不絞痛去乾薑加當歸以水煑之出第十五卷中
大注痢及赤白困篤腸滑方二首
深師卒大注痢及赤白滯下困篤欲死腸已滑方
乾薑二兩生　黃蘗者焙　石榴皮各一兩　阿膠二兩炙
淡豉一升　前胡四兩
右六味切以水三升煑取三合去滓內膠頓服不差更作無毒宜老小羸人稍稍服之此湯兼療傷寒大下及赤白困篤亦皆主之出第二十六卷中

范汪療得痢疾勞服藥不愈因作腸滑下痢膿血日數十行後中絞痛身熱如火頭痛如破其脉如瘤方
黃連四兩　苦參二兩　阿膠一兩
右三味㕮咀以水一斗煑取二升去滓適寒溫服一合日三少少益至半升服湯盡者復合以愈爲度曾試驗
古今錄驗同
痢兼渴方二首
病源夫水穀之精化爲血氣津液以養藏腑藏腑虛受風邪邪人於腸胃故痢痢則津液空竭藏腑虛燥故痢而兼

渴也渴而引飲卽痢不止翻溢水氣脾胃已虛不能尅消水水氣流溢浸漬肌肉則變成腫也 出第十七卷中

必効療痢兼渴方

麥門冬 三兩去心 烏梅 二大枚

右二味以水一大升煮取强半絞去滓待冷細細啜之卽定仍含之 出第二卷中

古今錄驗療熱渴痢方

冬瓜 一枚

右一味以黃土厚一尺火炮熟納以水爛去土淨洗絞取服之

許仁則痢方七首

許仁則云此病有數種有水痢有穀痢有血痢有膿痢有膿血相和痢者有腸澼痢其水痢者本由脾氣熱消穀作水穀氣不得消便生此痢穀痢者由脾氣冷穀氣不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入腸致有此痢膿痢者由積冷所致膿血相和痢者由冷熱相擊便致此痢腸澼痢者由積冷在腸腸間垢涕不能自固便有此痢色數雖多其源則一皆緣飲食不節將息失宜也

又水痢之候心腹甚痛食無妨但食後卽痢食皆化盡唯變作水穀無期度多食多下少食少下有此候者宜依後黃芩等五味散服之方

黃芩 黃連 黃蘗 各五兩 黃耆 四兩

龍骨 六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸七日二服稍稍加至二三七服差乃止

又穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每過冷便發有此疾候者宜依後附子等五味散主之方

附子 炮 細辛 白朮 各五兩 乾薑 四兩

神麴 一升

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸七日再服稍稍

加至二三七良

又血痢之候小腹絞痛無期度食不住如水但兼血而下有此患者宜依後方

犀角五味散方

生犀角 末五兩 阿膠 炙四兩 黃蘗 四兩 艾葉

乾薑 各三兩一作乾桑

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸七日再服稍稍加至二三七良

又膿痢之候腹亦刺痛食亦不大稀但大便兼膿過冷而劇有此候者宜依後神麴等五味散服之良

麴末一升　乾薑六兩　丁香　豆蔻各四兩
高良薑五兩
右藥搗篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍
加至二三七良
又腹血相和痢候食不甚稀每上膿血與食相兼腹亦小
痛有此候者宜依後黃耆等五味散服之方
黃耆六兩　赤石脂八兩　厚朴炙五兩　乾薑
艾葉炙各二兩
右藥搗篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍
加至二三七良

又腸滑痢候食稀或痢便但似膿每便極滑痢有常期有
如此者宜依後豆蔻子等八味散服之方
豆蔻子　丁香各三兩　細辛　附子炮
乾薑各四兩　人參　黃耆各五兩　赤石脂六兩
右藥搗篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再稍稍加
至二三七良
又前件諸痢患無新舊如雜療之雙差還發此即縱以新
藥止之終存其根本由腸胃中冷熱不調痢根固結必須
湯藥滌之以洩痢勢痢後更以藥物補助之有此候者宜
依後附子等六味湯以利之後服高良薑十味散以補之
方
附子炮　細辛　甘草炙　人參各二兩
乾薑三兩　大黃五兩別浸
右藥切以水七升煮取二升四合去滓分溫三服服如
人行十里久一服此湯當得快利利中有惡物如魚腦
狀或如桃李但異於常利勿怪之將息經三四日宜合
後高良薑等十味散服之方
高良薑　細辛　黃耆　白朮
苦參各五兩　丁香二兩　人參　乾薑炮各四兩
豆蔻子二兩　赤石脂六兩

右藥搗篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服之稍
稍加至二三七　並出上卷中

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔
校勘

唐王燾先生外臺秘要方第二十五卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十六卷目録 痔病陰病九蟲等三十五門

五痔方一十二首
五痔數年不差方六首
五痔脫肛方二首
腸痔方一十五首
諸痔方二十八首
痔下部如蟲齧方九首
大便下血風冷積年變作痔方三首
灸痔方二首
雜療痔方五首
脫肛方三首
肛門凸出方三首
卒大便脫肛方六首
腸肛俱出方二首
脫肛歷年不愈方三首
疝氣及㿗方六首
卒病㿗方五首
㿗卵偏大方三首
灸諸㿗法一十四首
陰㿉方六首

陰病腫縮方一首
陰卒腫痛方三首
陰㿗腫痛方五首
陰下痒濕方七首
陰痛方三首
陰瘡方七首
陰邊粟瘡方五首
著硇砂方四首
九蟲方一首
五藏蟲方七首
長蟲方二首
蚘蟲方九首
寸白蟲方一十九首
蟯蟲方六首
三蟲方六首
雜療蟲方三首

唐王燾先生外臺秘要方第二十六卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

五痔方一十二首

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血出者名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不爲患久久不差終

能困人別有大方今單行亦要便宜依狀用之肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方

生猬皮五分 皂角二兩炙去皮子 麝香研 鰻鱺魚炙

雄黃研 莨菪熬 丁香 木香各二分

右八味擣篩以猬皮和丸分爲五丸取一竅瓶可一升以來掘地埋之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內火瓶中灰蓋之然後內藥一丸燒以下部著疊孔上坐便通汗其盡一丸藥即止內痔以藥一丸內下部立効仍不

及熏忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方

蝟皮炙 鼈甲炙 當歸各六分 黃耆

槐子 大黃各八分 蛇皮五寸炙 露蜂房五分炙

藁本 桂心各五分 猪後懸蹄甲十四枚炙

右十一味擣爲散空腹以米飲服方寸七日二漸加一七半不利忌如前方

又療五痔下血不止方

槐子 五色龍骨 槲葉炙令紫色 乾薑

芎藭 當歸 茜根 吳茱萸各六分

白斂 附子五分炮 黃耆八分 大黃十分

猪懸蹄甲十四枚炙 髮灰四分

右十四味擣篩蜜丸空腹以飲服如梧子二十丸日二漸加至四十丸若利恐多以意減之忌如前方出第四卷中

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居血縱橫出方

赤小豆四分熬 黃耆三分 附子炮 白斂

桂心各一分 芍藥 黃芩各二分

右七味擣爲散以酒服方寸七日三止血大驗文仲備急集驗同

又方

藜蘆　大黄　黄連各半兩　楝木子十四枚

桃人十四枚去皮　巴豆四枚去皮心　草麻十四枚一名狗蜱

右七味㕮咀以猪肪一升煎三沸下去滓傅瘡內上日三外著此瘡內服紫參丸當併行　古今錄驗同

又療五痔大便肛邊清血出紫參丸療不差服之無不差方

紫參　秦艽　亂髮灰　紫菀

厚朴炙已上各一兩　藁本二兩　雷丸半升　白芷一兩

䗪蟲半兩熬　貫衆三兩去毛　猪後懸蹄甲十四枚炙

虻蟲半兩去翅足熬　石南半兩炙

右十三味擣篩以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和丸如梧子未食酒服十五丸日再亦可飲下劇者夜一服四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十日終身不復發久服益善有痔病十八年肛出長三寸服此方即愈亦療脫肛有人數可除羊髓以赤蜜代　集驗備急千金同

集驗療五痔有氣痔温寒濕勞即發蛇蚘皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鼈甲主之牝痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮主之腸痔更衣挺出久乃縮牡猪左懸蹄甲主之脈痔更衣出清血蜂房主之方

右所主藥皆研篩等分隨病倍其所主藥爲三分旦早以非花水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服難得食乾白肉病差之後百日乃近房室又用藥內下部有瘡內中無瘡內孔中　千金胡洽文仲同

又方

野葛末

右一味以刀圭內藥中服五日加二十日差三十日愈　徐安用之良千金同

又方

煮槐根洗之又煮桃根洗之　千金備急同　並出第九卷中

刪繁療五痔桃葉蒸痔方

桃葉一斛　細糠　胡麻各一斗熬

右二味合爲一家蒸之取細糠熟爲度內小口甕中將肛門坐桃葉氣熏入肛門蟲出當死　出第十七卷中

千金療五痔方

蝟皮三指大切　熏黄如棗大　熟艾一握

右三味穿地作坑調和取便燒之取口中熏黄煙氣出爲佳火氣消盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補慎猪雞魚生冷

又方

桑耳

右一味作羹空腹下飯飽食之三日食之待孔卒痛如鳥啄取大豆小豆各一升合擣作兩囊中蒸之及熱更互坐之即差 並出第二十四卷中

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄病若痒負乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中痛痒者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之即發方

槐子　乾漆熬　榝木根皮各四兩即茱萸一名榝子

秦艽　黃芩　白斂　青木香

牡蠣熬　龍骨　附子炮八角者　雷丸

蒺藜子　白芷　桂心　雞舌香各二兩

黃耆二兩

右十六味擣篩蜜和爲丸一服二十丸日三服 千金同千金具有丁香茱萸根皮無雞舌香榝木根皮

千金小槐實丸主五痔十年方

槐子三斤　龍骨十兩　礬石燒　硫黃各一斤

白糖二斤　大黃十兩　乾漆十兩熬

右七味擣篩石二種及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁以和藥合作丸併手捻之丸如梧子

大陰乾一服二十丸日三服 深師同

又槐酒主五痔五十年不差方

槐東南枝一石細剉　槐東南根三石細剉

槐白皮細剉一石　槐子一石

右四味大釜以水十六石煮取五石澄取清更煎取一石六斗炊兩石黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲日三四適寒溫量性常令小小醉耳合時更煮滓取汁淘米洗器不得用生水此藥忌生水故也 深師并翼同

又方

塗熊膽取差乃止但發即塗一切方皆不及此 救急并翼同 並出第二十四卷中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生孔橫肛中此牡痔肛邊生乳此牝痔皆飽勞氣所生方

大黃如金色者十兩　滑石七兩研　芒硝二兩　桑白皮二兩

棗三十枚　黃芩五兩　杏人二兩研

右七味切以酒一斗二升煮取二升盡服之當下

又療十年痔如鼠乳膿出便作血刺白斂散方

赤小豆四分　黃耆三分　芍藥二分　白斂二分

黃芩三分　桂心三分　附子炮　牡蠣各二分熬

處指藁草月須作藁陛

右八味擣篩爲散酒若泔汁服方寸匕日三服並出第三十卷中

五痔脫肛方二首

千金療五痔脫肛槐皮膏止痛痒血出方

槐白皮二兩 薰草 辛夷 甘草 白芷各半兩 野葛六銖 巴豆七枚去皮 漆子十枚 桃人十枚去皮 豬脂半斤

右十味切以豬脂煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死差止痒痛大佳出第二十四卷中

必効五痔脫肛方

以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出張文仲處出第六卷中

腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每大便常有血方

以蒲黃水服方寸匕日三差備急文仲崔氏千金古今錄驗同

又方

礬石熬 附子炮各一兩

右二味擣篩蜜丸如梧子服二丸酒下日三稍增百日永差不發備急文仲崔氏千金同

又方

以鯉魚作鱠薑虀食之任性多少良崔氏用常也

又方

常食鯽魚羮及熟隨意任之備急文仲同並出第二卷中

文仲療腸痔方

以槐木上耳擣末飲服方寸匕日三肘後古今錄千金同

又方

白蕎薇根 枸杞根各二分

右二味擣篩爲末服方寸匕日三五六日當更小膿是中病崔氏備急肘後同

又方

生地黃切一斤 酒二斗

右二味以酒漬地黃三日隨意飲多少即差肘後備急同

又方

取枳根皮末飲服方寸匕日三亦可煮汁常飲肘後備急崔氏皆同

備急療腸痔方

以穀子燒末傅之深者導之文仲崔氏同

又方

以槐白皮一擔剉水煮令濃脫衣入中坐當如欲大便狀冷更易不過三蟲出

又方

搗栢白皮作屑粉以導之崔氏文仲千金必効同

又方

以藥蔓燒灰礬石熬和爲粉粉之崔氏文仲范汪同出第六卷中

刪繁療肺虛勞寒損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而療生豬懸蹄青龍五生膏方

豬懸蹄甲三枚炙　生梧桐白皮四兩　生龍膽五分

生桑白皮五分　蛇蛻皮五分　雄黃五分

朱青竹皮六分　生栢皮七分炙　露蜂房炙

蜀椒汗各三分　猬皮　附子炮各四分

杏人二十枚去皮

右十三味細切綿裹以苦酒二升浸一宿於火上炙乾搗篩以豬脂三升和微火煎之如薄糖酒服如棗核出第七卷中

崔氏療大便後出血此腸痔之疾宜服薤白湯方

薤白切七合　羊腎脂一斤

右二味緩火煎令薤白黃去滓頓盡未差更服即止得膿血與糞相和即差

又方

白礬燒汁盡　附子炮去皮　乾姜各一兩

右三味搗篩蜜和飲服二丸至三丸日二服並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方

以蛇不問多少煎煮肉消盡去滓用汁和麥羅粥著少鹽食之大効一無所忌

又黃耆丸方

黃耆　枳實炙各三兩　烏蛇炙　當歸

赤石脂各二兩　猬皮二兩炙

右六味搗篩蜜丸空腹酒下如梧子二十丸日二服更不加減並出第四卷中

范汪療痔下血黃連散方

黃連二兩　蒲黃一兩

右二味搗篩爲散空腹先食以飲服五分匕日三不知增至方寸匕

集驗療痔猬皮丸方

槐子三兩　附子二兩炮　當歸二兩　連翹二兩

乾地黃五兩　乾姜二兩　礬石二兩燒令汁盡　續斷

黃耆各一兩　猬皮一具炙令焦細切

右十味搗篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加至三十丸亦可主瘻常用大驗肘後備急文仲刪繁千金古今錄驗同

又方
以生槐皮十兩削去黑皮熟擣丸如彈子綿裹內下部中大効備急千金同
又方
以槐赤雞一斤爲散飲服方寸匕千金云提檽也
千金療痔神方
以七月七日多採槐子熟擣涎取汁重綿絞內銅器中盛庭中高門上暴之二十日以上煎成取如鼠矢大內穀道中日三亦主瘻及百種瘡救急崔氏古今錄驗同

又方
鯉魚腸三具以火炙令香
右一味以綿裹內下部中一食頃蟲當出魚腸數數易之盡數枚當差一方云坐上蟲出古今錄驗同
又方
虎頭骨炙 犀角
右二味各爲末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上即差救急深師同並出第二十四卷中
崔氏療痔方
雀林草一大握粗切
右一味以水二大升煮取一升頓服盡三日重作一劑

無不差者
又方
取驢駞頷下毛燒作灰可取半雞子大酒和頓服之並出第四卷中
必効殺痔法痔頭出或疼痛不可堪忍方
取枳實爐灰中煨之及熱熨病上盡七枚立定發即熨之永除也
又方
以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人著亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方
以野猪肉炙食十頓即差三方云亦有効
又方
取五月五日蒼耳子陰乾擣末水服三方寸匕日三差乃止
又方
以二十年久鹹線袋口燒作灰分和水服
又療正發疼痛方
以蔥和鬚濃煮湯置盆中坐浸之須臾即當痛止
又方

以狸肉作羹食之或作脯食之不過三頓無不差

又方

以肥大棗一顆剝去赤皮取水銀掌中以唾研令極熟塗棗瓤上內下部中

又方

以萹蓄根葉擣汁服一升一兩服差

又方

萹蓄二兩

右一味以水三大合煑之取一合去滓煖空腹服隔日再服忌猪肉蒜等

又方

倚死竹色黑者取之折斷燒為灰篩和粥飲服之方寸匕忌牛肉餘無所忌出第三卷中

古今錄驗療痔黃耆丸方是直殿中省散騎常侍郎甄立言處

黃耆 青葙子 漏蘆 鱉甲炙

狼牙各五分 黃蘗四分 犀角屑八分 斑猫去足翅熬

蝟皮炙四分 白礬十分燒去汁 芫青去足翅熬 地膽去足翅熬

蜈蚣各十枚炙 猪懸蹄甲七枚炙

右十四味擣篩為散蜜和丸如梧子大空腹以飲服二丸日二增之以知為度忌一切油膩莧菜

又方

掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以魚簎著口上取莨菪子一合內坑中燒煙出痔人坐上以被擁當汗出密室內作之以煙盡更著一合莨菪子熏避風如發汗法則差

又療諸痔及下血不止轉虛羸者服之無不效方

黃耆 枳實各二大兩半細剉熬令黃

黃礬石一大兩炭火燒經一伏時仍數留轉令勻著火令乾細羅去滓滓

右三味先擣黃耆枳實篩訖然後和礬石更擣勻蜜和丸空腹以酒下二十丸加至三十丸日再服忌蒜麪猪

肉菜魚勞事雖久服一年半年愈良驗

又療痔方

鯉魚腸可半斤

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可闊二尺以來厚二寸當中鑿孔深一寸半闊如酒盞口大布魚腸于其內以好麝香碎末滲魚腸取厚薄二三重當心開孔可拔孔大小鋪坐以被擁之數進食可至兩炊久覺下部痛者即是蟲出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入於腸中蟲可長一二寸許細如細絲斑作五色無出不過十餘枚不問度數蟲盡則止

許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即有血外有異外痔下部有孔每出血從孔中出內痔每便即有血下血甚者下血擊地成孔出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥方

生槐子 一斗候未[illegible]

右一味擣令碎絞取汁[illegible]取地膽曝乾擣篩爲散和槐子煎作丸以飲服十丸日再加至二十丸如梧子大兼以煎摻作丸如棗核大內下部中日夜三四度亦可擣苦參末代地膽

依前生槐子煎不覺可宜合後黃耆十味散服之方

黃耆 五兩 苦參 玄參 各六兩 附子 炮

大黃 各三兩 乾姜 二兩 蝟皮 二兩炙 黃連 各四兩

槐子 六合 猪懸蹄甲 一具炙

右藥擣篩爲散空腹以飲服方寸匕日再服之漸漸加至二七忌猪肉冷水 出下卷中

痔下部如蟲齧方九首

肘後療痔下部痒痛如蟲齧方

胡粉 水銀

右二味以棗膏調勻綿裹夜臥內穀中導之效 崔氏[illegible]

又方

以菟絲子熬令黃黑末以雞子黄和塗之 集驗文仲備急范汪崔氏等同

又方

以杏人熬令黑擣取膏塗之 集驗備急文仲崔氏同

又方

以蝟皮燒灰傅之又獺肝燒擣散服之 崔氏備急文仲同

又方

以鹽湿令熱內少礬石以洗之良 崔氏同並出第二卷中

文仲療痔下部如蟲齧方

擣桃葉一斛蒸之令熱內小口器中以布蓋上坐之

蟲死即差 肘後崔氏備急同一方有烏梅

又方

掘地作小坑燒令赤以酒沃中擣吳茱萸三升內中及熱以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃下不過三度即差 肘後崔氏備急同

又方

以小豆一升好苦酒五升煮豆令熟出暴乾復內令酒盡止擣末以酒服方寸匕日三 崔氏備急同

又方

以猪椒子一升酒一升漬經五日稍稍飲一日令盡

佳崔氏則出第六卷中

大便下血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合而少血色此是內傷風冷積年多變作痔方

大黃三分　甘遂三分　黃芩二分　乾姜　附子各四分炮　桃人三七枚去皮尖　葱白七莖

右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半升須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忌猪肉等

又方

煮槐皮李皮篇蓄苦參取汁漬之大佳出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方

燒稻藁灰淋汁煎熱漬之三五度佳崔氏肘後文仲同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法

以繩圍病者項令兩頭相拄展繩從大椎正中量之盡繩一頭當脊正下以墨點訖又量病者口兩吻頭接繩頭正下復點之又量病者口吻如前便中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使相當所三處正下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法

令疾者平坐解衣以繩當脊大橛骨中向下量至尾株骨尖頭訖再折繩更從尾株尖頭向上量當繩頭正下即點之高琥州初灸至一百壯得差後三年再發又灸之便斷並療腰脚並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻痛疼方

先明砂別研　麝香當門子別研　蛇皮五月五日者熬

右三味等分研先以鹽湯洗拭乾於瘡上傅少許以散傅上差止

小品痔發道中痒痛痔瘡槐皮膏方

槐皮五兩　甘草　當歸　白芷各二兩　豉　桃人各五十枚去皮　赤小豆二合

右七味以猪脂二升煎候白芷黃膏成去滓以塗之日三度集驗同

刪繁療虛勞寒下痢不止肛邊轉生肉如鼠乳在大孔邊時時膿出名牡痔鼈甲丸方

鼈甲炙　乾地黃　黃連　蓮翹各七分　括樓　黃耆　乾姜各六分　蟒蟲五枚炙　猬皮炙　續斷各五分　附子炮　槐子

礬石燒汁盡各四分

右十三味擣篩以蜜丸如梧桐大飲下二十丸漸加至三十丸日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎臟病所爲酒痔肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房三兩炙　生槐白皮十兩鍊皮　桃人各五十枚熬

白芷二兩　赤小豆一合　豬膏一升

右七味以粗綿裹以苦酒一升漬一宿下豬膏煎取酒盡膏成去滓取杏子大綿裹內肛門中又酒服一方寸七出第三卷中

必効療痔及諸𧏾方

石榴東引根深者取一握

右一味勿令見風拭去土挫又取鹿脯四指大一片炙兩畔令熟搥碎擘以水三升煮取一升適寒溫空腹頓服之其患痔盛發者服即定諸𧏾無問赤白並出差出第三卷中

脫肛方三首

病源脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所爲肛門爲大腸之候大腸虛而傷於寒痢而用氣㖡而氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也出第十七卷中

小品療脫肛蒸方

以女萎一升以器中燒坐上熏肛門即愈范汪集驗千金同出第十卷中

刪繁論曰肛者主大便道肺大腸合也號爲通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸二分應十二時若臟傷熱即肛閉塞大便不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛寒大便洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之不虛不實依經調之

療肛門主肺熱應肛門閉塞大便不通腫縮白蜜兌通之方

以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得丸長六七寸許兌肛門中到身中向上入頭向下停少時兌烊斯須即通泄千金同出第三卷中

千金療肛出方

磁石四兩研　桂心一尺　蝟皮一枚炙黃

右三味擣爲散服方寸七一日服十服即縮勿舉重須斷房室周年乃佳出第二十五卷中

肛門凸出方三首

刪繁療肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出豬肝散方

豬肝一斤炙令燥　黃連　阿膠炙　芎藭各二兩

烏梅肉熬 五兩 艾葉熬 一兩

右六味擣篩平旦空腹溫服方寸匕日再若不能酒白飲服亦得 千金同出第三卷中

千金肛門凸出壁土散方

故屋東壁土一升碎研 皂莢三挺長者

右擣上為散以粉肛門其頭出處取皂莢炙暖更遞熨之取入則止

又麻履底按入方

麻履底 鱉頭一枚

右二味燒鱉頭為散敷肛門凸出頭炙履底以按熨令

人承不出矣 並出第二十五卷中

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方

灸頂上迴髮中百壯

又方

以豆醬清合酒塗之 文仲備急同

又方

燒虎骨末水服方寸匕日三即差

范汪療卒大便脫肛方

以絡桑牧螺取燒末豬脂和敷之立縮亦可末以粉

之 備急張文仲同出第三卷中

千金療卒大便脫肛方

以豬膏和蒲黃敷之指推內之但以粉粉之亦佳 張文仲備急同

又方

灸龜尾骨上七壯 備急文仲集驗同出第二十五卷中

腸肛俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方

擣生栝樓取汁溫服之以豬肉汁洗手隨抑按自得入効 范汪小品張文仲備急千金同

備急若腸隨肛出方

燒石灰令熱布裹熨之隨按令入冷即易 小品文仲備急同出第八卷中

脫肛歷年不愈方三首

集驗療脫肛歷年不愈方

以生鐵三斤以水一斗煮取五升以洗之日再 千金范汪備急文仲同出第六卷中

千金療脫肛歷年不愈方

以死鼈頭一枚燒令煙盡作屑以敷肛門上手按之令入兼灸龜尾骨七壯

又方

以鐵精粉上按令入即愈（並出第二十五卷中）

疝氣及癩方六首

廣濟療疝氣核腫疼方

黃耆　桃人（去尖皮熬）　山茱萸　五加皮

檳榔人（各八分）　牛膝（六分）　茯苓（六分）　蓯蓉（八分）

五味子（十分）　人參　續斷（各六分）　桂心（八分）

遠志（去心）　石南（各五分）　海藻（洗八分）　玄參（十分）

枳實（炙）　龍骨（八分）　蒺藜子（二十分熬）

右十九味擣篩蜜丸如梧子大酒服二十丸日二漸加至四十丸

又療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊壓痒狐陰丸方

狐陰（一枚炙）　木香　蒺藜子　腽肭臍

昆布（各六分）　牛膝　菟絲子（各八分酒漬）

桃人（去尖皮熬）　石斛（各十分）　檳榔人（十枚）

右十味擣篩蜜和丸如梧子大空腹以酒下二十丸至三十丸日再服忌蒸麪蕎麥猪魚粘食等物（並出第六卷中）

集驗療癩方

取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煮令極熱以故布乾掩腫處取柳枝更互拄之如此取差止（文仲備急）

千金同（通按共首 王刻出）

千金療癩方

牡丹（二兩）　海藻（二兩洗）　狐陰（一具炙）　地膚子（二兩）

茯苓（二兩）　五味子（二兩）　芍藥（二兩）　橘皮（去二兩）

蜘蛛（五十個熬）　防葵（二兩）　細辛（二兩）　蒺藜子（二兩）

桂心（二兩）　澤瀉（一兩）　桃人（五十枚去皮尖熬）

右十五味下篩蜜和服十丸如梧子大稍加至二十丸

忌胡荽生葱生菜酢物（出第二十五卷中）

備急療癩方

以桃人擣敷之亦療婦人陰腫乾即易（集驗同出五卷中）

古今錄驗療癩蒺藜丸方

蒺藜子　乾地黃（各一分）　鹿茸（十分炙）　白斂（八分）

磁石（十分研）　礬石（十分燒）　鐵精　桂心

續斷（各五分）　巴戟天　芍藥　玄參

通草　升麻　牛膝　寄生（各八分）

澤瀉（七分）　射干（八分）　蓯蓉（十分）　海藻（八分如髮者）

右二十味擣篩以蜜和爲丸如梧子大飲下十丸日二漸增至二三十丸（蔣立言處出第四十一卷中）

卒病癩方五首

肘後療迦羅擧重卒得陰癩方

白朮五分　地膚子十分　桂心二分

右三味擣末以飲服一刀圭日三（古今錄驗同）

又方

狐陰一具炙　海藻　牡丹皮各三分　桂心二分

右四味擣篩為散蜜和為丸如梧子大小兒服五丸大人增之

集驗灸卒癩法

以蒲橫度口折之一倍增之以布著小腹大橫理令度中央上當臍勿使偏僻灸度頭及中央合二處隨年壯好自養勿舉重大語怒言大笑呼（千金范汪同）

又方

牽陰頭正上向灸莖頭所極又牽下向穀道又灸所極又牽向左右髀直下行灸所極皆使正直勿偏四處炷隨年壯佳（千金范汪同）

又法

灸足厥陰左右各三壯穴在足大指間是也（千金范汪同）出第九卷中

癩卵偏大方三首

千金療癩疝卵偏氣上方

牡丹　防風各一分

右二味擣為散溫酒服方寸匕日二忌胡荽（出第二十五卷中）

張文仲小品牡丹散療癩偏大氣脹方

牡丹　桂心　防風　鐵精

豉熬等分

右五味擣篩酒和方寸匕服之小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁和大豆與之大効忌如前（肘後同出第七卷中）

古今錄驗牡丹五等散療癩疝陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大服此良驗方

牡丹皮　防風　黃蘗炙　桂心各一分

桃人二分去皮尖研

右五味擣為散以酒服一刀圭二十日愈少小癩疝最良小兒以乳汁和如一大豆與之忌如前（出第四十一卷中）

灸諸癩法一十四首

千金論曰男癩有腸癩卵癩氣癩水癩四種腸癩卵癩難差氣癩水癩針灸易差

又卵偏大上入腹方

灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

又男陰卵偏大癩法

灸肩井脾臂接處隨年壯男癩灸小指端七壯病在左者可灸左右者灸右良効

又法
灸關元百壯
又法
灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸
又法
灸泉陰百壯三報之在横骨邊三寸
又㿉病陰卒腫者法
令並足合兩拇指爪相並以一艾炷灸兩爪端方角
處一炷令頭上兩爪角各令半炷上爪上七壯
又兩丸縮入腹法

灸三陰交隨年壯神効
又男陰卵大㿗病法
灸足太陽五十壯三報之
又法
灸足太陰五十壯又在內踝上一穴
又法
灸大拇指內側去端一寸白肉際隨年壯雙灸
之
又法
灸横骨兩邊二十壯夾莖是也

陰長千金有銀石二閉灸作卒第右

又法
灸足大指理中十壯隨邊腫灸之
灸小兒㿗法
先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊㿗故灸
汝三七二十一灸訖便牽小兒令雄頭下向着囊縫
當陰頭灸縫上七壯即消已騐艾炷帽簪頭大耳
又法
凡男㿗當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸
木上隨年壯即愈 並出第二十五卷中
陰腫方六首

病源此由風熱客於腎經腎經流於陰腎不能宣散故致
腫也 出第四卷中
集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能忍者方
以雄黃一兩研碎綿裹甘草一尺生一尺切水一斗煮
取二升以洗之忌海藻菘菜
又方
取莧菜根擣薄之 范汪千金同
又方
取蔓菁根擣薄之 范汪同
又方

還後肘後用防風不用防葵

擣馬鞭草薄之范汪同並出第九卷中

文仲療陰㿗方

取桃人去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即差千金備急同出第七卷中

古今錄驗療㿗大如斗方

取雞翅燒灰飲服其毛一孔生兩毛者佳㿗在左取左翅在右取右翅雙㿗取兩邊翅千金治小兒卵㿗出第四十一卷中

陰疝腫縮方一首

病源疝者氣痛也衆筋會於陰器邪客於厥陰少陽之經與冷氣相搏則陰痛而攣縮也出第四卷中

文仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰疝方

狼毒四兩炙　防葵一兩　附子二兩炮

右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三丸日三夜一古今錄驗范汪同出第七卷中

陰卒腫痛方三首

文仲葛氏療男子陰卒腫痛方

灸足大指第二節下橫理文正中央五壯姚云足大指本三壯亦治小兒陰疝發時腫痛隨痛左右灸之出第七卷中

備急療男子陰卒腫痛方

雞翮燒六枚　蛇床等分

右二味為末以飲服少許隨卵左右取雞翮集驗同方無蛇床

又若有息肉突出方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗一日夜三四度差肘後同出第五卷中

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶不得眠驗方

取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消為効乃止

又方

擣大薊根汁服一升日三不過三劑愈

又方

醋和麪炙令熱熨之

又方

以醋和麪塗之

又方

釜月下土以雞子白和敷之効肘後同並出第三十五卷中

陰下痒濕方七首

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷夜自泄風邪乘之則搔痒也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養

生方導引法云臥令兩手布膝頭取踵置尻下以口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少腹裏痛膝冷不隨 出第四卷中

文仲療陰痒生瘡方

嚼胡麻塗之驗 肘後千金同

葛氏療陰囊下濕痒皮剝方

烏梅十四枚 錢四十文 鹽三指撮

右三味以苦酒一升於銅器中浸九日洗之効 肘後同

又方

煮槐皮苦參黄檗及香薷汁洗之並良 肘後同出第七卷中

救急療陰下濕痒成瘡方

猪蹄兩脚 槐白皮切一升

右二味斟酌以水煮洗瘡一日五六遍永差

又方

煮桃皮和黍米汁洗之 並出第五卷中

古今錄驗療陰下痒濕湯洗方

甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度便愈

又療陰下濕痒生瘡方

吳茱萸一升以水三升煮取三五沸去滓以洗瘡諸瘡亦治之 出第四十一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損為風邪所侵邪氣流入於腎經與陰氣相擊真邪交爭故令陰痛但冷者唯痛挾熱者則腫其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩足指向下拄席兩涌泉相拓坐兩足跟頭兩膝頭外扠手互前向下盡勢七通去勞損陰踈冷 出第四卷中

集驗療卒陰痛如刺汗如雨出方

小蒜一斤 韭根一斤方無 楊柳根一斤

右三味合燒以酒灌之及熱氣熏之即愈 千金同出第九卷中

千金療陰腫痛方

灸大敦三壯

又方

車前子末酒服之佳 出第二十五卷中

陰瘡方七首

病源腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪所乘邪客腠理而正氣不泄邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡 出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方

地榆 黄檗各八兩

右二味切以水一斗煮取六升去滓適寒温洗瘡日再
只以黄蘗湯洗亦効
又凡婦精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門内並似疳
瘡作臼方
用銀釵以綿裹用臘月猪脂熏黄火上煖以釵烙瘡
上令熱取乾槐枝燒塗之以麝香黄礬青礬末敷之
小便後即敷之不過三兩度差但用疳瘡方中藥敷
之即差 出第二十五卷中
葛氏療男子陰瘡方
爛煮黄蘗洗之又用白蜜塗之

又方
黄連黄蘗各等分末之先煮肥猪肉湯洗之然後以
藥粉之
又方
以蜜煎甘草末塗之大良此見有人患莖頭腫坎下
瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用前粉粉之及依磨
方即差神驗 出第七卷中
必効療陰生瘡膿出作臼方
高昌白礬一兩
右一味擣細研之納猪脂一合於瓷器中和攪作膏取

槐白皮切作湯洗瘡上拭令乾即取膏敷上及以楸葉
貼上不過三兩度永差
古今錄驗療陰瘡方
黄蘗 黄連各三分 胡粉一兩
右三味擣爲末粉上日三婦人綿裹棗核大内之 出第一卷中
陰蝕栗瘡方五首
必効療陰瘡陰蝕如粟粒生瘡及濕痒方
以槐花而不見日處白皮一大握鹽三指一撮以水
二大升煮取一升洗之日三五遍避寒温用若皮薄

恐衝風即以米粉和塗之神効
又療陰瘡有二種一者作臼膿出名曰陰蝕瘡二者但赤
作瘡名爲熱瘡若是熱瘡用此方
取黄蘗黄芩各一兩切作湯洗之用黄蘗黄連末粉
之云神良
又方
以黄連和胡粉末敷之必効
又方
紫芽茶末一分 荷葉一片燒灰
右二味爲末以鹽漿水洗訖敷之三五度即愈

又方

取停水處乾卷地皮末敷之神効是長安郭承恩用之得効出第四卷中

著硇砂方四首

救急避近著硇砂損陰方

豬蹄一具擘破　浮萍草三兩

右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁內陰瓶中漬之冷即出拭乾便數後敷粉之

又粉法

薔薇根皮　黃蘗各三分　朴硝　蛇床子各一分

甘草炙二分

右五味擣爲散用前法淺洗後以粉磨上亦不甚痛慎風出第八卷中

必効主著硇砂方

取雞子一枚煮熟剝取肉更用生雞子二個傾取白和蘗研令細以綿裹之立定李饒州云有効

又方

甘草　黃蘗　白礬燒令汁盡

右二味爲末敷之出第四卷中

九蟲方一首

病源夫九蟲者一曰伏蟲長四寸二曰蛔蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶形六曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細微形如菜蟲伏蟲群蟲之主也蛔蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉大長至四五尺亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟯蟲居胴腸多則爲痔劇則爲癩因人瘡處以生諸癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無所不爲人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無者此諸蟲依腸胃之間若腑藏氣實則不爲害若虛則能侵蝕隨其蟲之動而變成諸患也集驗同出第十八卷中

集驗貫衆丸主療九蟲動作諸病方

貫衆熬　石蠶熬五分　狼牙四分　藿蘆二分

蜀漆炙六分　殭蠶熬三分　雷丸六分　蕪荑四分

厚朴三分　檳榔六分

右十味擣篩蜜丸空心煖漿水服三十丸日三不知稍稍加之白蟲用榧子湯服備急文仲古今錄驗范汪同出第九卷中

五藏蟲方七首

刪繁療脾勞有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔而胸中駭駭一作欬去嘔而不出前胡湯方

前胡三兩 白术三兩 赤茯苓三兩 枳實炙二兩
細辛三兩 旋復花一兩 常山三兩 松蘿二兩
龍膽三兩 竹葉切一升 杏仁三兩去皮
右十一味切以水一斗煮取三升去滓分三服若腹中
熱滿下芒硝三兩黃芩三兩苦參二兩加水二升依方
煎忌如常
又療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔茱萸根下蟲
湯方
茱萸東引根大者一尺切 大麻子八升 橘皮二兩切
右三味切擣麻子爛並和煎服或下黃汁凡合藥禁聲

勿語道作藥處當關便不下切須忌之甚驗以水煎服
臨時量之効
又療肺勞熱損生肺蟲形如蠶在肺爲病令人欬逆氣喘
或謂憂恚氣隔寒熱皆從勞之所生名曰膏肓鍼灸不著
麥門冬五膈下氣丸方
麥門冬十兩去心 蜀椒四分汗 遠志 附子炮各六分
乾姜五分 甘草十分炙 人參七分 細心六分
桂心五分 百部根 白术 黃耆各五分
杏人四十枚 檳榔五分
右十四味擣篩蜜丸如彈子許含一丸稍稍咽汁忌如
常
千金療腎勞熱四肢腫急蟯蟲如菜中蟲生腎中爲病方
貫衆大者三枚熬 乾漆二兩熬 茱萸六分一云五十枚
杏人四十枚 蕪荑 胡粉 槐白皮各四分
右七味擣散平旦以井花水服方寸匕增之以差止
又肺勞熱生蟲在肺爲病方
東行桑根白皮切一升 東行茱萸根皮切五升 狼牙三兩
右三味切以酒七升煮取一升半平旦服盡
又療肝勞生長蟲在肝爲病令人恐畏不安眼中赤方
雞子五枚去黃 東行茱萸根切三升 蠟三兩

乾漆熬四兩 粳米粉半升
右五味擣茱萸根漆爲末和藥銅器中打雞子調大鐵
爲丸如小豆宿勿食旦以飲服一百二十丸小兒五十
丸蟲即爛便差
又療心勞熱傷心有長蟲名蠱蟲長一尺貫心爲病方
雷丸熬 橘皮 桃人五分 狼牙六分
貫衆三枚 蕪荑 青葙子 乾漆各四分熬
亂髮如雞子燒 殭蠶二十枚熬
右十味擣篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之
並出第十八卷中

長蟲方二首

集驗療長蟲雞子丸方

雞子白三枚　乾漆四兩一本無　臘三兩　粳米粉半斤

右四味內銅器中於微火上煎攪令調內粉令凝可丸置土上溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿食以飲下小豆許大一百二十丸小兒五十丸効驗

又方

取榧實以淳苦酒中漬再宿以綿裹內下部中令入三寸許一日易之千金范汪同並出第九卷中

蛔蟲方九首

病源蛔蟲者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因腑藏虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作腫聚去來上下痛有休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水貫傷心者則死診其脉腹中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則蛔蟲也出第十八卷中

廣濟療蛔蟲方

酸石榴根東引入土五寸者剉二升　檳榔十枚碎

右二味以水七升煮取二升半絞去滓著少米煮稀粥平旦空腹食之少間蟲便死快利効無忌出第四卷中

肘後療蛔蟲或攻心痛如刺口中吐清水方

取龍膽根多少任用以水煮濃汁去滓宿不食平旦服一二升不過再服下蛔蟲也

又方

取有子楝木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食旦取肥香脯一片先喫令蟲聞香舉頭稍從一口為度始少進漸加服一匕服至半升便下蛔蟲千金文仲同

又方

以雞子一枚開頭去黃以好漆少許內中相和仰頭吞之蟲悉出矣文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔蟲攻心腹痛方

取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出千金范汪同出第九卷中

千金療蟯蟲方

雚蘆下篩以餅臛和服方寸匕蟲不覺出之亦主蛔蟲出肘後云雚蘆一兩末以羊肉作臛和服出第十八卷中

崔氏療蟯蟲方

取綿蚕蛹汁空腹飲之良若非繰絲時即須收蛹暴乾患者擣篩取意斟酌多少和粥飲服之

又方

鶴蝨 三兩
右一味擣散以肥豬羊肉作得一色以葱豉為臛汁無
旦空腹服以臛汁和一方寸匕頓服稍多飲臛汁佳若
不能散服即以蜜和為丸如梧子一服十丸還以此臛
汁下之假令明旦服今日暮即勿食明旦服藥訖還至
巳時為佳要服此丸散使盡巳後三十日勿雜食求差
出第五卷中

必効療蛔蟲方
菉豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升以下
然後取麻子汁半升和豆汁一升更煖令溫溫正發

即炙羊肉脯令熱先含嚥汁三五繫即服之須臾即
吐出或利其蟲巳消如綿綫帶三二百條如米甚更
服即永絕 鄭參軍云須試無不差者一方服麻子汁 必効出第六卷中

寸白蟲方一十九首

病源寸白者九蟲之一也長一寸而色白形小褊因腑藏
虛弱而能發動或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并食
生魚所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發動則損人
精氣腰腳疼弱又云此蟲生長一尺則殺人 出第十八卷中

廣濟療白蟲如馬藺葉大於下部出不盡以刀截斷者令
人漸漸羸瘦石榴湯方

醋石榴根 東引者一大握 蕪荑 三兩 牽牛子 半兩熬
右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子
末每服如人行五里更服盡快利蟲亦盡死出忌生冷
豬魚牛肉白酒葵筍等此方神驗

又方
狼牙 白歛 各四分 蕪荑 六分
右三味擣散空肚以大醋和如膏溫頓服之無所忌 千金同並出第四卷中

肘後療白蟲方
淳漆 三合 豬血 三合

右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先
吃肥香脯一片服如大豆許一百丸日中蟲悉出亦主
蚘蟲 范汪同

又方
濃煮豬肉汁煎檳榔三十枚取三升服之蟲盡出 文仲備急同

又方
熟煮豬脂血宿勿食明日飽食之蟲當下 文仲備急同出第二卷中

范汪療白蟲榧皮丸方

橘皮四分　牙子　蕪荑各六分

右三味擣篩蜜丸如梧子以漿水下三十丸先食日再服

又方

狼牙五兩

右一味擣篩蜜丸如麻子大宿不食明旦空腹以漿水下一合服盡差

又方

榠實破其上取皮中子擣合蜜丸如梧子宿不食月以醋漿水若米汁下三百丸蟲並死或以麋蠋皮亦

可丸服八十丸忌如常法出第十九卷中

備急療白蟲蕪荑散方

狼牙三分炙　蕪荑二分

右二味擣爲末酒和服之先食脯後頓服盡立差張文仲同出第六卷中

救急療白蟲方

石榴枝東引者一握去麁皮　檳榔七枚

右二味以水二大升煮取強半頓服欲服時先嚼堅脯嚥汁即進之每月一二三日喫藥必差以蟲頭向上月三以後服藥不効爲其蟲頭向下也今日欲服預前一日莫食其蟲吃藥之後或利出或內消皆差忌食生膾白酒諸生肉冷物一月餘

又方

取榧子一百枚去皮火然啖之能食盡佳不能者但啖五十枚亦得經宿蟲消自下無忌崔氏同出第八卷中

崔氏療白蟲諸方不差方

取石榴東引根令患人以手大指與第三指滿一握兩頭出者總留之又取乾脯肥者如手大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煮取一升去滓分三服如人行十里久每欲服先嚼脯一片然後飲藥并令人

以手按所患人腹令藥易宣都服了有頃當自便蟲出服藥以月一至五日以前是蟲頭向上服之得力無問多少皆得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈

又方

東引茱萸根一大握切　麻子半大升

右二味先擣麻子極碎又盆中熟研以水一大升更和研絞取濃汁以漬茱萸根一宿明旦煮兩三沸頓服如不頓服分再服至明旦欲服藥今日午後便不得食仍須先嚼一片肥乾脯嚥汁然後服藥服一劑去蟲不盡停一日更作服一劑永差後一月日勿食脂膩魚肉必

劾出第五卷中

千金療白蟲方

取榧子四十九枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日服盡蟲消爲水永差

又方

取茱萸北陰根洗去土切以酒一升漬一宿平旦去滓分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若指以上大者皆不任用之無力（范汪同）

又方

狼錫令速擣末平旦作羊肉臛以藥方寸匕內汁中服之一方熬胡粉

又方

桑白皮切三升以水七升煮取二升宿不食明旦頓服之

又方

用石榴根如茱萸根法

又方

胡麻一升　胡粉一兩

右二味擣末明旦空腹以豬肉臛汁服盡即差（並出第十八卷中）

蟯蟲方六首

病源蟯蟲是九蟲之一也形甚小如今之蝸蟲狀亦因腑藏虛弱而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癩癰疽瘑諸瘡蟯蟲此是人體虛極重者故蟯蟲因之動作無所不爲也出十八卷中

范汪療蟯蟲芫花散方

芫花　狼牙　雷丸　桃人（去皮尖）

右四味擣散宿勿食平旦以飲服方寸匕當下蟲也

又巴豆白膏療蟯蟲方

巴豆一枚（燒令熟去心皮）　桃人四枚（熬令黑去尖皮）

右二味合擣作三丸大人清旦未食以漿服盡少小服

一丸若不下明旦更復作服（並出第十九卷中）

千金療蟯蟲在胃中漸漸羸人方

淳酒　白蜜　好漆各一升

右三味合銅器中微火上煎之令可丸丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下蟲不下再服之（肘後備急集驗范汪同出第十八卷中）

備急葛氏療蟯蟲攻心如刺吐清汁方

擣生艾汁宿不食平旦嚼脯一片令蟲聞香後飲汁一升當下蟯蟲（備急文仲並同肘後云療蛔蟲）

陶氏療蟲方

取七月七日蒺藜子陰乾燒作灰先食服方寸匕一
服三日止范汪千金同

又方

以好鹽末二兩淳酒半升於銅器中煮令數沸宿勿
食清旦溫空腹頓服之備急文仲千金范汪等同並出第七卷中

三蟲方七首

病源三蟲者長蟲赤蟲蟯蟲爲三蟲也猶是九蟲之數也
長蟲者蚘蟲也長一尺動則吐清水出則心痛貫心則死
赤蟲狀如生肉動則腸鳴蟯蟲細微形如菜蟲也居胴腸
之間多則爲痔劇則爲癩因人瘡處即生諸癰疽癬瘻瘑

疥癬蟲無所不爲此既是九蟲內之三者而今別立名者
當以其三種偏發動成病故謂三蟲也其湯熨鍼石別有
正方補養宜導今附於後養生方導引法云以兩手着頭
相叉長引氣即吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中
疾低頭入兩膝間兩手交叉頭上十二通愈三蟲又云叩
齒二七過輒咽氣二七如是三百通乃止爲之二十日邪
氣悉去六十日小病愈百日大病除三蟲伏尸皆去面體
光澤出第十八卷中

肘後療三蟲方

茱萸根取東引者大者長一尺 栝樓四兩切

右二味細剉茱萸根以酒一升漬之一宿旦絞去滓宿
勿食旦空腹先喫脯然後頓服之小兒分三服亦療寸
白蟲

又方

擣桃葉絞取汁飲一升千金集驗同一方云平旦飲三合

又方

真珠一兩研 亂髮如雞子大燒末

右二味內苦酒中旦空腹頓服之令盡集驗范汪同千金治蟯蟲

又三蟲者謂長蟲赤蟲蟯蟲也乃有九種而蟯蟲及寸白
人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人

服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜
速除之蟯蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清
朝口吐汁煩燥則是也其餘各種種不利人人胃中無不
有者宜服九蟲丸以除之

范汪療三蟲白歛丸方

白歛 狼牙 雚蘆 桃花
貫衆各三分 橘皮二分 蕪荑一分

右七味擣篩蜜丸如小豆大宿勿食旦以漿水服一丸
日中乃食立下男子病大腹面黃欲食肉服此藥下赤
蟲如箅者一尺所有頭目百餘枚病愈又九江謝丘

病臍下有積大如杯小腹亦堅伏痛上下移嘔逆喘
心下常痛欲食肉服此藥下蟲無頭足赤身有口尾二
百餘枚得愈又九江陳昉病大腹煩滿常欲食生米服
此藥下白蟲大如臂小者百餘枚立差娠身婦人不得
服之

又療三蟲竹節丸方

燒竹節　雷丸各三分　錫屑二分　橘皮一分半

右四味擣篩蜜丸如梧子大一服八丸日三服

又療三蟲芎藭散方

芎藭　雷丸　桔梗　白芷各四分

右四味擣散以蜜飲若酒或米汁服方寸匕日三服又
可用蜜丸如梧子吞十三丸當稍稍下不盡更服一劑
出第十九卷中

又療三蟲三

藜蘆炙四兩　乾漆熬二兩　吳茱萸四兩

右三味爲末依前先須朒以粥清服方寸匕日一服肘
後范汪同

雜療蟲方三首

廣濟療蛔蟲寸白蟲方

檳榔十二分　當歸　鶴蝨　蕪荑熬
橘皮各六分　貫衆　雷丸各四分

右七味擣散空腹煮大棗湯服方寸匕日二服漸加至
三匕微利無忌 出第四卷中

千金療蟯蟲蛔蟲及痔䘌蟲食下部生瘡桃湯方

桃皮一斤　槐子二兩　艾葉一兩　大棗三十枚

右四味以水三升煮取半升空腹頓服之 出第十八卷中

又療寸白蟲化爲水泄出永除方

榧子　檳榔　蕪荑等分

右三味爲散溫酒服二錢七先燒牛肉脯喫後服藥也

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔
校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十六卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十七卷目録　諸淋大小便等廿九門

諸淋方三十五首
五淋方三首
石淋方一十六首
血淋方五首
小便赤色如紅方三首
熱淋方三首
勞淋方二首
氣淋方五首
膏淋方二首
許仁則淋方二首
大便難方六首
大便不通方一十七首
大便閉澁不通方七首
大便失禁并關格大小便不通方二十二首
關格脹滿不通方四首
許仁則大便暴閉不通方三首
小便不通方一十二首
小便難及不利方九首
遺尿方六首

尿血方一十一首
胞轉方一十五首
小便血及九竅出血方一十二首
小便不禁方二首
小便數及多方五首
許仁則小便數多方四首
尿牀方六首
灸穴雜法一十二首

唐王燾先生外臺秘要方第二十七卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎為表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰為溲便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則腑臟不和致腎氣虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢而流於睪水道不通水不上不下停積於胞腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便出少起數少腹弦急痛引於臍又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名具說於後章而以一方療之者故謂諸淋也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃臥令兩足布膝頭斜踵置鳩口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋莖中痛又云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足趺上急手握足五指極力一通令內曲以利腰髖療淋出第十四卷中

廣濟療患淋來積年比醫療不能得愈或十日、五日一發即有可時今年因病更頻數二十日來不定方

滑石　冬葵子各八分　瞿麥　石韋各五分去毛

蒲黃六分　陳橘皮四分　芍藥　茯苓

芒硝各六分　子芩六分

右十味擣篩為散空腹煮葵子飲服方寸匕日二服漸加至一七半忌熱麪炙肉醋蒜等

又飲子方

桑白皮六分　通草　百合各八分　白茅根[illegible]分

右四味細銼以水四升煮取二升去滓溫下前散藥日乾湯合之亦得也

又療淋小便不通六七日方

滑石五兩　通草三兩　瞿麥二兩　冬葵子一兩

茅根一升　石韋三兩去毛　芒硝二兩

右七味切以水九升煮取二升八合去滓內芒硝分溫三服每服如人行六七里進一服以微利為度忌如前並出第四卷中

范汪療淋方

取蘩縷草滿兩手把以水煮服之可常作飲勿不飲也

又方

煮菟絲子服之如蘩縷法

又方

露蜂房燒飲服之取如梡大者妙

又方

雞子二枚去白黃以鹽內殼中使滿以三升水漬一
升或殺取汁取殼中鹽投汁中攪令調盡服之

又方

滑石　海蛤　雞子殼各等分

右三味擣篩爲散以飲服半錢匕日三服漸加至一錢
匕甚良

又方

取地麦草一名地膚草二七把以水二升煎之亦可
長服一法且漬或汁飲之良

又療淋利小便葵子散方

葵子半升　滑石二兩　石南葉一兩　地榆三兩
石韋去毛一兩　通草一兩

右六味擣篩爲散飲服方寸匕日三服良

又療淋莖中有石方

取雞屎白半升暴乾熬之令香擣篩爲散以酪一云酪
漿飲方寸匕日三服到一二日當下石即愈

又療淋師所不能療者神方

取葛上亭長生折斷腹中有白子如小米長二三
分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患十
年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小盃
中水如棗許內藥盞中少時食頃以爪甲研當令扁扁
見於水中仰頭令人寫入喉中勿令近牙近則著
牙齒間不盡得入咽之也藥雖微小下喉自當覺至
下焦淋所有頃藥作大煩急不可堪者飲麦乾飯汁
藥勢止也若無麦乾飯汁但水亦可耳老小服三分
之一藥當下淋如膿血連連爾石去者或如指頭或
青或黃男女服之皆愈并療婦人產生後餘疾積聚

或成帶下服之亦愈此蟲正月二月爲芫青三月爲
王不留行四月五月六月爲葛上亭長七月爲斑猫
九月十月爲地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若
淋不止以意節度更增服之並出第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或
便血溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及
步行冒熱冷飲逐熱熱結下焦及乳石熱動關格少腹堅
胞脹如斗大諸淋服之即通方

地膚草三兩　知母　猪苓去皮　瞿麦
黃芩一　升麻　通草各二兩　海藻一兩

葵子一升 枳實二兩炙

右十味切以水九升煮取三升分爲三服大小便皆閉者加大黃三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脉沉細者加猪腎一具千金同崔氏云若加猪腎先以水一斗半煮取一斗納藥煎

又療淋榆皮湯方

榆皮半斤 滑石二兩一方一兩 黃芩一兩一方二兩 甘草炙 瞿麥各二兩 葵子一升

右六味切以水一斗煮取三升温服一升日服忌海藻菘菜並出第四卷中

集驗療淋方

以比輪錢三百文以水一斗煮取三升飲之神効肘後同千金治氣淋過後此輪錢末服

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈文仲必効同

又方

燒頭髮灰服之良文仲同並出第五卷中

千金療淋痛方

滑石四兩 貝子三十枚燒 茯苓 白朮 通草 芍藥各二兩

右六味擣篩爲散酒服方寸匕日二服大良

又方

葵子五合 茯苓 白朮 當歸各二兩

右四味切以水七升煮取三升分三服范汪同

又方

栝樓 滑石 石韋去毛各二兩

右三味爲散以大麥粥飲服方寸匕日三服良

又方

蜀葵根八兩 大麻根五兩 甘草一兩炙 貝子五合燒 通草二兩 茅根三斤 石首魚頭石四兩

右七味切以水一斗二升煮取五升分爲五服日三夜

二服亦主石淋

又方

取細白沙三升一味炒令極熱以酒三升淋取汁一合服之一云頓服

又方

榆皮一斤 車前子一升 冬瓜子一升 鯉魚齒 排膠 地麥草 通草各二兩 瞿麥四兩

右八味切以水一斗煮取三升分三服日三服

又療卒淋方

灸外踝尖七壯

又方

取石首魚頭石末水服方寸七日三服

又方

鯉魚齒燒灰末酒服方寸七日三服並出第二十一卷中

崔氏療淋散方

石韋去毛洗 大蟲魄研一兩 滑石一兩半 當歸

芍藥 黃芩 冬葵子 瞿麥各一兩

亂髮如雞子大燒灰三團 茯苓一兩半

右十味擣篩爲散服方寸七日二服出第四卷中通按大蟲魄即琥珀

古今録驗療淋瞿麥散方主篤癃淋虛

瞿麥 石韋去毛 滑石 車前子

葵子各四兩

右五味擣篩冷水服方寸七日三服增至三七

又方

取生續斷絞汁一升服之

又療淋滑石湯方

滑石一兩 榆白皮二兩 石韋一兩去毛 地麥草二兩

葵子二兩

右五味切以水一斗煮取四升分四服日再服甚良

又療淋榆皮湯方

瞿麥二兩 防葵一兩 榆白皮一兩 葵子一升

滑石二兩一方四兩 黃芩一兩一方二兩 甘草二兩一方一兩炙

右七味切以水一斗煮取三升分二服

又方

取附紅底苦大如鴨子以既半水煎取一既頓服日三服千金治氣淋並出第二十六卷中

近効療淋方

葵子一升

右一味以水三升煮取二升去滓分溫服煎茅根飲之亦佳

又方

人參六分 厚朴三分炙 粟米二合

右三味切以水三升煮取七八合以新布絞去滓分溫三服服別相去如人行七里

又方

茯苓 地骨皮各三兩 甘草炙 黃芩

前胡 生薑各二兩 麥門冬八兩去心 竹葉切一升

蒲黃一兩

右九味切以水九升煮二升六合去滓分爲三服

五淋方三首

集驗論五淋者石淋氣淋膏淋勞淋熱淋也石淋之爲病

小便莖中痛尿不得卒出時自出痛引少腹膀胱裏急氣淋之爲病小便難常有餘瀝膏淋之爲病尿似膏白出少腹膀胱裏急勞淋之爲病倦即發痛引氣衝小便不利熱淋之爲病熱即發其尿血後如豆汁狀畜作有時五淋各異療方用雖故不載也並出第五卷中

范汪療五淋方

蜚蠊五分熬一作䗪蟲　班猫二分去翅足熬　地膽二分去足熬

猪苓三分

右四味擣篩爲散每服四分七月蓮三服夜三服但少腹有熱者去猪苓服藥二日後以器盛小便當有所下

肉淋者下碎肉血淋者下如短繩若如肉膿氣淋者下如羹上肥石淋下石或下砂劇者十日即愈禁食羹猪肉生魚葱薤醋以小麥汁服之良

又療五淋神良延命散方

滑石　礬石燒半白　石膏　車前子

露蜂房炙并白子用之　貝子擣著苦酒中一二宿取細者用之

栢子人　魚齒擣令熟　雞矢白　苦瓠中穣并子熬

特牛陰頭毛燒　芒硝熬令汁盡各一分　白雞肶胵裏黄皮熬

婦人陰上毛二分燒一本無

右十四味擣篩爲散每服半錢匕加至一錢七日三夜

遶拔大上征莽閉兩本作叹花門食集也又古物莧

一服以葵子飲下之三日愈甚者不過六七日愈小便以器盛之當見石及諸物也並出第十五卷中

必効療五淋方

白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升去滓分三四服肘後千金同出第十一卷中

石淋方一十六首

病源石淋者淋而出石也腎主水水結則化爲石故腎客砂石腎虛爲熱所乘熱則成淋其病之狀小便則莖裏痛溺不能卒出痛引少腹膀胱裏急砂石從小便道出甚者塞痛令悶絶出第十四卷中

范汪療石淋方

鼈甲燒灰擣篩爲散酒服方寸七頻服數劑當去石也肘後同

又方

取人家籬落上連蔓莓閉掘出見其根撓斷以杯於坎中承其汁服之一升石自當出若不出更服一升

又方

取車前子二升用絹囊盛之以水八升煮取三升去滓頓服之移日又服石當下也宿勿食服之神良肘後千金同

又方

梔子人　芥子　滑石各等分

右三味擣篩爲散以麥汁飲服方寸匕日三服已効

又方

牛角燒灰服方寸匕日五六服任意飲酒

又方

瞿麥子擣爲末酒服方寸匕日三服至一二日當下石又香薷擣作屑以酢漿飲服方寸匕日三至二三日當下石 並出第十五卷中

小品療石淋方

浮石取滿一手擣爲末以水三升苦酒一升煮取二升澄清溫服一升不過再三服石即出 古今錄驗千金崔氏同出第四卷中

集驗療石淋方

鯉魚齒一升貝齒一升擣篩以三歲苦酒和分爲三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分 古今錄驗范汪同

文仲石淋方

桃膠如棗大夏月著三合冷水中冬月以湯三合和之一服日三當下石石盡即止 千金古今錄驗同

近效此方與前延命散同

又方

濃煮車前草汁飲之良也 古今錄驗同出第四卷中

古今錄驗療石淋及諸淋方

石首魚頭石十四枚　當歸等分

右二味擣篩爲散以水二升煮取一升頓服立愈單用魚頭石亦佳

又石淋石韋散方

石韋去毛　滑石各三分

右二味擣篩爲散用米汁若蜜服一刀圭日二服 范汪同

又方

取生蘧蒢擣絞取汁三升爲三服石自出 范汪同

又滑石散療石淋莖中疼痛澀澀晝夜百餘行內出石及血方

滑石二十分　石韋去毛　當歸　通草

地膽去足熬　鍾乳各研二分　車前子三分　瞿麥

蛇床子二分　細辛　蜂房炙各一分

右十一味爲散以葵汁麥粥服方寸匕日三

又療石淋澀瀝莖中痛晝夜百行或血出延命散方

滑石　牛角鰓燒灰　芍藥各二兩　瞿麥三兩

車前子　露蜂房炙　貝子燒　梔子仁

謹按小蘇根疑是小薊根

魚齒灸　雞矢白　苦瓠子炙　牛膽頭毛各一兩
婦人陰上毛二分一本無
右十三味擣篩爲散以葵汁服方寸匕日三服
又療石淋方
取雞子壞者一枚用苦酒一升以雞子合苦酒置器中以油紙三四重密封頭不令水得入沉井中
平旦取剝去皮吞其黃石即消去並出第二十六卷中
血淋方五首
病源血淋者是熱淋之甚者則尿血謂之血淋心主血血之行身通遍經絡循環腑藏勞熱甚者則散失其常經溢

滲入胞而成血淋也出第十四卷中
廣濟療血淋不絕雞蘇飲子方
雞蘇一握　竹葉一握切　石膏八分碎　生地黃一升切
蜀葵子四分末湯成下
右五味以水六升煮取二升去滓和葵子末分溫二服如人行四五里久進一服古今錄驗范汪同
又療血淋小便碜痛方
雞蘇二兩　滑石五兩碎　生地黃半斤　小蘇根一兩
竹葉二兩　通草五兩　石膏五兩碎
右七味細切以水九升煮取三升去滓分溫三服如人行四五里進一服並出第四卷中
千金療血淋方
石韋去毛　當歸　芍藥　蒲黃各等分
右四味爲散酒服方寸匕日三服肘後文仲同出第二十一卷中
備急陶氏療淋下血二升者方
取苧麻根十枚以水五升煮取二升一服血止神驗肘後古今錄驗同
又方
灸足大指前節上十壯良並出第六卷中
小便赤色如紅方三首

延年論曰療小便赤色如淺紅花汁此是憂愁驚恐心氣虛熱容邪氣與熱搏於心所以小便赤心主南方火王在四月五月六月其色赤驚恐動於心心不受邪邪即傳於小腸滲入胞中所以小便赤此爲微邪其病猶輕令服丸子即得漸差心即是火火惡於清清即是水水能滅火既損心氣即不得食熱及冷水并勿憂恐如不慎恐小便色赤如血漸即難愈今處乾地黃丸補心神益脾氣散客熱自然調和小便色即自變如常第一不得憂愁在心并勿食熱食及冷水等方
乾地黃　黃耆各六分　防風　遠志

茯神 括樓 子芩各四分 鹿茸三分炙
龍骨四分五色者 人參五分 滑石十二分 石韋湯浸一宿刮去皮
當歸各二分 芍藥 蒲黃 甘草炙
戎鹽各三分 車前子八分

右十八味篩為末以蜜及鹿膏各半相和煎令消散和藥為丸如梧桐子大每食後少時以粥清下十九日二三稍加至十五二十丸以知為度蔣孝璋處

又茅根飲子療胞絡中虛熱時小便如血色方

茅根一升 茯苓三兩 人參 乾地黃二兩

有四味切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服

一日食盡文仲處

文仲通草飲子主熱氣淋澁小便赤如紅花汁色方

通草 葵子 茅根 王不留行
蒲黃炮 桃膠 瞿麥 滑石各二兩
甘草七炙

右九味切以水一斗煮取六升去滓分溫五六服忌如藥法

熱淋方三首

病源熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入于胞而成淋也其狀小便赤澁亦有宿病淋今得熱而發者其熱甚則變尿血亦有小便後如似豆羹汁狀者亦有時也出第十四卷中

廣濟療熱淋方

車前草切一升 通草三兩切 葵根切一升 芒硝六分湯成下

右四味以水七升煮取二升絞去滓內硝分溫三服服別相去如人行六七里[illegible]度忌熱食出第四卷中

古今錄驗療淋小便數痛[illegible]滑石散方

滑石二兩 括樓二兩 石韋二分去毛

右三味搗篩為散以大麥粥清服方寸匕日一並出第二十六卷中

近效療熱淋日夜數十度服藥不差方

空腹服井花水一二升必差當湯盡進用如神効方

喫水了後行六七百步甚良

勞淋方三首

病源勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通於陰其狀尿留莖內數起不出引少腹痛小便不利勞倦即發也出第十四卷中

千金夫勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝炙之方

灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之療與氣淋同

又療五勞七傷八風十二痺以為淋勞結為血淋熱結為肉淋小便不通莖中痛及少腹急痛不可忍者方

滑石三分 王不留行 冬葵子 車前子

桂心 甘遂 通草各二分 石韋四分去毛

右八味擣篩為散以麻子粥五合和服方寸匕日三服尿清差並出第二十一卷中

古今錄驗療石淋勞淋熱淋小便不利胞中滿急痛石韋散方

通草二兩 石韋二兩去毛 王不留行一兩 滑石二兩

甘草炙 當歸各二兩 白朮 瞿麥

芍藥 葵子各三兩

右十味擣篩為散先食以麥粥清服方寸匕日三服出第二十六卷中

氣淋方五首

病源氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所為也膀胱與腎為表裏膀胱熱熱氣流入胞熱則生實令胞內氣脹則少腹滿腎氣不能制其小便故成淋耳其狀膀胱小便皆滿尿澁常有餘瀝是也亦曰氣癃診其少陰脉數者男子則氣淋出第十四卷中

千金療氣淋方

灸關元五十壯

又方

夾玉泉相去一寸半灸三十壯

又方

水三升煮豉一升一沸去滓內鹽一合頓服之

又方

擣葵子末湯和服方寸匕

又方

空腹單茹蜀葵一滿口

膏淋方二首

病源膏淋者淋而有肥狀如膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也出第十四卷中

千金療膏淋方

擣蘋草汁三升醋三合和空腹頓服當如大豆汁下

一名蘋萍也

又膏淋之為病尿似膏自出療之一如氣淋也並出第二十一卷中

許仁則淋方二首

許仁則療小便淋澁方此病有數種有石淋有熱淋有氣淋氣淋者氣擁塞小便不通遂成氣淋此病自須依前療

水氣法石淋者緣先服石石氣不散擁遏生熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣食飲將息傷熱熱氣灼灼遂成熱淋更無餘候但若體氣熱小便澁出處酸酒宜依後瞿麥等六味湯大蚕繭等五味散三淋俱服之方

瞿麥穗三兩　冬葵子一升　榆白皮切一升　桑根皮六兩

白茅根切一升　石韋四兩去毛

右藥切以水一斗煮取三升去滓分温三服每服如人行十里久服三五劑後宜合大蚕繭五味散服佳

又方

大蚕繭六兩　石韋三兩去毛　瞿麥穗四兩　冬葵子一升

茯苓六兩

右藥擣篩為散煮桑白皮作飲子初服一方寸匕日再服稍加至三匕忌酢物吳昇同出下卷中

大便難方六首

病源大便難者由五藏不調陰陽偏有冷熱虛實三焦不和則冷熱并結故也胃為五穀之海水穀之精化為榮衛其糟粕行之於大腸以出也五藏三焦既不調和冷熱擁塞結在腸胃之間其腸胃本實而又為冷熱之氣所并結聚不宣故令大便難也又云邪在腎亦令大便難所以爾者腎藏受邪虛而不能制小便則小便利津液枯燥腸胃乾澁故大便難又渴利之家大便亦難所以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥診其左手寸口人迎以前脉手少陰經也脉沉為陰陰實者病苦悶悶大便不利腹滿四肢重身熱若胃脹右手關上脉陰實者脾實也病苦腸中伏伏一作如牢狀大便難脉緊而滑直大便亦難趺陽脉微弦法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虛寒從下而上也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃臥直兩手捻左右脅除大便難腹痛腹中寒口內氣鼻出氣温氣咽之數十病愈出第十四卷中

肘後療脾胃不和常患大便堅強難方

大黃　芍藥　厚朴炙各二兩　枳實六枚炙

麻子五合別研

右五味擣篩入麻子蜜和為丸如梧桐子大每服十丸日三服稍稍增之以通利為度可常將之集驗備急古今錄驗同出第二卷中

千金療大便難方

灸承筋二穴三壯在腨中央陷中

又方

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁並單潤之立出范汪同

又練中丸主宿食不消大便難方

大黃八兩　葶藶熬　杏人去皮尖熬　芒硝各四兩

右四味擣篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十丸日三服稍加之並出第十五卷中

備急不得大便或十日一月方

葵子二升水四升煮取一升去滓一服不愈重作服良忌蕪荑肉中古今錄驗文仲范汪同此方出第六卷

古今錄驗麻子人丸療大便難小便利而反不渴者脾約方

麻人二升別為膏　枳實炙一斤　芍藥半斤　大黃一斤

厚朴一尺炙　杏人一升去皮尖熬別為脂

右六味擣篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服飲下十丸漸增至三十丸日三服此本仲景傷寒論方出第二十六卷中

大便不通方一十七首

病源大便不通者由三焦五藏不和冷熱之氣不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕痞結壅塞不通也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云龜行氣伏衣被中覆口鼻頭面正臥不息九通微鼻出氣療閉塞不通出第十四卷中

肘後療大便不通方

研麻子以米雜為粥食之

通根熱石一不作錢君

又方

用礬石如指大者導下部並出第六卷中

千金療大便不通方

灸第七椎兩傍各一寸七壯

又方

桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方

水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方

烏麻子取汁飲之

又方

常服蜜煎五合

又方

豬脂和陳葵子末為丸如梧桐子大每服飲下十丸通即止

又方

常服車前子及苗並通也

又方

擣葵根汁服之良

又方

葱子一升牛酥一升猪脂亦得以水三升煮葱子取
一升內酥煮一沸待冷分二服 並出第十五卷中
必效療大便不通方
牛膠一條 廣二寸長四寸 葱白一握
右二味用水二升和煮消盡去滓頓服之 千金同
又方
煮瓜蒂七枚綿裹內下部如非時瓜亦得 並出第三卷中
崔氏療大便不通方
菖蒲末 石鹽末
右二味相和取半七和烏麻脂少許綿裹內下部中即

通
又方
猪脂一升溫酒一服令盡良 並出第四卷中
古今錄驗療心腹脹滿大便不通方
芍藥六分 黃芩五分 大黃八分 芒硝六分
杏人 熬去皮尖八分
右五味擣篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸
粥飲下加至二十丸取通利為度 經心錄同出第二十六卷中
近效療大便不通方
用猪膽和少蜜於鐺中熬令熱稠丸如棗大內下部
中即差
大便秘澁不通方七首
千金療大便秘澁不通神方
猪羊膽
右一味以筩灌三合許令[illegible]不盡須臾更灌
一方加冬葵子汁和之又有椒[illegible]合猪膏三合灌
之佳 經心錄同
又三黃湯療下焦熱結不得大便方
大黃三兩 黃芩二兩 甘草炙一兩 梔子二七枚
右四味切以水五升煮取一升八合分三服若秘加芒

硝二兩 並出第十五卷中
備急療卒大便閉澁不通方
葛氏云削瓜菹如指大導下部中即効
又方
燒亂髮灰三指撮投水半升一服
又方
綿裹鹽作三丸如指大內下部中
又方
煎蜜令強加乾薑末和丸如指導下部中 姚云欲死
者蜜三升微火煎如飴投冷水中令凝丸如大指長

三四寸導之良

又方

猪膽一枚內下部中姚云療七八日奔氣傷心欲死者須臾便通良 范汪同

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

病源大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能溫制故使大便失禁

又關格大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也陰氣大盛陽氣不得營之曰內關陽氣大盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則陰陽之氣痞結腹內脹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛內閉大小便不通日不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脉來浮牢且滑直者不得大小便也 並出第十四卷中

范汪療下部閉不通方

取烏梅五顆著湯漬須臾出核取熱搗之如彈丸內下部中即通也 肘後同

又方

遺溺足大指本節後日陂令今二年陰氣處脉閒也

取葫蘆根一把搗末水和絞去滓強人服一升數用有効兼療脚氣

又療大小便不通三陽實大便不通方

榆白皮 三兩 桂心 二兩 滑石 六兩 甘草 三兩炙

右四味以水一斗煮取三升分三服 集驗同並出第十六卷中

集驗療關格之病腸中轉痛不得大小便一日一夜不差欲死方

芒硝三兩紙三重裹於炭火內燒令沸安一升水中盡服之當先飲溫湯一二升以來吐出乃飲芒硝汁也 肘後同

千金療老人小兒大便失禁方

灸兩脚大拇指去爪甲一寸三壯

又方

灸足大指奇間各三壯

又療大小便不通方

灸臍下一寸三壯

又方

灸橫文一百壯

又方

葵子一升 竹葉一把

右二味以水一升煮一沸頓服之

又方

葶子一升 榆白皮切一升

右二味以水五升煮取二升分二服

又方

水三升煮葵子一升去滓取一升內猪脂一升空肚一服

又方

塩半升合蜜三合同煎如飴出之著冷水中丸如指大深內下部中立通 出第十五卷中

千金翼療蔵熱大小便不通六七日腹中有燥糞寒熱煩迫短氣汗出腹滿方

生葛根切二斤 猪脂一斤 大黄一兩切

右三味以水七升煮取五升去滓內脂煎取三升滓清強人頓服之羸人分再服 出第七卷中

備急葛氏療卒關格大小便不通支滿欲死二三日則殺人方

塩以苦酒和塗臍中乾又易之 必効同

陶氏卒大小便不通方

紙裹塩燒投水中服之

姚氏風寒冷氣入腸忽痛堅急如吹狀大小便不通或小腸有氣結如升大脹起名為關格病

又療大小便不利方

苦參 滑石 貝齒各等分

右三味搗篩為散每服飲下一七或煮葵根汁服之彌佳 文仲同出第六卷中

古今錄驗療關格大小便不通方

以水三升煮塩三合使沸適寒温以竹筒灌下部立通也

又療大小便不通方

通草四兩 郁李人三兩去皮 車前子五合一方一升

黄芩三兩 朴硝四兩 瞿麥一兩

右六味切以水八升煮取二升去滓分三服 經心錄同

又方

取生土瓜根搗取汁以水解之於筒中吹內下部即通 並出第二十六卷中

經心錄療關格大小便不通方

芒硝 烏梅 榆白皮各五兩 芍藥

杏人各四兩去皮尖 麻子人三兩 大黄八兩

右七味切以水七升煮取三升分為三服 一方無烏梅

加枳實乾地黃各二兩

又療大小便不通方

滑石二兩　葵子　榆白皮各一兩

右三味下篩爲散煮麻子汁一升半取二七和服兩服即通 並出第二卷中

近効療大小便不通方

含硝石吐去水

關格脹滿不通方四首

千金療關格脹滿不通方

芍藥六分　芒硝六分　黃芩五分　杏人八分去皮尖

大黃八分

右五味末之蜜和丸如梧子飲下十丸日二服良

又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通削薑裹鹽導並佳

又方

乾姜　鹽　杏人

右三味等分擣導之

又療脹滿關格不通方

吳茱萸一升　乾姜　大黃　桂心

當歸　芍藥　甘草炙　蒲黃各二兩

雄黃研三分　人參　細辛各四兩　真珠研一分

桃白皮一握

右十三味切以水一斗煮取三升去滓內雄黃真珠末酒一升微火煎三沸服一升得下即止不必盡也每服如人行十里久進之 並出第十五卷中

許仁則大便暴閉不通方二首

許仁則論曰此病久無餘候但由飲食將息過熱熱氣蘊積秘結若緣氣秘自須仍前療氣法服巴豆等三味丸及療水氣葶藶等諸方取利若是風秘自依後服大黃等五

味丸療秘之狀骨肉強痛體氣煩熱唇口乾焦大便不通宜依後大黃芒硝二味湯取利方

大黃六兩　芒硝五兩

右藥先切大黃以水四升煮取二升去滓內芒硝頓服之須臾利良久不覺以熱飲投之若服此依前不利宜合後大麻仁等五味丸服之取快利

五味大黃丸方

大黃五兩　大麻子一升微熬研之　芒硝六兩

乾葛　桑根白皮各五兩

右五味先擣四味爲散然後擣麻人令如膏即投四味

散和擣和少蜜擣之丸如梧子大初服十丸日再服稍稍服得大便通為限 主大便風秘不通吳昇同出下卷中

小便不通方一十三首

病源小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於小腸入胞者為小便腎與膀胱既熱熱入於胞熱氣大盛故結澁令小便不通少腹脹氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脉緊而滑直者不得小便也 出第十四卷中

廣濟療下冷痰小便不通雞蘇飲子方

雞蘇一握 通草四兩 石韋一兩炙去毛 冬葵子一升半

杏人二兩去皮尖 滑石二兩 生地黃四兩

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服如人行四五里進一服

又方

冬葵子五兩 通草三兩 茅根四兩 芒硝二兩湯下

茯苓三兩 滑石五兩

右六味切以水九升煮取三升去滓內芒硝分溫三服服別相去如人行六七里

又方

茯苓二分 大黃六分 芍藥 當歸

枳實炙 白朮 人參各二分 大麻人四分

右八味切以水六升煮取二升去滓分溫三服要著芒硝亦得 並出第四卷中

范汪療小便不通方

取熏黃如豆許末之內小孔中神良

又方

桑根白皮 豬苓去皮 通草各二兩

右三味切以水六升煮取二升分三服

又方

雞屎白如彈丸以苦酒和服卽下不過三四服佳

本云療淋

又方

足大拇指奇間有青脉針挑血出灸三壯愈 並出第四卷中

救急主小便不通方

取印成鹽七顆擣篩作末用青葱葉尖盛鹽末開便孔內葉小頭於中吹之令鹽末入孔卽通非常之效

又方

取嫩穀木梢濺汁可飲半升以來卽愈

必効療小便不通不得服滑藥急悶欲絕方

鹽二升大鐺中熬以布綿裹熨臍下接之小便當漸

通也 肘後同

古今錄驗療熱結小便不通利方

刮滑石屑水和塗少腹及繞陰際乾復塗之 肘後同

又方

取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱為度良 肘後千金同並出第二十六卷中

近效療小便不通數而微腫方

取陳久筆頭燒作灰和水服之

小便難及不利方九首

病源小便難者此是腎與膀胱熱故也此二經為表裏俱主水水行於小腸入胞為小便熱氣在於藏腑水氣則澁其熱勢微故但小便難也診其尺脉浮小便難尺脉濡小便難尺脉緩故小便難有餘瀝也 出第十四卷中

范汪療小便難淋瀝湯方

滑石八兩 石韋三兩去毛 榆皮一升 葵子一升 通草四兩

右五味切以水一斗煮取三升分三服一方加黃芩三兩

又療淋小便不利陰痛石韋散方

石韋二兩去毛 瞿麥一兩 滑石五兩 車前子三兩 葵子二兩

右五味擣篩為散服方寸匕日三並出第五卷中

千金療小便不利莖中痛少腹急方

通草二兩 葶藶子熬三兩 茯苓二兩

右三味擣為散以水服方寸匕日三服忌酢物 出第二十一卷中

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦人血結腹堅痛牛膝飲方

生牛膝一名牛唇掘取根煮服之立差 肘後同

陶效方

秦艽二分 冬瓜子二兩

右二味擣為末酒服一匕日三服神良 肘後同

文仲療小便不利方

桑螵蛸三十枚 黃芩一兩

右二味切以水一升煮取四合頓服之良 肘後同

又方

蒲黃 滑石各一分

右二味為散酒服一匕日三大驗 肘後同

又療諸淋及小便常不利陰中痛日數十度起此皆勞損虛熱所致當將散服方

石韋去毛 滑石 瞿麥 王不留行

葵子各二兩

右六味擣篩爲散飲服方寸匕日三服之姚方加滑石五兩車前子三兩無王不留行備急同出第四卷中

古今錄驗療淋胞痛不得小便滑石散方

滑石　葵子　鍾乳各一兩　桂心

通草　王不留行各半兩

右六味擣篩爲散先食訖以酒服方寸匕日三服忌生葱出第二十六卷中

遺尿方六首

病源遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也膀胱爲足太陽腎爲足少陰二經爲表裏腎主水腎氣下通於陰小便者水液之餘也膀胱爲津液之府府既虛冷陽氣衰弱不能約於水故令遺尿也診其脈來過寸口入魚際遺尿肝脈微滑亦遺尿左手關上脈沉爲陰絶者無肝脈也若遺尿尺脈實少腹牢痛小便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不禁脈當沉滑而反浮大其色當黑反黃此土之剋水爲逆不治其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝至趺上急手握足五趾極力一通令內曲以利腰髖療遺尿也出第十四卷中

集驗療遺尿方

取雄雞腸燒灰爲末用三指一撮服之朝暮服愈范汪同出第五卷中

千金療遺尿小便澁方

牡蠣熬　鹿茸炙各四兩　桑耳一兩　阿膠二兩炙

右四味切以水七升煮取二升分爲二服作散以飲送之經心錄同

又方

木防己二兩　葵子二兩　防風三兩

右三味切以水五升煎取二升半分溫三服作散亦佳古今錄驗同並出第二十一卷中

古今錄驗牡蠣湯療遺尿小便澁方

牡蠣四兩熬　鹿茸炙四兩　阿膠炙各二兩　桑螵蛸二兩

右四味切以水五升煮取二升分再服

又方

桑耳三分　礬石二分熬汁盡　阿膠二分炙　龍骨三分

右四味爲散空心服方寸匕日三服

又方

桑耳二兩　牡蠣二兩熬　礬石二兩熬汁盡

右三味擣篩爲散酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

尿血方一十一首

千金療房損傷中尿血方

牡蠣熬 車前子 桂心 黃芩

右四味等分擣篩爲散飲服方寸匕日三服不知加至二七忌生葱 出第二十一卷中

崔氏療卒傷熱行來尿血方

大黃末 芒硝末各半匕

右二味冷水和頓服之立止三日內禁如藥法 出第四卷中

古今錄驗療尿血鹿茸散方

鹿茸炙 當歸 乾地黃各二兩 葵子五合 蒲黃五合

右五味擣篩爲散酒服方寸匕日三服忌蕪荑 出第二十六卷中

蘇澄療尿血方

車前草擣絞取汁五合空腹服之差

又方

水服亂髮灰方寸匕日三服 肘後千金同

又方

服益母草汁一升差 一云雀草

又方

車前三升水五升煮取二升分三服

[illegible]

棘刺二升水三升煮取二升分三服差

又方

膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方

酒服蒲黃二方寸匕日二服水服亦得

又方

擣水芹汁服六七合日一服

胞轉方一十五首

病源胞轉者由是胞屈辟小便不通名爲胞轉其病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小便應下強忍之或爲寒熱所迫此二者俱令水氣上還氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出外內相擁塞故令不通此病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便因急奔走或忍尿入房亦皆令胞轉或胞落並致死 出第十四卷中

肘後療卒小便不通及胞轉方

取雞子中黃一枚服之不過三服佳 備急同

又方

水上浮萍暴乾末服之小便下通利水脹流腫佳 千金同

又方

灸桑螵蛸擣爲末水服之方寸匕日服良效

又療小便惡久致胞轉方

自取爪甲火燒服之 備急同

又方

取梁上塵三指撮以水服之有效

又方

服蒲黃方寸匕日二服良

范汪療胞轉不得小便方

用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通 肘後同

又方

雀矢半合　車前子　滑石各四兩　通草

芍藥各二兩

右五味切以水七升煮取三升服五合日二先食服立愈

又療胞轉欲死及失溺方

取豆醬清和灶突中黑如豆大內陰孔中立愈 並出第十五卷中

備急療卒小便不通及胞轉方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服 小品同出第六卷中

古今錄驗療胞轉小便不通亂髮散方

亂髮三斤燒　滑石半斤　鯉魚齒一兩

右三味擣篩爲散以飲服方寸匕日三服良

又療胞轉不得小便方

真琥珀一兩　葱白十四莖

右二味以水四升煮取三升去葱白末琥珀細篩下湯中温服一升日三服佳 范汪同

又張苗說有容忍小便令胞轉大小便不得四五日困篤欲死無脉服此差方

滑石二兩　亂髮二兩燒灰

右二味擣下篩取生桃白皮一斤熟舂以水合絞得汁

二升以汁服散方寸匕日三服即愈其但淋者取亂髮三兩燒灰滑石五兩合擣爲散服方寸匕日三服

又說不得小便者爲胞轉或爲寒熱氣所迫胞屈辟不得充張津液不入其中爲尿及在胞中尿不出方

當以葱葉除尖頭內入莖孔中吹之初漸漸以極大吹之令氣入胞中津液入便愈也朱郁用此藥療郭虎將十五歲男用

葵子一升　通草　甘草各二兩炙　石韋一兩半去毛

滑石四兩　榆皮二升

右六味以水一升煮取三升令服 范汪同並出第二十六卷中

疑誤脾俞在十一椎今云十椎恐誤

小便血及九竅出血方一十二首

小品療小便血菟絲丸方

菟絲子　蒲黃　乾地黃　白芷

荆實　葵子　敗醬　當歸

茯苓　芎藭各二兩

右十味合擣爲末以白蜜和丸如梧子大飲服二丸日三服不知加至五六丸劉洪珽方已効常服忌酢物蕪荑古今錄驗范氏同

又謝血諸方所云下血者其從腹裏出者悉爲下血也有痔病血從孔邊出者別尋痔方　出第四卷中

千金療小便出血方　一本云以下治勞虛尿白濁

又方

灸脾俞百壯在第十椎

又方

灸三焦俞百壯在第十三椎

又方

灸腎俞百壯在第十四椎

又方

灸章門百壯在季肋端

又方

榆皮二斤水二斗煮取五升令服之佳

又方

擣乾羊骨下篩水服方寸匕日三服

又治小便血方

生地黃八兩　柏葉一把　黃芩三兩　阿膠二兩

右四味切以水七升煮取三升去滓内膠分三服　並出第二十一卷中

文仲療小便出血方

生地黃汁一升　生薑汁一合

右二味相和頓服不差更作此法許令公處云極効　肘後同

又方

灸足第二指本第一文七壯立愈　肘後同

又方

龍骨末二方寸匕温酒一升服之日三服　深師肘後范汪崇氏同

又方

當歸四兩酒三升煮取一升頓服之　肘後深師范汪同並出第六卷中

小便不禁方二首

病源小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能温制其水液故小便不禁也　出第十四卷中

千金翼小便不禁日便尿數十或如血色方

宋按硝石疑是滑石又按藥只七味後云八味疑有缺

麥門冬去心 乾地黃各八兩 蒺藜子 桂心
續斷各二兩 甘草一枚炙 乾姜四兩
右七味切以水一斗煮取二升五合分三服
又久房散主小便多或不禁方
菟絲子一兩 蒲黃三兩 黃連三兩 硝石一兩
肉蓯蓉二兩 五味子三兩 雞肶胵中黃皮三兩炙
右八味擣篩為散每服方寸匕日三服每服如人行三
四里又服 並出第十五卷中
小便數及多方五首
病源小便數者膀胱與腎俱虛而有客熱乘之故也腎與

膀胱為表裏俱主水腎氣下通於陰此經既虛致受於客
熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澁澁則小便不
快故令數起也診其脈跗陽脈數胃中有熱即消穀引食
大便必難小便則數其湯熨針石別有正方補養宣導今
附於後養生方導引法云以兩踵布膝除數尿 出第十四卷中
范汪療小便數而多方
黃連二分 苦參二分 麥門冬一兩去心 土瓜根
龍膽各一分
右五味擣篩以蜜丸如梧子每服十丸加至二十丸此
一方無苦參有黃芩

又方
栝樓十分 黃連五分
右二味擣篩為散每服方寸匕日三度
又方
瞿麥二兩 滑石一兩 葵子一升 黃芩
甘草一兩炙
右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合
又方
桃仁一味㕮咀酒一升煮三沸去滓分為三服強人
一服盡之 並出第十七卷中

集驗療小便數而多方
羊肺羹內少許羊肉合作之調和鹽如常食之法多
少任意不過三具効 范汪同出第五卷中
許仁則小便數多方四首
許仁則論此病有二種一者小便多而渴飲食漸加肌肉
漸減乏氣力少顏色此是消渴一者小便雖數而不至多
又不渴食飲亦不異常或不至多能食但稍遇天寒冷即
小便多更無別候此是虛冷所致大都兩種俱緣腎氣膀
胱冷不差便能殺人腎虛腰冷無所為者若候知是消渴
小便數宜依後拔葜等八味湯黃耆等十四味丸并竹根

等十味飲小麥麪等十四味煎以次服之

菝葜八味湯方

菝葜　土瓜根各三兩　黃耆　地骨皮

五味子各四兩　人參三兩　石膏八兩碎　牡蠣三兩

右藥切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里服一劑服至五六劑但隔五日服一劑劑數滿宜合後黃耆等十四味丸服之

又黃耆十四味丸方

黃耆　黃連　土瓜根各五兩　苦參三兩

玄參六兩　栝樓　地骨皮　龍骨

菝葜　鹿茸炙各四兩　牡蠣熬　人參

桑螵蛸炙各三兩　五味子一升

右藥擣篩爲末蜜和爲丸用後竹根飲下之初服十五丸日二服稍加至三十丸如梧桐子大忌豬肉冷水

又竹根飲子方

筀竹根　生茅根　蘆根各五升切　菝葜切二升

石膏一斤碎　烏梅三十枚　生薑切一升　小麥三升

竹瀝二升　白蜜一升

右藥以水五斗煮取一斗去滓內竹瀝及蜜者不准渴時之用下前丸從不下丸但覺口乾及渴即飲之如熱

月即逐日斟酌煎之多則恐壞也如不能作此飲且用烏牛乳下丸及解渴日服丸及飲後中恐虛熱宜合後小麥麪等十四味煎細細含嚥之

又小麥麪十四味煎方

小麥五升以水硬溲之則於水中挼令麪粉盡麪筋洲成一塊即止以此麪粉汁別器澄濾却清汁即以稠粉盛於練袋子中濾著令微乾生葛根五挺徑三寸長二尺許搥於水中揉挺令葛根中粉汁盡別器澄停濾貯一如小麥麪法生栝樓五斤擣如上法胡麻三升去皮熬令熱爲散筀竹根切一斤生茅根切一斤生蘆

根切一斤烏梅五十個以上用水五斗用火煎取一升半去滓澄取清冬瓜汁二升生麥門冬汁三升生薑汁一升牛乳一升白蜜二升先取竹根等汁和冬瓜以下汁微火上煎減半次內牛乳白蜜又煎六七沸投小麥麪粉生葛粉栝樓粉胡麻散於諸汁中煎和熟攪之勿住手候如稠糖即成成訖止火待冷貯別器中每夜含如此初服一棗大稍稍加至一匙亦任性日日含之欲作丸飲服亦得出第十卷中

尿床方六首

病源人有於眠睡不覺尿出者皆因稟質陰氣偏盛陽氣

偏虚則膀胱腎氣俱冷不能温制於水則小便多或不禁而遺尿膀胱足太陽也爲腎之府腎爲足少陰爲臟與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入而陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞爲小便夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於眠睡而不覺尿出也 出第十四卷中

千金療尿牀方

羊肚系盛水令滿急繫兩頭熟煮開取水頓服之立差

又方

雞肶胵一具并腸暴乾末酒服之男雌女雄也

又方

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹服之不過四五頓差

又療尿牀方

新炊熟飯一盞寫尿床處拌之收取與食之勿令知

又方

當兩手髆上盡指頭處灸七壯又灸臍横文七壯並出第二十一卷中

近効療尿牀方

取麻鞋乳帶及鼻根等唯不用底須七輛以水七升煮取二升分再服

灸穴雜法一十二首

千金翼灸五淋法

灸大敦三十壯

又石淋臍下三十六種病不得小便法

灸關元三十壯一方云百壯

又血淋法

灸丹田穴隨年壯良

又方

灸復溜穴五十壯一云隨年壯

又尿黄法

灸石門穴五十壯

又遺尿法

灸遺道俠玉泉五寸隨年壯

又法

灸陽陵泉穴隨年壯

又失禁尿不自覺知法

灸陰陵泉穴隨年壯

又莖中痛法

灸行間穴三十壯

又腹滿小便數法

灸屈骨端二七壯

又淋痛法

灸中封穴三十壯亦隨年壯

又小便不利及轉胞法

灸心下八寸七壯 以上六法出第二十七卷中

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟

校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十七卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十八卷目錄 中惡蠱注自縊暍死溺死凍死一十八門

中惡方一十三首
卒死方二十四首
客忤方一十三首
卒魘方二十一首
鬼擊方一十首
尸厥方一十二首
中蠱毒方二十一首
蠱吐血方一十首
蠱下血方九首

五蠱方一十二首
蠱注方三首
蠱毒雜療方五首
貓鬼野道方三首
自縊死方一十五首
熱暍方七首
溺死方九首
凍死方一首
入井塚悶方二首

唐王燾先生外臺秘要方第二十八卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

中惡方一十三首

病源中惡者是人精神衰弱為鬼神之氣卒中之也夫人陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脉沉數細者死浮焱如疾者生中惡

有差後餘勢停滯發作則變成注

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪暴盛陰陽為之離絕上下不通故氣暴厥絕如死良久其真氣復則生也而有乘年之衰逢月之空失時之和謂之三虛三虛而腑臟衰弱精神微羸中之則真氣竭絕則死也其得差者若餘勢停滯發作則變成注 並出第二十三卷中

廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香一分研 青木香二分 生犀角二分屑

右三味為散空腹熱水服方寸匕日二立効未止更作 忌如常法 出第四卷中

肘後華佗療中惡短氣欲絕方

灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯即愈又法三七壯 集驗張文仲備急同

又方

杏仁七十枚去尖皮 桂心二兩 甘草一兩炙 麻黃三兩去節一方四兩

右四味切以水八升煮取三升分三服含嚥之通療諸邪客忤良忌如常法

又方

韭根一把 烏梅十四顆 茱萸半升

右三味切以勞水一升煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死煮取三升飲之大効

又方

桂心一兩 生薑三兩 梔子十四枚 豉五合

右四味擣碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度 並出第一卷中

崔氏療中惡遁尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手摸按之得其痛處則病色動亂人近則患痛處方

取艾葉挼碎著痛上厚寸餘鐺中煮湯和灰作泥令熱薄艾上冷輒易之不過再著則愈 出七卷中

又療中惡心痛胸脅疞痛喘急湯方

桃東行枝白皮一握　真珠一兩　梔子人十四枚

生薑二兩　當歸　桂心各二兩　附子一兩炮

香豉五合　吳茱萸五合

右九味切以水八升煮取二升去滓內真珠分二服忌

如常法小品同

又方

仰臥以物塞兩耳以兩個竹筒內死人鼻中使兩人

痛吹之塞口傍無令氣得出半日所死人即噫噫勿

復吹也千金同

又方

擣皂莢細辛屑吹兩鼻孔中單用皂莢末亦佳千金

同並出第四卷中

刪繁療中惡痛欲絕方

釜底墨五合　鹽一撮

右二味和研以水一升攪調一服范汪同

又方

牛屎絞取汁五合為一服口不開扣齒內藥若無新

者乾者即以水和取汁並出第十卷中

崔氏療卒中惡氣絕方

取真珠研末書鬼字于舌上額上亦書鬼字驗

又方

灸右肩高骨上隨年壯並出第四卷中

卒死方二十四首

病源卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂乘年之衰

一也乘月之空二也失時之和三也人有此三虛而為賊

風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣壅閉故

暴絕如死也若腑臓氣未絕者良久乃蘇然亦有挾鬼神

之氣而卒死者皆有頃邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然

氣絕其後得蘇若其邪氣不盡者停滯心腹或心腹痛或

身體沉重不能飲食而成宿疹者皆發成疰

又卒忤死候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑臓使陰

陽離絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良久陰陽之

氣和乃蘇若腑臓虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發

則心腹刺痛連滯變成疰也並出第二十三卷中

甲乙經云黃帝問於岐伯有卒死者何邪使然答曰得三

虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰願聞三虛

答曰乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷也願

聞三實答曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪

氣不能傷也有卒死不知人有復生何氣使然陰氣先竭

陽氣未入故卒死而不知人氣復則生（集驗同出第六卷中）
肘後云卒死中惡及尸厥者皆天地及人身自然陰陽之
有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可療
而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可
以符術護濟者

追按 術小肘 本後經 闕

又卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕皆是中惡之
類療方
取葱刺鼻令入數寸須使目中血出乃佳一云耳中
血出佳此扁鵲法同後云吹耳中葛氏吹鼻別為一
法（肘後集驗備急文仲范汪等同崔氏亦療中惡）

又方
令二人以衣壅口吹其兩耳亦可以葦筒吹之（肘後同）
又方
以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難療之有血
者是活候也其欲蘇時當捧兩手莫放之須臾死人
自當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻孔令
入七寸餘無苦立效亦療自縊死此扁鵲法（肘後集驗備急同）
又方
視其上脣裏弦有青息肉如黍米大以針決去之差（肘後同）

又方
以小便灌其面數過即能活扁鵲法（肘後集驗張文仲備急同）
又方
以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中并持其手足
莫令驚動也（肘後同）
又方
灸其脣下宛宛中名承漿十壯大良（肘後同並出第一卷中）
文仲療卒死方
燒牛馬糞絞取汁以灌其口中令入喉若口已噤者
以物強發若不可強發者扣折齒下之若無新者以
水若人尿和乾者絞取汁扁鵲法（集驗備急肘後同）

又方
以細繩圍其人肘腕中男左女右伸繩從背上大椎
度以下行脊上灸繩頭（一云五十壯）又從此灸橫行
各半繩此凡三灸各灸三壯即起
又方
令人痛爪其人人中取醒不起者捲其手灸下文頭
隨年壯
又方
灸鼻下人中三壯

又方

灸臍中百壯

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

又方

擣薤若韭取汁以灌口鼻中 張文仲集驗范汪同

又方

猪膏如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中 集驗肘後備急同

又卒死而壯熱者方

礬石半斤煮以漬脚令沒踝 肘後范汪同並出第一卷中

備急療卒死而目閉者方

騎牛臨其面擣薤汁灌耳中末皂莢吹鼻中 集驗文仲肘後范汪同

又療卒死而張目及折者方

灸手足兩爪甲後各十四壯飲以五毒諸膏散有巴豆者良 肘後張文仲同

又療卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗足又取牛糞一升温酒和灌口中 肘後同

又方

灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各百壯良 肘後同

又卒死而口噤不開者方

縛兩手大拇指灸兩白肉中二十壯 肘後文仲范汪同並出第一卷中

集驗療卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也方

牽牛臨鼻上二百息又灸熨斗以熨兩脅下鍼兩間使各百餘息灸人中

又療卒死而有脈形候陰氣先盡陽氣後竭故也方

嚼薤哺灌之 肘後文仲千金范汪同並出第一卷中

古今錄驗司空三物備急散療卒死及感忤口噤不開者方

巴豆去皮熬 乾姜 大黃各等分

右藥擣篩爲散服如大豆許二枚以水三合和之腹脹煩熱復飲水能多益佳

又療心腹痛幾死服此丸令小利差如腹常滿痛當令得下差一方服一刀圭以酒下之不能刀圭者便丸如大豆許四枚不知復加一豆許不差又加一豆許若病者口噤不能自飲捐口含之藥不預合預合氣力歇卒病者便合之無白木杯中擣耳不過三服取利無不差者蜜丸大良 出第四卷中

客忤方二十三首

病源卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂魄衰弱者則爲鬼氣所犯忤喜於道間門外得之其狀心腹絞痛脹滿氣衝心胷或即悶絕不復識人肉色變異腑臟虛竭者不療即至於死然其毒氣有輕重輕者微療而差重者侵赴腑臟雖當時救療餘氣停滯久後猶發乃變成疰出第二十三卷中

册後論曰客者客氣也忤者犯也謂客氣忽犯人也此惡鬼毒厲之氣療之多愈亦有侵赴臟腑經絡雖差後猶宜治療以消餘勢不爾終爲人患有時輒發

又客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即療亦殺人方

灸鼻下人中三十壯愈備急文仲同

又方

以水漬粳米取汁二升以飲之口已噤者以物強發之

又方

以銅器若瓦器盛熱湯器著腹上冷者瀉去衣器親肉大冷者易以熱湯取愈也

又方

先以衣三重藉腹上以銅器著衣上取茅草於器中燒之草盡再益勿頓多也取愈乃止備急文仲

又方

以繩橫其人口以度度臍下去冬一處灸三壯令火俱起也

又方

橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯也並出第一卷中

又療客忤心腹絞痛脹滿氣衝心胷煩躁壯熱或氣悶絞刺鬼魅之氣未散方

麝香一錢 茯神 人參 天門冬去心 鬼臼 菖蒲等分

右六味蜜丸如桐子服十丸日三

又仲景論療客忤有救卒死符並服鹽湯法恐非庸世所能用故不載而此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類爲療皆參取而用之已死者方

搗生菖蒲根絞取汁含之即愈備急同後同

又療卒忤停尸不能言者方

燒桔梗二枚末飲服之

又方

細辛 桂心各等分

右二味內口中 肘後備急同

又卒忤口噤不開者方

生附子末置管中吹內舌下 備急肘後同並出第一卷中

千金療客忤惡氣方

吞麝香如大豆立驗 出第五卷中

千金翼客忤方

灸間使七壯又兩并百壯又十指甲下各三壯 出第二十七卷中

卒魘方二十一首

病源卒魘者屈也謂夢裏爲鬼邪之所魘屈也人臥不寤

皆是魂魄外遊爲他邪所執録欲還未得致成魘也忌火照火照則魂魄遂不復入乃至於死而人有於燈光前魘者本由明出所以不忌火也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云拘魂門制魄戶名曰握固法屈大拇指著四小指內抱之積習不止眠時亦不復魘令人不魘魅又云人魘忽然明喚之魘死宜閽喚之好唯得遠喚亦不得近而急喚亦喜失魂魄也又魘不寤候人眠睡則魂魄外遊爲鬼邪所魘屈其精神弱者魘則久不得寤乃至氣暴絕所以須傍人助喚並以方術療之即蘇也 並出第二十三卷中

肘後療卒魘寐不寤方

臥忽不寤勿以火照之殺人但痛　其腳踵及足拇指甲際而多唾其面則覺也

又方

皂莢末以竹筒吹兩鼻孔中即起三兩日猶可吹之也

又方

以筆毛刺兩鼻孔男左女右展轉進之取起也 集驗同

又方

搗薤取汁吹兩鼻孔冬日取韭絞汁灌口 集驗仲景文仲備急同

又方

以蘆管吹兩耳並取其人髮二七莖作繩內鼻孔中割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良 並出第一卷中

集驗療卒魘方

以鹽湯飲之多少在意並嚙其足大指爪際痛嚙之即起也 肘後文仲備急同

又方

以其人置地取利刀畫從肩起男左女右畫地令周還訖以刀鋒刺病人鼻下人中令入一分急持勿動

其人當鬼語求去乃具問阿誰以何故來自當乞去乃以指戲向所畫地當肩頭數寸令得去

又方

雄黃細篩管吹兩鼻孔中佳（並出第一卷中）

崔氏主卒魘方

以餛帶左索縛其肘後男左女右用餘猶急救之又縛脒脚乃詰問其故（肘後方今錄驗同）

崔氏云療卒狂鬼語方以餛帶急令縛兩手大指便灸左右脅下屈肘頭尖各七壯須臾鬼語自道姓名乞去徐詰問乃解其手

文仲療卒魘方

令一人坐頭邊守一人於戶外呼病人姓名坐人應曰在便甦活也（肘後同）

又人喜魘及惡夢者方（以下並辟魘方）

取燒死人灰著屨中令枕之

又方

帶雄黃男左女右也

又方

枕麝香一分於頭邊佳又灌香少許

又方

以虎頭爲枕佳

又方

取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魘也（集驗范汪同）

又方

作犀角枕佳

又方

青木香內枕中幷帶之亦佳（並出第一卷中）

千金小定心湯療虛羸心氣驚弱多魘方

茯神（四分一本作茯苓） 甘草 芍藥 乾姜
大棗（十五枚擘） 遠志（去心） 人參 桂心（各二兩）

右八味切以水八升煮取三升分三服日三忌如常法

又大定心湯療心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不足方

人參 茯苓 茯神 遠志（去心）
赤石脂 龍骨 乾姜 當歸
甘草（炙） 白朮 芍藥 大棗
桂心 防風 紫菀（各二兩）

右十五味切以水一斗二升煮取三升半分爲五服日三夜二忌如常法

千金療卒魘不覺方

灸兩足大指聚毛中二十一壯 范汪同出第二十七卷中

備急療卒魘不寤方

末竈下黃土或雄黃桂心末亦得

右以蘆管吹入兩鼻孔中 文仲同出第一卷中

鬼擊方二十首

病源鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名為鬼排言鬼排觸於人也氣血虛弱精魂衰微忽與鬼神遇相觸突致之為其所排擊輕者因而獲免重者多死也 出第二十三卷中

肘後鬼擊之病得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名鬼排治之方

灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際差 千金翼同

又方

熟艾如鴨子大三枚以水五升煮取二升頓服之 范汪同出第一卷中

文仲療鬼擊方

鹽一升以水二升和攪飲之并以冷水潠之須臾吐即差 備急肘後同

又方

粉一撮於水中攪飲之 備急肘後同

又方

以淳苦酒吹令入兩鼻孔中 肘後同並出第一卷中

備急療鬼擊方

燒鼠屎末如黍米許水和服不能飲以水和少許內喉中 肘後文仲同

又方

升麻 獨活 桂心各等分

右三味為末酒服方寸匕立愈 肘後同

又有諸丸散並在備急條中今巫覡實見人忽被神鬼所擊刺擺撲者或犯其行伍或遇相觸突或身神散弱或愆負所招輕者獲免重者多死猶如周宣燕簡輩事不為虛也必應死者亦不可療要自不得不救之耳 肘後同並出第一卷中

刪繁倉公散方

特生礜石燒半日研 皂莢炙去皮子 雄黃研 藜蘆熬

右四味等分擣為末主療卒鬼擊鬼排鬼刺心腹痛下血便死不知人及臥魘齧腳踵不覺者諸惡毒氣病取前散如大豆許以管吹入鼻中得嚏則氣通便活若未嚏復更吹之得嚏為度此藥能起死人漢文帝太倉令

淳于意以此方療如前病勝餘方若別疾不若玉壺丸等佳崔氏備急范汪等同出第六卷中

千金翼療鬼擊方

灸臍下一寸三壯出第二十七卷中

尸厥方一十二首

病源尸厥者陰氣逆也此由陽脉卒下墜陰脉卒上升陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶微有息而不常脉尚動而形無知也聽其耳內循循有如嘯之聲而股間暖者是也耳內雖無嘯聲而脉動者故當以尸厥療之診其寸口脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣

相搏身溫而汗此為入腑雖卒厥不知人氣復則自愈若脣正青身冷此為入藏亦卒厥不知人即死候其左手關上脉陰陽俱虛足厥陰足少陽俱虛也病若恍惚不知人疾有所見

張仲景云尸厥脉動而無氣氣閉不通故靜而死也治方

菖蒲屑納鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下

又方

取左角髮方寸匕燒末酒和灌令入喉立起

肘後方

白馬尾二七莖白馬前腳甲二枚燒之以苦酒丸如小豆大開口吞二丸須臾服一丸

又方

灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下部一寸百壯若婦人灸兩乳中又云爪刺人中良久又針人中至齒立起此扁鵲法

又方

以繩圍其臂腕男左女右繩從大椎上度下行脊上灸繩頭盡處五十壯活此是扁鵲法

又方

熨其兩脇下取灶中墨如彈丸大漿和飲之更以管

吹耳中令三四人更互吹之

又方

以小管吹鼻孔梁上塵如豆大著中吹之令入

又方

針百會當鼻中入髮際五寸許針入三分補之針足大指甲下肉側去甲三分又針足中指甲上各三分大指之內去端韭葉許又針手少陰銳骨之端各一分

又方

灸膻中季肋間二七壯也肘後惟云灸膻中集驗同出第一卷中

千金論曰風寒之氣客於藏間滯而不能發故瘖不能言及喉痹失聲皆風邪所爲也入藏皆能殺人凡尸厥如死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也療方

灸百會百壯鍼入三分補之

又方

鍼足中指頭去甲如韭葉並刺足大指甲下內側去甲三分

崔氏論曰凡尸厥爲病脉動而形無所知陽脉下墜陰脉上爭榮衛不通其狀如死而猶微有息其息不常人乃不知欲殯殮者療之方

急可以蘆管吹其兩耳極盡以氣吹之立起若人氣極可易人吹之 出第四卷中

中蠱毒方二十一首

病源凡蠱毒有數種皆是變惑之氣人有故造作之多取蟲蛇之類以器皿盛貯任其自相噉食唯有一物獨在者卽謂之爲蠱便能變惑隨逐酒食爲人患禍患禍於他則蠱主吉利所以不羇之徒而畜事之又有飛蠱去來無由漸狀如鬼氣者得之卒重凡中蠱病多趨於死以其毒害勢甚故云蠱毒著蠱毒面青黃者是蛇蠱其脉洪壯病發之時腹內熱悶胷脅支滿舌本脹強不喜言語身體常痛又心腹如似蟲行顏色赤脣口乾燥經年不治肝膈爛而死其面色赤黃者是蜴蜥蠱其脉浮滑而短病發之時腰背微滿手脚脣口悉皆習習而喉脉急舌上生瘡二百日不治噉人心肝盡爛下膿血羸瘦顏色枯黑而死其面色青白又云其脉沉濡病發之時咽喉塞不欲聞人語腹內鳴喚或上或下天陰雨轉劇皮內如蟲行手脚煩熱嗜醋食欬唾膿血顏色乍白乍青腹內脹滿狀若蝦蟇若成蟲吐出成科斗形是蝦蟇蠱經年不治噉人脾胃盡脣口裂而死其脉緩而散者病發之時身體乍冷乍熱手脚煩疼無時節吐逆小便赤黃腹內悶胷痛顏色多青毒或吐出

似蜣蜋有足翅是蜣蜋蠱經年不治噉人血脉枯盡而死欲知是蠱與非當令病人唾水內沉者是蠱浮者非蠱又云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾如柱脚直下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又云含大豆若是蠱豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵠皮置病人臥下勿令病人知若病劇者是蠱也又云取新生雞子煮熟去皮留黃白令完全日晚口含以齒微齧勿令破作兩炊時夜吐瓦上著霜露內旦看大青是蠱毒也昔有人食新變鱧魚中毒病心腹痛心下鞕發熱煩寃欲得水洗沃身體搔摸如魚得水狀有人診云是蠱其家云從無此毒不作蠱

治蠱死其湯飲鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手著頭相叉坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中痛低頭入膝間兩手交叉頭十二通愈蠱毒及三尸毒腰中大氣又云常度日月星辰清淨以雞鳴安身臥漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生治心腹病又云治百病邪蠱當正臥閉目閉氣內視丹田以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令入多出少以微爲故存視五藏各如其形色又存胃中令鮮明潔白如素爲之倦極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者亦可止明日復爲之又當存作大雷電光走入腹中爲之不止

病自除出第二十五卷中

千金論曰蠱毒千品種種不同或吐下鮮血或好臥闇室不欲見光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沉重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆於九孔中或於脅下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱猫鬼狐狸老物精魅永不敢著人養生之家大須慮此以下亦有灸法初中蠱於心下作叉炷灸一百壯並主猫鬼亦灸得差

又論曰世有拙醫見患蠱者徧腹腫滿四肢如故小便不甚澁以水病療之近服水藥經五十餘日望漸益愈已復增加奄致殂殞如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云爾出第二十五卷中

療蠱毒方服此升麻散三四日後即服前光砂丸方

升麻 桔梗 栝樓各五兩

右三味搗爲散以熟湯洗所患人陰中再以濃汁服方寸匕日一服漸加至二匕內消忌粘食豬肉出第四卷中

肘後療中蠱毒諸方人有養畜蠱毒以病人凡診法中蠱狀令人心腹切痛如有物齧或吐下血不即療之食人五

藏盡即死矣欲知是蠱與非當令病人唾水沉者是浮者非也小品文仲備急集驗千金並異同

又欲知蠱主姓名方

取鼓皮一片燒灰末以飲服病人須臾自當呼蠱主姓名可語令知便即去病愈矣亦有以蛇涎合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有榮江南山間人不可不信之

又方

以蘘荷葉著病人臥席下亦能令呼蠱主姓名也文仲備急千金並翼同出第三卷中

小品療蠱方

皷皮廣五寸長一尺　薔薇根五寸如足拇指大細切本方黃苴若根

右二味以水一升清酒三升煮取一升頓服之當下蠱即愈千金古今錄驗同千金治蠱吐下血

又方

土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下古今錄驗同

又方

皂莢三挺長一尺者炙去皮子美酒一升漬一宿去滓頓服古今錄驗范汪同肘後云以酒五升分三服

又方

取蘘荷根擣爲末以飲服方寸匕古今錄驗同

千金犀角丸療蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角末　羚羊角末　鬼臼　桂心各四錢匕

天雄炮　莽草炙　真珠研　雄黃研各一兩

麝香半兩研　貝齒燒灰五枚　赤足蜈蚣五節炙

射罔如雞子黃三枚　巴豆五十枚去皮心熬

右十三味各擣合篩之以蜜和爲丸如小豆大服一丸不如增一丸卒得腹中痛飛尸服如大豆二丸若惡氣腫以苦酒和以塗之甚良以絳囊盛藥繫男左女右臂辟惡可以備急療萬病也忌如常法崔氏古今錄驗范汪同出第十五卷中

千金翼療蠱毒方

榔木北陰白皮一大握長五寸以水三升煎取一升空腹服之即吐蠱出也亦療蠱下血出第十五卷中

崔氏療蠱方

黃瓜樓根乾者二兩擣以絹裹酒一升漬一日去滓溫服之少時即吐利蠱即出後煮粥飲服一兩盞吐利即斷不斷即煮人參甘草炙生薑各一兩服之此根唯山南者好出第三卷中

備急療蠱方

取白鷄毛糞燒灰以飲和服之良

又療蠱方人家雖藏此方而不知如此効驗

擣生栝樓根取汁一升醬汁少許和溫服之須臾吐蠱出試驗並出第十六卷中

必効療蠱毒大神驗方

大戟　桃白皮東引者以火烘之　班猫去足翅熬等分

右三味擣篩爲散以冷水服半方寸匕一服其毒即出未出更一服蠱並出李饒州法云奇効若以酒中得則以酒服若食中得以飲服之崔氏千金同肘後云班毛一分桃皮大戟各三分和

棗核大米清飲服吐出蠱十日不差更一服千金崔氏云服八捻

又方

胡荽根擣取汁半升和酒服之立下

又方

取未鑽相思子二七枚擣碎爲末煖水半盞和攪頓服之令盡即當欲吐抑之勿吐若耐不得即大張口吐之其毒即出出訖服稀粥勿食諸肉輕者但服七枚若無問年月深淺并常神効勿輕之

又試蠱法

取銀匙若筯或釵含之經宿色黑即是不黑者非出第三卷中

古今錄驗療蠱方

巴豆十枚去心皮熬　豉半升熬　釜底墨方寸匕

右三味擣篩爲散清旦以酒服如簪頭大小行蟲去當自至門勿應之去到家立自知其姓名

又雄黃丸主蠱毒中藥欲死方

雄黃研　硃砂研　藜蘆炙　馬目毒公

皂莢炙去皮子二分　莽草二分炙　巴豆去心皮熬各二分

右七味擣篩以蜜丸如大豆許服三丸當轉下先利清水次出蛇等當煩悶者依常法可用鵝羹補之忌如常

法

又療中蠱毒方

取牡丹根擣末服一錢匕日三服至良忌胡荽范汪同

又療中蠱胡洽方

以豬膽導下部至良肘後[illegible]范汪同並出第四十王燾[illegible]

蠱吐血方一十首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其相啖食餘一存者名爲蠱能害人食人腑臟其狀心切痛如被物嚙或鞕面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也不即治之食藏腑盡則死出第二十五卷中

肘後療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方

茜根　蘘荷根各三兩

右二味㕮咀以水四升煮取二升去滓頓服即愈又當自知蠱主姓名千金小品崔氏文仲備急古今錄驗同

又方

巴豆一枚去心皮熬　豉三粒　釜底墨方寸匕

右三味擣分作三丸飲下一丸須臾當下蠱毒不下更服一丸小品必効集驗文仲備急范汪同並出第三卷中

范汪療中蠱吐血方

麥麴二升故以水服之令盡當下蠱

又方

苦瓠一枚以水二升煮取一升分服當吐蠱如蝦蟆科斗之類苦瓠毒可臨時揣用之肘後千金小品文仲備急古今錄驗同千金云苦瓠一分治下血

又方

生桔梗擣取汁服二三升日一服牛膝根亦得並出第十四卷中

文仲療中蠱吐血方

羖羊皮方三寸炙　苦參　蘘荷根三兩

黃連二兩　當歸二兩

右五味切以水七升煮取二升分三服肘後集驗同一方有苦瓠

又方

取桑木心剉一斛於釜中以水淹之令上有三寸煮取二斗澄取清又微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒崔氏集驗古今錄驗同

又方

雄黃研　釜月下黃土　藜芦炙各如棗　班猫十四枚去足翅熬

右四味擣末以酪漿服之分為三服則吐蝦蟆小品同古今錄驗方有大黃如棗大或吐蝦蟆及蛇等物餘同范汪同

崔氏療中蠱吐血方

雄黃研　丹砂研　藜蘆炙各一兩

右三味擣篩為散旦以井花水服一刀圭當吐蠱毒忌生血物狸肉肘後集驗同凡蠱有數種而人養作者最多也郡縣有名章者尤甚今東有句章章安故鄉南有豫章無村不有無縣不有而不能如此之甚耳非唯其飲食不可噉乃至目色之已入人類此輩小易療復有自然飛蠱狀如鬼氣者難療此諸種得真犀角麝香雄黃為良藥人可常帶此亦預防之易有蠱卦又子產所說並以器皿中蟲為蠱今省凡皿上安一虫字或作虫遊大非體也並出第四卷中

小品療中蠱心痛吐血欲死方

鹽一升淳苦酒一升煮令消和一服立吐蠱毒出已用良驗肘後文仲備急古今錄驗同出第四卷中

蠱下血方九首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其自相食噉餘留一存者為蠱能變化為毒害人有事之以毒害多因飲食內行之人中之者心腹懊痛煩毒不可忍食人五藏下血瘀黑如爛雞肝出第二十五卷中

小品療蠱毒腹痛注下赤血躑躅散方

羊躑躅　乾薑　藜蘆炙　附子炮

巴豆去皮心熬 野葛皮 肉桂 丹砂研

雄黃研 蜈蚣炙各一分

右十味擣為散以水服一刀圭不知加一粟米忌豬肉蘆筍生血物生葱狸肉古今錄驗同

又療蠱下血欲死方

薔薇根切一升 牛膝五兩 連翹子一升 隰子一升許

右四味切以水四升煮取一升分三服即愈古今錄驗同

又療諸蠱大便下血日數十行方

巴豆七枚去心皮 藜蘆炙 附子炮 芫青去足翅熬

礬石各一分燒汁盡

右五味擣下篩別研巴豆如膏和相得以綿裹一大豆許內下部中日二三愈忌同前方千金古今錄驗同並出第四卷中

千金凡忽患下血以上件方療更增劇者此是中蠱其下血狀如鴨肝腹中絞痛急者此方主之

茜根 升麻 犀角各三兩 地榆

白蘘荷各四兩 桔梗 黃蘗 黃芩各一兩

右八味切以水九升煮取二升半分三服

又凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷痢處之此大非也

又療中蠱毒吐血下血皆如爛雞肝令人心腹絞切痛如有物齧若不即療令人五藏盡乃死驗之法欲知是蠱令病人唾水中沉者是蠱浮者非蠱也方

槲木北陰白皮 桃根皮 蝟皮炙一方寸匕

亂髮灰一方寸匕 生麻子汁五升

右五味先煮槲皮桃根取濃汁一升和麻子汁亂髮灰蝟皮末等令病者少食且服一升須臾著盆水以雞翎擿吐水中如牛涎犢胎及諸蠱毒之物出第二十五卷中

千金療蠱毒下血方

蝟皮燒灰以水服方寸匕當吐蠱毒出第十五卷中

崔氏療中蠱下血及毒下羖羊皮湯方

羖羊皮方三寸炙 蘘荷根四兩 苦參 黃連各二兩

當歸 升麻 犀角各三兩

右七味切以水九升煮取三升分三服無蘘荷根以葅根代之

又療中蠱毒湯血日夜無度腹痛不可忍方

取白蘘荷葉四五枚私內著病人眠卧處席下勿令病人知之若為蠱毒所傷則不肯在上眠即知是蠱毒為病用皂莢三梃炙去皮子打碎用極釅醋四升於瓷器中從日正午時漬皂莢又以新白布三尺蓋上布上又横一口食刀並對病人服牀下安之至來

自午時取藥用蓋藥布漉去滓分三服每服相去如
人行十里久若不肯服可將鍼刺兩手大拇指端甲
赤不勞深其鍼且勿拔出病人當自服藥蠱毒或吐
或大便中出除其血即斷腹痛亦除此方用皆驗 並
出第三卷中

古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜下石餘血四藏
悉損唯心未毀或乃鼻破待死方

桔梗擣末以酒服方寸匕日三不能下藥以物拗口
開崖之心中當煩須臾自靜有頃下蠱至服七日止
當服猪肝臛以補之 出第四卷中

五蠱方一十二首

千金太上五蠱丸主百蠱吐血傷中心腹結氣或堅氣塞
咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常
狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅
卒得心痛上叉胸脅痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主
之方

雄黃 研　椒目 熬　巴豆 去心皮熬　鬼臼
莽草 炙　芫花 熬　真珠　藜蘆 炙
礬石 燒各四分　獺肝 炙二分　附子 炮去皮五分　蜈蚣 三枚炙
斑猫 三十枚去翅足熬

右十三味擣末蜜和更擣一二千杵每服如小豆一丸
餘密封勿泄十丸爲一劑如不中病後日增一丸以下
利爲度當下蟲種種狀貌不可具載下七日後將息服
一劑三十年百病盡除忌五辛猪肉冷水生血物狸肉
蘆笋等

又方

酒服桔梗犀角末方寸匕日三服不能自服拗口與
藥下心中當煩須臾自靜有頃下至七日止當食猪
肝以補之 並出第二十五卷中

崔氏療五蠱毒方

一曰蜣蠱食中得之咽中如有物嚥之不入吐之不出
悶亂不得眠心熱不能食方

服馬兜苓根即吐出又服麝香方寸匕亦自消或吐
出也

二曰蜥蜴蠱得之胸中忽然或哽人咽怵怵如蟲行欬
而有血方

服猪肪脂即下或吐或自消也

三曰蝦蟆蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大
喘而氣發方

服車脂半升即出

四曰抖斗蠱同上療法甚驗
五曰草蠱術在西涼以西及嶺南人多行此毒入人咽
刺痛求死方
服甘草藍汁即自消
又方
五蠱共一法療之但取茬茹席衣切之暴乾爲散水
和服半錢匕五毒自消
又方
含升麻嚥汁
又方
五蠱都服馬兜苓苗似蘿摩草形正直上取雞子大
擣爲散服半錢匕或至一匕五蠱毒之病多在喉中
常須記之或小醫不識此病言胃冷蛇動或淚稱是
注灸刺淚服諸藥枉死也此由醫生未經歷故也宜
令審別之並出第二卷中
古今錄驗五蠱湯方
犀角三兩 蘘荷根 黃連 絳草
當歸各二兩 羚羊皮方二寸炙
右六味切以水七升煑取二升分爲三服
又五蠱下利吐膏血赤朒丸方

一按小參解此補推皆道主當根柬附不詳是古

芫花一升 巴豆一百枚 赤朒方四一寸
右三味擣篩以蜜爲丸更擣九如胡豆服一丸如下利
不止以清粥汁止之不下小增之欲令除除不令大下
范汪同並出第四十五卷中
蠱注方三首
病源蠱注者住也言其病遲曆停住死又注易傍人也蠱
有是聚蛇蟲之類以器血盛之令其自相噉食餘有一個
存者爲蠱也而能變化人有造作敬事之者以毒害於他
多於飲食內而行用之中之者心悶腹痛其食五藏盡則
死有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊走
腹內常氣力羸憊骨節沉重發則心腹煩懊而痛令人所
食之物亦變化爲蠱漸侵食府藏盡而死死則病流注染
著傍人故爲蠱注也出第二十四卷中
范汪療蠱注百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利卒忤
遇惡風臚脹腹滿淋水轉相注殫門盡戶延及男女外孫
醫所不能療更生十七物紫參丸方
紫參 人參 半夏洗 藜蘆
代赭 桔梗 白薇 肉蓯蓉各二分
石膏一分 大黃一分 牡蠣一分熬 丹參一分
蝦蟆灰 烏頭炮四分 狼毒一分 附子炮五分

前按茜貫汁鏑毛母之小鳥紅毛布也

巴豆七十枚去心皮熬

右藥擣篩蜜和爲丸以飲下如小豆一丸日三服老小以意減之蜂蠆所螫以塗其上忌羊肉冷水一方無蜈蚣有乾薑四分出第十四卷中

小品雄黃丸療蠱注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀溺泄死後注易家人方一名蠱疰丸

雄黃研　巴豆　藜蘆炙　鬼臼各四分

蜈蚣三枚炙

右五味擣篩爲末蜜和更擣三千杵藥成密器封之勿令泄氣宿勿食服如小豆一丸不知加一丸當先下痛

水蟲長數寸及下蛇或如壞雞子或白如膏下訖後作蔥豉粥鴨羹補之忌生魚生菜豬肉蘆笋冷水及食將養也千金同出第十四卷中

集驗療鬼注蠱注毒氣變化無常鮫魚皮散方

鮫魚皮鵲魚皮是　犀角　麝香研

龍骨　丹砂研　雄黃研　蘘荷葉

鹿角炙各一分　蜈蚣一枚炙　椒一分汗　乾薑一分

貝子十枚　雞舌香一分

右十三味擣篩爲散空心酒服一錢七日三服出第一卷中

蠱毒雜療方五首

小品療蠱似蛇方

雄黃研　麝香研

右二味各如大豆許取生羊肺如指大以刀開取雄黃等末以肺裹呑之崔氏集驗古今錄驗同

又療人食菜及菓子中蛇毒方

大豆末以酒漬取汁半升服之又以雞血和真鐵精呑如梧子大一丸古今錄驗同

又療有人食新變魚取飽中毒病心腹痛心下堅發熱煩寃欲得水沃身動搖如魚得水狀有人診病云是蠱家云肝中相承無此毒不作蠱療之遂死並出第四卷中

千金療人得藥雜蠱方

斑猫六枚去足翅熬　桂心一片如指大　釜月下土如彈丸大

藜蘆如指大炙

右四味擣散水服一錢七下蠱蛇蝦蟇蜣螂白蟲

又療有人中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變狀無常方

犀角一兩　芍藥二兩　黃連二兩本方一兩　梔子人十枚

蘘荷葉四兩半　牡丹皮二兩　羚羊皮方廣五寸炙

右七味切以水五升煮取一升半去滓分溫再服翼古今錄驗同出第二十五卷中

古今錄驗療食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露
骨立病變無常方
爐中取鐵精細研別搗烏雞肝和之丸如梧子大以
酒服三丸日三服甚者不過十日愈微者便愈 肘後傳氏
同出第四十五卷中
貓鬼野道方三首
病源貓鬼者云是老狸野物之精變為鬼蜮而依附於人
人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺痛食人腑
臟吐血痢血而死又野道者是無主之蠱也人有畜事蠱
以毒害人為惡既積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮遊

田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其
於田野道路得之故謂之野道並出第二十五卷中
千金療貓鬼野道病歌哭不自由方
五月五日取自死赤蛇燒作灰研井花水服方寸匕
日一服
又療貓鬼眼見貓狸並耳有所聞方
相思子　蓖麻子　巴豆各一枚　朱砂末
蠟各四銖
右五味擣作丸取麻子許含之即以灰圍患人前頭著
一斗灰火吐藥火中即畫火上作十字其貓鬼並皆死

矣忌貓肉蘆笋生血物 異方有蝟粉出第二十六卷中
古今錄驗療妖魅貓鬼病人不肯言鬼鹿角散方
鹿角屑擣散以水服方寸匕痛者即言實也 出第四十五卷中
自縊死方一十五首
病源人有不得意志者多生忿恨往往自縊以繩物繫頸
自懸掛致死呼為自縊若覺早雖已死徐徐捧下其陰陽
經絡雖暴擁閉而臟腑真氣故有未盡所以猶可救療故
有得活者若見其懸掛便忽遽截斷其繩則不可救此言
氣已擁閉繩忽暴斷其氣雖通而奔迸運悶氣則不能還
即不復得生又云自縊死旦至暮雖已冷必可活暮至旦

則難療此謂其旦則陽盛其氣易通也夜則陰盛其氣難
通也又云夏則夜短又熱則易活又云氣雖已斷而心微
溫一日以上猶可活也出第二十三卷中
肘後錄氏療自縊死心下尚微溫久猶可活方
徐徐抱解其繩不得斷之懸其髮令足去地五寸許
塞兩鼻孔以蘆管內其口中至咽令人噓之有頃其
腹中礱礱轉或是通氣也其舉手撈人當益堅捉持
更遞噓之若活了能語乃可置若不得懸髮可中分
髮兩手牽之
又方

皂莢末葱葉吹其兩鼻孔中遂出復內之千金備急文仲同

又方

以蘆管吹其兩耳極則易人吹取活乃止若氣通者

以少桂湯稍稍嚥之徐徐乃以少粥清與之並出第三卷中

仲景云自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難也恐

此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可療又

云心下若微溫者一日以上猶可活皆徐徐抱解不得截

繩上下安被卧之一人以脚踏其兩肩手小挽其髮常弦

弦勿縱之一人以手按據胸上數動之一人摩捋臂脛屈

伸之若已殭但漸漸強屈之並按其腹如此一炊頃氣從

外臺秘要 二十八卷 三十九 經餘居

口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之須令可少桂

心湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥乃稍止兼令兩人

各以管吹其兩耳彌好此最善無不活者並皆療之肘後備急

文仲古今錄驗同

備急方

以鬭不若氈毡厚毡物覆其口鼻抑之令兩人極力

吹其兩耳一炊頃可活也肘後千金文仲集驗小品同

又方

懸牽其頭髮塞兩耳勿令通氣以葱葉刺鼻中兩人

極力痛吹之候其兩脚踶即活亦可塞鼻而吹口活

也小品古今錄驗同

范汪療自縊死方

懸其髮令足裁至地一時許即活

又方

急手掩其口鼻勿令內氣稍出二時許氣至即活備急

文仲古今錄驗肘後同

又方

以肩急以手擔令堅以車牛載行三十里許使人於

車上行踏肩引髮吹耳

又方

外臺秘要 二十八卷 四十 經餘居

以松子油內口中令得入咽中則便活

千金療自縊死方

以藍青汁灌之又極須安定身心徐徐緩解慎勿割

繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中即活男用雌

雞女用雄雞

又方

雞屎白以棗許酒半盞和灌口鼻中即活

又方

梁上塵如大豆各內一筒中四人各一筒同時吹兩

耳鼻中極力吹之即活

又方

尿鼻口眼耳中並捉頭髮一撮如筆管大掣之立活

並出第二十六卷中

删繁療五絕死方

一曰自縊二曰牆壁所迮三曰溺水四曰魘寐五曰產乳皆取半夏一兩搗篩以一大豆內鼻孔中即活心下溫一日者亦可活千金同

熱暍方七首

病源夏月炎熱人多冒涉途路熱毒入內與五藏相并客邪熾盛鬱瘀不宣致陰氣卒絕陽氣暴壅經絡不通故奄然悶絕謂之暍也然此乃外邪所擊真藏未壞若遇便治救氣宣則蘇也夫熱暍不可得冷得冷便死此謂外邪卒以令鬱其熱蘊積於內不得宣發故也又冒熱困乏後人已務之腑為冒大熱熱毒之氣入藏則悶煩冒至於困乏也並出第二十三卷中

肘後夏月中熱暍死凡中暍死不可使得冷得冷便死療之方

以屈草帶繞暍人臍使三四人尿其中令溫亦可用泥土屈草亦可扣瓦椀底若脫車釭以著暍人臍上取令尿不得流去而已此謂道路窮急無湯當令人

尿其中仲景云欲使多人尿取令溫若有湯便可與之仲景云不用泥及車釭恐此物冷暍既在夏月得熱土泥暖車釭亦可用也同備急文仲集驗小品千金

又方

灸兩乳頭各七壯千金同

又方

取道中熱塵土以積暍人心下多為佳少冷即易通氣也千金同

又方

搗菖蒲汁飲之一二升

又凡此療自經溺暍之法並出自張仲景為之其意理殊絕殆非常情所及亦非本草之所能開悟實拯救人之大術矣傷寒家別復有暍病在上仲景論中非此遇熱之暍

文仲同出第七卷中

千金療熱暍方

可飲熱湯亦可用少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿頓使飽但以熱土及熱灰土壅其上佳古今錄驗同

文仲療夏月暍死方

濃煮蓼汁灌三升不差更灌之肘後千金同

古今錄驗療熱暍方

令人口噤心前令暖易人爲之（肘後同）

溺死方九首

病源人爲水所沒溺水從孔竅入灌注府藏其氣擁閉故死早拯救得出即泄瀝其水令氣血得通便得活又云經半日及一日猶可蘇氣若已絕心下暖者亦可活（出第二十三卷中）

肘後療溺死一宿者尚可活方

以皂莢末綿裹內下部中須臾出水則活（古今錄驗同）

又方

倒懸解衣挑去臍中垢極吹兩耳即活（集驗千金小品文仲備急同）

又方

倒懸死人以好酒灌鼻中立活（千金備急文仲古今錄驗同）

又方

取甑顛之以死者伏甑上令口臨甑口然以蘆火二七把燒甑中當死人心下令煙出少入死者鼻口中鼻口中水出盡則活蘆盡更益爲之取活而止常以手候死人身及甑勿令甚熱冬天常令火氣能使死人心下得煖若卒無甑可就岸穿地令如甑燒之令煖乃以死人著上亦可用車轂爲之常勿隱其腹也令得低頭使水出并熬灰數斛以粉身濕即易（千金同）

小品療溺死若身尚煖者方

取灶中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔即活（備急千金肘後同）

又方

便脫取暖釜覆之取溺人伏上腹中出水便活也（肘後同並出第十一卷中）

千金療落水死方

以灶中灰布地令厚五寸以甑側著灰上令死人伏甑上使頭小垂下炒鹽二方寸匕內管中吹下孔中即當吐水水下因去甑以死人著灰中擁身使出鼻口即活矣

又方

掘地作坑熬灰數斛內坑中下死人覆灰濕徹即易之勿令灰熱燔人冷即易之半日即活

備急療溺死方

屈死人兩腳著人肩上以死人背向生人背負持走吐出水便活（肘後云亦治凍死千金肘後文仲集驗小品古今錄驗同出第八卷中）

凍死方一首

病源人有在途路逢凄風苦雨繁霜大雪衣服霑濡冷氣入藏致令陰氣閉於內陽氣絕於外榮衛結澁不復流通故致噤絕而死若早得救療血溫氣通則生又云凍死一

日猶可活過此即不療 出第二十二卷中

肘後療冬天墮水凍四肢直口禁裁有微氣出方

以大器中多熬灰使媛囊盛以薄其心上冷即易心媛氣通目則得轉口乃開可溫尿粥清稍稍含之即活若不先溫其心便持火炙其身冷氣與火相搏則死 集驗備急文仲千金古今錄驗同

入井冢悶方二首

肘後云此事他方少有其說且人爲之寡不俟別條今於水凍之後附此乃是地氣蒸蒸蓋亦障霧之例服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝升麻諸湯亦應爲佳 出第二卷中

小品療入井塚悶冒方

凡五月六月井中及深塚中皆有伏氣入中令人鬱悶殺人如其必須入中者先以雞鴨雜鳥毛投之直下至底則無伏氣毛若徘徊不下則有毒氣也亦可內生六畜等置中若有毒其物即死必須入不得已當先以酒若無以苦酒數升先灑井塚中四邊畔停少時然後可入若覺中有些氣鬱悶奄奄欲死者還取其中水灑人面令飲之又以灌其頭及身體即活若無水取他水用也 肘後千金集驗同出第十卷中

千金療入井塚毒氣方

取傍井中水灑身上至三食頃便活若東井取西井南井取北井中水用之 出第二十六卷中

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔

較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十八卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷目錄 墜墮金瘡等四十七門

從高墮下方三首
從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首
墜損方三首
墜落車馬方六首
折骨方三首
傷筋方三首
筋骨俱傷方七首
折腕方一首
折腕瘀血方四首
蹉跌方二首
被打有瘀血方一十三首
被打損青腫方七首
許仁則療吐血及墮損方三首
金瘡禁忌序一首
金瘡預備膏散方三首
金瘡方一十一首
金瘡續筋骨方三首
金瘡止痛方五首
金瘡生肌方四首

金瘡去血多虛竭內補方二首
金瘡中風方八首
諸瘡中風寒水露方五首
被刀箭傷方一十一首
竹木刺不出方一十六首
狐尿刺方二首
狂刺方五首
惡刺方三首
灸瘡方四首
灸瘡膿不差方三首
火燒瘡及火油天火瘡方三首
火灼爛壞方五首
湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首
湯火瘡無問大小方四首
湯火爛瘡方五首
湯煎膏火所燒方四首
漆瘡方二十七首
侵淫瘡方七首
月蝕瘡方一十二首
代指方一十一首

甲疽方五首
肉刺方二首
手足皸裂方五首
手足逆臚及瘃壞方二首
疣目方一十九首
去黑子方二首
疣贅疵黑子雜療方六首
滅瘢痕方一十七首

唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

從高墮下方三首

千金療丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經崩中皆主之方

阿膠炙　乾薑各二兩　艾葉　芍藥各三兩

右四味切以水八升煮取三升去滓入膠令消分二服羸人三服女人產後崩中傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止服之悉愈

又療從高墮下瀉血及女人崩中方

當歸二分　大黃一分

右二味擣爲散酒服方寸匕日三 范汪同 並出第三十六卷中

千金翼膠艾湯主男子傷絶或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡經內絶者方

阿膠炙　艾葉　芍藥　乾地黃各三兩

乾薑　當歸　甘草炙　芎藭各二兩

右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲

死腹痛血不止者服之良 出第十九卷中

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

廣濟療從高墮下內損瘀血消血散方

蒲黃十分 當歸 乾薑 桂心各八分

大黃十二分 虻蟲四分去足翅熬

右六味擣爲散空腹以酒服方寸匕日再漸漸加至一匕半忌生葱豬犬肉 出第四卷中

肘後療卒從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死方

取胡粉一錢匕以水服之 備急文仲同

又方

煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳 千金備急文仲同 一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以酒六七升和飲之一日飲盡 小豆亦佳

又方

生乾地黃二兩熬末以酒服之

又方

生地黃擣取汁服一升或二升尤佳

又方

烏鷄翅羽二七枚燒末酒和服之即當吐血也如得左羽尤佳

又療從高墮下若爲重物所頓笮得瘀血方

豆豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓內蒲黃三合攪調頓服之不過三四服神良 删繁小品文仲備急集驗千金同

又方

烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消 文仲備急千金同

又方

取茅沛根葉擣絞取汁一二升服之不過三四服愈冬用根

又方

刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕日四五服良

又方

末鹿角酒服三方寸匕日三 千金同

又方

取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕 並出第三卷中

深師療從高墮下傷內血在腹聚不出療下血方

取好大黃二兩 桃人三十枚

右二味擣以水五升煮取三升分爲三服去血後作地黃酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虻極殺人也

又療墮落瘀血桃枝湯方

桃枝一握中指長剉 芒硝五分 大黃四兩 當歸
甘草炙 桂心各二兩 䗪蟲二十枚去足熬
水蛭二十枚熬 桃人五十枚去尖皮熬
右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫分三服內消
又療墮落積瘀血消血理中膏方
大黃二兩 豬脂二斤 桂心一兩 乾薑一兩
當歸二兩 通草 亂髮各一兩
右七味切以膏煎髮令消盡搗藥下篩須令絕細下膏
置地內諸藥攪勻微火煎之三上三下即藥成去滓以
好酒服一兩日二服一方不去滓 並出第二十六卷中

千金療從高墮下及被木石所迮或因落馬凡是傷損血
瘀凝積氣急欲絕無不療方
淨土五升蒸之令極熱分半以故布數重裹之以熨病
上勿令大熱恐破肉候冷即易之以痛止即已但有
損傷並以此法療之神効已死不能言者亦活三十
年亦差
又療從高墮下損有瘀血方
蒲黃八兩 附子一兩炮去皮
右二味為散以酒服五六錢匕日三不知增之 並出第二十六卷中

通按 挈音刑 持也

近効土質汗療折傷內損有瘀血每天陰則疼痛兼療產
婦產後諸疾神効方 開寶本草云質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋消惡血下血婦人產後諸血並酒消服之亦敷病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃並熱血成之今以益母成煎故謂之土質汗也
三月採益母草一重擔 一名夏枯草
右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤
曬令水盡則用手捩斷可長五寸勿用刀切即置鑊中
量水兩石令水高草三二寸則縱火煎候益母草糜爛
水三分減二漉去草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日
以綿濾取清汁盆中滓澱並盡弃之其清汁於小釜中
慢火煎取一斗如稀餳每取梨許大暖酒和服之日再

服和羹粥喫並得如遠行不能將稀煎去即更鍊令稠
硬停作小丸服之七日內則疼痛漸瘳二七日平復或
有產婦惡露不盡及血運一兩服即差其藥兼療風益
心力無所忌 鄭長史處吏部李郎中服之得力

墜損方三首

廣濟療墜損骨肉苦疼痛不可忍方
故馬氈兩段其氈欲得故膩者於鐺中以酒五六升
著一抄鹽煮令熱即內氈於鐺中看氈熱便用裹所
損處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即
止仍服止痛藥散即斷瘥

又療男子虛勞墮傷內損吐血不止欲死面目黑如漆者悉主之方

黃耆　芎藭　當歸　芍藥各三兩

甘草三兩炙　生薑八兩

右六味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服服別相去六七里並出第四卷中

近効療墜損方

生地黃一斤分為三分

右每服取一分熬令焦黃以酒半升煎一兩沸絞去滓令溫緩得所食前日三無所忌馬墜亦療之

墜落車馬方六首

肘後療忽落馬墮車及墜屋坑崖腕傷身體頭面四肢內外切痛煩躁叫喚不得卧方

急覓鼠矢無問多少燒擣末以豬膏和塗封痛處急裹之仍取好大黃如雞子大以亂髮裹上如鴨子大以人所裁白越布衫領巾間餘布以裹髮外乃令火燒烟斷擣末屑薄以酒服日再三無越布餘布可強用當當預備此物為要備急集驗古今錄驗同出第二卷中

千金療凡人墜落車馬心腹積血唾吐血無數方

乾藕根末酒服方寸七日三如無取新者擣取汁服之尤妙

又療墮馬及樹崩瘀血腹滿短氣方

大豆五升水一斗煮得二升半去豆頓服劇者不過三服並出第二十六卷中

千金翼療落馬墮車及諸傷腕折臂脚疼痛不止方

黃耆　芍藥各三兩　乾地黃　當歸

附子炮　通草　續斷　桂心

乾薑各二兩　蜀椒一合汗　烏頭半兩炮

右十一味擣為散先食酒服五分七日三忌如常法本方有大黃一兩又云服方寸七出第十九卷中

救急療墜馬落車被打傷腕折臂呼喚痛聲不絕服此散呼吸之間不復大痛三日筋骨相連當歸散方

當歸熬令香　桂心　甘草炙　蜀椒汗各二分

芎藭熬六分　附子炮　澤蘭熬各一分

右七味擣為散酒服方寸七日三小兒被奔車馬所損裂其膝皮肉決見骨即絕死小蘇啼不可聽聞服之便眠十數日便行走其神驗如此忌同前方千金翼深師同出第六卷中

近効療墜馬內損方

取廣藥一小兩擣為末牛乳一盞煎五六沸和服李諫議云廣蘂以羊肉汁和服一日內不用喫菜極効

出第一卷中

折骨方二首

肘後療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風臥濕及多自扇若中風則發痓口噤殺人若已中此覺頸項強身中急束者急服此方

竹瀝飲三二升若口已噤者可以物拗開內之令下禁令飲食及飲酒竹瀝卒燒難得多可合束十許枚併燒中央兩頭承其汁投之可活（小品備急文仲古今錄驗同出第三卷中）

千金療腕折骨損不可忍方

取大麻根葉無問多少擣取汁飲一小升無生青者以乾者煮取汁服亦主墮墜打捷瘀血心腹脹滿短氣良（出第二十六卷中）

救急療骨折接令如故不限人畜也方

取鈷鉧銅錯取末仍擣以絹篩和少酒服之亦可食物和服之不過兩方寸匕以來任意斟酌之（出第九卷中）

傷筋方三首

千金療被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

又方

擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃敷瘡止血（並出第二十六卷中）

救急續斷筋方

取旋復草根淨洗去土擣量瘡大小取多少敷之日一易之以差為度（必效同出第九卷中）

筋骨俱傷方七首

肘後療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉跌方

爛擣生地黃熬之以裹折傷處以竹片夾裹之令遍病上急縛勿令轉動一日可十易三日即差（千金經心錄備急文仲古今錄驗同）

又方

取生栝樓根擣之以塗損上以重布裹之熱除痛止（備急同）

又方

擣大豆末合豬膏和塗之乾即易之（並出第三卷中）

深師療折腕傷筋骨槐子膏方

槐子中人 秦艽 白朮 續斷各一兩

桂心六分 巴豆十枚去皮心熬 大附子一枚炮

右七味㕮咀以醇苦酒漬槐子等一宿以成煉豬脂一斤於微火上煎三上三下候膏成絞去滓溫酒服棗子許一枚日三并塗敷忌生葱豬肉冷水蘆筍桃李雀肉

等出第二十卷中

千金療四肢骨碎及傷筋蹉跌方

生地黃多少熟擣熬以裹傷骨處類易 古今錄驗同

又方

豉三升以水七升漬之絞去滓取汁飲止煩悶 古今錄驗同

又方

乾地黃　當歸　獨活　苦參各二兩

右四味擣末以酒服方寸匕日三服 並出第二十六卷中

折腕方一首

深師卓氏膏

大附子四枚生用去皮

右一味切苦酒漬三宿以脂膏一斤煎之三上三下膏成傅之亦療卒中風口噤頸項強 出第二十六卷中

折腕瘀血方四首

千金療折腕瘀血方

䗪蟲熬去足翅　牡丹等分

右二味為散以酒服方寸匕血化成水

又方

大黃六兩　桂心二兩　桃仁六十枚去皮

右三味切以酒六升煮取三升分三服當下血差 並出第二十六卷中

千金翼療折腕瘀血方

菴蕳草汁飲之亦可作散服 出第十九卷中

古今錄驗療折腕瘀血方

蒲黃一升　當歸二兩

右二味擣散酒服方寸匕日三先食服之 千金同出第三十四卷中

蹉跌方一首

深師療蹉跌折絕復傷地黃散方

乾地黃十分　桂心　乾薑　芎藭

甘草炙　當歸各二分　芍藥五分

右七味擣為散先食以酒服方寸匕日三服

又方

大豆熬令黑　大黃各二兩　桂心一兩

右三味擣為散分為三劑酒和服忌生葱又大黃一兩生地黃三兩切搗以水酒二升煮取一升頓服之差 並出第二十六卷中

范汪療蹉跌膏兼療金瘡方

當歸　續斷　附子去皮　細辛

甘草炙　通草　芎藭　白芷

牛膝各一兩　蜀椒二合

右十味㕮咀以豬脂二斤煎以白芷色黃膏成絞去滓日再以摩損處 出第十卷中

被打有瘀血方一十三首

肘後療若爲人所打舉身盡有瘀血方

刮青竹皮二升 亂髮如雞子大四枚燒灰 延胡索二兩

右三味擣散以一合酒一升煎三沸頓服日三四 備急范汪同

又療被打擊有瘀血在腹內久不消時時發動方

大黃二兩 乾地黃四兩

右二味擣散爲丸以酒服三十丸日再爲散服亦妙 備急文仲小品范汪等同並出第三卷中

外臺秘要 卷二十九 十三 經餘居

范汪療被打有瘀血方

大黃二兩 桃人去尖皮熬 䗪蟲各二十一枚去足翅熬

右三味擣蜜丸四丸即內酒一升煎取七合服之 備急肘後同

又方

韮菜一升切 當歸三兩

右二味爲末以酒服方寸匕日三 並出第十卷中

備急若久血不除變成膿者宜此方

大黃三兩 桃人三十枚去皮尖

延後一方並出卷中

右二味切以水五升煮取三升分三服當下膿血不盡更作 文仲肘後同

又若久宿血在諸骨節及脅肋外不去者方

牡丹 䗪蟲去足熬等分

右二味擣末以酒服方寸匕血化成水 小品文仲千金並翼古今錄驗同

又方

大黃如雞子一枚 蚯蚓矢一合

右二味酒半升煮取三沸服之

又方

鐵一斤酒三升煮取一升服之又燒令赤投酒服之 小品文仲肘後同出第八卷中

外臺秘要 卷二十九 十三 經餘居

千金療被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃一升 當歸 桂心各二兩

右三味擣散以酒服方寸匕日三夜一不能酒飲服之 劉涓子方

又方

擣莨菪子末以敷瘡上

又凡有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞短氣方

甘草一兩炙 茯苓二兩 杏人五合

右三味切以水一斗煮取三升分爲三服 范汪同

又被歐擊損傷聚血腹滿方

豉一升以水二升煮三沸去滓再服不差重服之 范汪同 並出第二十六卷中

張文仲劉涓子療被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令烟斷擣末以酒服方寸匕日三夜一亦療婦人瘀血消化爲水 肘後備急千金同

被打損青腫方七首

千金療被打頭眼青腫方

用新熱羊肉敷之

又方

大豆黃末和敷之

又方

擣上朽骨唾於石上研摩塗之乾即易

又方

釜月下土細末塗之

又方

羊皮上卧之

又方

炙肥猪肉令熱搨上又炙猪肝貼之亦佳 出第二十六卷中

文仲療被打青腫方

以水磨桂塗之赤則以猪中朽骨磨塗之則平復也 梁都督傳中傳効也出第八卷中

許仁則療吐血及墜損方三首

許仁則論曰此病有兩種一者緣墜打損內傷而致此病一者緣積熱兼勞而有此病若內傷自須依前墜墜內損大便血等諸方救之若積熱累勞吐血狀更無餘候但覺心中悁悁似欲取吐背上煩熱便致此病宜依後雞蘇七味湯桑白皮八味散療之方

雞蘇五兩 生地黃切 青竹茹各一升 生薑 桑白皮各六兩 小薊根切六合 生葛根切六合

右藥切以水九升煮取三升去滓分溫三服服別相去如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑尤佳隔三四日服一劑如未定則宜合後桑白皮八味散服之

桑白皮散方

桑根白皮六兩 生薑屑六兩 柏葉 雞蘇各四兩 小薊根五兩 乾地黃七兩 青竹茹新者一升 地菘三兩

右藥擣散煮桑白皮飲和一方寸匕日再服漸漸加至二三匕以竹瀝下亦得

又此病有兩種一者外損一者內傷外損因墜打壓損或

過按於義尤虎桑未吁

手足肢節肱頭項傷折骨節痛不可忍覺內損者須依前
內損法服湯藥如不內損只傷皮節宜依後生地黃一味
薄之法及芥子蘇等摩之方

生地黃無問多少淨洗擣碎令爛熬之候水氣盡及
熱以薄折處冷即易之如骨頭跌即依療折傷法縛
縛兼薄竿腦生龜生鼠等法乃有所損此不復載如
傷損處輕擣芥子和蘇以摩傷處若被打墜壓傷損
急卒雖不至昏悶腹內無覺觸然身之中相去非遠
外雖無狀內宜通利或慮損傷氣不散外雖備用諸
方腹內亦須資藥但不勞大湯如前內損欲死者服

湯取利欲用時間小小諸物服之理應無嫌其法略
出如後小便酒煮生地黃餘如王木綴木桙葉壓藥
捨菜猪脂及石蜜白石地菘延胡索赤泥藥 以上十一物並
出下卷吳昇同

金瘡禁忌序一首

肘後凡金瘡去血其人若渴當忍之常用乾食並肥脂之
物以止渴慎勿鹹食若多飲粥漿則血溢出殺人不可救
也又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲
酒熱羹臛輩皆使瘡痛腫發甚者即死瘡差後猶爾出百
日半年乃稍復常耳丘金瘡傷天窻眉角腦戶臂裏跳脈

髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六腑輸此皆是
死處不可療也又破腦出血而不能言語戴眼直視咽中
沸聲口急唾出兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無
諸候者可療又瘡卒無汗者中風也瘡邊自出黃汁者中
水也並欲作痓候可急療之又痛不在瘡處者傷經也亦
死之兆又血出不可止前赤後黑或白肌肉腐臭寒冷堅
急者其瘡難愈亦死也 並出第二卷中

金瘡預備膏散方三首

肘後療金瘡膏散三種宜預備合以防急疾之要續斷膏
方

蜀續斷　蛇銜　防風各三兩

右三味切以猪脂三斤於東向露竈煎之三上三下膏
成去滓若深大瘡者但敷四邊未可使合若淺小瘡者
但通敷便相連令止血住痛亦可以酒服如杏子大

又冶葛蛇銜膏方

蛇銜　薔薇根　續斷　冶葛各二兩
當歸　附子各一兩半去皮　防風　黃芩
澤蘭各一兩　松脂　柏脂各三兩

右十一味㕮咀以猪脂二斤煎之別以白芷一枚內中
候色黃即膏成去滓濾以容器收貯之以塗瘡無問大

小皆差不生膿汁也出第 卷中

深師預備金瘡散方

乾薑 甘草炙 桂心各一兩 當歸三兩

芎藭四兩 蜀椒三兩汗

右六味擣散以酒服方寸匕日三肘後同出第二十九卷中

金瘡方一十一首

肘後療金瘡方

割鞄方一寸燒灰研以敷之差

又方

杏人去皮尖擣如泥石灰等分以猪脂和之淹足合

煎令杏人黄絞去滓以塗瘡上日五六過愈

又方

燒故青布作灰敷瘡上裹縛之數日差可解去

又方

以蛇銜草擣敷之差

又方

狼牙草莖葉熟擣敷貼之兼止血一方燈草挼敷之

又方

五月五日掘葛根暴乾擣末敷瘡上止血止痛

又方

釣樟根出江南刮取屑敷瘡上有神驗

又方

紫檀末以敷金瘡止痛止血生肌

又方

燒牡蠣末敷之佳凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好並出第七卷中

近効金瘡或壓損斷裂方

剝取新桑皮作線縫之又以新桑皮裹之以桑白汁塗之極驗小瘡但以桑皮裹即差

又金瘡灸瘡火燒瘡等方

蠟如胡桃人 杏子一枚去皮擣 檳榔人一枚 薰陸香半合

右四味和擣以猪脂煎即以此藥塗帛上貼瘡此方甚効

金瘡續筋骨方三首

千金療金瘡粉散辟風水續筋骨止血方

石灰 地菘苗 細辛 旋覆根

葛葉 猪膏 青蒿 麥門冬苗

益母苗不限多少切

右九味擣取汁和石灰作餅子暴乾末如粉以敷傷瘡上止血止痛生肌五月五日合之神効出第二十六卷中

必効療被斫筋斷者續筋方
旋復根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上即封裹之十五
日即斷筋便續矣更不須開易（此方出蘇景仲家獲効用効出第内卷中）
古今録驗療金瘡中筋骨續斷散方
續斷（五兩）　乾地黃　蛇銜　地榆
杜衡（各四兩）　乾薑　蜀椒（汗）　細辛
桂心（各一兩）　當歸　芎藭　茯苓
芍藥（各三兩）　人參　甘草（炙）　附子（炮去皮各二兩）
右十六味擣篩為散以酒飲和服方寸匕日三服忌海藻
菘菜生菜生葱猪肉冷水（一方無杜蘅有杜仲出第三十四卷中）

金瘡止痛方五首
范汪療金瘡內塞止痛地榆散方
地榆根　白斂（各二分）　附子（炮一分）　當歸（四分）
芎藭　白芷　芍藥（各三分）
右七味擣散以酒飲服方寸匕日三服忌同前方
又金瘡內塞逐痛方
黃芩　當歸（各三兩）　甘草（炙二兩）　細辛
烏頭（炮各二兩）　乾薑（一兩）　白芷（四兩）
右七味擣篩以酒飲服一錢匕日三可至二錢匕忌同
前方

又金瘡止痛方
馬蹄燒灰三指撮以酒和服之（並出第十九卷中）
千金凡金瘡若刺瘡痛不可忍者方
葱白一把水三升煮數沸漬洗瘡上痛即止（亦治因水入瘡痛與深師同出第二十六卷中）
古今録驗療金瘡止痛牡蠣散方
牡蠣（二分熬）　石膏（一分）
右二味下篩以粉瘡痛即止（出第二十四卷中）
金瘡生肌方四首
廣濟療金瘡生肌破血補勞消瘡輕身紫葛湯方

紫葛三握細剉之以順流河水三大升煎取一升二
合去滓空腹分三服若冷以酒一大升水二升和煮
取一大升（無忌出第六卷中）
范汪療金瘡內塞止痛生肌肉散方
當歸　甘草（炙）　肉蓯蓉　芎藭
芍藥　蜀椒（汗）　吳茱萸　乾薑
桂心　白及　黃耆　厚朴
人參
右十三味等分擣為散以酒飲服一方寸匕日三服忌
如前方

通按此即前藥性上瘡生肌方但無黃芩炙皮無日及日分兩不同耳

又療金瘡生肌白膏方

白芷一兩六銖　乾地黃十一兩　芎藭一兩六銖　甘草半兩炙

當歸　白歛　附子各十八銖去皮　蜀椒二合半汁

右八味㕮咀以猪脂五斤合煎三上三下藥成去滓塗

瘡上日再忌同前方　並出第九十五卷中

古今錄驗療金瘡生肌散方

甘草一斤炙　黃蘗八兩　當歸四兩

右三味擣末以封瘡上日再　出第三十四卷中

金瘡去血多虛竭內補方二首

千金療金瘡去血多虛竭內補方

當歸三兩　芍藥　細辛各五分　乾薑三分

甘草二分炙

右五味爲散以酒服方寸匕日三夜一忌同前方　出第二十六卷中

古今錄驗療金瘡去血多虛竭內補方

蜀椒三分　乾薑二分　茯苓　甘草炙

芍藥　當歸　芎藭　桂心

黃芩　人參　黃耆　厚朴炙

吳茱萸　桑白皮各一兩

右十四味擣散以酒服方寸匕日三　一方有白及無桑白皮千金翼同出

通按[illegible]

第三十四卷中

金瘡中風方八首

肘後療金瘡中風方

蜀椒量瘡大小用麪作餛飩塘灰中炮令熟及熱開

一小口當瘡上掩之即引風出可多作取差　備急小品同出第三卷中

必効療金瘡中風角弓反張方

取杏人碎之蒸令餾擣絞取脂服一小升許兼以摩

瘡上即差

又方

取蒜一大升破去心以無灰酒四升煮蒜令極爛并

滓服一大升以來須臾汗如雨出則差

又療口噤不能語方

蔓菁子淨洗一升擣令細粘手撮爲炷以灸瘡上一

兩度灸即差兼療後方

又療因瘡著風方

雞糞一合烏豆二升熬令聲二味相和於鐺中蒸令

焦黑及熱瀉出以酒二大升淋之與服隨多少令熱

取汗差如無汗更作服

又療因瘡著風角弓反張方

取莨菪根可瘡大小截令平如無大者並得數根併
瘡以爲限豬脂大合鹽末一雞子黃大和脂於火
上温之令脂鹽相得不用過熱熱即傷肉以煖得炷
瘡上冷即易之爲兩炷於相器中燒之更相用以差
止驗

又方

生雞子烏麻油二味合煎稍稠待冷以封瘡上

古今錄驗療金瘡得風身體痓強口噤不能語或因破打
而得及斧刀所傷得風臨死總用此方無有不差瘢瘢燒
麻燭熏之方

取未開瓠瓠一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令
瘡相當可繞四邊閉塞勿使遺氣上復開一孔如絲
口取浮麻子燭兩條並然瓠瓠向上燭盡更續之不
過半日即差若不止亦可經一兩日熏之以差爲度
若瓠長不得內入瓠瓠可中折用之　出第三十四卷中

諸瘡中風寒水露方五首

文仲云凡以八九月刺手足金瘡及諸瘡中寒露水冷毒
皆殺人不可輕也療之方

生竹若桑枝兩條著煻火中令極熱斫斷炷瘡口中
熱氣盡更易一枚盡二枚則瘡當燭乃取薤白擣以
綿裹著熱灰中使極熱去綿以薤白薄瘡上布帛急
裹之　肘後千金同

又療若已中水及惡露風寒腫痛方

以鹽數合著瘡上以火炙之令熱達瘡中畢以蠟內
竹管插熱灰中令烊以滴入瘡中即便愈若無鹽用
薤白但單用蠟亦良　肘後同出第五卷中

備急療諸瘡中風寒水露腫痛云因瘡而腫者皆中水及
中風寒所作也其腫氣入腹則殺人也方

燒黍穰或牛馬乾糞桑條輩多烟之物掘地作坎於
中燒之以版掩坎上穿版作小孔以瘡口當孔上熏
之令瘡汁出盡乃止又滴熱蠟瘡中佳　集驗肘後文仲同

又方　肘後同

以桑灰汁溫之以漬瘡大良姚云神驗　肘後千金同出第十八卷中

近效療瘡因水入疼痛方

取生葱一束擣以腳踏上須臾更著之差　李東萊房給事處方

被刀箭傷方一十一首

劉涓子療金瘡箭在肉中不出方

半夏三兩洗　白斂三兩

右二味下篩以酒服方寸匕日三淺者十日出深者二
十日出終不住肉中　肘後千金文仲小品同出第三卷中

通按本草毒類大明六首毒箭傷身飲藍箭及乾葛若丸熱一附苗射藥毒血後方用[illegible]

肘後療卒被毒箭方

擣藍青絞取汁飲之并薄瘡上若無藍取青布漬之絞取汁飲之亦以汁淋灌瘡中（肘後范汪文仲備急千金同）

又方

煮藕取汁飲之多多益善（肘後文仲備急同）

又方

但多食生葛根自愈或擣生葛絞取汁飲之乾者煮飲之（小品千金集驗備急文仲同）

又方

乾藍鹽等分擣末敷瘡上毒皆自出（范汪肘後備急同 一作乾薑）

又凡毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作鏃次嶺北用諸蛇蟲毒螫物汁著管中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪膿沸爛而死唯射豬犬雖困猶得活以其噉人糞故也人若有中之便即食糞或絞濾取汁飲之并以塗瘡上須臾即定不爾不可救也又一種是今之獵師射麞鹿用射罔以塗箭鏃人中之當時亦困頓著寬處者不死若近胷腹亦宜急療之今葛氏方是射罔者耳

又療箭鏑及諸刃刀在咽喉胷膈諸隱處不出者方

牡丹一分　白斂二分

右二味擣末以溫酒服方寸匕日三服刃自出（肘後備急千金）

同出第九卷中

小品療被毒箭傷方

雄黃末敷之愈（肘後千金集驗同此方亦療蛇毒）

又方

食麻子數升愈擣飲其汁亦佳（肘後范汪千金同出第十卷中）

集驗療毒箭方

以鹽滿瘡中灸鹽上三十壯（肘後同）

又方

煮藍根汁飲一二升（范汪小品同一云煮藍汁飲二三升）

又療刀箭瘡有血不止方

以小兒矢塗封之三日即差並不傷人（出第九卷中）

竹木刺不出方一十六首

劉涓子竹木刺不出方

鹿角燒灰末以水和塗之立出久者不過一夕（集驗文仲備急肘後范汪古今錄驗深師同出第三卷中）

肘後療竹木刺不出方

取羊糞燥者燒灰和脂塗之刺若未出重敷之（胡洽集驗千金備急深師同一云用乾羊糞末）

又方

嚼白梅塗之（集驗千金同）

又方

王不留行末服之並敷上即出集驗文仲深師千金同

又方

擣烏梅水和塗之刺上立出千金用白梅並出第三卷中

深師療刺不出方

以鹿腦厚敷上燥復易之半日即出出第二十九卷中

集驗療刺藏在肉中不出方

用牛膝根莖合擣以敷之即出縱瘡合其刺猶自出肘後備急文仲范汪深師千金同出第九卷中

千金療刺在人肉中不出方

煮瞿麥汁飲之日三立出

又方

温小便漬之次日即出

又方

白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風致腫肘後同

又方

薔薇燒灰以水服方寸匕日二度十日刺出

又方

燒鑿柄為灰酒服二方寸匕日三度其刺即出

又方

酸棗核燒末服之差

又方

頭垢塗之並出第二十六卷中

文仲療竹木刺不出方

刮象牙屑水和塗刺上立出肘後范汪備急深師同出第八卷中

救急療竹木刺傷方

嚼豉封之立差千金肘後同出第九卷中

狐尿刺方二首

千金翼論凡諸螳螂之類盛暑之時多有孕育遊諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不疑之間則成其疾故曰狐尿刺日夜慘痛不識眠睡百方療不能差方

但取蒲公英莖葉根斷之取白汁塗令厚一分即差神驗出第二十四卷中

肘後療狐尿棘刺人腫痛欲死方

以熱桑柴灰汁漬之冷復易永差備急崔氏同出第八卷中

狐刺方五首

崔氏療狐刺方

取好豉心以足為限但覺被刺即熟嚼豉以薄之少頃看豉中當見毛不見又速嚼豉數薄之以晝夜勿絕但以毛盡便愈

又方

熟擣杏人細研煮一兩沸承熱以浸刺處數數易之大良古今錄驗同

集驗療狐刺方

熱魚汁灌瘡中

備急療狐刺方

以熱蠟灌瘡中又烟熏之令汁出愈此狐狱所溺之木猶如蛇螫也肘後小品文仲同出第八卷中

必効主狐刺痛如鳥啄者方

生括樓香豉二味等分擣之為餅敷患處乾即易之

効良家方出第六卷中

惡刺方三首

千金翼療惡刺方

五月蔓菁子擣末和烏牛乳封之無烏牛但是牛乳亦得本方云人乳亦得出第二十四卷中

古今錄驗療惡刺方

取未煮餅油脂以麪和油調須臾著瘡上即愈一云蔓菁根和粉以麪和油

又方

取麪末和獨頭蒜擣之內瘡孔中蟲出即差出第三十五卷中

炙瘡方四首

肘後論曰凡炙不依明堂脉穴或是惡日神惡時殺病人年神人神所犯天地昏暗日月無光久積陰沉及炙日食毒物方畢或冬觸犯房室等其炙瘡洪腫發作疼痛病人加甚炙者亦本不瘥增其火毒日夜楚痛遂其凡愚取次亂炙此皆因火毒傷藏即死矣今用方療之

栢白皮三兩　當歸一兩　薤白一握

右三味切以猪脂一升煎三上三下以薤白黃綾去滓以塗瘡上亦療風水中瘡火瘡出第三卷中

集驗療炙瘡痛腫急方

擣竈中黃土末之以水和煮令熱以漬之深師千金肘後同

又療炙瘡薤白膏生肌肉止痛方

薤白　當歸各二兩　白芷一兩　羊髓一斤

右四味㕮咀以羊髓煎白芷色黃藥成去滓以敷瘡上日二肘後千金文仲同出第八卷中

千金療炙瘡方

甘草炙　當歸各一兩　胡粉六分一作胡麻　羊脂六分

右四味切以猪脂五合煎之去滓以敷瘡上忌海藻菘菜出第二十六卷中

炙瘡膿不差方三首

肘後療炎瘡膿不差方

白蘞一兩 烏賊骨一兩末

右二味相和以塗之 千金同

千金療炎瘡膿壞不差方

臘月猪脂一斤 薤白一升切 胡粉一兩

右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一兩更煎去之入胡粉令調塗之日三

又方

石灰一兩末細絹篩以猪脂和相得微火上煎數沸先以煖湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡上炎之又擣薤敷之 肘後同出第二十六卷中

火燒瘡及火油天火瘡方三首

集驗凡被火燒者初慎勿以冷水冷物並井下泥火瘡得冷即熱氣更深轉入至骨爛壞人筋攣縮者良由此也

又療卒被火燒苦劇悶絕不識人方

取新熱小便飲一升及冷水和蜜飲之口噤不開者可拗開灌之其悶差然後療外乃善 千金古今錄驗崔氏小品同出第八卷中

千金療火瘡方

末熬麻油和梔子人末塗之唯厚為佳已成瘡者篩白糖灰粉之即差 出第二十六卷中

近効療火油及天火瘡初出似沸子漸漸大如水泡似火燒瘡赤色熱翕翕須臾浸淫漸多急速者是也方

芸薹菜不限多少擣絞取汁芒硝大黃生鐵衣各等分擣大黃末相和芒硝等以芸薹汁調如稀糊以秃筆點藥敷瘡上乾即再點頻用極有効閻師云芸薹冬月煮取汁洗亦可

火灼爛壞方五首

劉涓子療火燒人肉爛壞麻子膏方

麻子一合 柏白皮 山梔子碎 白芷

甘草各一兩 柳白皮一兩

右六味㕮咀以猪脂一升煎三上三下去滓以塗瘡上日三 出第五卷中

集驗療火爛瘡膏方

柏白皮 生地黃切各四兩 苦竹葉 甘草各四兩

右四味切以猪脂一斤煎三上三下藥成濾去滓以塗瘡上日再摩 千金無地黃深師千金劉涓子范汪同出第八卷中

千金墮火灼爛瘡方

榆白皮熟嚼封之差

又火瘡敗壞方

通按甚良今芝苛又名雞[illegible]鷄子[illegible]當是鷄子白

栢白皮切臘月猪膏合淹相和煮四五沸色變去滓塗瘡范汪同出第二十六卷中

又方

栢白皮　生地黄　黄芩　蛇銜

梔子　苦竹葉各一兩

右六味切以羊髓半升煎之三上三下去滓塗瘡上差

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

肘後療湯火所灼未成瘡者方

取曖灰以水和習習爾以敷之亦以灰汁洗之

又方

黍米　女麴分等

右二味各熬令焦如炭擣下以雞子白和塗之良

又方

取擣蒋根洗去上燒灰雞子黄和塗之

又方

取栁白皮細切以猪膏煎以塗之以栢白皮彌佳凡此以上三方皆能止痛痰仍不成瘡也

又方

以小便漬洗之

又方

以苦酒和雄黄塗之

又若已成瘡者方

以白蜜塗瘡上取竹幕貼之日三出第七卷中

范汪療湯火灼瘡方

破雞子取白塗之肘後同

又方

以豆醬汁塗之肘後文仲同並出第二十一卷中

備急療湯火灼瘡方

栁皮燒灰如粉敷之肘後同

又方

猪膏和米粉塗之日五六過良此二方既令不痛又使速愈又無瘢痕已試有効肘後同出第八卷中

湯火瘡無問大小方四首

崔氏療湯火瘡無問大小秘要方

取狗毛碎剪以烊膠和之以遍封瘡上一封之後比至痂落亦不痛救急同出第五卷中

文仲療湯火瘡無問大小秘要方

新熱牛糞塗之良崔氏同出第十七卷中

救急療湯火瘡無問大小秘要方

取栗煞令焦黒投水中攪之良久濾取汁重煎如稠

以敷瘡上並滅瘢 楊氏同
又方
取黍米煮粥和雞子白敷瘡良 並出第五卷中
湯火爛瘡方五首
肘後療湯火爛瘡方
取石膏擣末以敷之立愈 古今錄驗同出第三卷中
備急湯火灼爛方
白斂末塗之立有効
又方
以竹中蠹蟲末塗之良

又方
石灰末以水和塗之乾即易之 並出第八卷中
古今錄驗療湯火爛方
取商陸根擣末以粉瘡上 出第四十卷中
湯煎膏火所燒方四首
肘後療為沸湯煎膏所燒火爛瘡方
丹參細切以羊脂煎成膏敷瘡上 千金備急文仲集驗同
又方
熟擣生胡麻如泥以厚塗瘡上 並出第七卷中
集驗療湯火熱膏所燒不問大小梔子膏方

梔子三十枚 白斂 黃芩各五兩
右三味切以水五升麻油一升煎令水氣竭去滓冷之
以淋瘡令溜去火熱毒肌乃得完也作二日任用膏塗
湯散治之 千金並與古今錄驗小品同出第八卷中
文仲療湯煎膏所灼火爛所燒方
牛糞新者和以雞子白塗之比常用之亦不作瘢不
痛神効 出第七卷中
漆瘡方二十七首
病源漆瘡方
煮椒湯洗頻三五度又嚼糯米敷上乾即易之頻四

五度即差忌熱麪肉飲酒 出第五卷中
肘後療卒得漆瘡方
以雞子黃塗之乾即易之不過三五度 文仲同
又方
煮柳葉湯適寒溫洗之柳皮尤妙 集驗必効文仲千金同
又方
取生蟹黃塗之
又方
煮香薷以漬洗之 深師古今錄驗同
又方

通按蝕蛀今山茱皮赤瓜木乃其木名

濃煮鼠查莖葉洗之亦可擣取汁以塗之 集驗千金同赤瓜木也

又方

嚼秫米以塗之

又方

以造酒小麴擣末以粉之乾即以雞子白和塗之良

又方

挼貫火草若雞腸草以塗之漆姑草亦佳 深師千金翼同

又方

以羊乳汁塗之 千金翼深師同

又呪漆法見漆人見漆便漆著之

唾之曰漆奕丹陽漆無弟無兄漆自死丹丛二七須鼠傷三唾之又呪三遍止則不復生瘡也 出第四卷中

刪繁療漆瘡方

取蓮葉乾者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再 肘後崔氏文仲千金同

又方

芒硝五兩湯浸洗之 肘後千金翼深師同出第九卷中

千金療著漆洗湯方

取磨石下滓泥塗之取差止大驗 翼同

又方

且按 徐即 今各本 俱不分 書是也

礬石著湯中令消以洗之 翼肘後同出第二十六卷中

千金翼療漆瘡方

貫衆擣末以塗之良乾以油和塗之 集驗文仲肘後同

又方

取猪膏塗之 文仲删繁千金同

又方

宜啖肥肉 集驗深師千金同

又方

嚼穄穀塗之 出第十九卷中

崔氏療漆瘡方

頻以鹽湯洗之大良

又方

以馬尿洗之差止

備急療漆瘡方

擣韭根如泥塗之又蕹菜洗之佳 肘後深師崔氏同

又方

取蟹擣以塗之最妙或以水浸之取水數數洗之亦効

救急療漆瘡方

以鐵漿洗之隨手差頻爲之妙 出第八卷中

謹按黄櫨作采黄之櫨不也

必効療漆瘡方

取漆姑草擣汁二分和芒硝一分塗之若無芒硝即朴硝最妙炙韭熨之効

又方

濃煮杉木汁洗之數數用即除小兒尤佳出第四卷中

古今錄驗療漆瘡方

黄櫨木一斤剉鹽一合二味以水一斗煮取五升去滓候冷以洗之即差王長華家傳方出第四十三卷中

論曰此疾雖小有著者遍身頭面似癮瘮浮腫生瘡痛痒毛髮脫落心煩悗悒不得眠睡因療之遲延爲他疾或便

成風癩亦可畏也

侵淫瘡方七首

肘後療卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之繞身周匝則能殺人方

以雞冠血塗之良

又方

取牛糞新者絞取汁以塗之亦燒煙熏之

又方

胡鷰窠末以水和塗之文仲備急同

又方

取鯽魚長三寸者以少豉合擣塗之亦療馬鞍瘡若先起四肢漸向頭面者難療也又取鯽魚油煎去魚塗之文仲備急同出第四卷中

集驗療卒毒氣攻身或腫或赤痛或痒并分散上下周匝煩毒欲死方

取生鯽魚切之如鱠以鹽和擣過塗瘡上乾復易之此爲侵淫瘡也備急同出第八卷中

古今錄驗療侵淫瘡苦瓠散方

苦瓠一兩　蛇皮半兩燒　露蜂房半兩熬　大豆半升
梁上塵一合

右五味爲散以粉粥和塗紙貼赤處日三甚良

又療侵淫瘡戎鹽散方

戎鹽二分　大黄四分　藺茹一分

右三味擣散以酒和敷瘡上日三良

月蝕瘡方一十二首

廣濟療月蝕瘡方

自死青蛙一枚燒灰　母猪蹄一枚燒灰　甘草末　救月杖燒灰

右四味等分蜜和塗瘡上日二差止

又方

五月五日乾蝦蟇一枚燒灰　石硫黄一兩研　礬石一兩熬令汁盡

右三味爲散以敷瘡上日二差止 小兒耳後瘡同用並出第五卷中

肘後療大人小兒卒得月蝕瘡方

五月五日蝦蟆灰以猪脂和塗之差止 文仲備急集驗同

又方

於月望夕取兔矢仍內蝦蟆腹中合燒爲灰末以敷瘡上差止 集驗崔氏同崔氏云兔矢七枚

又方

取羅摩草擣末塗之差

又方

燒蚯蚓矢令赤末以猪膏和敷之 文仲備急千金古今錄驗同

又云此瘡多在兩耳上及七孔邊隨月死生故名月蝕瘡也世言小兒夜指月所爲實多著小兒也 文仲備急同

又方

水銀 黃連末各二兩 胡粉熬 松脂各一兩研

右四味相和合研水銀消以塗瘡瘡如乾以臘月猪脂和先以鹽湯洗拭然後敷之 出第十六卷中

集驗療月蝕瘡方

救月蝕鼓皮如手許大一片以苦酒三升漬一宿以塗瘡上或云燒作灰脂和敷之 崔氏同

又方

虎頭骨二兩碎 浮萍一兩熬

右二味以猪脂一斤煎取骨黃成膏以塗瘡上 崔氏同

又方

茱萸根 地榆根 薔薇根

右三味各等分爲散作湯洗瘡取藥塗瘡上日三 崔氏同

又方

然燭照瘡使燭熱氣相及瘡即愈 崔氏古今錄驗同並出第九卷中

千金翼療月蝕瘡惡肉方

斑猫去足翅熬 石硫黃 䕡茹各一兩末

右三味擣篩以塗瘡上如瘡乾以猪脂和塗之日三 出第二十四卷中

代指方一十一首

小品代指者其狀先腫焮焮熱痛色不黯黑然後緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落亦謂之代指病也

又代指無毒正係人筋骨中熱盛搏結故耳吳人名遭指野夫名爲土盧即皆是代指疾也療方

單煮甘草汁漬之或用芒硝湯漬之擣青菜汁搨之但得一種浸搨之即差 千金同

肘後療代指方

以猪膏和白善敷之數易差止 深師千金翼同白善一作白堊土

通按白堊也

白墅按謂白土粉者是

道按鉢是銅

炙臘脉而灰此明時支當是所作銷中皀皮也

又方

以指刺炊上熱飯中七遍文仲集驗深師千金范汪同

又方

取梅核中人熟擣以淳苦酒和敷之須臾差止文仲同

又指忽掣痛不可忍方

灸指頭痛處七壯愈千金同

又指端忽發瘡方

燒鐵令熱勿令赤以灼之上二方俱上代指並出第五卷中

千金翼療代指方

先刺去膿灸鮓皮令熱以裹纏指令周匝痛即止便

愈千金同出第二十三卷中

崔氏論代指者是五藏之氣使然流注於十二源經脉熱衝手指不還即代指也

當取熱湯急漬之即出使滿七度便以冷水中浸之訖又復漬之如此三度即塗羊膽愈亦成膿此方甚效或以猪膽盛代指纏之差本方云訖乾封挂亦便愈出第四卷中

備急療手指忽腫痛不已者名為代指方

抑泥泥指令遍周匝厚一寸許以熱灰中炮之令燥皮皺即愈不皺者更為之良文仲深師范汪同

又方

取粱米粉鐵鐺中熬令赤以衆人唾和之塗上令厚一寸即消

又方

小便和鹽作泥厚裹之數易差燒針刺血出最妙並出第五卷中

甲疽方五首

崔氏夫甲疽之為病或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四邊腫焮黃水出侵淫相染五指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增萬醫所不能療之方

綠礬石五兩形色似朴消而綠色

右一味置於鐵版上聚炭封之以囊袋吹令火熾即沸流出色赤如融金看沸定汁盡去火待冷收取搗為末色似黃丹先以鹽湯洗瘡拭乾用散敷瘡上唯多為佳著藥訖以軟綿纏裹當日即汁斷瘡乾若患急痛即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處則洗使淨其痂乾處不須近每洗訖敷藥如初似急痛即塗酥五六日即覺瘡上痂漸剝起但依前洗敷藥十日即瘡漸漸總剝痂落軟處或更生白膿泡即摖破敷藥自然總差神驗無比刑部張侍郎親嬰此病卧經六十餘日困頓不

遺按礬黄黑者名雞屎礬

復可言在京衆醫並經造問皆隨意處方了無効驗唯
此法得効如神今故録之以貽好事者 出第五卷中

救急療甲疽方

屋上馬齒菜　崑崙青木香　印成鹽

右三味各燒成灰並等分又取光明砂少許於諸藥中拌擣和下篩爲細散以敷瘡上乾即易之以差止當瘡未差以前不宜食雞猪魚肉腥穢酒蒜等差後仍三十日忌酒良 出第九卷中

必効療甲疽赤肉生甲邊上裹甲者方

取瓜州礬石燒令沸定末敷之濕即刮却更著日數易即消散寶宜城緯云効亦主雞瘡有蟲有黄水者得吳白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

又療甲疽瘡瘻爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者方

黄耆二兩　䕡茹三兩

右二味切以苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取二合絞去滓以塗瘡上日三兩度其息肉即消散 出第四卷中

近効療甲疽瘡神妙方

熏黄 燃好者　蛇皮 燒灰

右二味等分更和研之　先以温泔清浸洗瘡令軟以尖刀子割去甲角入肉處裛乾取藥如粟許大以敷瘡

遺按皸音軍拆裂也

遺按瘃竹点上音平足中虫瘡也

上用軟綿裹之半日許藥濕即易之一日許即永除其先痛者敷藥訖一飯頃即宜痛定差訖一二日勿著窄靴鞋若能斷酒及猪雞魚蒜麪等其効愈速其藥不過三四度永差 蔣上四郎中有効

肉刺方二首

古今録驗療肉刺方

好薄刮之以新酒醅和羊腦敷之一宿洗去常以綿裹之良 出第四十一卷中

近効療肉刺方

以懸木耳取貼之自消爛又不痛宜以湯浸木耳軟乃用之

手足皸裂方五首

深師療手足皸裂方

蜀椒四大合汁以水一升煮之七沸去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸塗羊猪髓腦尤妙 范汪同出第二十九卷中

集驗療手足皸裂血出痛方

若瘃水霜凍面及手足皸裂瘃壞取麥窠濃煮汁及熱以浸洗之即差

又方

取蒜葉萎黄及莖煮以漬洗之 范汪同

直按瘡亡號逆臚指中後所趾甲皮俗名到刺前肉顛起是二頭方

中真珠千金作青珠

道按疣者瘊目日本作瘊疣

又療人脚無冬夏常坼裂名曰尸脚此因履踐尸水及
惡物故也方
取蠶屎一升以水二升煮數沸待小冷以漬脚半日
不過三四度差 深師千金范汪同出第九卷中
千金療手足皴裂血出疼痛方
猪脂著熱酒中以洗之即差 深師集驗同云無酒用湯亦佳出第二十四卷中
范汪療手足指逆臚方
手足逆臚及瘃壞方二首
真珠一分　乾薑二分
右二味擣末以塗瘡指上日三 千金深師同

深師療冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及始熱痛欲瘃者
方
蜀椒二分　芎藭二分　白芷　防風各一分
薑一分一作鹽
右五味以水四升煎令濃以洗之出第二十九卷中
疣目方一十九首
肘後療疣目方
月晦日夜於廁前取故草二七莖莖研二七過粉疣
目上訖呪曰今日月晦疣驚或明日朝乃棄勿反顧
之

道按突疣目皆用方作摩拭之衣熱燃之

又方
取亡人枕若席物以二七拭之亡人近爾易去也 並出第五卷中
集驗療去疣目方
七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣目
人種豆著南向屋東頭第二霤中豆生四葉以熱湯
沃殺疣目便去矣 千金肘後范汪同
又方
取松柏脂合和塗其上一宿即不知處 千金同
又方
作艾炷著疣目上灸之三炷即除 范汪千金同

又方
以石硫黃突疣目上六七過除 千金同
千金去疣目方
取月十五日月正中時望月以秃苕帚掃疣目上三
七過差止
又方
以猪脂癢處揩之令少血出即差神驗不可加也
又方
以苦酒漬石灰六七日取汁點疣上小作瘡即落

又方

杏人燒令黑研如膏塗之令差止

又方

以牛涎數塗之自落 並出第二十四卷中

崔氏疣目方

取月盡日平旦井花水月生一日煮作湯竈突北面南白疣咒曰日盡水月初湯竈突北千疣死百疣亡凡七度洗及咒甚良

又方

先布紙一張於牀上即以筆點疣一下還點紙一下

無問多少皆一一點每點即咒曰紙亦爛疣亦散點一遍訖乃深埋點紙於屋溜下久當疣散

又方

以蜘蛛網絲纏之自落良

又方

盜取一酸酒醋以塗疣上咒曰疣疣不知羞一酸酒醋洗你頭急急如律令咒滿七遍欠即自愈 並出第四卷中

張文仲療手足忽生疣目方

蒴藋赤子挼使壞疣目上塗之即去 范汪同

又方

以鹽塗疣上令牛舐之不過三度 出第五卷中

近效療疣子法

以墨塗之不過五度即差

又方

以屋溜下水塗疣上 崔給事方

去黑子方二首

集驗去黑子及贅方

生藜蘆灰五升 生薑灰五升 石灰二升半

右三味合和令調蒸令氣溜取甑下湯一斗從上淋之盡湯取汁於鐵器中煎減半更聞火煎以雞羽插中即

然斷藥成欲去黑子疣贅先小傷其上皮令裁破以藥點之此名三灰煎秘方 古今錄驗范汪同出第九卷中

救急去黑子方

夜以暖漿水洗面以布揩黑子令赤痛挑動黑子水研白檮檵取汁以塗黑子上旦又復以暖漿水洗面仍以鷹屎粉其上 出第三卷中

疣贅疵黑子雜療方六首

深師灰煎療瘤贅瘢痕疵痣及癰疽惡肉等方

石灰一斗五升 濕桑灰四斗 柞櫟灰四斗

右三味合九斗五升以沸湯令浥浥調濕內甑中蒸之

罒粉胡脉起是頭點

遠讀子一本作

遠讀子黄帝方中用遠讀子末如是而

從平旦至日中還取釜中沸湯七斗合鼫三淋之澄清內銅器中煎令至夜斟量餘五斗汁微火徐徐煎取一斗洗亂髮乾之如雞子大內藥中即消盡又取五色綵剪如韭葉大量五寸著藥中亦消盡又令不强藥成以白甖子中貯之作藥時不得令婦人小兒雞犬臨見之灰煎亦療瘤贅其肉瘤石瘤藥敷之皆愈其血瘤瘤附左右胡脉及上下懸癰舌本諸險處皆不可令消消即血出不止殺人不可不詳之

又療疣贅方

取速讀子熟時壞破之以塗其上便落 並出第二十九卷中

千金療皮中紫赤疵痣𩑔穢方

乾漆 熬 雌黄 礬石 各三兩熬 巴豆 五十枚

炭皮 一斤 雄黄 五兩

右六味為散以雞子白和塗故帛貼病上日二易之即除 深師䕡茹三兩餘同出第二十四卷中

又療疣贅疵痣方

雄黄 硫黄 真珠 礬石 熬

䕡茹 巴豆 去皮心 藜蘆 各一兩

右七味為散以漆和令如泥以塗貼病上須成瘡及去面上黑子點之即去 深師同出第二十四卷中

古今錄驗療黑子去疣等五灰煎方

石灰 蒴藋灰 桑灰 炭灰

藜灰 各一升

右五味以水溲蒸令氣匝仍取釜中湯淋取清汁五升許於銅器中東向竈煎之不得令雞犬小兒女人穢者見之膏成好凝强如細沙糖即堪用量以甖封之 出第五卷中

療疣贅赤黑疵痣𩑔穢瘡瘜息肉癭結瘤等神効灰煎方

炭灰三升湯拌令濕微以熱湯漬令半日後還以湯淋之稍稍點湯不得太速下即灰汁不驗候汁下得三二升即內一小鐺中煎令一兩沸即別取一兩石灰風化者爲佳恐中濕者須熬令極熱內灰汁中和煎以杖草攪之勿住手候如前餅麪少許細細取成膏急扇著一瓷器中好令冷不然須臾乾燥不堪用皆似此煎十分有一分堪久停但有傷損肉色須臾變赤黑色痛如火燒狀若灸瘢發燃經二十餘日瘡自然脫落無瘢痕欲衝風冷遠行貼烏膏亦神効瘢亦易落瘡未差間忌小豆蓋外紫有瘢亦不凸出烏膏在三十四卷中

滅瘢痕方一十七首

廣濟療人面瘢痕滅之方

取白雞以油脂和水煮小麥令熟純以飼雞三兩日大肥安甆著版上作籠籠之七日莫與雞食空飼清水七日取猪脂去脉膜切啖飼如食糞皆變白開收緩水取塗瘢上十度平復舊欲用塗以麤葛布揩微赤纔離訖然後塗之男女俱用効也

又療人面及身瘡瘢不滅方

鷹白糞　燗騰骨　屎白鹹各四分　麝香二分

右四味研令如粉以葛布揩令赤微離訖以脂和敷之日二度差止並出第五卷中

劉涓子六物滅瘢膏方

衣中白魚　雞屎白　鷹糞白　芍藥

白斂　白鮮等分

右藥研如粉以乳汁和塗瘢上日三良出第五卷中

小品滅瘢方

雞矢白一兩　辛夷四分　白附子二分　細辛二分

右四味酒漬一宿以羊脂六合微火煎三上三下去滓傷瘢以甘草洗訖塗之一方有桂心二分

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗瘢上日三並出第十卷中

千金翼凡面皰瘡瘢三十年以上亦令瘥豐瘢金瘡等方

斑猫三枚去足翅熬　巴豆三枚去心皮　密陀僧　胡粉二兩

鵝脂三兩　熏金鉚洮沙三兩　高良薑三兩去皮　海蛤三兩取中者

右八味為粉用鵝脂和夜半塗之旦以甘草湯洗之差止出第五卷中

又急滅瘢方

猪脂三斤飼烏雞令三日使盡收取白矢內白芷當歸各一兩煎白芷令黃去滓內鷹矢白二分攪令調塗之旦洗之千金同

又方

蒺藜子　山梔子人各一合

右二味為散醋漿和如泥臨卧時以塗之旦洗之千金同

又方

瘢凸出秋冬小麥麩春夏大麥麩下篩令細以酥和封之良千金同

又方

夏以熱瓦熨冬以凍瓦熨之千金同

又方

鷹矢白一兩　白魚二七枚

右二味為散蜜和塗之日三即差

冬以熱九夏貝湯微

又方

鷹矢白十分　白殭蠶八分

右二味研如粉白蜜和敷之日三差愼五辛肥膩生冷物千金同

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布摩傷以塗之日四五過千金同並出第三卷中

必効滅瘢方

禹餘粮　半夏

右二味等分末以雞子黄和之先以新布拭瘢上令赤以塗之勿令見風二十日滅矣十年瘢無不愈平復如故救急范千金同

又療灸瘡及金瘡凡百瘡瘢能令高者平下者起方

雞屎白　鷹屎白各二合　辛夷人四分　白附子　杜若各分　細辛二分

右六味下篩以赤蜜少少和先以布揩瘢微破塗之日二差後忌五辛小豆油膩及酢飲酒等若愼口味如大小淺深無不差一本無杜若有桂心並出第四卷中

古今錄驗療面上瘢滅之方

白殭蠶一兩　珊瑚一兩　白芷一兩　雞矢白一兩　朱砂研一兩

右五味擣篩和敷之尤良

又方

木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾擣末以塗之一方用醋漿水浸百日出暴乾末服方寸七日再出第三卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十卷目錄惡疾大風癩瘡等二十三門

惡疾大風方一十首
諸癩方九首
烏癩方一首
白癩方五首
十三種丁腫方一十三首
丁腫方二十首
犯丁腫重發方二首
惡腫一切毒瘡腫方一十八首
灰花瘡及諸惡瘡腫方四首

魚臍瘡方一十首
丹毒方九首
赤丹方五首
白丹方一十三首
丹疹方四首
赤疹白疹方一十一首
肺風冷熱疹方二首
雜丹疹毒腫及諸色雜瘡方五首
瘑瘡方一十二首
瘑瘡久不差方五首

癬瘡方一十一首
乾濕癬方一十五首
疥癬惡瘡方五首
疥風痒方七首

通按年不作落千金作手下疾落

唐王燾先生外臺秘要方第三十卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

惡疾大風方一十首

千金論曰惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而眉鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背皆有頑處重者手足十指已有墮落有患四體大寒而重衣不煖者有蒋常患熱不能暫凉者有身體枯槁者有津汗常不止者有身體乾痒徹骨搔之白皮如麩卒不作瘡者有瘡痍茶毒重疊而生晝夜痛不已者有直置頑鈍不知痛痒者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯闇此疾雖種種狀貌不同而難療易療皆屬在病人不繇醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語口順心違不受醫教直希望藥力不欲求巳故難療易療屬在病人不關醫藥臣嘗手療六百餘人差者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委知其情性若覺難共語不受人教即不須與療縱與療終有觸瑕力病既不差乃勞而無功也仁者易共語故可療也

又論曰神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道者何皆繇

割棄心累懷頴陽之風所以非止差病乃至因禍而取福也故臣所覩病者其中頗有士大夫乃至有異種名人乃遇斯患皆戀愛妻孥係著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙嘗問諸病士人皆云自作不仁之行久久並爲極猥之業於中仍欲更作云爲雖有悔言而無悔意但能自新受師教命食進藥餌何有不除臣以正觀中嘗將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之唯須求之於巳不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知其後病成狀候分明乃云卒患此皆自誤然斯疾也雖大治之於微亦可卽差此疾一得多者不過十年皆死近者五六歲而亾然病者皆自謂百年不死深可悲悼

又論曰一遇斯疾卽須斷鹽常進服松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃差差後終身慎房室犯之還發茲疾有吉凶二義得善則吉若還同俗類必是凶矣今略述其繇致以示後之學者可覽而思焉

又蒴豆療惡疾方

細粒烏豆擇取摩治之去有皮不落者三月四月取

通按千金此方無防葵枳實二味

天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆一宿豆如熟豆大漉出暴乾如此七度始堪服每服三枚漸加至六七枚日一忌房室猪魚雞雉肉畢三十日毛髮即生犯藥即不差

又岐伯㓝散療萬病癱疽疥癩風痿骨肉疽敗百節疼眉毛髮落身體淫淫躍躍痛痒目痛爛眥耳聾齲齒痔瘻等方

天雄炮去皮 附子炮去皮 細辛 烏頭炮去皮

茵芋炙各一兩 乾薑二兩 石南 菖蒲

防風各二兩 白朮 獨活各三兩 躑躅一兩

椒汗二兩 防葵二兩 枳實炙二兩

右十五味擣散以酒服方寸七日三勿加

又療惡疾狼毒散方

狼毒炙 秦艽

右二味等分為散酒服方寸七日二服五十日愈切須忌慎

又方

松脂鍊投冷水中二十遍杵末蜜丸服二兩饑即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及雜食房室

又石灰酒主生髮毛長鬚眉去大風方

松脂十斤成鍊者 黍米一石 石灰一石石灰和溫蒸令氣足

濵按淬音綷此音淬又漬也

上麴一石二斗

右四味先於大鐺中炒石灰以木著灰中火出為度枸杞根剉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和釀漬麴用汁多少一如釀法訖封四七日開飲一二升常令酒氣相及為度百無所忌不得觸風其米泔水及飯糟不得使六畜犬鼠食之皆須令深埋却此方九月作至二月止恐隔上熱服後進三五口冷飯壓之婦人不能食飲黃瘦積年及蓐風不過一石即差

又療風身體如蟲行方

鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍亦療一切風

又方

以淬灰汁洗面不過一月愈

又方

以大豆漬飯漿中旦溫洗面頭中痒加少麪沐頭勿以水濯之十洗必差

又方

成鍊雄黃松脂等分蜜和丸以飲服十丸如桐子大日二百日差慎酒肉鹽豉生冷生血物等神秘不傳

通按牀風二字疑誤兩人共服一劑即服半劑

傳出第二十四卷中

近効婆羅門僧療大風疾並壓丹石熱毒熱風手脚不隨方

消石一大兩　生烏麻油二大升

右二味內鐺中以土墼蓋口以紙泥固勿令氣出細細進火煎之其藥未熟氣腥候香氣發即熟更以生烏麻油二大升和之更微火煎之以意斟量得所訖內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作小紙屋子屋子外然火令病人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七日頭面疱瘡皆滅若服諸藥丹

石熱發不得食熱物著厚衣臥厚牀牀風者即兩人共服一劑服法同前不用火為使忌風二七日或但取一匙內口待消咽汁熱除忌如藥法吕員外處得

諸癩方九首

病源凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不仁或淫淫苦痒如蟲行或目前見物如垂絲或癮疹輒赤黑此皆為疾之始起便急療之斷米穀肴餚專食胡麻松朮輩最善也夫病之生多從風起當時微發不將為害初入皮膚之裏不能自覺或流通四肢潛於經脉或於五藏乍寒乍熱縱橫脾腎蔽諸毛腠理壅塞難通因成氣血精髓

通按蚝音刺有毒蟲

並雖久而不療令人頑痺或汗不流泄手足酸疼針灸不痛或在面目習習奕奕或在胷頸狀如蟲行或身體徧痒搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或頑如錢大狀如蚝毒或如梳或如手雖刺不痛或青黃赤黑猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗或若懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼目流腫內外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色恍惚多忘其間變狀多端毒蟲若食人肝眉睫墮落若食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不得通若食人脾即語聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓之音若食人筋脉支節墮落若食人皮肉頑痺不覺痒

痛或如針錐所刺名曰刺風若蟲乘風走於皮肉猶若外有蟲行復有食人皮肉徹外從於頭面即起為疱肉如桃核小棗從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風令人多瘡猶如癬疥或如魚鱗或痒或痛黃水流出初起之時或如榆莢或如錢孔或青或白或黑或黃變易無定或起或滅此等皆病之兆又五風起之緣皆是冷熱交通流於五藏徹入骨中虛風因濕和合蟲生便即作患論其所犯多因用力過度飲食相違房室太過毛孔既開冷熱風入五藏積於寒熱寒熱之風交過通徹流行諸脉急者即患緩者稍遲所食穢雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多

食人五藏骨髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩風
若其欲療先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黑黄
白等諸色之蟲與藥療者無不差然癩名不一木癩者初
得先當落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患急療之愈
不療患成火癩者生瘡如火燒瘡或斷肢節七年落眉睫
急療可愈八年成疾難可療金癩者是天所爲也負功德
崇初得眉落二年食鼻鼻柱崩倒叵療良醫能愈土癩者
作病身體塊磊如雞子彈丸許此病宜急療之六年成大
患十五年不可療水癩者先得水病因即留停風觸發動
落人眉鬚急療之經年病成蟋蟀癩者如蟋蟀在人身體

内百節頭皆欲血出三年叵療疑癩者蟲出如變堆體艾
白難療熏藥可愈多年叵療白癩者斑駁或白或赤眉鬚
墮落亦可療之多年難療疥癩者狀似疥瘙身體狂痒十
年成大患可急療之愈風癩者風從體入或手足刺疼風
冷痺癡不療二十年後便成大患急療之愈蛔癩者得之
身體沉重狀似風癩可療之至久積歲成大患疾速療之
酒癩者酒醉卧黍穰上因汗體虚風從外入落人眉鬚令
人惶懼小療大愈養生禁忌云醉酒露卧不幸生癩也又
云魚無鰓不可食食之令人五月發癩出第二卷中
肘後凡癩病皆起於惡風及觸犯忌害得之初覺皮膚不

遍據按一本作皆

仁淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲或癮瘮赤黑氣
滯沉此皆爲疾之始便急療之此疾乃有八九種大都皆
須斷米穀鮭肴專食胡麻松术最善别有蠻夷酒決疑凡
諸大方數首亦有符術今只取小小單方
苦參五斤剉之
右一味以好酒三斗漬四五日稍稍飲之二三合備急同本
方療白癩
又方
苦參根皮三斤
右一味麤擣以酒三斗漬二十一日去滓服一合日三
若是癩疾即應覺痒禁雜食

范汪療癩方
取馬新蒿一名馬矢蒿一名爛石草擣末服方寸匕
日三百日如更赤起一年都差平復肘後同
又方
灸兩手將指中理左右及手足指虎口中隨年壯
深師療癩身體面目有瘡必死方
取白艾蒿十束如升大煮取汁釀米七斗一如釀法
酒熟稍稍飲之
又方

通按蓮荷未詳

水銀研　藺茹　藜蘆　真珠研
丹砂研　雄黃研
右六味各一斤皆研如粉以三歲苦酒三石五斗於瓮
中漬諸藥令耗七日於爭溫密室中漬浴始從足漸至
腰浸之日一以綿拭面目訖以水洗兩目勿令入目也
可七日為之勿令冷禁劫忌狸肉生血等 范汪同
又療通身癩瘡方
蓮荷二十枚石灰一斗淋取汁合煮令極濃以漬瘡
半日許可數為之
又方
取水中浮萍青者一秤濃煮以漬浴半日用此方多
愈並出第九卷中

集驗療癩方
取葎草一擔以水二石煮取一石以漬洗瘡不過三
五度差
烏癩方一首
病源夫癩病皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變異
或淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常
驚恐皮肉之中或如桃李隱疹赤黑手足頑痺針刺不覺
痛腳下不得踏地凡食之時開口而鳴語亦如是身體瘡

痛兩肘如絕縛此名黑癩 出第二卷中
集驗烏癩白癩丸方
猬皮炙　魁蛤　蝮蛇頭炙　木虻四枚去翅足熬
虻蟲去翅足熬　蠐螬各一枚　鯪鯉甲去頭足炙　葛上亭長七枚炙
斑猫七枚去翅足炙　蜈蚣去頭足炙　附子各三枚炮去皮　蜘蛛五枚炙
水蛭一枚　雷丸三十枚　巴豆十五枚去皮心熬　水銀研
大黃　真丹　桂心　射罔各一兩
黃連一分　石膏二兩研　蜀椒三分汗　芒硝二分研
龍骨三分　甘遂熬　礜石燒　滑石各一分
右二十八味擣篩蜜和丸如胡豆服二丸日三加之以
知為度忌猪肉冷水生葱此方分兩多不同為是古方
傳寫差錯若臨用時節以意量之 一方有七蟲無木虻斑猫與蜈蚣蝮蛇作蛸
范汪同出第八卷中

白癩方五首
病源凡癩病語聲嘶破目視不明四肢頑痺肢節火燃 一作熱
心中懊熱手腳俱緩背膂至急內如遭劈身體手足隱
疹起往往正白在肉裏鼻有息肉目生白珠當瞳子視無
所見此名白癩 出第二卷中
集驗療白癩釀酒方
苦參二斤　露蜂房五兩炙

右二味切以水三斗法麴二斤和藥漬經三宿絞去滓炊黍米二斗釀準常法作酒候酒熟壓取先食一飲一雞子日三稍稍增之以差爲度一云赤癩風痿惡瘡肘後同出第八卷中

范汪療在身白屑虛搔之或呼作白癩方

苦參五升　露蜂房五兩炙　猬皮一具炙剉之　麴三升

右四味切以水三斗五升合藥漬四宿去滓炊米二斗釀如常法酒熟食後飲三五合漸增之以知爲度

千金療白癩大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸遁注水腫癰疽疥瘡惡瘡脚攣手折眼闇洞

淋痰飲宿癖寒冷方

商陸根二十五斤薄切之如馬耳　麴二十五斤

右二味以水一斛漬之炊黍米一石釀之如家造酒法使麴末相淹三服之訖封三七日開看麴浮酒熟澄清溫服之至三斗稍輕者二斗藥發吐下佳宜食粥飯牛羊鹿肉羹忌生冷酢滑猪肉魚雞犬肉等物出第二十四卷中

文仲療白癩方

乾艾葉濃煮以漬麴作酒如常法飲之令醺醺姚氏范汪同

又方

大蝮蛇一枚扎者并頭尾全勿令欠少以酒漬之大者一斗小者五升以糠火温令酒盡稍稍取蛇一寸許以臘月猪膏和傅瘡上忌小麥熱麵肘後范汪同並出第五卷中

十三種丁種方一十二首

千金論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此之二氣更相擊怒當其時也必有暴氣夫暴氣者每月必有卒然大風大霧大寒大熱若不時避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脉遂使腠理擁隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣瀉變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不旋踵若著訖乃

欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡痍無所逃矣

又一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色少烏四邊微赤多痒忌食麻子及衣麻布并入麻田中行二曰石丁其狀皮肉相連色烏黑如烏豆甚硬刺之不入肉內陰陰微疼忌瓦礫磚石之屬三曰雄丁其狀疱頭烏黶四畔仰瘡疱漿起色黃大如錢孔許忌房室四曰雌丁其狀瘡頭少黃向裏黶亦似灸瘡四畔疱漿起色赤大如錢孔忌房室五曰火丁其狀如火瘡頭烏黶四畔有疱漿漿如赤粟米忌火灸爍食炙煿等物六曰爛丁其狀色少黑有白斑瘡

中有膿水形大小如匙面忌熱食爛臭物七日三十六丁其狀頭烏浮起形如烏豆四畔起火赤今日生一明日生二後日生三乃至十若滿三十六藥所不療如未滿者可療俗名黑皰忌嗔喜愁恨八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮皮浮生形如小豆狀似蛇眼體大硬忌惡眼人見之及嫉妒人看之九曰鹽膚丁其狀如匙面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裹黑膚汁出中硬忌飲漿水洗渡河十一曰刀鐮丁其狀瘡闊狹如韭葉長一寸側肉黑忌痎爍刺及刀鎌切割十二曰浮漚丁其狀如浮漚瘡體曲圓少許不合長闊狹如薤

葉大內黃外黑曲黑曲處刺不痛裹黃處刺痛十三曰牛拘丁其狀肉皰起掐不破

右十三種丁瘡初起必先痒後痛先寒後熱熱定多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難療其麻子丁一種始末唯痒所錄之忌不得犯觸犯觸者難療其浮漚牛拘兩種無禁忌縱不治亦不殺人其狀寒熱與諸丁同皆以此方療之萬不失一欲知犯觸但脊強瘡痛極甚忍不可得則是犯之狀療之方用枸杞春名天精夏名枸杞秋名却老冬名地骨春三月上建日採葉夏三月上建日採枝秋三月上建日採子冬三月上建日採根四味並暴乾若得五月五日午時合和大良如不得依法採者但得一種亦得緋繒一片以裹藥爲限亂髮一雞子大牛黃如梧子大反勾棘刺針二七枚末赤小豆七枚末先於緋繒上薄布亂髮以牛黃末等布髮上即卷緋繒作團亂髮作索十字繫之熨斗中急火熬令沸以沸定自然乾即刮取擣作末絹下之以方寸一匕取枸杞根四味合和擣篩二匕和合前一匕共為三匕和令相得又分為二分旦空肚酒服一分日三

又丸是丁腫用之齊州榮姥方

白姜石一斤軟黃者　枸杞根皮二兩　牡蠣九兩燒者
鍾乳下者一兩研　白石英一兩研　桔梗一兩

右六味各擣篩乃秤之合和攪令相得先取伏龍肝九升末之以清酒一斗二升攪令渾渾澄取清二升和藥捻作餅子大六分厚二分其濁滓仍置盆中布餅子于籠上以一重紙藉盆上以泥酒氣熏之仍數攪令氣發經半日藥餅微乾乃內瓦坩瓶中一重紙一重藥遍布勿令相著密以泥封之三七日乾以紙袋貯乾處舉之用法以針刺瘡中心深至瘡根并刺四畔令血出以刀刮取藥如大豆許內瘡上若病重因日夜三四度輕者

一二度著重者二日根爛始出輕者半日一日爛出當看瘡浮起是根出之候若根出已爛者勿停藥仍著之藥甚安穩令生肌易其病在口咽及胸腹中者必外有腫異相也寒熱不快疑是此病即以飲或清水和藥如二杏仁許服之日夜三四服自然消爛或以物剔吐根出即差若根不出亦差當看精神自覺醒悟合藥以五月五日爲上七月七日次之九月九日臘月臘日皆可若急須藥他日亦得要之不及良日也修合須清淨燒香不得觸穢毋令孝子不全之人及產婦六畜雞犬等見之凡有此病忌房室豬牛雞魚生韭葱蒜芸薹胡荽

酪麪等若犯諸忌而發動者取枸杞根湯和藥服並如後方前二家方本是一家智者平論以爲後方最是真本其病通忌酒肉五辛芸薹胡荽油麪生冷酢滑耳

後方如左 崔氏同

白薑石一十五兩 牡蠣十兩 枸杞根白皮四兩 茯苓三兩

右四味細篩合和先取新枸杞根切六升水一斗半煮取五升去滓內狗屎二升攪令調勻澄取清和前藥熟擣捻作餅子陰乾取兩刃針當頭直刺瘡痛徹拔出刺取藥末塞孔中拔針出即內藥勿令歇氣并遍封瘡上頭即服忌針挑根出重者半日以上即出或已消爛挑根不出自差勿憂之其病在內者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞研取藥如梧子五枚和服之日夜三四服外自消也若須根出服藥後一日以上以雞羽剔吐出根縱不出根亦自消爛在外者亦日夜三四遍敷藥根出後常敷勿休生肉易差若犯者取枸杞根切三升以水五升煮取三升去滓研藥一錢匕和枸杞汁一盞服之日二三服并單飲令枸杞汁二盞彌佳

又以枸杞汁殺狗屎取汁服之最良合藥即用不必待乾所言白狗屎是狗食骨其屎色如石灰故直言狗白

屎也如預造取五月五日七月七日臘日合者其用療病尤良但有人卒患頸中痛乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之腹中焦攻而痛惡寒發熱者亦是此病

前二方同是一方法用一同亦主瘡疽 其昇同

又方

以針刺四邊及中心塗雄黃立愈 一云塗黃土

又方

馬齒菜二分 石灰三分

右二味和擣以雞子白和塗之 文仲備急等同出第二十二卷中

又療一切丁腫方

取蒼耳根莖子等燒作灰以酢泔澱和如泥塗上乾
即易不過十餘度即拔根出
又論曰臣以正觀四年忽口右角患丁腫造甘子振其子
振每為貼藥十日不差臣以此療之一如方說自是常作
此方以救諸人未說有不愈者故特論之以傳後世丁腫
方殆有千首皆不及齊州榮姥方亦不同此物造次易得
也
又方
飲鐵漿一碗即差
又方
外臺秘要〈三十卷〉　書　經餘居
蕪菁子一升作灰以臘豬和封塗瘡上一宿差
又方
皂莢子中人末敷之數貼五日愈
又論曰凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血
出去血後敷藥藥氣入針孔中佳若不達瘡裏則不得力
也
又論曰其腫好著口邊頰中舌上赤黑如珠子疼痛應心
是寒毒久結變作此疾不即療日夜根長流入諸脈數道
如箭入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經
五六日不差眼中火光生心神惛昧不可具論此其狀也

通按千金心神惛昧

下本口能必須即死也七字無不可具論八字

通按備急須即今緘頭也

并出第二十三卷中
備急療丁腫姚方云丁毒為瘡肉中突起如魚眼狀赤黑
瘮痛是寒毒之結變作此疾始作服湯及如療丹法便差
又支太醫云有一十三種丁瘡其狀在大方中初起皆患
寒熱又三十六丁亦是十三種數內或今日生一明日生
二或生三或生十滿三十六丁皆療之方
蛇皮炙末和鼠矢以針刺破瘡內中即拔出差止文
仲同
又方
取人糞乾者末之挑腫破敷瘡大良若犯瘡未死者
外臺秘要〈三十卷〉　六　經餘居
開口灌糞清一大升須臾立差
又方
取白馬牙齒燒作灰先以針刺瘡令破以灰封之用
麵周匝圍之候腫軟用好酢洗却灰其根即出當便
差
又內令消神驗方
反勾棘針三十二枚一年以上陳者　生大豆黄四十枚全者
緋頭纇三條條闊一寸　亂髮三雞子許
右四味作三分先將緋一片裹棘針豆黄各三十枚用
髮一塊纏緋令周匝牢固又取兩段緋各如法裹之訖

各於炭火上燒令煙盡且以兩㕘於瓷器中熟研之和酒半盞空腹服之半日許四邊軟內紓適即差半日不覺可更服一㕘必差若後犯之有三五豆亦黑腹出不經犯者十八日即差此方甚効勿犯之

丁腫方二十首

廣濟療丁腫毒氣敷藥差方

白馬牙（燒令赤內米醋中更燒） 附子（生用） 雄黃（研） 半夏

右四味各等分爲末以臘月豬脂和如泥封腫上一兩遍即差先以針刺至痛處後可封藥即効

又方

燭棘刺三枚反勾者丁香七枚並燒令煙斷以末滿月孩子糞和塗腫上頻頻三兩度根爛差

又方

車轄軸脂 白鹽 蕪菁根 釜底墨（等分）

右四味等分爲末和以臘月豬脂敷上以醋及水亦得

又療丁腫封藥後宜常服散方

亂髮（雞子大） 反勾棘針（棚者二升） 露蜂房（一升）

蛇脫皮（一升） 緋帛（一尺）

右五味分作五分以緋裹之用麻急纏之於炭火上燒如煙欲斷即收勿令作白灰末以酒和空肚服方寸匕日二夜一差止

又方

半夏（生用） 石灰（等分）

右二味擣末以敷瘡上（並出第五卷中）

備急療丁腫方

蘢葿 胡椒 龍骨 斑猫（去翅足熬）

皂莢（炙去皮子）

右五味各等分擣篩以酒和封瘡上日一敷之

又方

以針刺破瘡頭取熱人糞塗上乾易之不過十五遍

即出又以硇砂封上若毒入腹以枸杞根切煎服之如犯觸亦然

又方

露蜂房（二七枚） 曲頭棘刺（二七枚） 蒼耳子（七枚）

緋（一寸） 亂髮（雞子大） 蔄蒿草節（二七枚）

右六味熬令黑末研朱砂少許和酒服方寸匕日三服後加酒令微有酒色禁食如常療肉腫彌佳（文仲同）

又方

斑猫一枚捻破然後以針畫瘡上作米字以封上根乃出也

又方

生大豆黃三十二豉生者 緋頭帑三條如無用五寸緋代 亂髮一雞子許

右三味以緋裹亂髮牢纏於炭火上燒得黑煙欲盡即出之於瓷器中研如粉以酒空腹服之方寸匕平明至午時覺四體舒通覺瘡輕即差如未依前服之差止若犯之瘡即出膿血未經犯六七日平貼忌如常法

必効療丁瘡方

取舊厠清斂取汁青竹茹燒作灰

右二味可和清攪一百遍稀稠成膏刺瘡四邊令遍先以唾和麪圍瘡四面寫藥漸漸令滿其中仍三五度換

之瘥時瘡即爛以針挑之拔去根即差止未出更著之

神効

又方

蜂窠七枚露者 真緋大手掌 亂髮拳大

右三味各燒為灰作末酒一小升和頓服之差止未差更作之並出第六卷中

古今錄驗療丁腫方出徐王

大黃 秦艽 藜蘆 石硫黃研 硇砂各一兩研

右五味擣篩為散以刀子頭取和冷水塗瘡大小封之

若腫大悶可作五香湯服之并取麪和塗腫上乾即易之差止一方無大黃封之須刺四面麪溏紙貼勿令乾數著也

又方

白馬齒 亂髮 髑髏各一分 枸杞白皮三分

右四味燒作灰以酒和服方寸匕不差至二七

又方

曲頭棘刺四百枚 橘皮三兩

右二味以水三升煮取半升服一合塗腫上亦得

又方

取磁石擣為粉酸醋和封之立拔根出

又方

五月五日取壯狗矢燒作灰敷瘡數易之謹按壯一作牡

又方

巴豆二七枚去皮半夏二七枚擣末以寒食餳和之以針刺瘡四邊即以藥塗之立拔出以澤瀉末填瘡孔中便差侍郎崔世黃述

又方

蛇蛻皮四分燒灰 露蜂房灰一分 髮灰一分

右三味並用五月五日採燥之相和以新瓦瓶內燒灰

白斂服棗許大令汗出未汗更服以汗為度七日不得

食鹽酒肉五辛房室生冷酢滑等不得食蝟肉雞肉食者難差蛇皮不得帶赤色有毒純白者上此高頓奴洗邪長史傳之

又方

亂髮一雞子許　緋帛三寸　曲頭棘刺七七枚東枝白腐者

蒼耳枝三七

右四味合燒作灰研成散每以水半盞許服方寸匕日二三差止慎風熱餘忌同前處有犯觸加鹿角一方寸龜甲三方寸蜂房二寸三物等分燒灰為散若有犯者依前方服之甚効並出第三十卷中

犯丁腫重發方二首

廣濟療丁腫犯之重發方

青羊糞一升

右一味以水二升漬少時煮兩沸絞取汁一升頓服無所忌出第五卷中

古今錄驗療犯丁腫方

枸杞白皮一方寸匕　麥七粒燒灰　麻子七粒燒灰

緋帛燒灰一方寸匕　勾頭棘子燒灰三七枚　亂髮灰半匕

半夏一七枚大小如羊糞者熬令黄

右七味藥不問冬夏悉須溫酒和服多少任人性此方無所忌不宜犯麻子多致死晉鹿公上出第三十卷中

黄按鐵此方用法述燒有數文

惡腫一切毒瘡腫方一十八首

廣濟飛黄散療諸惡瘡腫方

曾青　雌黄　白礬石　磁石

雄黄　丹砂各一兩

右六味各細研依四方色以藥置色處曾青東方丹砂南方白礬石西方磁石北方雄黄中央瓦甕二枚以黄泥下再三過使厚五六分以雌黄滑著下合飾諸藥著上後以半雄黄滑覆上以泥密塗際勿令氣泄土須厚一宿如常熟火點火用二年陳蘆作樵中調火以新布浣水中覆釜上乾復易九十沸止若日暮七十七沸亦

足止太熟一斛米飯頃發出藥惡肉青黑乾不復出汗愈無甕以土釜二枚如上法也第二十四卷錄直中有此方更有石英石膏鍾乳雲母為十味出第三十一卷中

千金療惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急攣痛牽少腹不可忍一宿殺人方

茴香苗

右一味擣取汁飲一升日三四服其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國神方從永嘉以來用之起死神効

又凡風勞毒腫疼攣痛或牽引少腹及腰髈痛方

桃人一升去尖皮兩人熬令黑煙出熱擣研如脂膏

以酒三升攪令相和一服覆取汗不過三差甚妙

又大麻子小豆湯主毒腫無定處或嗇嗇惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也方

射干二兩 商陸二兩薄切 赤小豆一升 麻子五升

附子二兩炮 升麻四兩

右六味切以水二斗煮麻子取一斗半去滓研麻子令破以麻子汁煮藥令豆極熟去滓可得六七升一服一升日夜令盡小便當利大下即毒腫氣當減食此豆益佳如湯沃雪也 出第二十三卷中

崔氏五香湯療毒腫方

麝香研 青木香 雞舌香 藿香

薰陸香 當歸 黃芩 升麻

芒硝各三分 大黃五分

右十味切以水六升煮取二升去滓入芒硝令烊分爲二服相去六七里久亦療諸卒尸注惡氣也

又療惡腫犀角湯方

薰陸香 青木香 雞舌香 藿香

犀角各二分 沉香二分 升麻七分

右七味切以水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之出第五卷中

又烏膏療一切瘡引膿生肌殺瘡中蟲方

烏麻油一升生清者 黃丹二兩熬之 薰陸香一兩乳頭者

松脂半兩 蠟半兩

右五味先空煎油三分減一停待令次內黃丹更上火緩煎又三分減一又停冷次內薰陸香末不冷即恐溢沸出煎候香消盡次下松脂及蠟看膏稍稠即以點鐵物上試之斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡是熱即減薰陸及松脂若瘡如久不差此藥於冷依方煎之其貼杖瘡者油若一升地黃汁半合黃丹二大兩蠟一小兩餘准上法此膏不須硬 出第二卷中

必効療惡瘡方

熱毒腫以篦近下鑽孔瀝水令水射腫又以雞子清封腫上熱即易之

又方

取羌蔚臭草擣汁服一雞子許滓封腫熱則易之甚良

又方

擣地松汁服之每日兩三服即差止

又方

大黃 石灰 赤小豆各等分

右三味擣末以苦醋和傅之効 出第四卷中

經心錄療諸毒腫升麻膏方

升麻三兩　白斂　漏蘆　連翹

芒硝各二兩　黄芩　蛇銜各三兩　蒴藋根四兩

山梔子二十枚　枳實二兩

右十味擣碎以酒漬半日以猪膏五升煎之膏成去滓以器盛有毒熱腫取塗貼上摩之即消散日三 小品同

又大瀉漬腫毒升麻湯方

升麻一兩　黄芩三兩　梔子二十枚　漏蘆二兩

蒴藋根五兩　芒硝二兩

右六味切以水一斗煮取七升候冷分用漬瀉腫常令

濕潤即消 小品集驗同

又漏蘆湯方

漏蘆無用梔子　白斂　黄芩　麻黄

白薇無用知母　枳實炙　升麻無用犀角　芍藥

甘草炙各二兩　大黄三兩無用芒硝

右十味切以水一斗煮取三升分三服若無藥處單服大黄一兩取利忌海藻菘菜等 千金云療一切毒小品亦治丹毒並出第五卷中

近効療一切熱毒腫驗方并主乳癰

青木香　紫葛　紫檀　朴硝各二兩

赤小豆一合　蜀升麻　白斂　生礬石各一兩

右八味擣篩以水和如稀麪糊又以榆皮汁和之亦佳以布剪可腫大小仍每片剪三兩箇小孔子塗藥貼腫上乾即易之 王度支處

又助毒熱腫消方

莨菪根三兩　芸薹菌菜根三兩

右二味擣以雞子清和貼之乾即易之當日消

又方

商陸根　芸薹菌菜根等分

右二味擣之依上方貼之効

又療一切熱瘡腫硝石膏方

硝石一斤　生麻油三升

右二味先煎油令與臭下硝石緩火煎令如稠餳膏成以好瓷器中收貯以塗貼瘡腫或熱發服少許妙用好酥煎更良忌生血物

反花瘡及諸惡瘡方四首

病源反花瘡者由風毒相搏所爲初生如飯粒其頭破則血出便生惡肉漸大有根膿汁出肉反散如花狀因名反花瘡凡諸惡瘡久不差者亦惡肉反出如反花形也 出第三十五卷中

千金療一切久不差諸惡瘡兼反花瘡大神驗方

鼠粘子草根細切熟擣和以臘月猪脂封貼腫瘡上取差止 出第二十三卷中

必効療反花瘡方

柳枝葉以水煎成膏如稠餳塗之良

又方

取馬齒草燒灰敷之頻貼差止 千金同

又方

鹽灰敷之神驗 並出第四卷中

魚臍瘡方一十首

千金療魚臍瘡似新火針瘡四邊赤中央黑色以針刺之若不痛即可畏也方 亦名魚臍丁

臘月魚頭灰以亂髮灰等分以雞猪膽和令均得封瘡上頻貼差止此瘡見不足言而能殺人

又方

以寒食餳封之又硬者燒灰塗貼敷之即差

又療魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡上及四畔作孔擣白芷取汁滴著瘡孔中如無以乾白芷末用敷 一云白芷

又方 本方云赤根丁瘡

取鼴鼠壤土以水和如泥塗貼上熱則易之差

又方

馬牙齒擣末以臘月猪脂和塗之拔根出即止亦燒灰用

又方 本方云療犯丁瘡

刺瘡頭及四畔令汁極出擣生栗黃敷上以麪圍之勿令黃出自旦至午根必出

又方 同上

以麪圍瘡如前法以針亂刺瘡上及四畔取銅器煎臘令沸寫著麪圍中令容一盞令即易之不過三度即拔根出

又方 同上

以水四升煮蛇蛻皮如雞子大三四沸去滓服之立愈又燒蛇皮灰以雞子清和塗上差 並出第二十三卷中

崔氏療魚臍疔瘡腫方

瘡初生之時頭白如黍米許大當中黑如蠅四畔赤至四五日之後疼痛不可忍似潰不潰腫至潰破膿出廻轉還滿疼痛不止者便是其候取獺屎以水和封腫處及瘡上即得膿出止痛消腫慎口味與患丁腫同 千金同

謹按瘃映有刺音飯苞也

又方

取瞿麥和生油熟擣塗之亦佳 並出第五卷中

丹毒方九首

肘後夫丹者惡毒之氣五色無常不卽療之痛不可堪又待壞則去膿血數升或發於節解多斷人四肢蓋疽之類療之方

煮栗脥有刺者洗之 姚同

又療發足踝方

擣蒜如泥以厚塗乾卽易之 集驗文仲備急同出第二卷中

小品㾦丹毒一名天火也肉中忽有赤如丹塗之色大者

謹按豆豉千金作豆蘗

如手掌其劇者竟身體亦有痛痒微腫方

赤小豆一升

右一味末下篩以雞子白和如泥塗之乾復塗之逐手消也竟身者倍合之盡復作 刪繁千金同

又療丹諸單行方或得一物差

水苔　生蛇銜　生地黃　生菘菜

蒴藋葉　五葉藤　慎火草　浮萍草

豆豉　大黃　梔子　黃芩

芒消

右十三味但得一物擣以貼之卽差赤小豆末和雞子

謹按新附淋草一作新[illegible]草

白塗無雞子水和用之 千金同

又方

新附淋草半斤　蛇退皮一條　露蜂房三兩

右二味以水一斗煮取四升以帛搨洗之隨手消神妙經用効故附此卷傳之

又方

煮栗取澱汁以洗之妙

又方

取蚯蚓糞水和如泥塗之

千金論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗大者如手

謹按[illegible]此條千金亦無異

甚者竟身痒微腫又白丹肉中起痒痛微虛腫如吹癮胗起亦有雞冠丹赤起大者如錢小者如麻豆粒如雞冠上澀一名茱萸火丹有水丹由遍熱遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在中喜著腹及陰處此雖小疾不治令人至死療之皆用升麻膏方

升麻　白薇　漏蘆　連翹

芒硝各二兩　黃芩　蛇銜　枳實炙各三兩

梔子二十枚　蒴藋四兩

右十味擣碎令細以水三升漬半日豬脂五升煎之候水氣竭去滓乾器中收之暑取敷丹毒上頻塗敷之以

遵按千金芸薹菜莖作芸苔菜

差止凡種丹及熱瘡癧皆用之効忌如常內宜服瀉熱湯 文仲備急集驗無自蔡崔氏同

又療丹神驗方

芸薹菜莖擣令熟厚封之隨手即消散餘熱未愈再封臣以貞觀七年三月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四體骨肉並疼比至曉頭痛目眩額左角如彈子大腫痛不可得近至午時近右角至夕諸處皆到眼遂閉合不暫開幾致殞斃其縣令周公以種種方藥治皆不差經七日臣自處此方其驗如神故疏之以傳來世云爾

赤丹方五首

病源赤丹者初發疹起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如雞冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹 出第三十一卷中

肘後療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或痒搔之隨手脈起不急療之日甚殺人方

羚羊角煎以摩之數百遍若無用牛脂及猪脂有解毒藥者皆可用摩務令分散毒氣神妙

又若已遍身赤者方

生魚合皮鱗燒擣末以雞子白和遍塗之 文仲備急同

又新附方

羚羊角無多少即燒之為灰令極細以雞子白和塗之極神効無雞子以水和塗之亦妙 出第二卷中一云赤小豆一升羊角燒之三兩為末雞子白和敷之無羊角單用赤小豆及備急文仲同

集驗療人面目身體卒赤黑丹起如疥狀不療日劇遍身即殺人也

煎羊脂以摩之青羊脂最良 千金文仲肘後劉繁同

又方

以猪槽下土泥塗之 千金同又以倒猪枋炙熨之即差並出第八卷中

白丹方一十三首

病源白丹者初發痒痛微虛腫如吹瘮起不痛不赤而白色由挾風冷故然色白也 出第三十七卷中

肘後療白丹方

末豉以酒和塗之擣香薷葉苦蓼敷之

又方

屋上塵以苦酒和塗之

又方

燒鹿角作灰以猪膏敷之

又方

猪和乾薑末敷之

又方

酸模草五葉草煮飲汁又以摩赤丹以瘥亦佳 文仲

同出第二卷中

集驗云有白丹者肉中起痒痛微虛腫如吹㾮㾴起者瘥之亦如赤丹法有雞冠者赤色丹起大者如連錢小者如麻麥豆粒肉上粟粟如雞冠肌理也方說一名爲茱萸火丹瘥之如天火法有水丹由體熱過水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在其中喜著腹及陰處瘥之亦如火丹法其水丹著人足趺及踹脛間者作黃色如火丹狀經久變紫色不瘥皆成骨疽也無毒非殺人疾若成骨疽即難瘥也經言風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒氣搏皮

膚外發腠理開毫毛淫邪氣妄行之則爲痒也所以有風㾴風瘙疾皆由於此有赤㾴者忽起如蚊蚋啖煩痒劇者連連重沓壟腫起搔之逐手起有白㾴者亦如此證也療之皆如療丹法也療之方

擣白瓷器屑猪膏和塗之

又方

燒猪矢灰和雞子白塗之 肘後千金備急文仲同

崔氏療丹毒或發背及諸腫方

取馬齒莧熟擣敷之數數易勿住若得藍靛和之更良

又方

以生羊牛肉貼熱數易之良

又方

鼠粘草根勿使見風及犬見洗去土熟擣以敷腫處兼絞取汁飲之佳

又方

蒐蔚草蛇銜草慎火草相和熟擣敷之良數數易之

又方

擣鯽魚敷之數數易之良 出第五卷中

備急療白丹方

苧根三斤小豆四升水二斗煮以浴日二四遍 肘後文仲

同出第四卷中

丹㾴方四首

病源丹㾴者肉色不變又不熱但起㾮㾴相連而微痒故謂之丹㾴 出第三十一卷中

千金翼療丹㾴方

酪和鹽熱煮以摩之手下消也

又方

白芷根葉煮汁洗之効

又方

擣愼火葉封之神良

又方

以一條艾蒿𦊱竿以兩手極意尋之著壁伸十指當中指頭以大艾炷灸𦊱竿上令𦊱竿斷即止灸十十差於後重發更依此灸永差

赤疹白疹方一十一首

千金云凡赤疹熱時發冷即止白疹天陰冷即發方

白疹以水煮白礬汁拭之又煮蒴藋著少酒以浴又以酒煮石南拭之又以水煮雞屎汁拭之又枳實汁拭之所療一如療丹法 集驗同

又方

末白朮酒服方寸匕日三盡五斤

又方

淋石灰汁清洗之

又方

煮白芷根葉作湯洗之

又方

芥子末以醋漿水服方寸匕日三服差

又療身體赤癮疹而痒搔之隨手腫方

莽草二分 當歸 丹參 躑躅花 大戟 細辛 芍藥 芫花 附子炮 蜀椒各四分 猪脂一升半

右十一味切以猪膏合煎之候附子色黃膏成濾去滓收貯以敷病日三以差爲度

又方

礬石二兩酒三升漬令㴱拭上立差

延年療赤白二疹丸方

白朮一斤 蔓荊子四分 防風四分 附子二分炮 桂心一分

右五味擣篩蜜和爲丸如梧子大酒服十丸日二服漸

加至十五丸若能作散服一錢匕此療風疹正方凡風皆由舊來有風氣所以方中不得不用桂心附子白朮既用一斤附子只有二分復有防風其防風即能斷附子毒所以一物毒亦無所至伏惡進止

又其赤疹心家稍虛熱氣相搏其色赤宜作芒硝湯拭之方

芒硝三兩

右一味用湯一升內芒硝令消散以帛子沾取拭疹即漸除湯盡更合 以前二件赤白疹方許崇處並出第十三卷中

古今錄驗云赤疹者由冷濕折於肌中甚即爲熱熱成赤

瘮也得天熱則劇取冷則瘥療之方
取生蛇銜草擣極爛以塗之最驗 集驗小品同
又白瘮者由風氣折於肌中之熱熱與風相搏遂為白瘮
也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣身暖
亦瘥療之方
水煮枳實拭之佳又擣末熬之青布裹熨之 集驗同 出第三十卷中
肺風冷熱瘮方二首
延年論曰凡風瘮有二先受風寒氣其瘮色白厚搔之即
破應手下有道生此是肺家風冷氣宜外洗拭即定方

吳茱萸一兩清酒一升煮取五合以軟帛取汁拭瘮
處不過三兩度即定如瘮處多用盡更合白瘮即是
肺藏受寒冷氣所發也
又療肺風熱皮膚生風結狀如瘮或生風搔如水疥粟粒
戢戢然方
天門冬八分去心 枳實十二分 白朮 人參各六分
獨活 苦參各五分有冷不用
右六味擣篩蜜和為丸梧子大食後以飲下七丸日再
服加至十丸忌如常法 出第十三卷中
雜丹瘮毒腫及諸色雜瘡方五首
刪繁療丹走皮中淫淫名火丹方
取礦蹟末水和敷之 出第九卷中
千金療赤流腫方
榆根白皮擣末以雞子白和塗之 出第二十三卷中
近効梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤
大小便不利方
芒硝四分 大黃四分 梔子 甘草炙
黃芩 知母各六分
右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服忌如常法
此方甚佳 一方芒硝三兩大黃四兩梔子二七枚黃芩加知母各三兩甘草二兩右以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去滓內芒硝分三服

又療諸色瘡腫神驗方 考功章郎中處
胡粉熬令赤 赤小豆熬 糯米 吳茱萸
黃連各一兩 水銀二分
右六味擣篩以生麻油和如稀麵糊然後取水銀於手
掌中以唾指研熱並入藥中令勻先椒湯洗瘡乾拭以
藥塗之日再以差為度療孩子瘡佳 一云用泔清洗瘡
又牛蒡粥療瘡腫方
取牛蒡根二莖淨洗煮令爛於盆中研令細去筋脈
汁中即丁米煮粥鹹淡任性服一碗甚良無忌

瘑瘡方一十二首

病源瘑瘡者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結聚所生多著手足間遞相對如新生茱萸子痛痒抓搔成瘡黃汁出侵淫生長拆裂時差時劇變化生蟲故名瘑瘡（出第三十五卷中）

深師療瘑瘡方

剉木燒取汁塗之差（救急同）

又方

炙瘑上周匝最良（並出第二十九卷中）

集驗療瘑瘡方

苦酒一升溫令沸以生韮一把內中以薄瘡上即差（范汪同）

又方

雄黃（一兩） 黃芩（二兩） 松脂（二兩） 髮灰（如雞子大）

右四味以白膏與松脂合擣以敷瘡上（范汪文仲備急用黃連餘同）

又方

亂髮頭垢等分螺殼二十枚燒以臘月豬脂和如泥以敷之（范汪同）

又方

羊躑躅花三升以水漬之半月去滓以汁洗瘡一方炙鮓以敷瘡上蟲當出也（范汪同）

又方

桃花鹽等分熟擣以醋和敷之（范汪同）

又方

皂莢十枚苦酒四升煮之去滓煎如飴以敷瘡上（范汪同）

又方

新死雞一口安雞屎一合酒煎成膏塗之

又方

穀木白汁（一合） 苦酒（二合） 小蒜（半合） 釜月下土（一合）

右四味和如泥塗之乾復塗（並出第八卷中范汪同）

刪繁療瘑瘡螺殼膏方

螺殼（二七枚燒者） 亂髮（燒灰） 頭垢 龍膽（末）

右四味各等分合研如粉以三年油淀和敷之加膩粉妙

又療瘑瘡多汁方

水銀（八分以唾手掌中研令入藥用） 黃連（八分） 胡粉（八分熬令黃）

右三味黃連爲末和以粉敷瘡上（並出第二十九卷中）

瘑瘡久不差方五首

病源瘑瘡積久不差者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間則生瘡當痒痛故經久不差（出第三十五卷中）

廣濟療瘑瘡久不差方
豆豉熬令極乾爲末先以泔清洗瘡拭乾以生麻油和之敷上差以油單片裹之三日開未差更塗差止
又療諸瘑瘡經年依手拂疵痒引日生不差瘡久則有蟲藜蘆膏方
藜蘆六分　黃蓮八分　礬石熬汁盡　松脂
雄黃各八分研　苦參六分
右六味擣以厚絹篩之用豬脂二升煎之候膏成去滓入雄黃礬石末攪令和調待凝以敷之諸瘡經年或搔之汁出不生痂百藥療不差悉主之瘑疥痒頭瘡亦効

熱瘡者起瘡便生白膿是也黃爛瘡者起瘡淺但出黃汁若肥瘡是也侵淫瘡者淺瘡黃汁出兼搔之漫延長不止是也瘑瘡者喜著手足相對痛痒折裂春夏隨差
集驗同
又方
剉羊桃枝葉
右一味水煮以洗之三四度
劉涓子療久瘑疥癬諸惡瘡毒五黃膏方
雄黃二兩研　亂髮如雞子大燒　黃連一兩　黃蘗二兩
黃芩二兩　青木香二兩　雞舌香二兩　白芷二兩
狼跋子四十枚　雄黃二兩研
右十味㕮咀以苦酒半升漬諸藥一宿以臘月豬膏三升煎取髮三四沸內諸藥又三沸止絞去滓膏成敷瘡日五過出第五卷中
崔氏療瘑積年不差瘡汁浸四畔好肉復變成瘡瘡色赤黑痒不可耐搔之並汁出者方
黃連　黃蘗　豉心各三分擣爲末一方加蔓菁子亦有加杏人者與黃連等分研篩之　胡粉　水銀　油脂以上三物和之如泥
右六物若處水銀不散可內掌中細細和唾研之自當散訖然後攪胡粉等以塗瘡上仍取黃連末粉之此瘡多有黃汁著藥候汁微即易之以差爲度出第五卷中

癬瘡方一十一首
病源癬病之狀皮肉隱胗如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭裏生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏則血氣否澁發此疾按九蟲論云蟯蟲在人腸內變化多端發動亦能爲癬而癬內實有蟲也養生方云夏勿露面臥露下墮面皮厚及喜成癬出第三十五卷中
肘後療癬瘡方
獨活根去土擣之一把許附子二枚炮擣以好酒和塗之三日乃發欲敷藥先以皂莢湯洗拭令乾然後

雷攢羊蹄根或作大黃

敷藥便愈（出上卷中）

深師療癬秘方

雄黃（一兩研）　硫黃（一兩研）　羊蹄根（一兩）　白糖（一兩）

荷葉（一兩）

右五味以後三種擣如泥合五種更擣和調以敷之若强以少蜜解之令濡不過三差

又療癬神驗方

用雄黃研以淳苦酒先和以新布拭癬上令傷以漿塗之神効

又方

菖蒲細切取五升以水五斗煮取二斗以釀二斗米如酒法熟極飲令得極醉即愈未差更作無有不愈

一云長服菖蒲末酒調並作丸佳

又方

取乾蟾蜍燒灰末以猪脂和塗之良（出第二十卷中）

千金翼療癬秘方

擣羊蹄根分著瓷中以白蜜和之刮瘡四邊令傷先以蜜和者敷之如炊一石米久拭去更以三年大醋和之以敷癬上燥便差若刮瘡處不傷即不差（深師同出第二十三卷中）

救急療癬方

先以針鑱癬上即擣瓜蒂末敷上仍先以泔洗之

又方

烊松脂擣熏黃末和更煎仍以泔清洗癬乃熱敷之一兩度即差（並出第五卷中）

必効療癬方

淳甲煎塗之愈好口脂亦得

又方

附子（一枚炮）　大皂莢（一枚炙）　九月九日茱萸（日合）

右三味爲散揩癬上令汗出敷之乾癬苦酒和塗之（深師古今錄驗同並出第四卷中）

古今錄驗療癬方

作麻淳敷癬上裹之差麻淳不差以鹽及豉和擣塗之即差止

乾濕癬方一十五首

病源乾癬但有匡郭皮枯索痒搔之白屑出是也皆是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若其風毒氣多濕氣少故風沉入深故無汁爲乾癬其中生蟲

又濕癬者亦有匡郭如蟲行浸淫赤濕痒搔之多汁成瘡是其風毒氣少濕多風少故爲濕癬也其中亦有蟲（出第三十

五卷

肘後療燥癬方

水銀和胡粉研令調以塗之 范汪同

又方

以雄雞冠血塗之 范汪同

又方

胡粉熬令黃赤色苦酒和塗之乾即易差止

又方

以穀汁塗之

又方

擣桃白皮苦酒和敷之佳 千金同

又療濕癬方

刮瘡令坼火炙指挳之以蛇床子末和猪脂敷之差

止

深師療乾濕癬神方

取狼毒末以苦酒研之如墨法先洗刮令傷以敷之

不用大塗恐壞人肉 范汪同

又烏梅煎治燥濕癬方

烏梅十四枚 大蒜十四枚 屋塵三合 鹽三合

大麻子四合

謹按外臺書

謹按麻腴作麻脂假米諸米下更須汁方迴然猶有土器也瑞香瓷取出

右五味相和熟擣以苦酒一升半拌和以敷之日三過

差

又香瀝療燥濕癬及瘑疥百瘡方

栢節 杉節 沉香節 松節各一斤

右四味悉碎一如指大以布囊盛之竟令囊注麻腴中

半食頃出漉先取一枚白坩穿去底令孔如雞鴨卵大

以松葉一小把藉孔上以坩安著白鹽以黃土泥塭坩

合際令厚數分單以藥內坩中以生炭著藥上使然其

瀝當流入塭中須然盡乃開出取塭中汁以薄瘡上日

再用之療白禿疽疥惡瘡神効 出第二十九卷中

崔氏療乾濕癬方

取楮葉面著癬用匙背打葉葉碎即換可三四度換

即差亦可只用一葉唯熟打使極碎即裹之勿令碎

葉落即差

又療乾癬積年痂厚搔之黃水出每逢陰雨即痒方

取巴豆肥者一枚炭火上燒之令脂出即於斧上以

指研之如杏灤法以塗癬上薄敷之不過一兩度便

愈

又療乾癬諸治不差者方

但看癬頭有排瘤子處即以小艾炷灸之差 出第五卷中

古今錄驗療濕癬方
石硫黃研大醋三年者和數敷癬上
又方
蛇床子一兩　黃蘗一兩　黃連一兩　胡粉一兩研
右四味擣篩為散內水銀一棗大和猪膏研入相和以
塗瘡云是驗方
又方
取肥猪肉薄割之於鐵上炙之令熱以薄瘡上日三
四度出第四十卷中
疥癬惡瘡方五首

廣濟療疥癬惡瘡方
石硫黃六兩　白礬十二兩熬並於瓷器中研以烏麻
油和稠調如煎餅麪更熟研敷之熱炙疥癬上摩一
二百下乾即移摩之取差出第五卷中
劉涓子療疥癬惡瘡膏方
丹砂研　雄黃研　亂髮　白蜜
松脂別入各一兩　䕡茹三兩　巴豆十四枚去皮　猪膏二升
右八味先煎猪膏亂髮消盡內松脂蜜三上三下絞去
滓末䕡茹石藥內膏中更一沸以攪令極調以敷瘡上
日三差止神効出第五卷中

救急療癬瘡方
白礬石熬　多年韭根　雄黃研　藜蘆
瓜蔕　胡粉各一分　水銀三分
右七味以柳木杵研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆韭
根瓜蔕三沸去滓入石藥等攪令相得以敷瘡上甚妙
近効療熱瘡疥癬痒痛不可忍者方
硝石一物先用泔清洗瘡去痂拭乾看瘡大小研硝
石末和生麻油如麪糊以塗瘡上三兩度差
又方
水銀與蕪荑酥和塗之　薑黃塗之　牛李子塗之
醋煎艾塗之　羊蹄根和乳汁塗之出第三卷中

疥風痒方七首
肘後療疥方
石灰二升以湯五升浸取汁先用白湯洗瘡拭乾乃
以此汁洗之有効出第六卷中
深師療疥大黃膏方
黃連十四銖　藜蘆十二銖　大黃一兩　乾薑十四銖
䕡茹十銖　莽草十二銖　羊躑躅十銖
右七味擣篩以成煎猪脂二斤微火向東煎之三上三
下膏成去痂汁盡付之神効合時勿令婦人雞犬見之

出第二十九卷中

集驗療疥方

擣羊蹄根和猪脂塗上或著少鹽佳范汪同

又療疥及風瘙瘡苦痒方

丹參四兩　苦參四兩　蛇床子一升

右三味切以水六升煎之以洗疥瘙以粉粉身日再為之即差

備急葛氏療疥瘡方

取楝根削去上皮切皂莢去皮子等分熟擣下篩脂膏和搔疥去痂以塗之護風勿使女人小兒雞犬見之范汪同

又療方

右硫黃無多少研粉以麻油或以苦酒和塗摩之以酒漬苦參飲之並出第五卷中

熏疥法

取艾如雞子大先以布裹亂髮於紙上置艾熏黃末朱砂末杏人末水銀各如杏人許水銀於掌中以唾研塗紙上以卷藥末炙乾燒以熏之一一云筒瓦一口同安灰蓋上以繩束之用熏疥於腳頭被內置之少時火盡止隔日一熏不過再即差無所損

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十一卷目錄 採藥時節所出土地諸家丸散酒煎解諸毒等二十二門

採藥時節一首
藥所出州土一首
用藥分兩煮湯生熟法則一十六首
古今諸家丸方一十八首
古今諸家散方六首
古今諸家膏方四首
古今諸家煎方六首
古今諸家酒方一十二首
解飲食相害成病百件
食魚中毒及食鱠不消方五首
食椒菜瓠中毒方四首
解一切食中毒方三首
酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方二首
飲酒連日醉不醒方九首
飲酒令難醉方一首
飲酒積熱方二首
斷酒方一十五首
服藥過劑及中毒方一十一首
解諸藥草中毒方二十九首

解諸蛇蠱毒方六首
辨五大毒方一首
解金鐵等毒方八首
惡毒瘴氣毒風腫毒方四首

唐王燾先生外臺秘要方第三十一卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等　上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

采藥時節一首

千金翼論曰夫藥採取不以時節不知陰乾暴乾雖有藥名終無藥實故不依時採取與朽木不殊徒費人功卒無補益其法雖具本經學者尋覽造次難得所以甄別即日可知耳

萎蕤 立春後採陰乾　藁本 十月暴乾　三通草 取枝陰乾　烏喙 陰乾

烏頭 陰乾　絡石 陰乾 以上並正月採　茯苓 陰乾

茯神 陰乾　桂心 陰乾　白朮 暴　乾地黃 陰

天門冬 暴　麥門冬 陰　薯蕷 暴　甘草 暴

人參 暴勿見風　石龍芮 採皮陰乾　藁本 暴　龍膽 陰

杜仲 陰　牛膝 陰　細辛 陰　獨活 暴

升麻 暴　柴胡 暴　榆皮 暴　藍葉 暴

當歸 陰　防風　芍藥　桔梗

秦艽　前胡　知母　括樓根

沙參　狗脊　茜根　王不留行

萆薢　菝葜　白芷　杜若

百合　白斂　地榆 乾 以上暴　大黃 火乾

虎掌　黃連　秦皮　猪苓

石韋　紫菀　紫葛　狼毒

鬼臼　天雄　防巳　烏喙

烏頭　甘遂　牡丹　巴戟天

石南葉　貫衆　羊桃　黃精

黃耆 以上並陰乾二月採　黃芩 陰　大青 陰

天門冬 暴　水萍 暴　厚朴 陰　青葙葉 陰

玄參 陰　白薇　艾葉 暴　芫花 陰

商陸 日乾　白朮 暴　麥門冬 陰　紫菀 陰

躑躅 陰　射干 陰　茵芋 陰　黃環 陰

虎蘭 陰　蕪荑 陰　杜蘅 暴　藍葉

王瓜 陰　寄生 陰　防葵 暴　紫草 陰

葶藶 暴　苦參 暴　茜根 暴　紫參 火炙

澤漆 陰　藜蘆 陰 以上並三月採　赤箭

菥蓂子　蒲黃　玄參　蘼蕪 以上暴

遠志 陰　景天 陰　人參 暴　葶藶

大青 陰　白頭翁　白鮮　石南葉

鼠尾草 乾 以上並四月採陰　菖蒲 陰　卷柏 陰

白鮮 陰　澤瀉 陰　車前 陰 五月採　石龍芮子

蜀漆陰　肉蓯蓉陰　菥蓂子暴　覆盆子
乾漆夏至後採　半夏暴　五加採莖陰　杜仲
茵蔯陰　莽草陰　桑核　葛根暴
丹參暴　蛇床子陰　葶藶子立夏後採陰
茺蔚子　青葙子　莨菪子　蘼蕪暴
松蘿陰　旋復花暴　萹蓄陰　蔄茹陰
青蘘巨勝苗也以上五月採　松脂　青蒿子
茅根　杜仲　蕘花以上六月採陰　石斛陰
五加皮採莖陰　卷柏陰　蒺藜暴　腐婢陰
澤漆陰　天門冬暴　鼠尾花陰　瓜蒂

槐子　麻黃立秋採陰　石龍芮暴　景天陰
漏蘆陰　薇銜陰　菌桂陰立秋採　木蘭
瞿麥立秋採實陰　桃人陰　續斷陰　蒺藜子暴以上並
七月採　白瓜子　飛廉陰　女青陰
地榆暴　大黃火乾　桔梗暴　木蘭暴
楮實暴　秦皮陰　桂陰　營實陰
鬼臼陰　百合暴　牡丹陰　防己陰
狼毒陰　萆薢暴　菝葜暴　白芷暴
連翹陰　苦參暴　石龍芮陰　狗脊暴
白斂暴　前胡暴　知母暴　栝樓根暴

巴豆　豬苓陰　茯神陰　蛇含陰
茯苓陰　虎掌陰　薏苡人　天門冬
麥門冬陰　杜若暴　當歸陰　營實暴
柴胡暴　升麻暴　獨活暴　細辛陰
牛膝陰　石斛陰　人參暴　蒟蒻暴
甘草暴　天雄暴　恒山陰　半夏暴
雷丸暴　牡荊陰　漏蘆陰　酸棗陰
白朮暴　秦艽暴　龍膽陰　巴戟天陰
蒺藜子暴　黃連　沙參暴　王不留行暴
續斷陰　貫衆陰　乾地黃陰　地膚子陰

五味子陰　蜀椒陰　藿菌陰　鬼箭陰
附子上旬採　秦椒　澤瀉陰　牙子暴
黃耆陰　芍藥暴　石南實陰以上八月採
松實陰　菊花陰　蓍實暴　乾漆
枳實陰　白朮暴　楮實暴　厚朴陰
杜仲　皂莢陰　山茱萸陰　吳茱萸九月採陰
梔子暴　辛夷暴　牡荊陰　秦椒
菟絲子暴　營實陰以上並九月採　麥門冬陰
牛膝陰　地膚子陰　枳實陰　防風暴
決明子　皂莢陰　桂陰　菴蕳子陰

山茱萸陰　五加根陰　厚朴陰　□實陰
貝母暴以上並十月採　菊子陰　蒐實陰
款冬花陰　龍膽陰以上並十一月採　冬葵子
菖蒲　龍膽　忍冬　木蘭
大戟以上並十二月採陰　枸杞子冬採根春夏採葉
桑根白皮採無時　柏葉四時各依方面採之陰
菥蓂春夏採葉秋冬採根莖

論曰凡藥皆須採之有時日陰乾暴乾則有氣力若不依時採之則與凡草不別徒棄功用終無益也學者當要及時採掇以供所用耳

藥所出州土一首

千金翼論曰按本草所出郡縣皆是古名今之學者卒尋而難曉自聖唐開闢四海無外州縣名目事事惟新所以須甄明即因土地名號後之學者容易即知其出藥土地凡一百三十三州合五百一十九種其餘州土皆有不堪進御故不繁錄耳

關內道

雍州　柏子人　茯苓
華州　覆盆子　茯神　白朮　薯蕷　杜蘅　柏白皮　茯苓　□蘞　茵芋　天門冬　細辛　狼牙　木防己　麥門冬　龍膽　水蛭　黃精　王不留行　丹參　松花

鬼臼　鼈頭　兔肝　沙參　桔梗　通草　白芷　小草　遠志　續斷　石南　□頭　斑猫　蕪荑　虎骨　茶蒿　菴䕡子　亞□　蔄茹　秦艽　楓柳皮　白藥　款冬花　桑螵蛸　澤瀉　山茱萸　石韋　白斂　松子　五味子　單□　松蘿　玄參　茯□　白薇
同州　□鼠　麻黃根　麻黃　蒲黃　寒水石　麻黃子
岐州　□雞　及己　盧□　六□　鬼督郵　甘草
寧州　芫青　荊子　□□　草蒿花
鄜州　芍藥　黃芩
原州　□狼牙　黃耆
延州　蕪荑
□州　代赭　野豬黃
涇州　秦艽　□□
隴州　防風　黃芩　青□

河南道

洛州　黃魚膽　黃石脂　秦椒
穀州　半夏　桔梗
□州　秦椒
陝州　栝樓　柏子人
汝州　鹿角　鹿茸
許州　鹿茸
□州　茯苓　白石英　茯神　虎掌　桔梗　括樓
□州　吳茱萸　虎掌　桑上寄生
齊州　阿膠　防風　海藻　海蛤　葶藶　蔓荊
□州　文蛤　□□　烏賊魚　牛黃　馬刀　七孔決明
兗州　防風　伏翼　羊石　牛膝
□州　□□　雲母　礬石　理石　鹿角　枇花石
徐州　桑上寄生
□州　牛黃　海蛤
□州　防風　紫石英

按通典郴州異作柳州鈎樟字

按道有郴凡此當是柳州

按通典異肅州作蒲桃

江南東道

潤州鍾乳鬼臼 貝母半夏 卷柏 越州榧子劉寄奴

婺州 睦州 歙州 建州茵陳黃連 泉州乾薑

江南西道

宣州半夏 黃連 饒州黃連

吉州陟釐 江州生石斛

岳州杉木橘木 蟬蛻鼈甲 潭州生石斛

郎州牛黃 永州石鷰

郴州鈎樟根 辰州丹砂

隴右道

秦州防葵狼牙 狼毒鹿茸 鹿角麋茸 芎藭

成州防葵狼牙 蘭州茯苓鹿角膠 廓州大黃

武州石膽雌黃 雄黃 宕州藁本當歸 獨活

河西道

涼州大黃鹿茸 白附子 甘州椒根

肅州肉蓯蓉 百脈根 伊州伏翼 葵子

瓜州甘草 西州蒲桃 沙州石膏

劍南道

益州苧根梅煎薑黃乾薑 枇杷葉蜀漆木蘭慎火草 黃環薏苡人沙糖 鬱金百部根 百兩金何山

按別本有也

眉州巴豆 資州折傷木 嘉州巴豆紫葛

綿州天雄側子 烏頭附子 烏喙

卭州貢子木 一莖天 瀘州甘皮[illegible]

茂州升麻馬牙消 羌活朴消 金牙大黃 馬齒礬雄黃 芒消礬石

巂州高良薑 松州 當州並出當歸

扶州芎藭 龍州側子烏頭 巴戟天烏喙 天雄附子

黎州黃連

嶺南道

廣州石斛決明子 白藤花甘蕉根 丁根 恩州蚺蛇膽

賀州 梧州 象州並出蚺蛇膽 桂州滑石蚺蛇膽

春州 封州 瀧州並出石斛 融州桂心

潮州石斛鍾乳 牡桂 柳州桂心鈎樟根

潘州蚺蛇膽 交州檳榔蘆根 三百兩銀木鼈子

峯州豆蔻

馬牙石一名長石一名太乳一名牛腦石出在齊州堅礦辟

空青出蔚州蘭州宣州梓州宣州者佳蔚州者無空理大色深深

曾青鄧州蔚州者佳餘州者惡

白青簡州梓州者並佳

石膽蒲州虞鄉東亭谷及薛集窟嶺如雞子大者佳芒消同名爲消石者南始安出者佳他州齊州者惡堅潤服之勝乳

乳石第一出始興其次連廣連朗郴等州今陝州青溪房州三洞出者亞於始興者自餘不可用也桃花石青出中州鍾山縣似赤石脂但不著舌

紅俊門生六寸六分但而坐三十六背赤洋

赤石脂鄧州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有凡石中有石骨如玉　陽起石齊州歷城縣西北五六里齊山西北六七里盧山出白者佳黑者不堪

石膽一名石飴餅出徐州宋里山入土一丈餘得之大如雞子觸著即破　青琅玕出嶲州西烏白蠻中及于闐國一名青珠若石梁州均州房州金州並出

凝水石出同州韓城縣色青黃理如雲母者佳澄城斜理文逆白者劣　礬石出漢川武當西遼坂名礬石谷即是其真者梁州馬道戍澗中有

上陰櫱色白如脂出潤州鄒縣三女驛西北坡平坳土窟中乳是也有六十餘坎人云服之同鍾乳不發熱　戎鹽沙州名為禿登鹽廓州名為土陰鹽生河岸山坂之陰燒之不鳴　黃石齊州歷城東者良

代赭今靈州鳴沙縣大勝齊代所出者

論曰既知無物非藥及所出土地復採得時須在貯積以供所用不得虛棄光陰臨時忽遽失其機要使風燭不救實可悲哉博學者深可思之用為備耳

用藥分兩煮湯生熟法則一十六首

千金或曰古人用藥至少分兩亦輕差病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而差病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫故病輕藥味須少痾重用藥即多此則醫之一隅何足怪也

又古之醫者自解採取陰乾暴乾皆悉如法用藥必依土地所以療十得九今之醫者但知診脈處方不知採藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不悉所以療十不能得愈五六者寔繇於此處方者常須加意重復用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳將來學者須詳熟之

凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映澈色理鮮淨者為佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死

凡草木藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾療病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘唯須精新也

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經即不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸藥草石強弱相欺入人腹中不能治病更加鬬爭草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得所雖未能治病猶得利安五藏於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度

皆脚下注之今方不然此篇具條之更不煩別注也
凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤
凡石藥及玉皆碎如米豆以綿裹內湯酒中煮之
凡鍾乳及諸石以玉槌著水研之三日三夜漂練務令極
細乾研則七日七夜
凡銀屑以水銀和成泥
凡礜石以黃土泥圍之火燒半日乃熟可用仍不得過之
不鍊生入藥使人破心肝
凡朴消礬石燒令汁盡乃入丸散芒消朴消皆絞湯訖乃
內汁中更上火兩三沸令烊盡乃服

凡湯中用丹砂雄黃細熟研如粉臨服乃投湯中攪令調
和服之
凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦
打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正
爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩
亦完用之
凡橘皮吳茱萸椒等入湯不㕮咀
凡諸果子人皆去尖皮及兩人者湯挼撻去皮仍切之用
梔子者去皮用蒲黃者湯成下
凡生麥門冬生薑入湯皆切三擣三絞取汁湯成去滓下

之煮五六沸依如升數不可共藥煮一法薄切用之
凡麥門冬皆微潤抽去心
凡麻黃去節別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃內諸
藥煮之不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白
前三分斬之膏中細切用之
凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以碪
槌極打令碎乃入臼不爾擣不熟
凡用桂厚朴杜仲秦皮木蘭皮輩皆削去上虛軟甲錯取
裏有味者秤之茯苓豬苓削去黑皮秤牡丹天門冬巴戟
天遠志野葛等皆捶破去心紫菀洗去土暴乾乃秤之薤

白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去
大枝鬼臼黃連皆除根毛石韋辛夷拭去毛又去心蜀椒
去目及閉口者用大棗烏梅皆去核用鬼箭削取羽皮
凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥唯赤者
凡菟絲子湯淘汰去土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白
擣之不盡者更以酒漬之三五日乃出暴微乾擣之須臾
懸盡極易碎
凡甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳
實去瓤藜蘆去頭皂莢去皮子
凡椒要實微熬令汗出則有勢力

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰炮令微拆削去黑皮乃秤之唯薑附湯及膏酒中即生用亦削去皮乃秤之直理破作七八片半夏熱湯浸洗去上滑一云上洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散皆煻灰炮之用

凡巴豆去心皮膜熬令紫色杏人桃人葶藶胡麻諸有膏脂藥皆熬黃別擣令如膏脂撚視之泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散乃復都以輕絹篩之須盡又內臼中依法研治數百杵也湯膏中亦有熬者雖有生用者並擣破

凡麥糵麴末大豆黃卷澤蘭蕪荑皆微炒乾漆熬令煙斷

烏梅入丸散熬之用熟艾者先炒細擘合和諸藥擣之令細散不可篩者內散中和之

凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鮫鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙

凡用斑貓諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣熬令黃色殭蠶蜂房微熬之

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡丸散用膠先炙令通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更上火令烊盡

凡用蜜先以火煎掠沫令色紫黃即丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤遂至大稠於丸彌佳

凡丸中用蠟烊之投少蜜中攪調以和藥

凡湯中用飴糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

又云古秤唯有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩為定方家有云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩兩三種或五種皆悉分兩同等爾

凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服三方寸匕須差止是三五兩藥爾

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢匕者以大錢上全抄之若云半錢匕者則是一錢抄一邊爾並用五銖錢也錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散勿按抑之正爾微

勠令平調耳今人分藥不復用此
凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也如大麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今之青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以小豆準之如梧桐子者以二大豆準之一方寸匕散蜜和得如梧桐子十丸爲度如彈丸及雞子黄者以十梧子準之
凡方云巴豆若干枚者當先去心皮畢乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實

若干枚者去核畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩乾薑一累者以半兩爲正本草云以一兩爲正
凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正椒一升三兩爲正吳茱萸一升五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有大小虛實輕重不可通以秤準皆取平升爲正
凡方云桂一尺者削去皮重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者重三兩爲正云一把者重二兩爲正
凡方云蜜一斤者有七合豬膏一斤者一升二合
凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂擣篩如法也
凡丸散先細切暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其濕潤藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴乾獨擣令偏碎更出細擘暴乾若值陰雨可微火烘之小停冷乃擣之

凡爲藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒不須如此
凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者
凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳
凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此爲率皆絞去滓而後酌量也然則利湯欲生少水而多取汁者爲病須快利所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者爲病須補益是以多

水而少取汁好詳覶之不得令水數多少湯熱可用新布
兩人絞取汁撥去滓澄去垽濁分再服三服者第二第三
服以紙覆令密勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上煖之若
於鐺中勿令器中有水氣方云再服三服者要令力勢相
及並覶人之暴羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依
方說也

古今諸家丸方一十八首

廣濟療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢
時氣鬼魅瘴癧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤
中小兒吐乳大人狐狸等病吃力伽丸方

吃力伽 白朮是也　光明砂　訶梨勒皮　麝香當門子
香附子　丁子香　沉香　蓽撥
檀香　青木香　安悉香　犀角 屑各二兩
薰陸香　蘇合香　龍腦 各半兩

右十五味擣篩白蜜和爲丸每朝取井花水服如梧子
四丸於淨器中研破服之老小一丸以蠟裹一丸如彈
丸緋絹袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷
水煖水臨時量之忌五辛生血物以臘月合神前藏之
密器中勿令洩藥氣神驗

千金耆婆萬病丸療七種癖塊五種癲病各種注忤七種
飛尸十二種蠱毒五種黃病十二時瘧疾十種水病八種
大風十二種瘰痺並風入頭眼暗䀮䀮及上氣欬嗽喉中
如水雞聲不得臥飲食不作肌膚五藏滯氣積聚不消擁
閉不通心腹脹滿連及胸背鼓脹氣堅結流入四肢或復
又心膈氣滿時定時發十年二十年不差五種下痢疳蟲
蚘蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡眠消瘦
無力陰入骨髓便成滯疾身體氣腫飲食嘔逆膂胸酸疼
四肢沉重不能久行久立婦人因產冷入子藏藏中不淨
或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛爲患或
因此斷產並小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病服此

藥以三丸爲一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故
稱萬病丸以其牛黃爲主故一名牛黃丸以耆婆良醫故
名耆婆丸方

牛黃　麝香　犀角　朱砂
雄黃 並研　芫青 去頭翅足熬本方七枚　黃連
人參　禹餘根　大戟 炙　芫花 熬
茯苓　乾薑　桂心　桑白皮
當歸　芎藭　芍藥　甘遂 熬
黃芩　蜀椒 汗　細辛　巴豆 去皮心別熬擣
前胡　桔梗　紫菀　蒲黃

葶藶子熬　防風各一分　蜈蚣三節炙　石蜥蜴一寸炙
右二十一味並令精細上牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹
餘粮巴豆別研餘者合擣篩之以白蜜和更擣三千杵
極熟密封之除破日平旦空腹以酒服三丸如梧子微
下三五升惡物爲良若卒暴病不要待平旦無問早晩
即服以吐利爲度若不吐利更加一丸或至三丸五丸
須吐利爲度不得限以丸數病强藥少即不利吐若其
發遲以熱稀粥一杯發之若吐利不止即以酢飯兩三
口止之服藥忌陳臭生冷酢滑粘食大蒜猪魚雞狗馬
驢肉白酒行房七日外始得一日服二日補之得食新

禾韭菜汁作羹粥臛飲食之三四頓大良亦不得全飽
産婦勿服之吐利以後常須閉口少語於無風處温煖
暖室將息若旅行卒暴無飲以小便送之若一歲以下
小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利爲度近病及
卒病皆用多積久疾病即少服常取微溏利爲度范氏無黄
芩桑白皮桔梗防風
卒病欲死服三丸如小豆取吐利即差
卒得中惡口噤服二丸如小豆和暖水一合灌入口令下令微利即差
五疰鬼刺客忤服二丸如小豆不差後日更服二丸
男女邪病歌哭腹大如妊身服二丸如小豆日三夜一服間食服之

猫鬼病服小豆三丸不差更服
蠱毒吐血腹痛如刺服小豆二丸不差更服以差止
瘧病未發前服三丸未差更服
諸痰飲者服三丸如小豆不差更服
冷癖服三丸如小豆日三服皆間食常令微溏利爲度
宿食不消服二丸如小豆取利
癥瘕積聚服二丸如小豆日二服皆間食以利差止
拘急心腹脹滿心痛服三丸如小豆未差更服
上氣嘔逆胷中滿不得卧服二丸不差更服
大病服小豆一丸日二

疳濕以一丸如杏人和酢二合灌下部中服小豆二丸差
水病服三丸如小豆日再間食服之差止人弱隔日服
頭痛惡寒服小豆二丸覆取汗
傷寒天行病服二丸小豆一日二間食服
小便不通服小豆二丸不差明日更服之
大便不通服三丸如小豆大又內一丸下部中則通
耳聾聤耳以綿裹如棗核塞耳中差
鼻衄服二丸如小豆無不差
癰腫丁腫破腫內一丸如麻子日一敷之根自出亦服二丸差
犯丁腫血出以猪脂和塗有孔內孔中差止

瘑瘡以酢泔洗訖取藥和猪脂塗之
漏瘡有孔以一丸如小麥內孔中和猪脂敷
痔瘡以藥塗綿內孔中別易差止
瘰癧以酢和塗上差
癬瘡以布揩令汁出以酢和塗上日一易差止
胷背腰脅腫以醋和敷腫上日一易之服二丸如小豆
諸冷瘡積年不差者以酢和塗之亦餅貼之
惡刺以一丸內瘡孔中即差
蝮蛇螫以少許內螫處若毒入腹心煩悶欲絶者服三丸如小豆大
蚣螫以少許塗之
蜂螫以少許敷之差
婦人諸疾胞衣不下服二丸如小豆大
小兒驚癎服一丸如米許以塗乳令嗍之看兒大小量之
小兒客忤服一丸如米和塗乳頭與嗍之以意量之
小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米許塗乳頭令嗍之易差
又大麝香丸療鬼注飛尸等萬病皆療之方
麝香三分　牛黄　眞珠並研　附子炮
鬼臼　莽草炙　犀角屑　礬石熬令汁盡
細辛　桂心　獺肝炙　藜蘆各二分
蜈蚣炙　蜥蜴炙各一枚　斑猫熬

杏人去尖皮熬各五十枚　丹砂研二兩　雄黄研一兩
礬石八分泥裹燒半日　芫青熬　亭長並去足翅各七枚　巴豆去心皮熬
右二十三味合擣別擣巴豆杏人如泥蜜和更擣三千杵丸如小豆每有病以飲服一丸日再漸至三丸丸效
毒蟲所螫摩之以知爲度若欲入毒疫癘鄉死喪家及鬼神廟塚墓處以絳囊盛之男左女右肘後繫之又以少許塗人中卧不魘魅神驗忌如常法
又小麝香丸主療與大麝香丸同方
麝香三分　雄黄研　丹砂研各四分　細辛
乾薑　桂心　芍藥各五分　莽草炙
犀角屑　梔子人各三分　附子炮　烏頭炮各五枚去皮
巴豆五十枚去心皮熬　蜈蚣一枚去頭足炙
右十四味並擣篩蜜和更擣一千杵丸如小豆每服三丸至五丸日三一切尸注心痛皆主之忌生血物生菜蘆筍猪肉冷水神驗一方有當歸一兩
崔氏溫白丸療癥癖塊等一切病並治之方
紫菀　吳茱萸　菖蒲　柴胡
厚朴炙　桔梗　皂莢炙去皮　茯苓
桂心　乾薑　黄連　蜀椒汗
巴豆熬去心皮　人參各三分本方各二分　烏頭十分炮

右十五味合擣篩以白蜜和更擣二千杵丸如梧子大
有病服一丸至二丸不知稍增至三丸五丸以知爲度
主心腹積聚久癥癖塊大如盃碗黃疸宿食朝起嘔吐
支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脅徹
背連胷痛無常處繞臍撓痛狀如蟲蛟又療十種水病
八種痞塞反胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積年食
不消化或婦人癥瘕斷緒不生帶下淋瀝或痃癖連年
不差又療一切諸風身體頑痹不知痛痒或半身不遂
或冷痛或眉髮墮落又療七十二種風三十六種遁尸
注忤癲癇或婦人五邪失心夢與鬼神交通四肢沉重

不能食飲昏昏默默只欲取死終日憂悲情中不樂或
恐懼悲啼飲食無味月水不調具似懷妊連年累月羸
瘦困弊遂至於死或歌或哭爲鬼所亂莫之知也但服
此藥者莫不除愈臣知方驗使合藥與婦人服之十日
下出癥蟲長二尺五十三十枚下膿二升黑血一斗
青黃汁五升所苦悉除當月有子臣兒墮馬被傷腹內
有積血天陰即發羸瘦著牀命在旦夕與藥服下如雞
肝黑血如手者二百餘片白膿二升赤黃水一升其病
即除臣知方驗敢不以獻　忌生冷酢滑猪雞魚犬牛馬
鷄肉五辛油麵豆糯米陳臭等物

仲景三物備急丸司空裴秀爲散用療心腹諸卒暴百病
方

大黃　乾薑　巴豆各一兩去皮心熬別研如脂

右藥各須精新好藥擣篩蜜和更擣一千杵丸如梧子
或小豆服三丸老小量之爲散不及丸也若中惡客忤
心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以
煖水若酒服之或不下捧頭起灌令下咽須臾差如未
更與三丸以腹中雷鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須
折齒灌之令入尤妙神驗忌蘆笋猪肉冷水肥膩
又理中丸療三焦不通嘔吐不食并霍亂吐痢不止者並

主之方

人參　乾薑　白朮　甘草炙各三兩

右四味擣篩蜜和如梧子空腹以飲汁服十五丸忌桃
李雀肉海藻菘菜
延年駐車丸主赤白冷熱血痢腹痛者方

黃連六兩　乾薑　當歸　阿膠各三兩

右四味擣篩以三年米醋煮膠令消和藥衆手撚丸如
梧子大以飲下三十丸日再服亦療產婦下痢不止者
服之甚驗忌猪肉冷水黏膩等物
救急五香丸療諸毒疰氣心腹脹滿大小便不通[illegible]

[illegible]

痛不可忍方

牛黃研　犀角屑各三分　升麻　沉香

薰陸香　當歸　桂心　青木香

麝香研　雄黃研如粉　鬼箭羽　巴豆去心皮熬

訶梨勒皮　朱砂研　檳榔人　乾薑

吳茱萸　甘草炙　豆蔻各四分　桃人去尖皮熬

附子炮各五分

右二十一味擣篩蜜和丸如梧子以煖水服三丸至五丸如不利更服以利為度此方甚驗人久不傳忌海藻菘菜豬肉冷水生葱蘆笋生血物等

必効玉壺丸主萬病與麝香丸同効方

雄黃研　朱砂研　巴豆去心皮熬　附子炮去皮

特生礜石燒半日研　藜蘆各三兩炙

右六味擣篩蜜和丸如小豆以飲服二丸得利病差小兒黍粟一丸以意量之

又青木香丸療一切氣腹脹滿心痛氣冷食不消方

青木香　檳榔人各六分　芍藥　枳實炙

訶梨勒皮各五分　桂心四分　大黃十二分

右七味擣篩蜜和丸如梧子飲下十五丸以意增減之常令溏利甚效

又五補七宣者麗正殿脩書學士李公所傳公名子昭字雲卿趙郡人幼志道法以棲名山往來茅嵩山經三十載云五補七宣丸方

人參　茯苓　地骨皮　乾地黃

牛膝等分

右五味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒飲下三十丸稍稍增至五十丸日再此是五補丸服至五日十日及半月日覺氣擁即服七宣丸服經二三日覺氣散還服五補丸若病候未退即稍稍增之常自審以取調適終須五補及七宣丸並須合服之夫人所疾皆因風不宣散

即成擁緩熱風若氣不流行即成痃癖冷氣轉生眾病皆因此由尋其本源都為不關將理覺虛則補覺風氣擁即利利即腰背更虛且丸是利藥皆急服便透過未能蓄泄諸病凡是補藥皆滯服未見效先覺風氣發動明知宣補必藉兼行故其人授余二法名曰五補七宣所以安七魄鎮五藏堅骨髓養神明久服長生百病日去髮黑行及奔馬

又七宣丸方

大黃十五兩　枳實炙　青木香　柴胡

訶梨勒皮各五兩　桃人六兩去尖皮熬　甘草三兩

右七味擣篩蜜和丸如梧子以酒服二十丸稍加至五
十丸病在下空腹服病在上食後服之以宣利爲度增
減以意量之若風氣結聚宿食不消兼沙石皮毛在腹
中服經七八日乃盡出下似牛涎魚腦等若病深痼則
須半月或一月專服之不用五補丸若積年腰膝疼痛
寒冷如水石熱氣衝心煩悶將死頭旋暗倒肩背重悶
心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣連及頭面及大小便或
利澁脾胃氣不理不能飲食夜臥脚轉筋脈掣痛恍惚
然眠寢不安等疾以飲服之盡差此藥功效不可盡說
如前十數種病則須服七宣丸自外輕病不妨與五補

丸兼服循環不輟補養無限不問男女老小並可服餌
但須量氣力細察候之加減服若是初生孩子可與三
丸五丸稍稍加之取通利其二方常須經久常服不限
春秋冬夏朝夕行止勿間藥性甚善禁如常法

近効大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癥癖氣來心肋下
有塊溫瘧毒氣精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂螫等方

麝香研　牛黃研　藜蘆炙　朱砂研
芍藥　當歸　茯苓　桔梗
鬼箭羽　金牙研　烏頭炮　桂心
吳茱萸　貫衆各一分　雄黃一分半研　乾薑

人參　大蠱骨各二分炙　蜈蚣二寸去足　蜥蜴半枚去牙炙
巴豆二十枚去心皮熬

右二十一味擣篩蜜和丸如梧桐子飲下三丸如未下
以熱飲投之即利三行後以酢飲止之即定然後煮飯
葱薤合之忌冷水豬肉如蛇咬塗者取一丸研和塗之
即差精魅狐狸之病撚禱丸少如兵馬行夜發者是鬼
魅無早晚每日服一丸只三兩日即定仍每日服一丸
繫身體衣服無忌以三五丸用絳囊子盛帶左臂上
辟大蠱毒蛇精魅鬼氣等病

又犀角丸療癰腫腸癰乳癰發背一切毒熱腫服之腫膿
化爲水神方

犀角屑十二分　川升麻　黃芩　防風
人參　當歸　黃耆　乾薑一作乾藍
藜蘆一方無　黃連　甘草炙　梔子各四分
大黃五分　巴豆二十四枚去心皮熬

右十四味如法擣篩蜜和更擣三千杵丸如梧子以飲
服三丸至五丸以利爲度或不利投以熱飲如利以冷
漿水粥止之未差每日服一丸以意量之腫消散爲度
若下黃水或腫輕皮皺色變即是消候忌如藥法効驗
不可論之

又黃連丸療痢無問冷熱並主之方

黃連一兩　伏苓二兩　阿膠一兩

右三味擣篩以水消膠和衆手丸暴乾有痢空腹以飲下十五丸日再以差止甚效

又加減麻人丸療積年患氣不能食飲兼食不消化風氣冷氣熱氣衝上疰癖氣並乳石氣發動並療之服經三四日自覺有效方

蜀大黃錦文者四兩　人參二兩　大麻人二兩

訶黎勒皮四兩

右四味擣篩依法以蜜和丸每服十丸二十丸增減以意量之以通利病除亦不損人齊州下長史常服三十餘年八十歲病皆無百無所忌補理腰脚服經七八日服腎先冷者即下腰水腰脚輕健以酒飲下之並得

又三黃丸療五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱一切熱方

春三月用　黃芩四兩　大黃二兩　黃連四兩

夏三月用　黃芩三兩　大黃一兩　黃連四兩

秋三月服　黃芩六兩　大黃二兩　黃連二兩

冬三月用　黃芩六兩　大黃一兩　黃連三兩

右三味隨時月擣篩蜜和丸如梧子日服七丸諸痢悉

除

古今諸家散方六首

千金小金牙散療南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼注方

金牙五分研　牛黃一分研　天雄　萆薢

黃芩　蜀椒汗　由跋　雄黃研

朱砂研　烏頭　桂心　莽草炙

麝香各二分研　萎蕤　細辛　犀角屑

乾薑各三分　蜈蚣一枚長六寸者炙　黃連四分

右十九味治下篩爲散合牛黃麝香擣三千杵以溫酒服五錢七日三夜二以知爲度以絳袋盛男左女右帶

一方寸匕省病問孝不避夜行塗鼻入中辟鬼惡毒氣最辟霧露亦金之佳

崔氏五香散療疰忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似差似劇兼主百病方

沉香　丁香　麝香　薰陸香

鬼箭羽　當歸　豆蔻人各四分　牛黃

鬼臼　橘皮　金牙燒各三分　犀角屑

羚羊角屑　大黃各六分　升麻　桔梗

桃人去尖皮熬　光明砂研　安息香各二分研

右十九味擣篩爲散以湯飲酒隨病服一方寸匕日再

服病差即停亦可蜜丸如梧子服十九

又備急散療卒中惡心痛脹滿欲吐短氣方

大黄二兩　桂心四分　巴豆一分去皮熬研

右三味擣篩為散取一錢匕以湯七合和服當吐下即愈甚妙

紫雪散療腳氣毒遍內外煩熱口中生瘡狂易叫走及解諸石草藥毒發邪熱卒黄等瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五注心腹諸疾㽲刺切痛蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病方

黄金一百兩　寒水石　石膏各三斤一本用滑石

玄參一斤　羚羊角屑　犀角屑　沉香

青木香各五兩　丁香一兩　甘草炙八兩

右十味切以水三斗煮取一斗去滓取硝石四升芒硝亦可用朴硝十斤投汁中微火煎以柳木篦攪勿住手候欲凝入盆中內朱砂三兩麝香一兩急攪即成霜雪紫色以水和一二分服之以意加減一劑十年用之神效腳氣乳石天行熱病等服之若神千金翼有磁石三斤滑石一斤升麻一斤丁香用四兩朴硝用四升麝香用二分

仙人鍊絳雪療一切病肺氣積聚欬逆嘔吐服血丹石諸發天行時氣一切熱病諸黄疸等心風昏亂心怯健忘四肢煩熱頭痛眼赤大小便不通煩悶不安骨節疼痛赤白痢血痢熱毒痢宿食不消化心腹脹滿出氣不得下一切諸毒藥腳氣等飲酒多醉困久痢不差孩子驚癇等以上和水服之產後一切諸病蘇枋和酒服之方

朴硝十斤　升麻三兩　大青　桑白皮

槐花各二兩　犀角屑　羚羊角屑各一兩　蘇方木六兩

竹葉兩半　訶黎勒　山梔子三十枚　檳榔人二十顆

朱砂半大兩研

右十三味以水二斗漬一宿煎取一斗去滓入鐺內朴消煉絣攪勿住手候欲凝出於盆中攪入朱砂麝香訖

雪成收於密器中密封有疾量取之和水服之以利病除身輕目明四肢調適療一切病神驗老小量之上云入麝香未見分兩

近効腎瀝湯煮散主除風下氣彊腰腳明耳目除痰飲理榮衛永不染時氣諸風疾方

薯蕷　芎藭　茯苓　五味子

防風　澤瀉　獨活　玄參

人參　牛膝各六兩　麥門冬去心　地骨皮各八兩

桂心　甘草炙三兩　丹參五兩

右十五味切如大豆分作二十四貼每貼著生薑一兩切

杏人十四枚去尖碎以水三升煮一貼取一升去滓澄清服九合頓服每日一貼晚間以氣下心胃空妙十服以後身力不可當常須護惜將養之以飲食補之每年春夏秋冬服一劑勝服腎氣丸二十劑亦不患風氣然有諸病自然除差張中丞自服以來神效不可言以為孔石力不可比今服不闕效驗如方云腎瀝湯恐須用猪腎湯煎

古今諸家膏方四首

廣濟神明膏主諸風頑痺筋脉不利瘡癬諸疥痒方

前胡　白朮　白芷　芎藭各切

椒去目　吳茱萸各一升　附子三十枚去皮切　當歸

細辛　桂心各二兩切

右十味以苦酒漬一宿令浥浥然以成鍊猪膏一斗微火煎十沸以來九上九下候附子白芷色黃絞去滓膏成病在外摩之在內以酒服棗核大疥癬等瘡皆塗之並去諸風病亦摩折傷被打等崔氏云藥滓酒浸服之亦大療諸病

崔氏陳元膏會稽太守臣琳昧死再拜上書皇帝陛下臣幸得典郡視事六年處地下濕身病苦痺飲食衰少醫療不差命在旦暮蒼梧道士陳元賣藥於市臣取藥摩之日至再十五日平復臣男嘗墮馬苦腰痛天陰雨轉發臣取元膏摩之復愈臣妻年四十五苦心腹積聚得病三年臣復從元取膏摩之六日下宿食即愈臣從下郭少苦頭眩臣取膏摩三日鼻中下水二升所病即愈臣知元藥驗謹取元本方奉上

當歸三兩一方隴西者　生地黃二斤擣取汁

附子三兩　細辛二兩　桂心一兩　天雄三兩去皮

乾薑二兩　丹砂一兩研　芎藭二兩　雄黃二兩半研

烏頭三兩　苦酒三升　白芷一兩　松脂半斤

不中水猪脂十斤鍊去滓

右十五味㕮咀以地黃汁苦酒漬一宿取猪脂內諸藥微火煎之令十五沸膏成去滓內朱砂等末熟攪勿令

婦人雞犬孝子惡疾不具足人小兒等見有人若胸脅背痛服之七日所下狀如雞子汁者二升即愈又有人苦脅下積聚如杯摩藥十五日即愈又有人苦臍傍氣如手摩之去瓜中黃穢者升許即愈有人患腹切痛時引背痛數年以膏摩之下如蟲者三十枚即愈又有婦人若月經內塞無子數年膏摩少腹並服如杏子一枚十日下崩血二升即愈其年便有子又癖風搔癢起累累如大豆以膏摩之五日即愈老少患腳膝冷痛摩之五日便愈又有人苦頭項痛寒熱瘰癧摩頸及病上即愈又有人患面目黧黑消瘦是心腹中病服藥下如

臣按生乳一作牛乳然逆也每金物之不拄痰

酒糟者一升餘，卽愈內外諸風及腹中積聚可服之百病無不愈所療人無數不可悉記

又烏膏療一切瘡引膿生肌藥殺瘡中蟲方

烏麻油一升 黃丹上好者二兩羅之 蠟一兩鍊滓

薰陸香乳頭者一兩末 松脂半兩末以上並大升兩

右五味緩火煎油三分減一下蠟待冷乃內黃丹更上煎之又三分減一又停待冷次內薰陸香末上火煎候銷盡又內蠟及松脂看膏稍稠卽點於鐵上試看硬軟適中乃罷先問所患瘡如熱卽除薰陸及松脂瘡如久不差此涉於冷卽依方合其貼杖瘡者油若一升熟黃汁半合和煎黃丹二大兩蠟一小兩餘並上法此膏不須使也

近効蓮子草膏療一切風耳聾眼闇生髮變白堅齒延年本是婆羅門方

蓮子草汁三升 生巨勝油一升 生乳一升不食者 甘草一大兩末

右四味和於鍋中煎之緩火熬令魚眼沸數攪之勿住手看上沫盡清澄濾不津瓷器中貯之云本方有青蓮蘂六分龍腦花三分鬱金香二分並末先煎諸藥三分減一次下汁及油等膏成每欲點卽仰臥垂頭牀下一孔中各點如小豆許久乃起有唾唾卽勿咽之起訖卽啜少熱湯飲與經一年白髮盡黑禿處並出韓庶子處得効用驗

古今諸家煎方六首

廣濟阿魏藥煎方

阿魏四分 豆蔻人七顆細研 生薑十二分 人參八分

甘草八分炙 鼈甲十二分炙 藕汁二升 訶黎勒七枚去核

牛膝半斤 白蜜一升 地黃汁二升

右十一味下地黃等汁煎次下藥末微火煎攪勿住投似如餳於不津器盛每取一匙酒和服之

又鹿角膠煎療五勞七傷四肢沉重百事不任怯怯無力昏昏欲睡身無潤澤腰疼頑痺脚弱不便不能久立胸脅脹滿腹中雷鳴春夏手足煩熱秋冬腰膝冷疼心悸健忘

腎氣不理五藏風虛並悉療之方

鹿角膠一斤擣碎作西分於鐺中熬令色黃 紫蘇子二升以酒一升研濾取汁

生地黃一斤取汁 生薑一斤取汁 黃牛酥一升 白蜜三斤

右六味先煎地黃汁蘇子汁生薑汁等二十餘沸次下酥蜜又煎三五沸次以蜜並膠末下之攪令相得膠消盡煎卽成矣以器盛之空腹以酒調二合服之日再此藥補五藏益心力實骨髓生肌肉理風補虛耳聰目明腰脚甚效驗一兩劑顯健彼覽十倍常時忌羊血蕪荑

又主冷氣益氣力溫中下氣蒜煎方

剝了蒜二升 牛乳五升 牛膝一大斤末

右三味以蒜內牛乳中煎之候蒜消盡攪勿住手下牛膝末煎成於器中貯之食前以酒和兩匙服忌羊血

又地黃煎主婦人丈夫血氣勞骨熱日漸瘦悴方

生地黃汁二升 甘草三兩炙末 豉心一升 葱白切一升

牛酥半斤 藕汁二升 白蜜二升

右七味以小便六升煮葱豉等取二升綾去滓次下地黃藕汁更煎取三五沸下酥蜜攪勿住手候似稀餳以器貯之每服一匙漸至三匙成煎柔枝熱煎湯調和服

之尤妙桃人湯亦良

小品單地黃煎主補虛除熱散乳石癰疽瘡癤等熱方

生地黃隨多少取汁於銅鉢中重湯上煮勿蓋釜令氣得泄煎去半更以新布濾絞去麤滓穢又煎令如餳成矣此用地黃須肥大味濃者作煎甘美東南地黃堅細味薄作煎鹹不美

近効地黃煎療肺氣欬嗽補心肺令髭髮不白方

生地黃汁二升 麥門冬汁五升 生薑汁五合 紫菀三兩

貝母 欵冬花 甘草炙各三兩

右七味切以水七升煮取三大升去滓却入鍋中下地黃汁麥門冬薑汁等三十沸下蜜一升煎如餳成矣盛不津器中冷含如棗許增加量之一方有人參三兩

古今諸家酒一十二首並代茶飲列於下

千金天門冬酒療五藏六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥結滯氣冷熱諸風癎惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮白重黑方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利

右一味擣取汁一斗漬麴二升以糯米二斗候麴發準家醞法釀之春夏極冷下飯秋冬稍溫如人肌下飯酒熟取清飲一盞常令酒氣相接勿至醉吐慎生冷酢滑

雞猪魚蒜特忌鯉魚亦忌油膩此是一斗法餘一石二石亦準此以爲大率服藥酒十日覺身體隱瘮大痒二十日更大痒三十日乃漸止此是風氣出去故也四十日卽覺身心朗然大快似有所得五十日更覺大快當風坐臥覺風不著人身中諸風悉盡用米法先淨淘暴炕令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾曬炒餘汁拌飯甚宜密封取天門冬汁法淨洗心皮水寸切擣押各三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之久停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八九月卽少少合至十月多合擬到來年五月

三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合
服酒若得散服得力倍速散方如左
天門冬去心及皮暴乾擣篩以上件酒服方寸匕日三
加至三七久服長生凡酒亦得服
又大金牙酒療瘴癘毒氣中人風冷濕痹口喎面戾半身
不遂手足拘攣歷節腫痛甚者少腹不仁名曰脚氣無所
不療方
金牙一斤燒　白朮　附子　側子
天雄　蓯蓉　茯神　當歸
防風　芎藭　黃耆　薯蕷

細辛　桂心　茵芋　地骨皮
五加皮　杜仲　萆薢　狗脊
萎蕤　白芷　厚朴　枳實炙
桔梗　黃芩　遠志去心　蔓荊子各三兩
人參二兩　獨活半斤　石南二兩　磁石十兩燒
用參　牛膝各五兩　薏苡人一升　麥門冬一升去心
生石斛八兩　生地黃切二升　蒴藋四兩
右三十九味並切用絹袋盛以酒八斗漬七日溫服一
合日四五夜一石藥細研如粉別絹袋盛共藥同浸藥
力安和主治極多凡是風虛四體小覺有風痾者皆須
將服無不治者服者一依方合之不得輒信證人大言
減有加減忌如常法
又鍾乳酒療虛損通順血脈極補益下氣方
鍾乳五兩碎　附子二兩炮　石斛五兩　甘菊花三兩
蓯蓉五兩
右五味剉以生絹袋盛用酒三斗漬經五日每服二合
日再稍加至一升
千金翼五精酒主萬病髮白反黑齒落更生方
黃精四斤　天門冬五斤去心　松葉六斤　白朮四斤
枸杞五斤洗

右五味皆生者內釜中以水三石煮之一日去滓取汁
漬麴如家醞法酒熟取清任性飲之長年補養忌鯉魚桃李雀
肉等
又白朮酒方
白朮二十五斤
右一味㕮咀以東流水兩石五斗於不津器中漬之二
十日去滓內汁於大盆中夜候流星過時抄巳姓名置
盆中如是五夜汁當變如血取以漬麴如家醞法造酒
熟取清任性飲之十日萬病除百日白髮反黑齒落更
生面有光澤久服長年忌桃李雀肉[illegible]

風痹服之百神衛人

又枸杞酒方

枸杞一百斤

右一味切以東流水四石煮之一日一夜去滓令得一石汁漬麴釀之如家醞法酒熟取清置不津器中取乾地黃桂心乾薑商陸澤瀉蜀椒末各一升六味以絹袋盛內酒中實密封口埋入地三尺堅築覆土二十日沐浴整衣冠向仙人拜訖開之其酒當赤如金色平旦空腹服一盞或半升為度十日萬病皆愈二十日瘢痕皆滅惡疾人以一升水和半升酒分為五服服之即愈若

飲食少者取河中青白石如棗杏人大者半升以水三升煮一沸以酒半合置中須臾即熱可食也

崔氏菝耳酒療大風惡疾及一切諸風乃至骨髓中毒風令人充悅方

菝耳和莖葉花實取剉一斗八月收　牛膝根一斗　秋麻子二斗

商陸根二升白色者　鼠粘根一斗

右五物皆剉訖量之以水兩石五斗煮取六斗汁和釜小可分煮之即分三斗汁將浸麴一斗二升商量其麴加於常法五分為藥力費麴故也餘三斗汁留將拌饙米當合一石二斗分作五酘淨淘乾漉以上並大斗第一酘一日炊四斗米取藥汁九升拌饙熟細切生地黃三斗和米下之第二酘三日炊三斗米取藥汁七升拌饙熟與杏人一斗去皮尖碎和擣如泥下之第三酘五日炊二斗米取藥汁六升半拌饙熟取木麻子一斗擣碎和下之第四酘七日炊二斗米取藥汁四升半拌饙熟取胡麻一斗擣碎和下之第五酘九日炊一斗米取藥汁三升拌饙下之

右以前五酘法須候米消盡即炊酘之未必要須隔日其酒如米少味薄更炊一二斗米下之使味足然後去糟取清依常法飲半升不能者可量性多少常使有酒

氣通夜飲最是所宜此酒縱非風疾飲之補養益精神令人充健

又烏麻地黃酒療風虛補不足除百病巳試大効方

六月六日麴四升搗　王斯油麻六斗五升出充州赤色者是如無別用巨勝會之以甑去皮乾暴雁烏麻法以冷水浸經一宿出之置布袋中流水冷盡春之即皮自脫去耳

生地黃四斗冷熟湯洗一待水氣盡一便切之更取生地黃一石以水一石細擣布絞去滓即取汁六斗又以甑及麻子瓮內蒸之令乾前三味總內瓮中浸之

丹參　生石斛　牛膝　杜仲

萆薢　生薑各二斤　人參八兩

右七味切以生絹袋盛同內前件熟地黃汁瓮中浸封

用七日外更取烏豆四大斗摩使光淨分作四度微熬
令香取無灰重醖酒二斗八升三度淋豆豆一熬三淋
淋訖並去豆總計十二度淋豆取淋酒別器中盛然後
更寫麴汁等物及諸藥並出在大瓮中以物閉頭及更
將此酒先重蒸瓮看冷暖還内麴汁及藥等安在瓮中
其日即用八斗糯糯米炊作飯加常醸酒法醸酒即以
淋豆酒投在瓮中訖閉經一兩宿看米消盡又炊四斗
糯米飯醸之此後更封閉經七日其酒即熟任性飲多
少量之不限時候常微微覺身潤夜中稍加火許或汗
出佳避風及忌房室特禁毛桃芥生菜熱麪並酢蒜牛

肉令物醞和酒法待此酒熟即將此酒更重醖
右麴依當家常用法每一斗麴用熟水一斗一升浸炊
酒飯即量熟湯多少用沾飯如凡醸酒法更不得加生
水每一斗米酒為佳醸重醖酒法待此酒熟即將酒二
斗入升淋豆
右每一斗麴以熟水一斗浸其酒米每一斗饙料以四
斗清酒淋其饙然後炊飯使熟更不得加水其所洗饙
洗手盆瓮等皆須用此酒遝投醸瓮中醸藥酒法右欲
封藥酒時先量五斗許藥在瓮底然後加五斗許飯每
次如此斟酌至半即内藥袋其藥袋上亦使藥飯相和

以至於盡然始閉封
封閉藥酒瓮法
右封閉瓮頭用紙七重布一重其醸酒室唯造酒得入
自外猫犬婦人不得輒入室中
又枸杞酒療五内邪氣消渴風濕下胷脅氣頭風本方作痛堅
筋骨强陰利大小便填骨髓長肌肉破除結氣五勞七傷
去胃中宿食利耳目衄血吐血風疰補中逐水破積瘀膿
血石淋長髮傷寒瘴癘毒氣煩燥滿悶虛勞喘吸逐熱破
血及脚氣腫痺悉主之方
糯米一石黍米亦得 麴計常醸酒米一石用麴一斗此黍加五升彌佳未用之
枸杞根二十斤剉去赤皮半寸剉之以水一石漬經三日煮取汁五斗
生地黃二十斤洗去土細切和米炊之 秋麻子三斗微熬以枸杞湯淋取汁
香豉二斗以枸杞湯煮取汁

右四味地黃和米蒸之三物藥汁總合得五斗地黃漬
即四斗分半漬米饙半及麴和醸飯即總和一醱密蓋
瓮口經二七日壓取封泥復經七日初一度一醸用麻
子二斗多即恐令人頭痛服酒忌生冷酢滑雞魚麪蒜
油膩白酒房室等服訖一二七日將息
又地黃酒療虛羸令人充悅益氣力輕身明目方雍州高長史盟
用効

生地黃一石二斗搗絞取汁四斗 杏人一斗去尖皮兩人者熬令黃搗末
大麻子一斗熬搗末 糯米一石暴乾
麴一斗五升淨刮暴乾細剉
右五味先以地黃汁四斗漬麴待發炊米二斗作飯冷暖如人肌投麴汁中和之候飯消更炊米一斗投之如前法又取杏人麻子末各一升二合半和飯攪之投麴汁中待飯消還炊米一斗杏人麻子末各一升二合半一依前法投之如此凡入投訖待酒沸定封泥二七日取清溫服一升漸加至二升日再服之令人頓能食久服去萬病婦人服之更佳令人有子

近効五加酒方
五加根莖細剉五斗 六月六日麴末三斗
黍米一石糯米亦得
右二味以水五斗共五加同下於大釜中以木蓋深淺與水平勉之即更添水一石五斗蓋面訖兩石即下火煎旋旋急火取藥汁減下至木蓋處即得以大盆安淨筐筐中安淨布單漉滓漉者筐中其汁在盆中唯有五斗且別盛密封蓋之又重取所漉者五加滓以水煮之如別有五加添和同煮更佳取此汁用浸米拌飯炊之如常炊法用前五加濃汁漬麴日炊米五斗釀之餘五斗分為兩投如常造酒法酒熟壓漉密封頭每服一盞煖飲之漸加勿令醉又遠志十兩末之下釀中益妙玄參及蛇皮內亦得其糟與已下食之尤佳

又代茶新飲方
黃耆 通草各二斤 茯苓 乾薑
乾葛各一斤 桑根白皮一斤 鼠粘根三斤濕加一斤
生乾地黃 枸杞根洗 忍冬十二月採枝莖葉陰乾濕加五兩
薏苡人各十兩 菝葜八兩 麥門冬去心 萎蕤各五兩
右十四味並揀擇取州土堅實上者刮削如法然後秤大斤兩各各別搗以馬尾羅篩之攪令勻調重篩務令

相入不令偏並別取黃白楮皮白皮根相兼細切煮取濃汁和溲令硬軟得所更於臼中搗別作一竹棬子圍闊二寸半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此亦無定象手依摸捻成餅子中心穿孔日暴乾百餘餅為一穿即以葛蔓為繩貫之竹作篾亦得挂之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙令香熟勿令焦臼中搗末任隨時取足煎以代茶大都濃薄量之著少鹽煮之頻揚之即滑美著鹽橘皮蓽撥亦佳除風破氣理丹石補腰腳聰耳明目堅肌長肉緩筋骨通腠理頭腦開悶眼睛疼痛心虛腳弱不能行步其效不可言若患腳氣脇氣

以按此門卅方七十八首

痼氣欬嗽入口即愈思消中消渴尤驗主療既多又衆

一一具說但服之立取其驗禪居高上特宜多飲暢腑

藏調適血脉少服益多心力無勞饑飽飲之甚良若臘

月臘日合之十年不敗

解飲食相害成病百件

朋後凡飲食雜味有相害相伐則成病以此

致疾例皆難療所以病有不受藥療於死也今略疏

其不可啖物不須各題病名想知者善加慎之諸鳥獸陸

地肉物忌法

白犬白肾肝不可雜白雞肝白鵝肝 白羊肉不可雜雞肉 大肝不可雜烏狗死肉 猪

肉不可合烏入不可合食 一 兎肉不可雜獺肉及白雞心食 白馬黑頭者不可食 麞肉

又不可合生菜食 腸 不可合犬肉 白 白猪白蹄青爪斑者不可食 雉肉不可合

食不可合 鹿 白 馬 不可合食 猪 肉 雉 雞

食自不可合 雞 雞肉不可合 雀 肉 不可合李 雉 雞

鴨 子 不可合李 雀肉 不可合 地 暴 脯

雞 雞子不可合鼈肉 山 雞 肉 不可食 烏 獸 不可合

可 鳥 獸 不可燒食死病人肉 不可食 山 羊 肉 半 夏

食 菖蒲 羊肉 雞 子 鯉魚不合 巴 豆 忌蘆筍猪肉 商 陸 忌大肉 細 辛 桔 梗 忌米

白 术 忌桃李 甘 草 忌菘菜 牡 丹 忌胡 常 山 忌葱 茯 苓 忌醋 天 門 冬 忌鯉

魚 黃 連 桔 梗 忌猪肉 黎 蘆 忌狸肉 凡 兩 食 之 致 病 也 蜂 蠔 蟻 集 食 上 食之 致 瘻

菜及酒不見影香不可飲之 丙午日勿食雉肉 壬子日勿食猪五臟及黑獸肉等 甲子日勿食龜鼈鱗物水族之類

又療卒得食病似傷寒其人但欲卧七日不療殺人

按其脊兩邊當有陷處正灸陷處兩頭各七壯則愈

又療中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦四肢尫弱百病因

此而生方

麴白一斤 枳實三兩 大棗十二枚擘 粳米二合

豉七合

右五味以水七升煮麴餘五升內諸藥煮取一升半分

三服差止

又方

豉心一升熬 麥蘖 麴各一兩熬 蜀椒一升汗

乾薑一升末

右五味擣篩以蜜拌食後酒服之方寸匕

又方

麴一斤熬 麥蘖五升熬 杏人一升去尖皮熬

右三味擣篩蜜和末食後服如彈丸一枚漸增之

又方

大黃 芍藥 芒消各一斤

右三味末之以蜜三斤於銅器中湯上煎可丸服如梧

子十九日再服

又方

麴一斤熬　吳茱萸一升　乾薑十兩

右三味擣爲末服方寸匕

又療脾胃氣弱穀不消兼不復受食方

大麻人三升　大豆黃二升並熬香

右二味擣篩以飲服一方寸匕漸加服

又療飽食訖便卧得病令人四肢煩重嘿嘿欲卧方

大麥糵一升熬　乾薑二兩

右二味擣爲末服方寸匕日三良

又療食生冷雜物或寒冷衣薄當風夜食便卧不消心腹飽滿痛脹急或連日不化方

燒地令極熱即敷薄覆取汗愈

深師療食飽煩悶但欲卧而腹痛方

麴熬令香黃

右一味擣爲末服方寸匕大麥糵亦佳

千金翼凡六畜五藏著草自動搖及得鹹醋不變色及又隨地不汙又與犬犬不食皆有毒殺人也食飲有毒燒地地熱凡肉在器中蓋密氣凡脯肉熟肉不露起皆殺人凡不泄者皆殺人凡深藏密氣不泄食人若中此毒者皆大糞灰水服方寸匕良

古今錄驗療新中雜食瘀實不消心腹堅痛方

取水三升煮白鹽一升令消分服取吐必差

備急席辯刺史云嶺南俚人毒藥皆因食得之多不即覺漸不能食或更心中嘈脹並背急悶先寒似瘴微覺即急取一片白銀含一宿銀變色即是藥也銀色青是藍藥銀色黃赤是菌藥久久毒入眼眼或青或黃赤若青是藍藥若黃赤是菌藥俚人有解療者畏人得法在外預合或言三百頭牛藥或言三百兩銀藥余住久與首領親狎知其藥並是常用俚人不識本草乃妄言之其方如後

初得俚人毒藥未得餘藥且令定方

生薑四兩　甘草三兩炙

右二味以水六升煮取二升平旦分二服訖後別方療之

又療之方

常山四兩　白鹽二七

右二味以水一斗漬之一宿以月盡日漬之月一日五更以土釜煎勿令奴婢雞犬見之煮取二升平旦分再服服訖少時即吐以銅盆盛之看若色青以杖舉得五尺不斷者即藥未盡一二日後更進一劑

又方

都淋藤十二兩此藥嶺南有土人識俚人呼爲三百兩銀藥其細長有高三尺微藤生切

右一味以水一升酒二升和煮取二升分三服服訖頭
毒逐大小便出十日慎毒食不差更服以差爲度肘後云葛
藤
又療腹內諸毒方
都惏藤　黄藤各二虎口長三寸並細剉
右二味以酒三升合甖中密封以糖火圍四邊燒令三
沸待冷出之溫常服令有酒色無禁忌若不獲已欲食
俚人食者先取甘草一寸炙令熟嚼咽汁若食著毒藥
即吐便是藥也依前法療之若經含甘草而不吐非也
宜常收甘草十數片隨身帶之自防也嶺南將毒食來

及生食甘蔗巴蕉之屬自更於火上炮炙燒食之不無
慮也若被席上散藥卧著因汗入肉最難主療可常自
將淨席隨身及匙筯甘草解毒藥行甚妙肘後無黄藤
張文仲白黍不可合飴糖蜜共食黍米不可合葵共食白蜜不可合棗食菰首不
合生菜食病人不可食胡荽芹菜及青花黄花菜姙身勿食桑椹并鴨子五月勿食十
月椒勿食二月三日四月八日勿食百草二月勿食小蒜四月勿食胡荽
仲景方云正月勿食生葱二月勿食蓼三月勿食小蒜四月八月勿食蒜五月勿食韭五月五日勿食生菜七月勿食
食茱萸八月九月勿食騏馬肉不可食馬黑脊而食蕎十月勿食椒勿食涯殺人也不飮馬不下肉可食
皆亦勿食
食馬肝中毒方

取牡鼠矢二七枚兩頭尖者是水和研飲之仲景同
又食諸六畜鳥獸肝中毒方
取髮剪之長半寸接土作泥沾二升合和所剉髮飲
之須臾髮皆貫所食肝出也謹按髮誤食之令人成
髮瘕爲病不可療今和髮土飲之豈得有此理否可
詳審之別有方法也
又方
服頭垢一錢匕立差仲景千金同
又方
清水投豉絞取汁飲數升差止

又凡物肝藏自不可輕啖自死者彌勿食之
凡心皆勿食之爲神識所舍使人來生獲報對又食生肝
中毒方
服附子末方寸匕日三須以生薑湯服之不然自生
其毒
又食獸有中毒箭死者其肉有毒可以藍汁大豆解射罔
也
又食鬱肉及漏脯中毒方
取犬矢燒末以酒服方寸匕
又方

謹按本草無甘豆湯解毒方中有甘草大豆湯或是也

謹按自服頭垢至此皆本仲景方也

擣生韭絞取汁服一二升冬月連根取和水洗絞之
用薤亦佳凡肉閉在密器中經宿者爲鬱肉茅屋漏
下沾脯爲漏脯並有大毒
又食黍米中藏乾脯中毒方
濃煮大豆汁飲數升即解兼療諸肉及漏脯毒
又食自死六畜諸肉中毒方
擣黄蘗末以水和方寸匕服未覺再服差
又凡六畜自死皆是遭疫則有毒人有食疫死牛肉令病
洞下亦致堅積者並宜以利藥下之良
又食諸菜肉脯中毒方

燒猪骨擣下篩水服方寸匕日三四差千金同
又方
燒笠子末服方寸匕日三
又食馬肉洞下欲死者方
豉二百粒 杏人二十枚
右二味合於炊飯中蒸之擣丸服之至差仲景同
又甘豆湯冷飲之諸毒悉解諸不可及也
辨魚鼈蟹毒不可食及不得共食
肘後云凡魚頭有正白連珠至脊上不可食也 魚無腸膽不可食 魚頭黑點不可食 魚頭似有角不可食 魚無鰓不可食 鯷魚赤目鬚不可食 魚不可合烏雞肉食 生魚目赤不可作膾
可食

食魚不可合鸕鷀肉食 鯷魚不可合鹿肉食之 鯽魚不可合猴雉肉食 青魚不可合猪肝
合小豆藿食 小豆魚汁不可合六畜肉食 自死青魚鮓不可合生葵麥醬食 胡荽及鯉魚鮓
不可合小豆藿食 鰕不可合雞肉食 鰕無鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食 鯉魚不可合白犬肉食
鯉魚鮓不可合小豆藿食 鼈目凹陷及厭下有如王字不可食之 鼈肉不可合雞鴨子食之
肉不可合莧菜食之 不可合鷄子共煮之 亦 龜鼈肉不可合瓜及飲酒 蟹目相向及足斑目赤者不可食
病人不可食鯷魚鮑魚等 妊身不可食鱓及魚鱠 鼈 桂天門冬 忌鯉魚
又療食蟹及諸肴膳中毒方
濃煮香蘇飲汁一升解本仲景方
又人有食蟹中毒煩亂欲死服五蠱黄丸得吐下皆差夫
蟹未被霜多毒熟煮乃可食之或云是水茛所爲彭蜞亦
有毒蔡謨食之幾死
又療食諸鱠百物毒方
取貝齒一枚含之須臾吐所食物差千金同

又方
擣韭汁服一升冬以水煮根服千金云服數升
又方
掘厠傍地作坎深一尺以水滿坎中取故厠籌十四
枚燒令燃以投坎中乃取汁飲四五升即愈千金同
又諸饌食直爾何容有毒皆是以毒投之耳既不知是何
處毒便應煎甘草薺苨湯療之漢質帝食餅魏任城王噉

通按鮭鯢鮨二音郎故言也今今并名

觀按此方中吳有枝皮一兩

通按諸食魚中毒方及此方皆中忠大方此類諸數用多本仲景方

夷皆致死即其事也

食魚中毒及食鱠不消方五首

古今錄驗療食鯸鮧傷毒欲死方

取鮫魚皮燒之無皮壞刀裝取燒飲服之鮫魚皮也

食諸鮑魚中毒亦用之千金同

千金療食魚中毒方

煮橘皮停冷飲之

又療食魚鱠及生肉住胸膈中不化吐不出便成癥瘕方

厚朴炙　大黃各二兩

右二味以酒二升煮取一升頓服立消人强者倍大黃

用三兩酒取二升再服

肘後療食鱠過多冷不消不療必成蟲瘕方

馬鞭草擣絞取汁飲一升即消去亦宜服諸吐藥吐

之千金同

删繁療食魚鱠不消生瘕常欲須鱠者方

獺骨肝肺　乾藍　大黃各分　蘆根

鶴骨各七分　桔梗五分　乾薑四分　桂心

斑猫二十枚炙

右九味擣篩蜜丸酒服十丸至十五丸日再差

食椒菜瓠中毒方四首

肘後蜀椒閉口者有毒食之戟人咽使不得出氣便欲絕

又令人吐白沫并吐下身體冷痺療方

煮桂飲汁多益佳又飲冷水一二升又多食蒜又上

漿飲一升又濃煮豉汁冷飲之一二升又急飲酢又

食椒不可飲熱飲熱殺人

又療中苦瓠毒方

煮黍穰濃汁飲之數升此物苦則不可食恐作藥中

毒也

千金療菌毒方

掘地作坎以水沃中攪至濁名地漿飲之

又療食菜中毒發狂煩悶吐下欲死方

取雞毛燒末以飲服方寸匕差

解一切食中毒方三首

千金論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中其毒

素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久設其法以

救活之正爲貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心絕

不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意

焉

又論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中

烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中

通按黃龍湯即小柴胡湯也

通按此方仲景用苦參煮服

野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒臣試之大懸絕不及甘草又能加之爲甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸吐嘔不已以百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此即成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

又療諸食中毒方

飲黃龍湯及犀角汁白無不治也若飲馬尿亦良

又療食飲中毒方

苦參三兩

右一味切以酒二升半煮取一升頓服之取愈

古今錄驗療諸食毒方

取桑黃心破作一斷著釜中令水出三寸煮取二升漉澄清微火煎得五升宿不食服之日三合則吐瘀未差更作服者減之

酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首

千金療卒大醉恐腸爛方

作湯著大器中漬之冷復易之酒自消夏月亦用之佳 肘後同

又方

取茅根汁飲二升

又療連月飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻子一升　黃芩二兩

右二味擣末以蜜和丸含之

飲酒連日醉不醒方九首

肘後療飲酒連日醉不醒方

蕪菁菜並少米熟煮去滓冷之內雞子三枚或七枚調勻飲之二三升無雞子亦可單飲之

又方

取水中螺蚌若螺蚌輩以著葱豉椒薑煮如常食法

飲汁數升即解

又方

擣生葛根汁及葛蔓絞和絞汁飲之無濕者乾葛煎服佳乾蒲煎服之亦佳

又方

粳米一升水五升煮使極爛漉去滓飲之尤良

千金療酒醉不醒方

葛根汁飲一二升無多少取醒止

又方 本方治飲酒不醉

九月九日菊花末飲服方寸匕

又方

小豆葉陰乾一百日末服之日方寸匕良

又方

五月五日取井中倒生草陰乾末酒服方寸七佳

又病酒方

取豉葱各一升以水四升煮取二升飲之差止

飲酒令難醉方一首

千金飲酒令無酒氣方

乾蕪菁根二七枚三遍蒸乾末之取兩錢七飲酒後水服之

飲酒積熱方二首

肘後飲酒積熱遂發黃病方

雞子七枚苦酒漬之器中密封內井底一宿出當歎取呑之二三枚漸至盡驗

千金治飲酒房勞虛受熱積日不食四體中虛熱飲酒不已入百脉心氣虛令人錯謬失常方

酸棗人半升 人參 白薇 枳實炙

知母 栝樓 芍藥各二兩 茯苓三兩一云茯神

甘草一兩炙 生地黃八兩

右十味切以水一斗煮取三升分三服

斷酒方一十五首

千金斷酒方

酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安豬圈中任豬豕動經七日取盡飲之永斷

又方

臘月鼠頭灰柳花等分黃昏時酒服一杯

又方

正月一日酒五升淋碓頭擣一下取飲

又方

故毡中菜耳子七枚燒作灰黃昏時爰取一杯酒呪言與病狂人飲勿令知之後不喜飲酒

又方

白豬乳汁一升飲之永不用酒

又方

刮馬汗和酒與飲之終身不飲酒

又方

大蟲屎中骨燒末和酒與飲

又方

鸕鷀矢灰水服方寸匕永斷

又方

謹按騐駒衣疑是驢胞衣

故紡車絃燒灰和酒與飲之

又方

驢駒衣燒灰酒服之

又方

自死蠐螬乾擣末和酒與飲永世閑酒名即嘔吐神驗

又方

酒客吐中肉七枚陰乾燒灰服之

又方

酒漬汗鞋替一宿旦空腹與飲即吐不喜見酒

又方

白狗乳汁酒服之

又方

臘月馬腦酒服之

服藥過劑及中毒方一十一首

前後服藥過劑及中毒多煩悶欲死方

刮東壁土少少以水一二升和飲之良

又方

水和胡粉稍稍飲之

又方

青粳米取其瀋汁五升飲之

又方

擣蘘荷取汁飲一二升冬月用根夏月用莖葉

又方

屋霤下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中攪揚之令沫出取沫一升飲之未解更作

又方

擣藍青絞汁數升飲之無藍以青布水洗飲之

又方

燒犀角水服一方寸匕

備急服藥失度腹中苦煩方

飲生葛汁良或乾葛煎湯服之　肘後同

又方

雞子黃三枚吞之良又雞子清飲之又服豬膏良

又方

服諸石藥過劑者白鴨矢水和服之差　肘後同

又方

大黃三兩芒硝二兩以水五升煮取三升分三服得下便愈　肘後用地黃汁五升煮不用水

解諸藥草中毒方二十九首

肘後療食野葛已死者方
以物開口取雞子三枚和以灌之須臾吐野葛出
又方
取生鴨就口斷鴨頭以血瀝口中入咽則活若口不開取大竹筒以一頭注其胸脅取冷水注筒中數易注之須臾口開則可與藥若甚者兩脅及臍各筒注之甚佳
又方
飲甘草汁佳唯多更善
又鉤吻與食芹相似而其所生之地傍無他草莖有毛誤

食之殺人方
薺苨八兩㕮咀以水六升煮取三升服之
又此多生籬埒水瀆邊絕似茶人識之無敢食但不知之必是鉤吻按本草鉤吻一名野葛又云秦鉤吻乃並入藥用非此又一種葉似黃精唯花黃莖紫亦呼爲鉤吻不可食故經方引與黃精爲比言其形色相似也
備急療諸藥各各有相解者然難常儲今但取一種而兼解衆毒求之易得者方
甘草濃煮汁多飲之無不生也又食少蜜佳
又方

謹按脩雜注是以毒解係也

煮桂多飲之又服葱涕佳
又方
煮大豆汁服豉亦解
又方
煮薺苨濃汁飲之秘方卒不及煮便嚼食之亦可散服此藥在諸藥中並解衆毒
又方
藍青皮子亦通解諸毒可預畜之急則便用之
凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲之待冷則解毒熱則不解毒也

集驗療中諸毒藥及葛未死但悶腹中煩寃刺裂作聲如腸胃被斲狀目視一人成兩人或五色光起須臾不救方
取新小便和清潔久尿一升絞取汁一升頓服氣已絕但絞口與之入腹便活也已死萬一冀活但數與尿汁也
又療中藥毒方
取竈中當釜月下土末服方寸匕
千金中百藥毒方
甘草薺苨大小豆汁藍汁及實汁根汁並解之
又中狼毒毒方

白歛鹽藍汁並解之
又中蔾蘆毒方
雄黃葱汁並解之
又中巴豆毒方
黃連菖蒲小豆藿汁大豆汁並解之
又中躑躅花毒方
梔子汁解之
又中芫花毒方
防風防已甘草桂枝汁並解之
又中射罔毒方

藍汁大小豆汁竹瀝大麻子汁六畜血貝齒屑蚯蚓
屎藕芰汁並解之
又中半夏毒方
以生薑汁乾薑解之
又中大戟毒方
菖蒲汁解之
又中烏頭天雄附子毒方
用大豆汁遠志防風棗飴糖解之
又中杏人毒方
用藍子汁解之

又中莨菪毒方
薺苨甘草升麻犀角蟹汁並解之
又解諸毒雞腸草散方
雞腸草三分 藍子一合 芍藥二分 甘草四分炙
薺苨四分 墳土一分 升麻四分 當歸二分
右八味爲散以水服方寸匕多飲水佳若爲蜂蛇等衆
毒蟲螫以鍼刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕
差爲射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏沾
水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出
即差若服毒藥水服毒解痛止愈

又解一切藥發不問草石始覺惡即服方
生麥門冬八兩去心 葱白八兩切 豉三升
右三味以水七升煮取三升半分三服
又療一切諸藥毒方
甘草三兩炙以水五升煮取二升內粉一合更煎三
兩沸內蜜半兩分服以定止
又解毒藥散方
薺苨一分 藍葉花二分七月七日取葉並花陰乾
右二味擣末以水和服方寸匕日三
又中毒方

取秦鶏毛二枚燒灰以水服之

千金翼療藥毒不止解煩悶方

甘草切二兩炙　白粱粉一升　蜜四兩

右三味以水三升煮甘草取二升去滓內粉湯中攪令

調下蜜煎令熟如薄粥適寒溫飲一升千金同

解諸蛇蟲毒方六首

千金蛇虺百蟲毒方

並用雄黃巴豆並麝香乾薑解之

又蜈蚣毒方

桑汁及葉根汁解之

又蜘蛛毒方

藍青解之

又蜂毒方

蜂房及藍青解之

又斑猫芫青毒方

猪膏大豆汁戎鹽藍汁鹽湯煮猪膏巴豆並解之

又馬刀毒方

清水解之

辨五大毒一首

古今錄驗辨藥有五大毒不可入口方經曰夫藥有大毒

驗一作 鴆

不可入口鼻耳目即殺人一曰鈎吻生崖二曰鴆状黑雄

雞生山谷中一名雉三曰陰命赤色著木懸其子生山海

中四曰海薑狀如龍赤色生海中五曰鴆羽狀如鸛雀黑

頭赤足遇其毒解之則活卒無藥可飲小便

解金鐵等毒方八首

肘後療金毒已死方

雞矢半升淋取一升飲之可再三千金云雞子清並屎白燒猪脂和服

又方

吞水銀一兩即金出

又方

鴨血雞子並解之千金云及屎汁

又中雄黃毒方

防己解之

又礜石毒方

大豆汁解之千金又云白鵝膏

集驗療服金屑死未絕者知是金毒方

以水銀一兩寫口中搖動令下咽喉入腹金則消滅

成泥即出可三與服則活

千金解金銀銅鐵毒方

取鴨屎汁解之

又鐵毒方

磁石解之

惡毒瘴氣毒風腫毒方四首

千金療惡氣瘴毒百毒方

用犀角羚羊角雄黃麝香解之

又主喉腫邪氣惡毒入腹方

升麻射干並解之

又主咽腫毒方

用五香紫檀解之

又甘草湯主天下毒氣及山水露霧毒氣去地風氣瘴癘等毒方

甘草三兩

右一味以水二升煮取一升分服

右迪功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張　寔校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十一卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十二卷目錄 面部面脂藥頭膏髮鬢衣香澡豆等三十四門

面膏面脂兼療面病方一十三首 内一方有缺
洗面藥方二首
面色光悅方五首
令面色白方四首
面皯方一十三首
面皯䵟方二十一首
面皯皰方一十五首
面皶皰方一十三首
面粉滓方四首
化面方二首
雜療面方六首
頭風白屑方四首
沐頭去風方五首
頭風白屑兼生髮方八首
生頭髮膏方一十一首
生眉毛方二首
令髮黑方八首
拔白髮良日并方三首
變白髮染髮方五首

髮黃方三首
䰅髮禿落方一十九首
白禿方一十二首
赤禿方三首
令髮不生方三首
鬼舐頭方二首
澡豆方八首
手膏方三首
口脂方三首
燒甲煎法六首
造燕脂法一首
造水銀霜法二首
鹿角桃花粉方二首
熏衣濕香方五首
裛衣乾香方五首

[illegible]

唐王燾先生外臺秘要方第三十二卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等　上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

面膏面脂兼療面病方二十三首

千金翼論曰面脂手膏衣香澡豆士人貴勝皆是所要然今之醫門極為秘惜不許子弟洩漏一法至於父子之間亦不傳示然聖人立法欲使家家悉解人人自知豈使愚於天下令至道不行壅蔽聖人之意甚可怪也

又面脂方主面及皴皺黶鼾凡是面上之病皆悉主之

丁香十二分　零陵香　桃人去皮　土瓜根
白歛　白及　防風　當歸
沉香　辛夷　商陸　麝香研
梔子花　芎藭各十二分　蜀水花　青木香各八分
白芷　葳蕤　菟絲子　藿香
甘松香各十五分　木蘭皮　白殭蠶　藁本各十分
茯苓十八分　冬瓜人十六分　鵝脂　羊髓各一升半
羊腎脂一升　猪胰六具　清酒五升　生猪肪脂三大升

右三十二味援生猪胰汁漬藥一宿於脂中煎三上三下以白芷色黃去滓以上件酒五升援猪胰以炭火微

臣按天門冬一本作天花粉橘人作橘皮

微煎膏成貯器中以塗面

又面膏方

杜蘅　杜若　防風　藁本

細辛　白附子　木蘭皮　當歸

白朮　獨活　白茯苓　萎蕤

白芷　天門冬　玉屑各一兩　菟絲子

防巳　商陸　梔子花　橘人

冬瓜人　蘼蕪花各三兩　藿香　丁香

零陵香　甘松香　青木香各二兩　麝香半兩

白鵝脂半升如無以　白羊脂　牛髓各一升　羊胰三具

右三十二味先以水浸膏髓等五日日別再易水又五日日別一易水又五日二日一易水凡二十日止以酒一升挼羊胰令消盡去脉乃細切香於瓷器中浸之密封一宿曉以諸脂等合煎三上三下以酒水氣盡爲候即以綿布絞去滓研之千遍待凝乃止使白如雪每夜塗面晝則洗却更塗新者十日以後色等桃花小品方白斂人參各三兩無蘼蕪花冬瓜人此皆是面膏藥疑更有此二味

臣按香附子一作白附子

又方

香附子　白芷二兩　零陵香二兩　茯苓一兩

蔓菁油二升無以猪膏充　牛髓　羊髓各一斤以大兩并

水漬白臘八兩　麝香二分

右九味以油髓微火煎五物令半乾去滓內麝香研千遍凝用澡豆洗面後塗敷之

臣按[illegible]白鮮皮

又方

杏人二升去皮尖　白附子三兩　密陀僧二兩研如粉　白羊髓二升半

真珠十四枚研　白鮮皮一兩　雞子白七枚　胡粉二兩石炙下以

又方

防風　白及　芎藭各三兩　白朮八分

甘松　白斂　木蘭皮　栝樓

白芷　藁本　桃花　蜀水花

商陸　密陀僧　白殭蠶　零陵香

杜蘅　鷹屎　白蒺藜　土瓜根各三分

麝香　丁香各二兩　白附子　玉屑各四分

鵝脂五合　鹿髓一升　羊髓一升　白臘四兩

猪膏二升

右二十九味細切酢漬密封一宿明旦以猪膏煎三上

延按千金此方有猪肪脂一

三下白芷色黃為藥成去滓攪數萬遍令色白以傅面慎風日良

又方

防風 芎藭 白芷 白殭蠶

蜀水花 白斂 細辛 茯苓

藁本 萎蕤 青木香 辛夷人

當歸 土瓜根 栝樓人各三分 桃人去皮尖

猪脂二升 鵝脂一升 羊腎脂一升

右十九味細切漬酒二升浸一日一夜便內脂中急火煎之三上三下然後緩火一夜藥成去滓以寒水石粉三分內脂中以柳木篦熟攪任用之並出第五卷中

千金面膏去風寒令面光悅耐老去皺方

青木香 白附子 芎藭 白蠟

零陵香 白芷 香附子各二兩 茯苓

甘松各一兩 羊髓一升半煉之

右十味以酒水各半升漬藥經宿煎三上三下候酒水氣盡膏成去滓收貯任用塗面作妝皯䵟皆落

又方

玉屑 芎藭 土瓜根 白芷

冬瓜人 木蘭皮 萎蕤 桃人去皮

斤作二十八味共脩劉皮先畔

白附子各四兩 商陸根五分 辛夷 菟絲子

藁本 白殭蠶 當歸 黃耆

藿香 細辛 防風 麝香

青木香各三分 猪胰三具 蜀水花一合 [illegible]一合

白狗脂一升 鵝脂一升 熊脂二升

右二十七味細切以清酒漬一宿微火煎一日以新布絞去滓以塗面切慎風任用之出第六卷中

崔氏蠟脂方

白蠟十兩煉令白 桃花 菟絲子 白芷

木蘭皮 細辛 辛夷人 白茯苓

土瓜根 栝樓根 白附子 杜蘅

桃人去皮 杏人去皮各三分 蔓菁子油二升半 羊髓

牛髓 鹿髓脂各一合

右十八味並細切以苦酒漬一宿用土件臘油髓脂等煎如面脂法其蔓菁油酒在前煎令煙出後始下蠟髓花內諸藥候白芷色黃膏成任用每以漿豆洗面後以塗之

又常用臘脂方

蔓菁油三升 甘松香一兩 零陵香一兩 辛夷人五分

白朮二升 細辛五分 竹茹一升 竹葉切一合

白茯苓三分　蘼蕪花三分　羊髓半升以水浸去赤脈鍊之

麝香任多

右十二味切以綿裹清酒經再宿絞去酒以脂中煎緩火令沸三日許香氣極盛膏成乃鍊蠟令白看臨熟下蠟調攪硬得所貯用之出第九卷中

文仲療人面無光潤黑及皺常傅面脂方

細辛　萎蕤　黃耆　白附子

薯蕷　辛夷　芎藭　白芷各一分

栝樓　木蘭皮各二分　猪脂二升鍊成

右十一味切以綿裹用少酒漬一宿內脂膏煎之七上

七下別出一斤白芷煎色黃藥成去滓攪凝以傅面任用之亦主金瘡止血良

延年面脂方

白朮　茯苓　杜蘅各六分　萎蕤

藁本　芎藭　土瓜根　栝樓各五分

木蘭皮　白殭蠶　蜀水花　辛夷人

零陵香　藿香各四兩　菟絲子八分　梔子花

麝香酒浸綿裹　鷹屎白各三分　冬瓜人五分　桃人五合令碎

白蠟三兩　羊脂腎邊者一升　猪脂三升水浸七日日別易水

猪胰一具　白附子四分

右二十五味並細切酒二升取猪胰桃人冬瓜人綿裹內酒中挼令消絞取汁用漬藥一宿別煎猪脂令消去滓以鵝脂羊脂白蠟於鐺中用綿裹內鐺微火煎三上三下藥黃色去滓待澄候凝內鷹屎末攪令勻以塗面妙

又方

防風　萎蕤　芎藭　白芷

藁本　桃人去皮　白附子各六分　茯苓八分

細辛　甘松香　零陵香各二分　當歸

栝樓研各四分　蜀椒五十粒　鸕鷀屎　冬瓜人研各三分

麝香一分

右十七味酒浸淹潤一夕明日以綿薄寬裹之以白鵝脂三升羊脂三升並鍊成者以煎之於銅器中微火上煎使之沸勿使焦也乃下之三上看白附子色黃膏成去滓又入鐺中上火內麝香氣出仍麝香更以綿濾度之乃內栝樓人桃人冬瓜人等脂并鷹屎鸕鷀屎粉等攪令調膏成待凝以瓷器貯柳木作槌子於鉢中研使鄉虛得所生光研之無度數二三日研之方始好唯多則光滑任用

洗面藥方二首

千金翼面藥方

朱砂研 雄黃 水銀霜各半兩 胡粉二兩

黃鷹屎一升

右五味合和洗淨面夜塗以一兩霜和面脂令稠如泥先於夜欲臥時以澡豆淨洗面并手乾拭以藥塗面厚薄如尋常塗面厚薄乃以手細細熟摩之令藥與肉相入乃臥一上經五日五夜勿洗面止就上作粉即得要不洗面至第六夜洗面塗一如前次澈三度塗洗用不塗也一如常洗面也其色光淨與未塗時百倍佳出第五卷中

延年洗面藥方

萎蕤 商陸根 栝樓 杜若

滑石各八兩 土瓜根 芎藭 辛夷人

甘松香各三兩 黃瓜樓五枚去皮 白茯苓 白芷各一斤

木蘭皮 零陵香各三兩 麝香二兩 蓽豆二升

冬瓜人二升去皮 猪蹄三具

右十八味擣爲散和蓽豆以水桃人冬瓜人黃瓜樓子掭之令碎猪蹄汁中挼令散和藥作餅子暴乾擣篩更和猪蹄汁又捻作餅更暴乾汁盡乃止擣篩爲散稍稍以洗手面妙

面色光悅方五首

千金療人令面悅澤好顏色方

猪胰三具 蕪菁子二兩 栝樓子五兩 桃人三兩去皮

右四味以酒和之擣如膏以傅面慎風日妙

又方

酒漬三月三日桃花服之好顏色治百病

又方

採三株桃花陰乾爲散以酒飲服方寸匕日三令面光悅如紅出第六卷中

千金翼令面生光方

密陀僧以乳煎塗面即生光出第五卷中

延年去風令光潤桃人洗面方

桃人五合去皮

右一味用粳米飯漿水研之令細以漿水擣取汁令桃人盡即休微溫用洗面時長用極妙

令面色白方四首

千金療面黑不白淨方

白鮮皮 白殭蠶 芎藭 白附子

鷹屎白 白芷 青木香 甘松香

白朮 白檀香 丁子香各三分 冬瓜人五合

白㑹二七枚去核 瓜子一兩 杏人三十枚去皮 鷄子白七枚
大棗三十枚去核 猪脏三具 麪三升 麝香二分研
右二十味先以猪脏和麪暴令乾然後合諸藥擣篩又
以白豆屑二升爲散且用洗面手十日以上大白神驗出第
六卷中
又仲令人面白似玉色光潤方
羊脂 狗脂各一升 白芷半升 烏喙十四枚
大棗十枚 麝香少許 桃人十四枚 甘草一尺炙
半夏半兩洗
右九味合煎以白芷色黃去滓塗面二十日即變五十

日如玉光潤妙
又隱居効驗面黑令白去䵟方
烏賊魚骨 細辛 栝樓 乾薑
蜀椒各三兩
右五味切以苦酒漬三日以成鍊牛髓二斤煎之以酒
氣盡藥成作粉以塗面醜人亦變鮮妙光華
近效則天大聖皇后鍊益母草留顔方
用此草每朝將以洗手面如用澡豆法面上䵟䵴及
老人皮膚兼皺等並展落浮皮皮落著手上如白垢
再洗再有效淳用此藥已後欲和澡豆洗亦得以意
斟酌用之初將此藥洗面覺面皮手滑潤顔色光澤
經十日許特異於女面經月餘生血色紅鮮光澤異
於尋常如經年久用之朝暮不絕年四五十婦人如
十五女子俗名鍊臭此方仙人秘之千金不傳即用
藥亦一無不効世人亦有聞説此草者爲之皆不得
真法今録真法如後可勿傳之五月五日收取益母
草暴令乾燒作灰取草時勿令根上有上有上即無
効燒之時預以水灑一所地或泥一鑪燒益母草良
久煙無取斗羅篩此灰乾以水熟攪和溲之令極熟
團之如雞子大作丸於日裏暴令極乾訖取黃土泥

泥作小鑪子於地四邊各開一小孔子生剛炭上下
俱著炭中央著藥丸多火經一炊久即微微著火燒
之勿令火氣絕絕即不好經一復時藥熟切不得猛
火若藥熔變爲瓷巴黃用之無驗火微即藥白色細
膩一復時出之於白瓷器中以玉槌研絹篩又研三
日不絕收取藥以乾器中盛深藏旋旋取洗手面令
白如玉女項頸上黑但用此藥揩洗並如玉色秘之
不可傳如無玉槌以鹿角槌亦得神驗
面皯方十三首
廣濟療面皯方

臣按千金石蠶作石檢本草但有蟹石亦無石蠶

雄黄（七分） 雌黄（五分，並以絹裹於水中煮一日） 光明砂
密陀僧（五分，內猪脂中煮數沸熬乾用） 眞珠（三分，研末） 胡粉（三分）
白殭蠶（三分） 白及（三分） 茯苓（五分） 水銀（五分，和藥末研令消盡）

右十味各研如粉訖相和又研之令勻少減取和猪脂面脂攪令調每夜用澡豆漿水洗去粧勿衝風及火

千金療面皯方

李子人和雞子白塗上則落

又方

眞白羊乳（三升） 羊胰（三具，以水漬去皮細擘） 甘草（二兩，炙末）

右三味相和一宿先以酢漿水洗面以生布拭之夜塗藥明旦以猪蹄湯洗却又依前爲之即盡

又方

白附子末以水和塗上頻頻用即落盡

又方

桂心石鹽末蜜和塗之

又方

杏人酒浸皮脫擣如泥以絹囊裹夜則拭之効

又方

水和丹破水服方寸匕男女七日皆色白也

臣按蕣華即木槿花也草一名木作舜大黄飲令百皮薄潤如木槿花也

又方

美酒浸雞子三枚密封四七日成塗面淨好無比

又方

狗杞根（一百斤） 生地黄（三十斤）

右二味先下篩狗杞又擣碎地黄暴乾合下篩空腹服方寸匕日三効

文仲療皯令人面皮薄如蕣華方

鹿角尖（取實白處於平石上以水磨之稍濃取一升二合） 乾薑（一兩）

右二味擣篩乾薑以和鹿角汁攪使調每夜先以煖漿水洗面軟帛拭乾取上白蜜塗面以手摩使蜜盡手指

石粘爲候後塗藥平明還以煖漿水洗之二三日顏色驚人塗藥不用過見風日妙

必效療面皯方

芍藥　茯苓　杏人（去皮）　防風　細辛　白芷（各一兩）　白蜜（一合）

右七味擣爲散先以水銀霜傅面三日方始取前件白蜜以和散漿傅面夜中傅之不得見風日向晚任意作粉能常用大佳每夜先須漿水洗面後傅藥

古今録驗療面皯方

取白蜜和茯苓粉傅面七日愈

又療面皯䵳蘇合煎方

蘇合香　麝香　白附子炮　女菀

蜀水花各二兩　青木香三兩　雞舌香　鸕鶿屎各二兩

右八味先取糯米二升淅使極淨手生用一十合研酢

用水一斛五斗稍稍煮取汁令得一斛煮藥令沸以綿

裹諸藥內著沸漿中煎得三升藥熟以澡豆洗面後令

燥以藥傅皯上日再欲傅藥前以酢漿水洗面後傅藥

塗藥至三四合皯處當小急痛皯處微微剝去便白以

漿三洗三傅玉屑膏訖白粉之若急痛勿怪亦勿擾之

但以粉粉上面按抑痒處滿百日可用脂胡粉取差

面皯䵳方二十一首

肘後療面多皯䵳如雀卵色者方

以苦酒漬白朮以拭面上即漸漸除之

又方

以羖羊膽酒二升合煮三沸以塗拭之日三差

又方

羊膽豬胰細辛末煎三沸塗面平旦以醋漿水洗之

又方

茯苓白石脂等分末和蜜塗之日三除去

文仲療皯䵳方

杏人去皮擣末雞子白和塗經宿拭之

又方

桃花瓜子各等分擣以傅面

又方

茯苓末以蜜和傅之

備急療皯䵳方

雞子一枚去黃　朱砂末一兩

右二味朱砂末內雞子中封固口與雞同令伏鷄候雞

雛出即取之以塗面立去也

又方

七月七日取露蜂房子於漆杯中漬取汁重濾絞之

以和胡粉塗

又去黶䵳方

桑灰　艾灰各三升

右二味以水三升淋之又重淋三遍以五色帛內中合

煎令可丸以傅黶上則爛脫乃以膏塗之并滅瘢痕甚

妙

小品療面䵳滅瘢痕除皯去黑䵳方

薺苨二分　桂心一分

右二味擣篩以酢漿水服方寸匕日一止即脫又服栀

子散差千金治面䵟

千金療面皯黯令悅白潤好及手方

猪蹄二具治如食法白粱米一升洗令淨以水五升煮蹄爛澄取清汁三升 白茯苓

商陸各五兩 萎蕤 藁本 白芷各三兩

右六味以猪蹄汁并桃人一升合煮取二升去滓以白瓷器中貯之內甘松零陵香各一兩以綿裹漬以傅之

又澡豆方

猪胰五具乾之 白茯苓 藁本 白芷各四兩

甘松香 零陵香各三兩 白商陸五兩 大豆末二升絹篩

蘿灰一斗火鍊

右九味擣篩調和訖收貯稍稍取前瓷中汁和以洗手面只用幾酢漿洗淨後任意水洗如常八月九月則合冷處貯之至三月已後勿用神良

又鼆皯面方

沉香 牛黃 薰陸香 雄黃

鷹屎各三分 丁香一分末 水銀一兩 玉屑三分

右八味作粉以蜜和塗之

又鼆面內外療方

以成鍊松脂爲末溫酒服二合日三服盡二升即差

又方

白芷 白斂各八兩 白附子 辛夷

烏頭炮 防風 藿香 商陸各二分

藁本 萎蕤各四兩 零陵香三分 麝香一分

牛脂一升 鵝脂一升 羊脂五合 麻油二合

右十六味細剉以酢漬浹浹然一宿以諸脂油煎白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傅之日三差

又療面䵟方

白礬燒汁 硫黃 白附子各一分

右三味擣篩以酢一盞漬之一宿夜淨洗面塗之勿見風白如雪也翼同

又方

雞子三枚 丁香一兩 醋一升

右三味漬七日取雞子白研丁香胡粉一兩和之洗面夜以藥塗之甚

又方

羖羊膽 牛膽

右二味以醋二升合煮三沸塗之差

千金翼面藥方療面䵟及瘡瘢并皮膚皴劈方

防風 藁本 辛夷 芍藥

商陸根 白芷 牛膝 當歸

細辛　蜜陀僧　芎藭　獨活
萎蕤　木蘭皮　零陵香　雞舌香
丁香　麝香　真珠各一兩　蕤人
杏仁二兩去皮　臘月猪脂二升　油一升
麞鹿腦各一具無以羊腦充　牛髓五升
右二十五味先以浸腦髓使白藿香已上㕮咀如麥豆
乃於腦髓脂油中煎三上三下以綿絞濾去滓入麝香
及真珠末等研攪千遍凝即塗面上千金翼云二十九味亦以諸本并千金翼數之但二十五味右云藿香以上㕮咀恐并藿香更有三味
必效療皯皰令面白悅澤白附子膏方

白附子　青木香　丁香各一兩　商陸根一兩
細辛二兩　酥一升　羊脂二兩　蜜陀僧一兩研
金牙二兩
右九味以酒三升漬一宿煮取一升去滓內酥煎一升
膏夜塗面上旦起溫水洗不得見大風日差
面皯皰方一十五首
劉涓子療面皯皰麝香膏方
麝香二分　附子一兩炮　當歸　芎藭
細辛　杜衡　白芷　芍藥各四分
右八味切以臘月猪膏一升半煎三上三下去滓下香

膏以傅皰上日三差
肘後療年少氣盛面生皯皰方
冬瓜子　冬葵子　柏子人　茯苓各等分
右四味為散食後服方寸匕日三服
又方
黃連一斤　木蘭皮十兩　猪肚一具治如食法
右三味㕮咀二味內肚中蒸於二斗米下以熟切暴乾
擣散食前以水服方寸匕日再
又方
麻黃三兩　甘草二兩炙　杏人三兩去尖皮

右三味擣篩酒下一錢匕日三服
又方
黃連二兩　蛇牀子四合
右二味擣末以面脂和塗面日再差
文仲療面皯皰方
胡粉水銀以臘月猪脂和傅之
又方
熟研水銀向夜塗之平明拭却三四度差
又方
土瓜根擣以胡粉水銀青羊脂合塗面皯處當差

備急療面皯皰方

鹿脂塗拭面上日再

又方

鷹屎白二分 胡粉二分

右二味以蜜和傅面上差

又主少年面上起細皰方

接上浮萍擣之可飲少許汁良[illegible]飲一本字

又方

以三年苦酒漬雞子三宿當軟破取塗之差

古今錄驗療面皯皰及產婦黑䵟如雀卵色羊膽膏方

羊膽一枚 猪脂一合 細辛一分

右三味以羊膽煎三上三下膏成夜塗傅早起洗以漿水洗去驗

又療面皯皰㓨玉屑膏方

玉屑 珊瑚 木蘭皮各三兩 辛夷去毛

白附子 芎藭 白芷各二兩 牛脂五兩

冬瓜人十合 桃人一升 猪脂五合 白狗脂二斤

商陸一升

右十三味切煎三上三下白芷色黃其膏成洗面塗膏神驗

皮剉一升以水三升煮取一升去滓以沐頭髮塗膏驗出第二卷中

延年療頭風白屑風痒長髮膏方

蔓荊子 附子去皮 澤蘭 防風

杏人去皮 零陵香 藿香 芎藭

天雄 辛夷各二兩 沉香一兩 松脂

白芷各二兩 馬鬐膏 松葉切 熊脂各一升

生麻油四升

右十七味以苦酒漬一宿以脂等煎緩火三上三下白芷色黃膏成去滓濾收貯塗髮及肌中摩之日三兩度

差

又療熱風衝髮髮落生髮膏方

松葉切 蓮子草切 鍊成馬鬐膏 棗根皮各一升切

韭根切 蔓荊子碎各三合 竹瀝 猪脂各二升

防風 白芷各二兩 辛夷人 吳藍

升麻 芎藭 獨活 寄生

藿香 沉香 零陵香各一兩

右十九味以棗根煮汁竹瀝等浸一宿以脂等煎之候白芷色黃膏成以塗頭髮及頂上日三五度妙

古今錄驗生髮及療頭風痒白屑膏方

臣按石南用葉醫本俗此云混說誤

烏喙　莽草　細辛　續斷

石南草　辛夷人　皂莢　澤蘭

白术　防風　白芷各二兩　柏葉

竹葉切各一升　猪脂五升　生麻油七升

右十五味以苦酒漬一宿以油脂煎候白芷色黄膏成濾去滓收以塗頭髮先沐洗後用之妙

生髮膏方一十一首

廣濟生髮方

蓮子草汁二大升　熊白脂一大合　豬鬐膏一合　生麻油一合

柏白皮切三合　山韭根切三合　瓦衣切三合

右七味以銅器煎之候膏成去滓收貯每欲梳頭塗膏令頭肌中髮生又黑

又生髮膏方

細辛　防風　續斷　芎藭

皂莢　柏葉　辛夷人各一兩八銖　寄生二兩九銖

澤蘭　零陵香各二兩十六銖　蔓荊子四兩　桑根汁一升

韭根汁三合　竹葉切六合　松葉切六升　烏麻油四大升

白芷六兩十六銖

右十七味以苦酒韭根汁漬一宿以綿裹煎微火三上三下白芷色黄去滓濾以器盛之用塗摩頭髮日三兩

又男女皰面生瘡方

黄連二兩　牡蠣熬三兩

右二味擣篩以粉瘡上頻傳之即差

又療面皰瘡臆白附子散方

白附子　青木香　由跋各二兩　麝香二分

右四味為散以水和塗面千金翼有細辛二兩

又療面皰氣甚如麻豆瘡痛搔之黄汁出及面黑色黯䵟不可去之葵子散方

冬葵子　柏子　茯苓等分

右三味為散以酒服方寸匕日三差千金翼有冬瓜子

面粉滓方四首

千金療面粉滓方

礬石熬汁盡

右一味以酒和塗之三數度佳甚妙

備急療婦人面上粉滓赤膏方

光明砂研四分　麝香二分　牛黄半分　水銀四分以面脂和研

雄黄三分

右五味並精好藥擣篩研如粉以面脂一升內藥中和攪令極調一如傳面脂法以香漿水洗傳藥避風經宿粉滓落如蔓菁子狀此方秘不傳

又主去粉滓䵟䵳方
白歛　白石脂　杏人各等分
右三味擣散以雞子白和以井花水洗傅之三二遍即
差
又方
黃耆　白朮　白歛　萎蕤各七分
蔄茹　蜀水花　鷹屎白各一兩　防風
芎藭　白芷　細辛　白附子炮
杏人去皮尖　青木香各六分
右十四味擣爲粉以雞子白和之作挺子暴乾研之以
漿水和塗夜傅朝洗差出第六卷中

化面方二首
張文仲療化面方
眞珠研　光明砂研　冬瓜人各二分　水銀四分
右四味以四重絹袋盛於銅鐺中以酢漿水微火煮
一宿一日始堪用取水銀和面脂熟研使消合珠冬瓜
下末更和調以傅面取差爲度
備急面上皯䵳子化面仍令光潤皮急方
土瓜根
右一味擣末以漿水和令調入夜以漿水洗面塗藥旦

洗却即差
雜療面方六首
肘後療面生皰瘡如麻子中有粟核方
不灰以水漬之寸淹以米一把置上令米釋淘取一
一粒瘡上當漸拔之軟乃爪出粟以膏藥傅之即
差
千金療面上風方
玉屑研　密陀僧研令如粉　珊瑚研各二大兩　白附子三兩
右四味細研如粉用酥和夜塗面上旦洗差出第六卷中
千金翼芎藭湯主面上及身體風搔痒方

麻黃去節十分　芎藭　白朮　吳茱萸
防風　枳實炙　羌活各二兩　薯蕷四兩
蒺藜子六兩　烏喙炮一兩　甘草炙二兩　生薑六分
右十二味切以水九升七合煮取二升五合去滓分服
甚妙驗
又洗方
蒴藋根　蒺藜　景天葉各一兩　蛇牀子五兩
玉屑二兩
右五味以水一斗煮取三升稍稍洗之慎風日差
又急面皮方

謹按火猪未詳千金作大猪

火猪蹄一具治如食法

右一味以水二升清漿水一升煎成膠以洗面又和澡豆塗面以漿水洗令面皮急矣出第五卷中

蘇澄去面皯及粉皶方

取三年大酢二升漬雞子五枚七日雞子當軟如泥去酢瀉著瓷器中以胡粉兩雞子許和研如膏盞口蒸之於五斗米下熟瓶成封之勿泄氣夜欲臥時研塗面皰粉刺上旦以漿水洗面日別如此百日差勿見風效

頭風白屑方四首

廣濟療頭風白屑痒髮落生髮主頭腫旋悶蔓荊子膏方

蔓荊子一升 生附子三十枚 羊躑躅花四兩 葶藶子四兩
零陵香二兩 蓮子草一握

右六味切以綿裹用油二升漬七日每梳頭常用之若髮稀及禿處即以鐵精一兩以此膏油於瓷器中研之摩禿處其髮即生也

延年松葉膏療頭風鼻塞頭旋髮落白屑風痒並主之方

松葉切一升 天雄去皮 松脂 杏人去皮
白芷各四兩 莽草 甘松香 零陵香
甘菊花各一兩 秦艽 獨活 辛夷人
香附子 藿香各三兩 烏頭去皮 蜀椒汗
芎藭 沉香 青木香 牛膝各三兩
躑躅花一兩半並剉

右二十一味㕮咀以苦酒三升漬一宿以生麻油一斗微火煎三上三下苦酒氣盡膏成去滓濾盛貯以塗髮根日三度摩之

又療頭痒搔之白屑起方

大麻人三升擣碎 秦椒二升

右二味擣內泔汁中漬之一宿明旦濾去滓溫以沐髮訖用後方白芷一斤雞子三枚芒硝一升三味以水四

升煮取三升去滓停小冷內雞子清及硝攪令調更溫令熱分爲三度澤頭覺頭痒即作洗之不過三度永除

又療頭風髮落或頭痒腫白屑方

蔓荊子一升 防風三兩 寄生三兩 秦椒一兩
大麻人一升 白芷四兩

右六味切以水一斗五升煮取一斗去滓以洗頭三四度差加芒硝一升亦妙

沐頭去風方五首

集驗療頭風方

甘菊花 獨活 茵芋 防風

細辛　蜀椒　皂莢　桂心
杜蘅　莽草
右十味分等水煮以沐頭必效
又主風頭沐湯方
猪椒根三兩　麻黃根　茵芋　防風各一兩
臣按猪椒即本經木部下品蔓椒是
細辛
右五味切以水二斗煮取一斗以沐頭甚妙
又主頭風搔之白屑起雞子沐湯方
新生烏雞子三枚
右一味以五升沸湯揚之使溫溫破雞子內中攪令勻

分爲三度沐令髮生去白屑風痒差
必效沐髮方
取生柏葉細剉一斗煮取湯沐髮妙
又方
取杏人烏麻子二味擣以水投濾取汁並擣用甚妙
頭風白屑兼生髮方八首
廣濟療頭風白屑生髮白令黑方
浮木子五升未識以九月九日巳前採曝乾擣末去子　鐵精四兩
零陵香二兩　丁香子二兩
右四味細切以絹袋盛用生麻油二升漬經二七日洗
頭訖每日塗之方驗
集驗療頭風痒白屑風頭長髮膏方
蔓荆子　附子炮　細辛　石南草
續斷　皂莢　澤蘭　防風
杏人去皮　白芷　零陵香　藿香
馬鬐膏　熊脂　猪脂各二兩　松葉切半升
莽草
右十七味㕮咀以苦酒漬一宿明旦以脂膏等煎微
火三上三下以白芷色黃膏成用以塗頭中甚妙
又療頭風痒白屑生髮膏方

烏喙　莽草　石南草　細辛
皂莢　續斷　澤蘭　白术
辛夷　白芷　防風各二兩　柏葉切二升
松葉切二升　猪脂四升
右十四味以苦酒浸一宿以脂煎三上三下膏成去滓
濾收沐髮了以塗之妙千金同
崔氏松脂膏療頭風鼻塞頭旋髮落復生長髮去白屑方
松脂　白芷各四兩　天雄　莽草
躑躅花各一兩　秦艽　獨活　烏頭
辛夷人　甘松香　零陵香　香附

藿香　甘菊花各二兩　蜀椒　芎藭
沉香　牛膝　青木香各三兩　松葉切，一升
杏人四兩，去皮碎
右二十一味切以苦酒二升半漬一宿用生麻油九升微火煎令酒氣盡不咤去滓以摩頂上髮根下一摩之勿摩時初夜臥摩時不用當風盡日依常檢校東西不廢以差為度
又蓮子草膏療頭風白屑長髮令黑方
蓮子草汁二升　松葉　青桐白皮各四兩　棗根白皮三兩
防風　芎藭　白芷　辛夷人

藁本　沉香　秦艽　商陸根
犀角屑　青竹皮　細辛　杜若
蔓荊子各二兩　零陵香　甘松香　白朮
天雄　柏白皮　楓香各一兩　生地黃汁五升
生麻油四升　豬鬃脂一升　馬鬐膏一升　熊脂二升
蔓青子油一升
右三十味細切以蓮子草汁并生地黃汁浸藥再宿如無蓮子草汁加地黃汁五升浸藥於微火上內油脂等和煎九上九下以白芷色黃膏成布絞去滓欲傅時先以好泔沐髮後以傅頭髮摩至肌又洗髮取[illegible]根

又療面黑似土肉皰白蘞脂方
白蘞一分　白礬一分，燒　石脂一分　杏人半分，去皮尖
右四味擣篩雞子和夜塗面明旦以井花水洗之白蘞即白斂也甚妙老與少同
面皯皰方一十三首
劉涓子療面皯皰木蘭膏方
木蘭皮　防風　白芷　青木香
牛膝　獨活　藁本　芍藥
白附子　杜蘅　當歸　細辛
芎藭各一兩　麝香二分

右十四味切以臘月豬脂二升微火煎三上三下絞去滓入麝香調以傅面上妙出第五卷中
肘後療面及鼻病酒皶方
木蘭皮一斤，漬酒用三年者百日出暴乾　梔子人一斤
右二味合擣為散食前以漿水服方寸匕日三良千金藁木蘭皮五兩梔子人六兩
又方
鸕鷀屎末以臘月豬膏和塗之千金同
又方
真珠　胡粉　水銀等分

右三味以猪膏研令相和塗之佳
又方
馬藺子花擣封之佳
佳驗療面上皯皰䵟驗方
蒺藜子　梔子人　豉各一升
右三味擣合如泥以酸漿和如泥臨臥以塗面上日大出便洗差千金有木蘭皮一斤翼云半斤
又木蘭散方
木蘭皮一斤
右一味以三年酢漿漬之百日出於日中暴之擣末服方寸匕日三

古今錄驗主皰方
雄黃　哨粉末　水銀等分
右三味以臘月猪脂和以傅面皰上差止
又卒得面皰方
土瓜根　水銀　胡粉　青羊脂各等分
右四味為粉和傅面皰上差止
又方
胡粉二兩　水銀二分
右二味和猪脂研令以傅之千金同

度
深師療頭風烏喙膏生髮令速長而黑光潤方
烏喙　莽草　石南草　續斷
皂莢去皮子熬　澤蘭　白朮各二兩　辛夷人一兩
柏葉切一升　猪脂三升
右十味以苦酒漬一宿以脂煎於東向竈釜中以葦薪煎之先致三堆土每三沸即下致一堆土候沸定却上至三沸又置上堆上三畢成膏訖去滓置銅器中數北向屋溜從西端至第七溜下埋之三十日藥成小兒當刮頭日三塗大人數沐沐已塗之甚驗

千金療脉極虛寒髮墮落安髮潤方
桑根白皮切一升
右一味淹漬煮五六沸去滓以洗沐髮數數為之不復落也
又方
麻子碎三升　白桐葉切一把
右二味以泔汁二升煮取八九沸去滓洗沐頭髮不落而長也翼同
又生髮膏方
胡麻油一升　鴈脂一合　丁子香一　甘松香各半兩

吳藿香　細辛　椒各二兩　澤蘭

白芷　牡荊子　苜蓿香　大麻子各兩

芎藭　防風　莽草　杏人各三兩去皮

竹葉切五合

右十七味切以酢漬一宿煎之以微火三上三下白芷色黃膏成去滓以塗髮及頂尤妙出第十三卷中

千金翼生髮膏令髮速長黑傅藥時特忌風方

烏喙　莽草　續斷　皂莢子去皮

澤蘭　竹葉　細辛　白朮各二兩

辛夷　防風各一兩　柏葉切四兩　杏人別擣

松葉各三兩　猪脂三升

右十四味先以米酢漬一宿以脂煎三下三上膏成去滓塗髮及頂上

又長髮方

蔓荊子三升　大附子二枚

右二味以酒一斗二升漬之以瓷器盛之封頭二十日取雞脂煎以塗之澤以汁櫛髮十日長一尺勿近面塗驗

又生髮附子松脂膏方

附子　松脂各二兩　蔓荊子四兩末研

右三味以烏雞脂和瓷器盛密縛頭於屋北陰乾百日藥成馬鬐膏和以傅頭如澤勿近面驗

又生髮猶灰散方

猶衣五合暴乾擣末　鐵精一合　合歡木灰二合　水萍末三合

右四味擣研末以生油和少許如膏以塗髮不生處日夜再即生髮効並出第五卷中

近効生髮方

蔓荊子　青葙子　蓮子草各一分　附子一枚

砕頭髮灰二七

右五味以酒漬內瓷器中封閉經二七日藥成以烏雞

脂和塗之先以泔洗後傅之數日生長一尺也

生眉毛方二首

千金生眉毛方

爐上青衣　鐵生等分

右二味以水和塗之即生甚妙

又方

七月烏麻花陰乾末生烏麻油二味和塗眉即生妙

令髮黑方八首

深師療生髮黑不白澤蘭膏方

細辛　續斷　皂莢　石南草

澤蘭　厚朴　烏頭　莽草
白朮兩各二　蜀椒二升　杏人半升去皮
右十一味切以酒漬一宿以鍊成豬脂四斤銅器中向
東炊竈中煎三上三下膏成絞去滓拔白者以辰日塗
藥皆出黑髮十日効
又生長髮令黑有黃白者皆黑魏文帝用効秘之方
黃耆　當歸　獨活　芎藭
白芷　芍藥　莽草　防風
辛夷人　乾地黃　藁本　蛇銜兩各一
薤白切半升　烏麻油四升半　馬鬐膏二升

右十五味切以微火煎三上三下白芷黃膏成去滓塗
髮竟後塗之
千金令白髮還黑方
隴西白芷一升　旋覆花　秦椒一升　桂一尺
右四味下篩以井華水服方寸匕日三三十日白髮還
黑禁房室
又方
烏麻九蒸九暴擣末以棗膏和丸久服之集同
又方
取黑椹水漬之頻沐髮即黑効可塗傅之
又方
取生麻油漬烏梅塗髮良
又方
以鹽湯洗沐以生麻油和蒲葦灰傅之常用効出第十二卷中
千金翼瓜子散主頭髮早白又虛勞腦髓空竭胃氣不和
諸臟虛絕血氣不足故令人髮早白少而生蒜髮及憂愁
早白遠視䀮䀮得風淚出手足煩熱恍惚忘誤連年下痢
服之一年後大驗方
瓜子一升　白芷　松子去皮　當歸

芎藭　甘草炙各二兩
右六味擣散食後服方寸匕日三酒漿湯飲任性服之
忌如常法出第五卷中
拔白髮良日并方二首
金翼白髮令黑方
八角附子一枚　大酢半升
右二味於銅器中煎兩沸內好礬石大如棊子許一枚
消盡內香脂三兩和令相得攪至凝內竹筒內拔白髮
以膏塗拔根即生黑髮也出第五卷中
新急拔白毛令黑毛生方

拔去白毛以好白蜜塗拔處卽生黑毛眉中無毛以
鍼挑傷敷蜜亦生眉毛比見諸人以石子研丁香汁
拔白毛訖急手以敷孔中卽生黑毛此法神驗

延年拔白髮良日

正月四日二月八日三月十二十三日兩日並得四
月十六日五月二十日六月二十四日七月二十八
日八月十九日九月十五日十月十日十一月十日
十二月十日右並以日正午時拔當日不得飲酒食
肉五辛經一拔已後黑者更不變千金同

變白髮染髮方五首

范汪王子喬服菊增年變白方

菊以三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰
容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名
曰長生者根莖也陰乾百日取等分以成日合擣千
杵下篩和以蜜丸如梧桐子日三服七丸百日身體
潤一年白髮變黑二年齒落復生三年八十者變童
兒

又染髮方

胡粉一分　白灰一分

右二味以雞子白和先以泔漿洗令淨後塗之卽急以
油帛裹之一宿以澡豆洗却黑軟不絕甚妙

必効染白髮方

揀細粒烏豆四升

右一味以醋漿水四斗煮取四升去却豆以好灰汁淨
洗髮待乾以豆汁熱塗之以油帛裹之經宿開之待乾
卽以熊脂塗揩還以油帛裹卽黑如漆一塗三年不變
妙驗

又方

擣木檻葉以熱湯和汁洗之亦佳

近効換白髮及髭方嚴中書處得云驗

熊脂二大兩臘月者佳　白馬鬐脂一兩細切熬之以綿濾絞汁

婆羅勒十顆其狀似大棗子去皮取汁使以指甲掐之卽有汁　生薑一兩亦爚中蒸之

母丁香半大兩

右五味二味擣爲末其脂鍊濾之以藥末相和令勻取
一小槐枝左攪數千過少傾卽凝或似膏卽拔白髮以
辰日良以槐枝點藥拔一條卽以藥令入髮根孔中以
揩頭熟揩之令藥入十餘日便黑髮生此方妙

髮黃方三首

肘後髮黃方

臘月豬脂和羊矢灰蒲灰等分傅黑也千金并翼同

千金髮黃方

大豆五升 醋漿水二升

右二味煮取五升汁淋之頻爲之黑 翼同

千金翼療髮黃方

熊脂塗髮梳之散頭入牀底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

頭髮禿落方一十九首

深師療髮白及禿落茯苓术散方

白术一斤 茯苓 澤瀉 猪苓各四兩 桂心半斤

右五味擣散服一刀圭日三食後服之三十日髮黑

又療禿頭方

蕪菁子末和酢傅之日一兩度 千金同

又方

麻子二升熬末

右一味以猪脂和塗之髮生爲度 千金同

又方

東行棗根長三尺以中央安

右一味以甑中心蒸之以器承兩邊汁以傅頭即生髮良 千金同肘後作桑根良

又方

麻子三升

右一味擣末研內泔中一宿去滓以沐髮便生

又方

取爛熟黑椹二升

右一味於瓷瓶中三七日化爲水以塗洗之髮生妙 千金同

又療髮禿落生髮膏方

馬鬐膏 驢鬐膏 猪脂 熊脂 狗脂各半合 升麻 防風 薺苨各二兩

蜣螂四枚 莽草 白芷各二兩

右十一味以脂煎諸藥三上三下膏成去滓收以塗之 千金并翼同

又主髮落生髮方

大黃六分 蔓荊子一升 白芷 防風 附子 芎藭 莽草 辛夷 細辛 椒 當歸 黃芩各一兩 馬鬐膏五合 猪膏三升

右十四味煎之以白芷色黃先洗後傅之驗

又主風頭毛髮落不生方

堪按蜜脂千金作脂卽

遠按千金此方作長髮治髮不止

取鐵上生衣研以臘月豬脂塗之并主眉毛落悉生千金云合煎三沸

又長髮方

麻子一升熬令黑押取油以傅頭長髮膏脂亦佳千金同

又方

多取烏麻花瓮甕盛密蓋封之深埋之百日出以塗髮易長而黑妙

千金療髮落不生方

取羊糞灰淋汁洗之三日一洗不過十洗大生集同

千金療髮落方

柏葉一升　附子二兩

右二味擣以豬脂和作三十丸每洗頭時即內一丸於泔中洗髮即不落其藥以布裹密器貯勿令漏泄之

又療髮落不生方

取石灰三升水拌並令濕炒令極熱以絹袋盛之取好酒三升漬之密封冬二七日春秋七日取酒溫服一合常令酒氣相接七日落止百日服終身不落新髮旋生

又方

取桑根白皮一石水一石煮五沸以沐頭三過即落止並出第五卷中

必效療頭一切風髮禿落更不生主頭中二十種病頭眩面中風以膏摩之方

蔄茹三兩半大戟　細辛　附子各二兩　桂心兩半

右四味擣篩以豬膏勿令中水去上膜及赤脈二十兩擣令脂銷盡藥成擣訖仍研恐其中有脂膜不盡以生布絞掠取以密器貯之先用桑柴灰汁洗髮令淨方云桑灰兩日洗待乾以藥摩須令入肉每日須摩勿作十二月令則用生烏麻油和極妙

近效韋慈氏療頭風髮落并眼暗方

蔓荊實三兩研　桑上寄生　桑根白皮各三兩　韭根切三合

白芷二兩　甘松香　零陵香各一兩　馬鬐膏三合

烏麻油一升　甘棗根白皮汁三升　松葉五粒者切二合

右十一味細切諸藥內棗根汁中浸一宿數數攪令調溼匝巳後且內油脂中緩火煎之勿令火熱三五日候棗汁竭白芷色黃膏成去滓每日揩摩鬢髮及搽洗其藥滓經宿臨時以綿寬裹煎之膏成去滓綿濾以新瓷瓶盛稠濁者卽先用卻不堪久停特勿近手糜壞也

又宜服防風蔓荊子丸方

防風　黃連　乾地黃各十六分　蔓荊子二十分
甘皮六分　萎蕤十分　甘草八分炙　茯神十二分
大黃八分文者錯
右九味擣篩蜜和丸如梧子飲下二十丸稍稍加之以大腸暢爲度盡更合服除服中黑花令眼目明以差爲度
劉尚書療頭中二十種風髮禿落摩之即此療頂如劍似劍盆者若小髮落不足爲難方
蜀椒汗三兩　莽草二兩　乾薑　半夏
桂心　䕡茹　附子　細辛並生用各一兩

右八味細擣篩以生猪脂剝去筋膜秤取二十兩和前件藥令擣令消盡脂其藥成矣先以白米泔沐髮令極淨每夜摩之經四五日即毛孔漸漸日生軟細白皮毛十五日後漸漸變作黑髮至一月四十日待髮生五寸以上任止若至五日不停彌佳好酥及生油和藥亦得
又傷寒鼻塞但以摩之差
白禿方一十二首
集驗療白禿方
以羊肉如作脯炙令香及熱以搨上不過三五度即差千金同

又方
以大豆髑髏骨二味各燒末等分以臘月猪脂和如泥塗之立差
千金松瀝煎療頭瘡及白禿方
松瀝七合　丹砂研　雄黃各二兩研取精　水銀研
黃連各一兩　礬石一兩燒有本方無礬
右六味擣散內瀝中攪令調以塗之先以泔洗髮令淨及瘡令無痂後敷藥日三後當作膿膿訖更洗塗藥如此三度作膿訖以甘草湯去藥痂可十度許洗即差
又療白禿髮落生白痂終年不差方

五味子三分　蓯蓉二分　松脂二分　蛇牀子一分
遠志三分　菟絲子五分　雄黃研　雌黃研各一分
白蜜一分　雞屎白半分
右十味擣篩以猪膏一升合煎先入雄黃雌黃次雞屎白次蜜次松脂次入諸藥末並先各各別末之候膏成
先以桑柴灰洗頭後傅之
又療白禿方
煮桃皮汁飲并洗頭訖以麪豉二味和以傅之效
又方
炒大豆令焦黑擣末和臘月猪脂熱煖之以塗傅上

可襄勿令見風日 並出第六卷中
千金翼王不留行湯主白禿及頭面久瘡去蟲止痛方
王不留行　東引桃皮 各五兩　蛇牀子 三升
東引茱萸根 五兩　苦竹葉 三升　牡荊實
蒺藜子 各三升　大麻子 一升
右八味以水二斗煮取一斗洗瘡日再并療癰疽妬乳
月蝕瘡爛 千金同
又方
以桃花末和猪脂傅上差爲度
又松脂膏主白禿及癰疽百種瘡悉治方

杜衡　雄黃 研　木蘭皮　礬石 燒汁
附子　大黃　石南　秦艽
眞珠　苦參　水銀 各一兩　松脂 六兩
右十二味細切諸藥以酢漬一宿猪脂一斤半煎之以
附子色黃去滓乃內礬石雄黃水銀更煎三兩沸待凝
以傅之 並出第五卷中 千金同
必效主禿瘡方
以童子小便煖用洗之揩令血出取白鴿糞五合熬
末和釅醋令調塗之即差
又主禿方

取三月三日桃花開口者陰乾與桑椹等分擣末以
猪脂和以灰汁洗後塗藥差
又方
柳細枝 一握 取皮　水銀 大如小豆　皂莢 一挺 碎
右三味以醋煎如餳以塗之
赤禿方三首
千金療赤禿方
擣黑椹三升如泥先灰汁洗後以塗之又服之甚妙
又方
燒牛羊角灰和猪脂傅之

又方
馬蹄灰和臘月猪脂塗之
令髮不生方三首
千金令毛髮不生方
蚌灰以鼈脂和拔却毛髮即塗永不生
又方
取狗乳塗之
又方
拔毛髮以蟹脂塗之永不復生
鬼舐頭方二首

千金療鬼舐頭方

燒猪屎灰以臘月猪脂和傅之

又方

取赤塼末以蒜擣和傅之

澡豆方八首

廣濟療澡豆洗面去䵟䵳風痒令光色悅澤方

白朮　白芷　白及　白歛
茯苓　藁本　萎蕤　薯蕷
土瓜根　天門冬　百部根　辛夷人
栝樓　藿香　零陵香　雞舌香各三兩
香附子　阿膠各四兩炒　白麪三斤　楝子三百枚
蓽豆五升　皂莢十挺去皮子

右二十二味擣篩以洗面令人光澤若婦人每夜以水和漿塗面至明温漿水洗之甚去面上諸疾

千金療澡豆方

丁香　沉香　桃花　青木香
木香花　鍾乳粉各三兩　麝香半兩　捺花
櫻桃花　白蜀葵花　白蓮花　紅蓮花各四兩
李花　梨花　旋復花各六兩　玉屑
眞珠各二兩　蜀水花一兩

右十八味擣末乳等并研以和下之合和大豆末七合研之千遍密貯勿洩常以洗手面後作妝百日面如玉光潤悅澤去臭氣粉滓咽喉臂膊皆用洗之悉得如意

又澡豆方

猪脏一具去脂　豆末四升　細辛　土瓜根
白朮　藁本　防風　白芷
茯苓　商陸根　白附子　杏人
桃人各四兩去尖皮　栝樓三枚　皂莢五挺炙去皮子　冬瓜人半升
雀屎半合　菟絲子一合擣末

右十八味擣末以麪一斗用漿水和猪脏研令爛和諸藥及麪作餅子暴乾擣絹篩收貯勿令遇風洗手面極妙

又澡豆令人洗面光潤方

白鮮皮　鷹屎白　白芷　青木香
甘松香　白朮　桂心　麝香
白檀香　丁子香各三兩　冬瓜子五合　白梅三七枚
雞子白七枚　猪脏二具　麪五升　土瓜根一兩
杏人二兩去皮

右十七味以猪脏和麪暴令乾然後諸藥擣散和白豆末三升以洗手面十日如雪三十日如凝脂妙無比

崔氏澡豆令人色如桃花光潤如玉急面皮去皯黯粉刺方

白芷（七兩） 芎藭（五兩） 皂莢末（四兩） 萎蕤

白朮（各五兩） 蔓荊子（二合） 冬瓜人（五兩） 梔子人（三合）

栝樓人（三合） 蓽豆（三升） 猪腦（一合） 桃人（一升去皮）

鷹屎（三枚） 商陸（三兩細剉）

右十四味諸藥擣末其冬瓜人桃人梔子人栝樓人別擣如泥其猪腦鷹屎合擣令相得然後下諸藥更擣令調以冬瓜瓤汁和為丸每洗面用漿水以此丸當澡豆用訖傅面脂如常妝飾朝夕用之亦不避風日

備急蓽豆香澡豆方

蓽豆（一升） 白附子 芎藭 芍藥

白朮 栝樓 商陸根 桃人（去皮）

冬瓜人（各二兩）

右九味擣末以洗面如常法此方甚妙

延年澡豆洗手面藥豆屑方

白茯苓 土瓜根 商陸根 萎蕤

白朮 芎藭 白芷 栝樓

藁本 桃人（去皮各六兩） 皂莢（五挺去皮子） 豆屑（二升）

猪脏（三具暴乾） 猪蹄（四具治如食法爛煮取汁） 麪（一斗）

右十五味取猪蹄汁拌諸藥等暴乾擣散以作澡豆洗手面妙

[illegible][illegible]藥澡豆方

白芷 芎藭 栝樓子（各五兩） 青木香

雞舌香（各三兩） 皂莢（十兩去皮子炙） 蓽豆 赤小豆（各二升）

右八味擣末和散任用洗手面去皯黯妙

手膏方三首

千金翼手膏方

桃人 杏人（各二兩去皮） 橘人（一合） 赤匏（十枚）

辛夷人 芎藭 當歸（各一兩） 大棗（二十枚）

牛腦 羊腦 白狗腦（各二兩無白狗諸狗亦得）

右十一味擣先以酒漬腦又別以酒六升煮赤匏以上藥令沸待冷乃和諸腦等勻然後碎辛夷等三味以綿裹之棗去皮核合內酒中以瓷器貯之五日以後先洗手訖取塗手甚光潤而忌火炙手

備急作手脂法

猪脏（一具） 白芷 桃人（去皮） 細辛（各一兩）

辛夷 冬瓜人 黃瓜樓人（各三兩） 酒（二升）

右八味煮白芷沸去滓膏成以塗手面光潤妙

古今錄驗手膏方

通按玉蘂木 甲香

通按之外始自從方中好錦朱砂也

白芷四兩 芎藭 藁本 萎蕤
冬瓜人 橡人各三兩 桃人一升去皮 棗肉二十枚
猪脛四具 冬瓜瓤汁一升 橘肉十枚 栝樓子十枚
右十二味以水六升煮取二升酒三升挼猪脛取汁桃
人研入以洗手面

口脂方三首

千金翼口脂方
熟朱二兩 紫草末五兩 丁香二兩 麝香一兩
右四味以甲煎和爲膏盛於匣內即是甲煎口脂如無
甲煎即名唇脂非口脂也

備急作脣脂法
蠟二分 羊脂二分 甲煎一合須別作自有方
紫草半分 朱砂二分
右五味於銅鍋中微火煎蠟一沸下羊脂一沸又下甲
煎一沸又內紫草一沸次朱砂一沸瀉著筒內候凝任
用之

古今錄驗合口脂法
好熟朱砂三兩 紫草五兩 丁香末二兩 麝香末一兩
口脂五十挺武德六年十月內供奉尚藥直長蔣合進 沉香三升
五藥 上蘇合香四兩 麝香二兩 甲香五兩

白膠香七兩 雀頭香三兩 丁香一兩 蜜一升
右十四味並大秤大兩麤擣碎以蜜揔和分爲兩分一
分內瓷器瓶內其瓶受大四升內訖以薄綿幕口以竹
篾交絡蔽瓶口
藿香二兩 苜蓿香一兩 零陵香四兩 茅香一兩
甘松香一兩半
右五味以水一斗酒一升漬一宿於胡麻油一斗二升
內煎之爲澤去滓均分著二坩各受一斗掘地著坩令
坩口與地平土塞坩四畔令實即以土甲煎瓶器口中
間一尺以糠火燒之常令著火糠作火即散著糠三日

三夜燒十石糠即好冷出之綿濾即成甲煎蠟七斤上
朱砂一斤五兩研令精細紫草十一兩於蠟內煎紫草
令色好綿濾出停冷先於灰火上消蠟內甲煎及攪看
色好以甲煎調硬即加煎軟即加蠟取點刀子刃上看
硬軟著紫草於銅鐺內消之取竹筒合面紙裹繩纏以
鎔脂注滿停冷即成口脂模法取乾竹徑頭一寸半一
尺二十鋸截下兩頭並不得節堅頭三分破之去中分
前兩相著合令蜜先以冷甲煎塗摸中合之以四重紙
裹筒底又以紙裹筒令縫上不得漏以繩子牢纏消口
脂瀉中令滿停冷解開就摸出四分以竹刀子約筒截

剖令齊整所以約筒者筒口齊故也（前有麝香末一兩後又有麝二兩未詳）

燒甲煎法六首

千金翼甲煎法

甲香（三兩） 沉香（六兩） 丁香 藿香（各四兩）
薰陸香 楓香膏 麝香（各二兩） 大棗（十枚取肉）

右八味粗搗如豆片又以蜜二合和攪內瓷坩中以綿裹口將竹篾交絡蔽之又油六升零陵香四兩甘松二兩綿裹內油中銅鐺緩火煎四五沸止去滓更內酒一升半并內煎坩中亦以竹篾蔽之然後掘地為坑置坩於上使出半腹乃將前小香坩合此口上以濕紙纏兩

口仍以泥塗上使厚一寸訖竈下幾坩火起從旦至暮燒至四更止明發待冷看上坩香汁半流瀝入下坩內成矣

崔氏燒甲煎香澤合口脂方

蘭澤香（半斤） 零陵香（一斤） 甘松香（五兩） 吳藿香（六兩）
新壓烏麻油（一升）

右五味並大斤兩揀擇精細煖水淨洗以酒水漬使調勻經一日一夜並著銅鐺中緩火煮之經一宿通前滿兩日兩宿唯須緩火煎訖漉去香滓澄取清以綿濾攪訖內著瓷坩中勿令香氣洩出封閉使如法

沉香（一斤） 丁香 甲香（各一兩） 麝香
薰陸香 艾納（各半小兩） 白膠香 蘇合香（各一兩）

右八味並大斤兩令別擣如麻子大先鍊白蜜去上沫盡即取沉香等於漆盤中和之使調勻若香乾取前件香澤和使勻散內著瓷器中使實看瓶大小取香多少別以綿裹以塞瓶口緩急量之仍用青竹篾三條找之即覆瓶口於前件所燒香澤瓶口上仍使兩口上下相合然後穿地埋著香澤瓶口共地平覆合香瓷瓶令露乃以濕紙纏瓶口相合處然後以麻擣泥瓶口邊厚三寸盛香瓶上亦令遍厚一寸以炭火繞瓶四邊緩炙使

薄乾然後始用糠火馬糞火亦佳燒經三宿四日勿得斷火看之必使調勻不得有多少之處香汁即下不勻三宿四日燒訖即住火其香澤火傷多即焦令帶少生氣住仍停經兩日使香餅冷訖然始開其上瓶樬除却更取別瓶內一分香於瓶中燒之一依前法若無別瓶還取舊瓶亦得其三分者香並燒訖未得即開仍經三日三夜停除火訖又經兩日其甲煎成訖澄清斟量取依色鑄瀉其沉香少即少著香澤只一遍燒上香瓶亦得好味五升銅鐺一口銅鉢一口黃蠟一大斤右件蠟置於鐺中緩火煎之使沫銷盡然後傾鉢中停經少時

使蠟冷凝還取其蠟依前銷之即擇紫草一大斤用長竹箸挾取一握置於蠟中煎取紫色然後擢出更著一握紫草以此爲度煎紫草盡一斤蠟色即足若作紫口脂不加餘色若造肉色口脂著黃蠟紫蠟各少許若朱色口脂凡一兩蠟色中和兩大豆許朱砂即得但搗前件三色口脂法一兩色蠟甲著半合甲煎相和著頭點置竹上看堅柔得所瀉著竹筒中斟酌凝冷即解看之

又煎甲煎先須造香油方

零陵香　藿香各一兩並剉之以酒拌微濕用綿裹內烏麻生油二升浸以一宿絞去滓將油安三升瓶中擱地作坑埋瓶於中瓶口與地面平　沉香一斤

小甲香八兩　麝香三兩　蘇合香一兩

右六味並搗如大豆粒以蜜拌內一小角瓶中用竹篾封其口勿令香漏將此角瓶倒插上中瓶口內以紙泥泥兩瓶接口處不令土入用泥泥香瓶上厚六七分用糠火一石燒上瓶其火微微不得烈使糠盡煎乃成矣並出第九卷中

古今錄驗甲煎方

沉香　甲香各五兩　檀香半兩　麝香一分

香附子　甘松香　蘇合香　白膠香各二兩

右八味擣碎以蜜和內小瓷瓶中令滿綿幕口以竹篾十字絡之又生麻油二升零陵香一分半藿香二分茅香二分又相和水一升漬香一宿著油內微火上煎之半日許澤成去滓別一瓷瓶中盛將小香瓶覆著口入下瓶口中以麻泥封并泥瓶厚五分埋土中口與地平泥上瓶訖以糠火微微半日許著瓶上放火燒之欲盡糠勿令絕三日三夜煎成停二日許待冷取澤用之云停二十日轉好云燒不熟即不香須熟燒此方妙

又方

蠟　蜜各十兩　紫草一兩半

右三味和蠟煎令調紫草和朱砂併澤瀉筒中

祭尼甲煎方

沉香六兩　丁香　穫香兩闕　楓香

青木香　麝香各二兩　大棗十枚　肉甲香三兩

右八味剉以蜜一合和拌著坩內綿裹竹篾絡之油六升零陵香四兩甘松香二兩綿裹著油中煎之緩火可四五沸即止去香草著坩中埋出口將小香坩合大㙮濕紙纏口泥封可七分須多著火從旦至午即須緩火至四更即去火至明待冷發看成甲煎矣

造燕脂法一首

崔氏造燕脂法

準紫鉚一斤別擣 白皮八銖別擣碎 胡桐淚半兩 波斯白石蜜碎

右四味於銅鐵鐺器中著水八升急火煮水令魚眼沸內紫鉚又沸內白皮訖攪令調又沸內胡桐淚及石蜜總經十餘沸紫鉚並沈向下即熟以生絹濾之漸漸浸疊絮上好淨綿亦得其番餅小大隨情每浸訖以竹夾如乾脯獵於炭火上炙之燥復更浸經六七遍即成若得十遍以上益濃美好出第九卷中

造水銀霜法二首

千金翼飛水銀霜法

水銀一斤 朴消八兩 大醋半升 黃礬十兩

錫二十兩成鍊三遍者 玄精六兩 鹽花三斤

右七味先鍊錫訖又溫水銀令熱乃投錫中又擣玄精黃礬令細以絹下之又擣錫令碎以鹽花并玄精等合和以醋拌令濕以鹽花一斤藉底乃布藥令平以朴消蓋上訖以盆蓋合以鹽灰為泥泥縫際乾之微火三日武火四日凡七日去火一日開之掃取極須勤心守勿使須臾間解慢則大失矣出第五卷中

崔氏造水銀霜法

水銀 石硫黃 伏龍肝各十兩細研 鹽花一兩鹽末是也

右四味以水銀別鐺熬石硫黃碎如豆並別鐺熬之良久水銀當熱石流黃消成水即併於一鐺中和之宜急傾併併不急即兩物不相入併訖下火急攪不得停手若停手即水銀別在一處石硫黃如灰死亦別在一處攪之良久硫黃成灰不見水銀即與伏龍肝和攪令調并和鹽末攪之令相得別取鹽末羅於鐺中令遍底厚一分許乃羅硫黃伏龍肝鹽末等於鐺中如覆蒸餅勿令全遍底羅訖乃更別羅鹽末覆之亦厚一分許即以盆覆鐺以灰鹽和土作泥塗其縫勿令乾裂裂即塗之唯令勿洩炭火氣飛之一復時開之用火先緩後急開訖以老雞羽掃取皆在盆上凡一轉後即分舊土為四

分以一分和成霜研之令調又加二兩鹽末準前法飛之訖弃其土又以餘一分土和飛之四分凡得四轉及初飛與五轉每一轉則弃其土五轉而土盡矣若須多轉更用新土依前法飛之七轉而可用之出第九卷中

麋角桃花粉方二首

崔氏鹿角粉方

取角三四寸截之乃向炊竈底燒一遍去中心虛惡者并除黑皮訖擣作末以絹篩下水和帛練四五重置角末於中絞作團大小任意於炭火中熟燒即將出火令冷又擣碎作末還以水和更以帛練四五重

敍作圓如此四五遍燒擣碎皆用水和已後更三遍
用牛乳和燒擣一依前法更擣碎於瓷器中用玉鎚
研作末將和桃花粉佳

又桃花粉方

光明砂　雄黃(並研)　真硃末
鷹糞　珊瑚　雲母粉　麝香(用當門子)
鹿角粉(無問多少各等分)

右九味研以細為佳就中鹿角粉多少許無妨

薰衣濕香方五首

千金濕香方

沉香(三分)　零陵香　棧香　麝香(各六分)
薰陸香(一分)　丁子香(二分)　甲香(半分以水洗熬)　甘松香(二分)
檀香(一分)　藿香(二分)

右十味麤擣下篩蜜和丸燒之為濕香薰衣(出第六卷中)

千金翼薰衣濕香方

薰陸香(八兩)　詹糖香(五兩)　覽探　藿香(各三兩)
甲香(二兩)　青桂皮(五兩)

右六味先取硬者粘濕難碎者各別擣或細切㕮咀使
如黍粟然後一一薄布於盤上自餘別擣亦別於其上有
須篩下者以紗不得太細別煎蜜就盤上以手搜擣令
勻後乃擣之燥濕必須調適不得過度太燥則難丸太
濕則難燒易盡則香氣不發難盡則煙多煙多則惟有
焦臭無復芬芳是故香須麤細燥濕合度蜜與香相稱
火又須微使香與綠煙共盡(出第五卷中)

備急六味薰衣香方

沉香　麝香(一兩)　蘇合香(一兩半)　丁香(二兩)
甲香(二兩酒洗蜜塗微炙)　白膠香(一兩)

右六味藥擣沉香令碎如大豆粒丁香亦擣餘香訖蜜
丸燒之若薰衣加艾納香半兩佳

又方

沉香(九兩)　白檀香(一兩)　麝香(二兩)　丁香(一兩二銖)
蘇合香(一兩)　甲香(二兩酒炙牟前)　薰陸香(一兩二銖和擣)　甘松香(一兩別擣)

右八味蜜和用瓷盛埋地底二十日出丸以薰衣

又薰衣香方

沉水香(一斤剉酒漬一宿)　棧香(五兩雞骨者)　甲香(二兩酒洗)　蘇合香(一兩細研)
麝香(一兩)　丁香(一兩半)　白檀香(一兩別研)

右七味擣如小豆大小相和以細羅羅麝香內中令調
以蜜器盛封三日用之七日更佳欲薰衣先於潤地陳
令浥浥上籠頻燒三兩大佳火炷籠下安水一椀燒訖
止衣於大箱中裹之經三兩宿後復上所經過處去後

今按崇雞香外香附千也 今按不須一作此須

猶得半日以來香氣不歇正觀年中勑賜此方

裛衣乾香方五首

千金乾香方

麝香　沉香　甘松香各二兩　丁香

馥香各一兩　藿香四兩

右六味合擣下篩用裛衣大佳 出第六卷中

千金翼裛衣乾香方

沉香　苜蓿香各五兩　白檀香三兩　丁香

藿香　青木香　甘松香各一兩　雞舌香一兩

零陵香十兩　艾納香二兩　雀頭香二兩　麝香半兩

右十二味各擣如黍粟麩糠勿令細末乃和相得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著盛熱暑之時香速浥凡諸香草不須及時乃佳若欲少作者準此為大率也 出第五卷中

備急裛衣香方

藿香　零陵香　甘松香各一兩　丁香二兩

右四味細剉如米粒微擣以絹袋盛衣箱中 南平公主方

又方

澤蘭香　甘松香　麝香各二兩　沉香

檀香各四兩　苜蓿香五兩　零陵香六兩　丁香六兩

右八味麤擣絹袋盛衣箱中貯之

又方

麝香研　蘇合香　鬱金香各一兩　沉香十兩

甲香四兩酒洗熬　丁香四兩　吳白膠香　詹糖香六兩

右八味擣以絹袋盛裛衣中香妙

外臺秘要方卷第三十二終

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十三卷目錄 婦人上三十七門

求子法及方一十二首
久無子方五首
養胎法幷禁忌一十三首
妊娠隨月數服藥及將息法一十九首
妊娠嘔吐及惡食方九首
妊娠胎動方九首
動胎腰腹痛方三首
頓仆胎動方四首
胎數傷及不長方三首

妊娠傷寒方四首
妊娠患瘧方二首
妊娠下痢方四首
妊娠心痛方八首
妊娠腹痛方二首
妊娠漏胞方五首
妊娠下血及尿血方七首
妊娠小便不通利方五首
妊娠子淋方五首
妊娠大小便不利方五首
妊娠子癇方二首
妊娠水氣方三首
損娠方六首
數墮胎方四首
妊娠得病欲去子方三首
落胎去胎方四首
產乳序論三首
年立成法一首
十二月立成法一首幷圖
推日遊法一首幷圖

體玄子爲產婦借地法一首
日曆法二首
安置產婦法二首
產難方二十四首
逆產方一十二首
橫產方四首
子死腹中欲令出方一十五首
胞衣不出方二十首

唐王燾先生外臺秘要方卷三十三

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

求子法及方一十二首

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五藏虛實交錯惡肉

內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或行步風來便利於懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也唯懷胎妊孕而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以爲病根深療之難差故養生之家特須教子女學此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免其夭枉者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也

又論曰人之性情皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昬爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德

合并本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相剋及與刑殺衝破并在子休廢死墓中生者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣禁忌法

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昬冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘂聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圊廁之側塚

墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絶一日三日五日為男仍遇男宿在貴宿日又以夜半後生氣時瀉精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以經絶後二日四日六日瀉精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十二日二十七日

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十二日二十八日

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五日十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日

六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日二十七日二十八日二十九日

七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日二十六日二十七日二十九日

八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十三日二十四日二十五日二十六日

九月三日六日十一日十六日十九日二十日二十一日二十二日二十四日

十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二十二日二十九日

十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九日二十六日二十九日

十二月四日九日十二日十二日十四日十五日十七日二十四日二十七日

若春合甲寅乙卯　夏合丙午丁巳　秋合庚申辛酉冬合壬子癸亥

與上件月宿日合者尤佳 出第二卷中

千金翼論曰夫求子者服藥須有次第不得不知其次第

謂男服七子散女服盪胞湯及上藥并服紫石門冬丸別
無不得効矣不知此者得力鮮焉其七子散盪胞湯紫石
門冬丸 出第五卷中在丈下千金并翼方中

廣濟療無子令子宮內炙丸方

麝香二分研 皂莢十分塗酥炙削去黑皮子 蜀椒六分汗

右三味擣篩蜜丸酸棗人大以綿裹內産宮中留少綿
綫出覺憎寒不淨下多即抽綿綫出却丸藥一日一度
換之無問晝夜皆內無所忌

又方

蛇牀子 石鹽 細辛 乾薑

土瓜根各四兩

右五味擣散取如棗核大以綿裹內子宮中以指進之
依前法中間病未可必不得近丈夫餘無所忌 並出第三卷中

又療婦人百病斷絕緒産白薇丸方

白薇 細辛 厚朴炙 椒汗
桔梗 鼈甲炙各五分 防風一 大黃
附子炮 石硫黃各六分研 牡蒙二分 人參
桑上寄生各四分 半夏洗 白殭蚕 續斷
秦艽 紫菀 杜仲 牛膝
䖟蟲去翅足熬 水蛭各二分 紫石英研 朴消

桂心 鍾乳 當歸各八分

右二十七味擣篩蜜丸空腹溫酒服如梧桐子十五丸
日二漸加至三十丸不過不利忌生冷油膩餳生血物
人莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭 出第二卷中

千金七子散療丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子 牡荆子 菟絲子 車前子
乾地黃 薯蕷 石斛 杜仲
鹿茸炙 遠志去心 菥蓂子各八分 附子炮
蛇牀子 芎藭各六分 山茱萸 天雄炮
黃耆 人參 茯苓 牛膝各五分

桂心十分 巴戟天十二分 蓯蓉七分 鍾乳三分

右二十四味擣篩爲散酒服方寸七日二服不知增至
二七以知爲度忌生冷酢滑猪雞魚蒜油膩不能酒者
蜜和丸服亦佳行房法一依素女經女人月信斷一日
爲男二日爲女三日爲男四日爲女已外無子仍每日
午時前半夜後陽時爲男下精欲得去玉門入半寸不
爾過子宮一方加覆盆子八分忌蕪荑生葱 經心錄并
翼同

又朴消盪胞湯療婦人立身已來全不生及斷緒久不産
三十年者方

朴消　牡丹　當歸　大黃
桃人(去皮尖生用各三兩)　細辛　厚朴(炙)　桔梗
芍藥　人參　茯苓　桂心
甘草(炙)　牛膝　橘皮(各二兩)　虻蟲(去翅足微熬)
水蛭(炙各六十枚)　附子(一兩半炮)
右十八味切以清酒五升水六升合煮取三升分四服
日三夜一每服相去三辰少時更服加常覆被取少汗
汗不出冬日著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁
本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月
水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱人困不

堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿
一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡
大好一日後仍著導藥(翼方無桔梗甘草並出第二卷中)
千金翼坐導藥方
皂莢(一兩炙去皮子)　大黃　戎鹽　礬石(燒)
當歸(各二兩)　五味子　乾薑(各三兩)　細辛(三兩)
蜀椒(二兩汗)　葶藶子　苦瓠(各三分千金作山茱萸)
右十一味擣篩內輕絹袋子如中指許大長三寸盛之
令滿內子門中坐任意勿行走急小便時即出之仍易
新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若
未見病出亦可至十日安之千金無葶藶一方又有砒
霜三分(廣濟同)著藥後一日乃服紫石門冬丸其方如
左
紫石英(七分研之)　天門冬(各二兩去心)　紫葳　甘草(炙)
桂心　牡荊子(千金作牡蒙)　烏頭(炮)　乾地黃
辛夷人　石斛　卷柏　禹餘糧
當歸　芎藭(各三兩)　烏賊魚骨　牛膝
薯蕷(各六分)　桑寄生　人參　牡丹皮
乾薑　厚朴(炙)　續斷　食茱萸
細辛(各五分)　柏子人(一兩)

右二十六味擣篩蜜和酒服十丸如梧桐子日三稍加
至三十丸廣如藥法(經心錄同并出第五卷中)
延年療婦人子藏偏僻冷結無子坐藥方
蛇牀子(三兩)　芫花(三兩)
右二味擣篩取棗大紗袋盛內產門中令沒指袋少長
便時須去任意臥著慎風冷(出第四卷中)
久無子方五首
廣濟療久無子白薇丸方
白薇　牡蒙　藁本(各五分)　當歸
乾地黃(各七分)　芎藭　人參　柏子人

石斛　桂心　附子炮　五味子
防風　吳茱萸　甘草炙　牛膝
桑寄生各六分　薑黃七分　禹餘糧八分　秦椒二分汗
右二十味擣篩蜜丸如梧桐子空腹酒下二十丸加至三十丸日再服不利忌生葱生菜熱麪蕎麥猪肉葵菜蕪荑粘食陳臭物等
又療久無子斷緒少腹冷疼氣不調地黃湯方
乾地黃　牛膝　當歸各八兩　芎藭
卷柏　防風各六分　桂心　牽牛子末各三分
右八味切以水六升煮取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛子末服如人行四五里更進一服以快利止忌熱麪蕎麥炙肉生葱蕪荑蒜粘食等物出第三卷中
千金療月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子金城太守白薇丸方
白薇　細辛各五分　人參　杜蘅
厚朴炙　牡蒙　半夏洗　白殭蠶
秦艽　當歸　紫菀各三分　牛膝
沙參　乾薑各三分　蜀椒汗　附子炮
防風各六分　古今錄驗不用杜蘅用牡蠣三分熬
右十七味末之蜜和丸先食服如梧桐子三丸不知稍

增至四五丸此藥不可將服覺有身則止用大驗忌餳猪羊肉冷水生葱生菜崔氏延年同　有桔梗丹參各三分出第二卷中
千金翼白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療之方
白薇　車前子各三分　當歸　芎藭
蛇牀子各四分　紫石英　菴䕡子　石膏
藁本　卷柏各五分　澤蘭　太一禹餘糧
覆盆子　桃人熬　白芷　麥門冬去心
人參各六分　桂心　蒲黃各十分　細辛
乾薑　乾地黃　椒汗各十二分　茯苓
赤石脂　遠志去心　白龍骨各八分　橘皮二分
右二十八味擣篩爲末蜜和酒服十五丸如梧桐子日再增至四十丸以知爲度亦可至五十丸慎猪雞魚蒜生冷酢滑生葱生菜蕪荑驢馬等肉覺有身則止禁秘之勿妄傳也出第五卷中
經心錄茱萸丸療婦人陰寒十年無子方
吳茱萸一升　蜀椒一升去目汗末
右二味蜜丸如彈子丸綿裹導子腸中日再易無所下但開子藏令陰溫即有子也出第六卷中

養胎法并禁忌一十三首

千金論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和性情節嗜慾庶事清靜生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

又論曰兒在胎日月未滿陰陽未備府藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

又妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

又妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

又妊娠食雀肉并豆醬令子滿面䵟䵳黑子

又妊娠食山羊肉令子多病

又妊娠食兔犬肉令子無音聲并缺脣

又妊娠食驢馬肉延月

又妊娠食椹并鴨子令子倒出心寒

又妊娠食騾肉難產

又妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

又妊娠勿向非常之地大小便必半產殺人

又妊娠勿食羊肝令子多厄

又妊娠勿食鱉令兒短項

又妊娠食冰漿絕產 並出第二卷中

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

千金妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂才正

又妊娠一月足厥陰脈養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜無令恐畏

又妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞一隻治如食法 茯苓二兩 吳茱萸一升

芍藥 白朮各三兩 麥門冬五合去心 人參三兩

阿膠二兩 甘草一兩炙 生薑一兩切

右十味切以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煮取三升內酒三升并膠烊盡取三升去滓溫服一升日三服

又若曾傷一月胎者當預服補胎湯方

細辛一兩 防風二兩 烏梅一升 吳茱萸五合

乾地黃 白朮各一兩 大麥五合 生薑四兩

右八味切以水七升煮取二升半去滓分溫三服若寒

多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根二兩若有所思去大麥加柏子人三合忌生菜蕪荑桃李雀肉等物一方人參一兩

又妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿近筋節背痛是謂胎始結

又妊娠二月足少陽脈養不可鍼灸其經足少陽內屬於膽膽主精二月之時見精成於胞裏當慎護驚動

又妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方

丹參三兩　當歸　人參　麻黃去節

艾葉　阿膠炙各二兩　甘草炙一兩　大棗十二枚擘

生薑一兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎取三升分溫三服忌海藻菘菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連　人參各一兩　吳茱萸五合　生地黃五兩

生薑三兩

右五味切以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌豬肉冷水蕪荑一方當歸半兩

又妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

又妊娠三月手心主脈養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔恚喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下雄雞湯方

雄雞一隻治如食法　甘草炙　人參　茯苓

阿膠各二兩　黃芩　白朮各一兩　麥門冬五合去心

芍藥四兩　大棗十二枚擘　生薑一兩切

右十一味切以水一斗五升煮雞減半內藥煮取半內清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫臥忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等一方當歸芎藭二兩不用黃芩生薑

又若曾傷三月胎者當預服茯神湯方

茯神　丹參　龍骨各一兩　阿膠

當歸　甘草炙　人參各二兩　赤小豆二十一粒

大棗十二枚擘

右九味切酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑

腹痛者加桑寄生二兩忌海藻菘菜（深師有蔥白二兩麻子一升）是謂
又妊娠四月始受水精以成血脉宜食稻秔羹魚鴈是謂
成血氣以通耳目而行經絡
又妊娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三
焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食
又妊娠四月爲離經有寒心下溫溫欲嘔胷膈滿不欲食
有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒
熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷心煩不得
安卒有所下菊花湯方

菊花（如雞子大一枚） 麥門冬（一升去心） 麻黃（三兩去節） 阿膠（三兩炙）

甘草（二兩炙） 當歸（二兩） 人參（一兩半） 生薑（五兩）
半夏（二兩洗） 大棗（十二枚擘）

右十味以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三
升分三服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日忌羊肉
海藻菘菜餳等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥（四兩） 甘草（炙） 芎藭 續斷（各一兩）
生李根白皮 柴胡 白朮（各三兩） 烏梅（一升）
當歸（一兩半） 生薑（四兩） 厚朴（炙） 枳實（炙各二兩）

右十二味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一八
日復服一劑一方半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉等
物

又妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深
其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛
羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五藏
又妊娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰內輸於
脾五月之時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自炙
熱無大勞倦
又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹
滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛

悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方（又方旋覆花湯）

阿膠（四兩炙） 人參（一兩） 麥門冬（一升去心） 生薑（六兩）
吳茱萸 旋覆花 當歸 芍藥
甘草（炙） 黃芩（各二兩）

右十味切以清酒三升以水九升煮減半內清酒三升
并膠微火煎取三升半分四服日三服夜一先食再服
便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草（炙） 芍藥（各三兩） 當歸 人參
乾地黃 芎藭（各二兩） 五味子（五合） 麥門冬（一升去心）

大麻人五合　生薑六兩　大棗三十五枚擘　黃芩一兩

右十二味切以水七升清酒五升煑取三升半分四服日三夜一七日復服一劑忌菘菜海藻蕪荑

又妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂

又妊娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫

驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥冬湯方

麥門冬一升去心　甘草炙　人參各一兩　乾地黃三兩

黃芩二兩　阿膠四兩　生薑六兩　大棗十五枚擘

右八味切以水七升煑減半內清酒二升幷膠煎取三升分三服每服如人行三四里中間進糜粥忌海藻菘菜蕪荑

又若曾傷六月胎當預服柴胡湯方

柴胡四兩　芍藥一方作紫葳　白朮　甘草炙各二兩

麥門冬三兩去心　茯苓一兩　芎藭二兩　乾地黃五兩

生薑六兩　大棗三十枚擘

右十味切以水一斗煑取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等一方用黃芩二兩

又妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食稉稻以密腠理是謂養骨而堅齒

又妊娠七月手太陰脉養不可鍼灸其經手太陰內屬於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若

傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方

葱白長三四寸十四枚　半夏洗　麥門冬去心各一升　生薑八兩

甘草炙　當歸　黃耆各三兩　阿膠四兩

人參一兩半　黃芩一兩　旋復花一把

右十一味切以水八升煮減半內清酒三升幷膠煎取四升溫服一升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉餳海藻菘菜等

又若曾傷七月胎者當預服杏人湯方

杏人去皮尖双人　甘草炙　鍾乳研各二兩　麥門冬去心

吳茱萸各一兩　乾薑二兩　五味子　粳米各五合
紫菀一兩
右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一中
間進食七日服一劑忌海藻菘菜
又妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是
謂密腠理光澤顏色
又妊娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明內屬於
大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒
失食無忍大起
又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動

不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或
黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫芍藥湯方
芍藥四兩　人參　當歸　甘草炙各三兩
白朮一兩　厚朴二兩炙　薤白切一升　生薑切四兩
右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再
夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等
又若曾傷八月胎者當預服葵子湯方
甘草炙三兩　芍藥二兩一方四兩　柴胡三兩　葵子二升
白朮三兩　生薑六兩　大棗二十枚擘　厚朴二兩
右八味切以水九升煮取二升分三服日三十日服一
劑忌海藻菘菜桃李雀肉等
又妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲
醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力
又妊娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰內屬於
腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷無著炙
衣
又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉
側短氣半夏湯方
半夏洗　麥門冬去心各五合　乾薑一兩　當歸
吳茱萸　阿膠炙各三兩　大棗十二枚擘

右七味切以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火
上溫分四服痢即止忌生血物餳等
又若曾傷九月胎者當預服猪腎湯方
猪腎一具　茯苓　桑寄生　乾薑
乾地黃　芎藭各三兩　白朮四兩　麥門冬一升去心
附子中者一枚炮　大豆三合
右十味切以水一斗煮腎令熱去腎內諸藥煎取三升
半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃
李雀肉酢物等
又妊娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使

關節人神皆備但俟時而生（集驗異年同並出第二卷中）

小品療姙娠五月日舉動驚愕動胎不安下在小腹痛引腰胳（公洛切腋下也）小便疼下血安胎當歸湯方

當歸　阿膠（炙）　芎藭　人參（各一兩）

大棗（十二枚擘）　艾（一虎口）

右六味切以酒水各三升合煮取三升去滓內膠令烊分三服腹中當小便緩差也（古今錄驗救急同出第七卷中）

姙娠嘔吐及惡食方九首

集驗療婦人姙娠惡阻嘔吐不下食湯方

青竹茹　橘皮（各五兩）　生薑　茯苓（各四兩）

半夏（五兩洗）

右五味切以水六升煮取二升半分三服不差頻作忌羊肉餳酢物等（千金婦心錄同）

又療姙娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮　竹茹　人參　白朮（各三兩）

生薑（四兩）　厚朴（二兩炙）

右六味切以水七升煮取二升半分三服不差重作忌桃李雀肉等（千金救急經心錄同出第十一卷中）

古今錄驗療姙娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯方

甘草（炙）　柴胡（各三兩）　麻黃（一兩去節煎去沫）　大棗（十二枚擘）

食茱萸（二升）

右五味切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三療食噫醋除熱下氣多所宜與上同但春秋冬夏去茱萸加枸杞一斤六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黃加乾薑一兩十月加芎藭三分

忌海藻菘菜

又療惡食人參湯方

人參（四兩）　厚朴（炙）　生薑　枳實（炙）

甘草（二兩各炙）

右五味切以水六升煮取三升分三服忌海藻菘菜（並出第三十四卷中）

崔氏半夏茯苓湯療姙娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢百節疼煩沉重多臥少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏（洗）　生薑（各五兩）　旋復花（一兩）　橘皮（二兩）

茯苓（二兩）　細辛　芎藭　人參

桔梗　甘草（各二兩炙）　芍藥（二兩）　乾地黃（三兩）

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌猪羊肉餳菘菜海藻生菜蕪荑

千金云若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客

熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩若變
冷下痢者除乾地黃用桂心二兩若食少胃中虛生熱大
便閉塞小便赤少者加大黃三兩除地黃加黃芩一兩餘
依方服一劑得下後消息看氣力冷熱更增損方調定更
服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也
又茯苓丸療妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣
便嘔逆吐悶顛倒四肢垂重不自勝持服之即効要先服
半夏茯苓湯兩劑後可將服茯苓丸方
茯苓 人參各一兩 桂心熬 橘皮
白朮 甘草炙 葛根熬 乾薑

半夏洗 枳實炙各二兩
右十味擣篩蜜和丸如梧桐子大飲服二十丸漸至三
十丸日三忌海藻菘菜羊肉餳桃李雀肉酢等 千金同
肘後只五味又云妊娠忌桂故熬 肘後不用乾薑半夏橘皮葛根
又療妊娠常苦煩悶此子煩也竹瀝湯方
竹瀝三兩 防風 黃芩 麥門冬去心各三兩
茯苓四兩
右五味切以水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差
重作忌酢物
又方 時時服竹瀝隨多少 出第十卷中

近効療妊娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐方
青竹茹 麥門冬去心各三兩 前胡二兩
陳橘皮一兩炙令黃焦香氣出佳 蘆根一握取肥白嫩者
右五味切以水二大升煮取半大升去滓分再服食後
一服無麥門冬用小麥三合煮之勿令裂即熟四肢煩
熱者加地骨皮醫人夏侯拯録
妊娠胎動方九首
廣濟主安胎胎病漏胞痛方
當歸 芎藭 阿膠炙 人參各一兩
大棗十二枚擘

右五味切以水三升酒四升合煮取二升半分三服五
日一劑頻服二四劑無所忌 出第三卷中
小品療妊娠重下痛引腰背安胎止痛湯方
當歸 阿膠炙 乾地黃 黃連
芍藥各一兩 雞子一枚 秫米一升
右七味切以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蟹目
沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑 經心錄同
又膠艾湯療損動母去血腹痛方
阿膠二兩炙 艾葉二兩
右二味以水五升煮取二升半分三服 出第七卷中經心錄同

集驗療妊娠胎動不安腹痛葱白湯方

葱白切一升 阿膠炙 當歸 續斷

芎藭各三兩 銀隨多少

右六味切以水一斗先煮銀取七升去銀內餘藥煎取二升半內膠令烊分三服不差更作千金同

又療妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

艾葉 阿膠炙 芎藭 當歸各三兩

甘草一兩炙

右五味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分三服日三千金文仲備急同

又療妊娠六七月胎不安常處旋復花湯方

旋復花一兩 厚朴炙 白朮 枳實炙

黃芩 茯苓各三兩 半夏洗十遍 芍藥

生薑各二兩

右九味切以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜一忌羊肉餳醋桃李雀肉等千金同出第十一卷中

删繁療女人懷娠胎動不安葱豉安胎湯方

香豉一升 葱白切一升 阿膠炙二兩

右二味切以水三升煮二物取一升去滓下阿膠更煎膠烊服一日一夕可服三四劑出第七卷中經心錄同

文仲徐王効神驗胎動方

當歸六分 芎藭四分

右二味切以水四升酒三升半煮取三升分三服若胎死即出比用神驗血上心腹滿者如湯沃雪救急經心錄同崔氏用水醋二升煮二十沸服

又安胎寄生湯療流下方

桑上寄生五分 白朮五分 茯苓四分 甘草十分炙

右四味切以水五升煮取二升半分三服若人壯者可加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑四分即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等崔氏小品經心同出第七卷中

動胎腰腹痛方三首

廣濟療婦人妊娠動胎腰腹痛及血下方

當歸三兩 葱白切一升 芎藭三兩 艾葉二兩

鹿角膠二兩炙 苧根三兩

右六味切以銀汁一斗煮取三升絞取滓內膠上火膠烊分三服服別相去如人行六七里未好差停一日更進一劑無所忌出第三卷中

小品苧根湯療勞損動胎腹痛下血胎動向下方

苧根　乾地黃各二兩　當歸　芍藥
阿膠炙　甘草炙各一兩
右六味切以水六升煮取二升去滓內膠烊分三服忌
海藻菘菜蕪荑出第七卷中
救急療姙娠動胎去血腰腹痛方
芎藭　阿膠炙　當歸　青竹茹各三兩
右四味切以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥煎
取二升半分三服日再夜一不差更作一劑集驗千金文仲古今
録驗備急等同出第四卷中
頓仆胎動方四方

集驗療姙娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安傷
損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方
當歸　芎藭　甘草炙　阿膠炙
芍藥各二兩　艾葉三兩　乾地黃四兩
右七味切以水五升好酒三升合煮取三升去滓內膠
更上火令膠烊分三服日三不差更作忌海藻菘菜蕪
荑文仲同出第十一卷中
文仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方
擣黃連下篩酒服方寸匕日二愈血乃止忌猪肉冷水
等物

又方
赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆中更
熬令黃黑末和酒服一匕日三服
又方
膠三兩炙　當歸二兩　甘草二兩炙
右三味切以水五升煮取二升分再服忌菘菜海藻並出
第七卷中
胎數傷及不長方三首
廣濟療婦人懷姙數傷胎方
鯉魚二斤　粳米一升

右二味如法作臛少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月
中頓三過作効安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年同出第三卷中
集驗療婦人懷胎不長方
鯉魚長一尺者水漬沒內鹽如棗煮令熟取汁稍稍
飲之當胎所腹上當汗如鼻狀雖有所見胎雖不安
者十餘日輒一作此令胎長大甚平安出第十一卷中
古今録驗療姙娠養胎白朮散方
白朮　芎藭各四分　蜀椒三分汗　牡蠣二分
右四味擣下篩酒服滿一錢匕日三夜一但苦痛加芍
藥心下毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半

夏大錢二十枚服之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋
漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴大麥
粥服之病雖愈盡服之勿置忌桃李雀肉等（裴伏張仲景方出第十一卷中）

妊娠傷寒方四首

廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱支節煩疼方

前胡 知母各三兩 石膏五兩 大青
黃芩 梔子各一兩 葱白一升切

右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分三服服
別相去如人行七八里再服不利忌熱麪羊肉（集驗文仲備急

救急同出第三卷中）

千金療妊娠傷寒方

葱白十莖 生薑二兩切

右二味以水三升煮取二升半頓服取汗

又方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸七取汗（並出第二卷中）

救急療婦人妊娠十月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血
方

升麻 梔子仁各四兩 大青 杏人去皮尖
黃芩各三分 葱白切一升

右六味切以水六升煮取半分三服（出第四卷中）

妊娠患瘧方二首

集驗療妊娠患瘧湯方

常山二兩 甘草一兩炙 黃芩三兩 烏梅十四枚碎
石膏八兩

右五味切以水一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初
服六合次服四合後服二合凡三服忌海藻菘菜生葱（千金救急古今錄驗同）

千金妊娠患瘧方

常山 竹葉各三兩 石膏八兩碎 糯米一百粒

右四味切以水六升煮取二升半去滓分三服第一服
未發前一食久服之第二服取臨欲發餘一服用塗頭
額及胸前五心藥滓置頭邊當一日勿進水及進飲食
過發後乃進飲粥忌生葱菜（集驗文仲備急同出第二卷中）

妊娠下痢方四首

千金療妊娠下痢方

白楊皮一斤以水一大升煮取二小升分三服

又妊娠及產已寒熱下痢方

黃連一升 梔子二十枚擘 黃蘗一斤

右三味切以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜

令盡嘔者加橘皮一把生薑二兩翼同並出第二卷中

文仲療姙娠下痢不止方

黃蘗　乾薑　赤石脂各二兩　石榴皮一具

右四味切以水八升煑取二升分三服出第七卷中

古今錄驗療姙娠下痢方

酸石榴皮　黃芩　人參各三兩　榉皮四兩

粳米三合

右五味切以水七升煑取二升半分二服千金經心錄同出第三十四卷中

姙娠心痛方九首

千金療姙娠心痛方

青竹茹一升　羊脂八兩　白蜜三兩

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日三服

又方

蜜一升和井底泥泥心下

又方

青竹皮一升酒二升煑三沸頓服之

又方

破雞子一枚和酒服之

又方

麻子三升水八升煑取五升分三服

又方

橘皮三兩　豉二兩

右二味擣為丸如梧桐子服二七丸

又方

燒牛屎焦末水服方寸匕日三並出第二卷中

文仲葛氏療姙娠卒胎上迫心痛方

取弩弦急帶之立愈出第七卷中

古今錄驗療姙娠卒得心痛欲死朮湯方

白朮六兩　黃芩三兩　芍藥四兩

右三味切以水六升煑取二升半分三服半日令盡微下水令易生忌桃李雀肉出第三十四卷中

姙娠腹痛方二首

千金療姙娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁酒一升合煎減半頓服

又方

燒車釭脂末內酒中服又服一升蜜良並出第二卷中

古今錄驗療姙娠腹痛或是冷痛或是胎動葱白當歸湯方

葱白一虎口　當歸三兩

右二味切以水酒共五升煮取二升分再服亦將小便服相去一炊頃出第三十四卷中

姙娠漏胞方五首

小品療姙娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎視說要知如此小豆散療數傷胎將用之方

赤小豆五升濕地種之令生牙乾之

右一物下篩懷身數月日經水尚來以溫酒服方寸匕日三得効便停千金救急經心錄同出第七卷中

集驗姙娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

雞子十四枚取黃以好酒二升煮使如餳一服之

又方

生地黃汁一升酒四合合煮三四沸頓服之不止頻服救急千金文仲備急古今錄驗經心錄同並出第十一卷中

崔氏療姙娠漏胞方

乾地黃四兩　乾薑二兩

右二味擣篩酒服方寸匕日再服集驗文仲經心錄同

又方

乾地黃擣末以三指撮酒服之不過三服甚良千金同並出第十卷中

姙娠下血及尿血方五首

千金療姙娠卒下血方

葵子一升

右一味以酒五升煮取二升分三服差

又方

生艾葉一升

右一味以酒五升煮取二升分三服冬用莖

又方

生地黃切一升

右一味以酒四升煮取二升分三服亦療落身後血

又方

燒秤錘令赤內酒中沸定取出飲之

又方

葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三並出第二卷中

又仲療姙娠下血方

取黍穰燒末服一匕日三出第七卷中千金云黍莖

古今錄驗療姙娠下血豆醬散方

豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸匕日五六服出第三十四卷中

姙娠小便不通利方五首

千金療姙娠小便不通方

蕪菁子七合擣爲末水和方寸匕服日三 出第二卷中

千金翼療姙娠小便不利方

葵子一升 榆白皮一把

右二味以水五升煮五沸服一升日三服 千金同

又方

葵子 茯苓各一兩

右二味爲散水服方寸匕日三小便利止 千金同並出第五卷中

古今錄驗療姙娠卒不得小便方

杏人二十枚去皮尖熬令變色

右一味擣服如大豆大七枚立得利

又療姙娠不得小便方

滑石水和泥臍二寸 並出第三十四卷中

姙娠子淋方五首

小品療姙娠患子淋宜下地膚大黃湯

地膚草 大黃各三兩 知母 黃芩

茯苓作猪苓 芍藥 枳實炙 升麻

通草 甘草炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分三服得下後淋不好

差還飲地膚葵根汁忌海藻菘菜酢物

又方

猪苓五兩

右一味擣篩以白湯三合和方寸匕爲一服漸至二匕

日三夜二盡不差宜轉下之服甘遂散 出第七卷中甘遂散在姙娠大小便不利中

千金療姙娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服 經心錄同

又方

葵根一把水三升煮取二升分再服 出第二卷中

經心錄療姙娠患子淋小便數出少或熱痛酸疼及足腫

地膚飲方

地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服日三夜

一劑 文仲小品同 出第六卷中

姙娠大小便不利方五首

小品療姙娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差

宜服甘遂散下之方

太山赤皮甘遂二兩

右一味擣篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩

得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服

漸加可至半錢匕以微下爲度中間將猪苓散黃蘗寄

生湯在療子淋方中（經心錄同出第七卷中子淋方中唯有豬苓散無黄葵寄生湯）

古今錄驗療姙娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎除熱葵子湯方

葵子二升　滑石四兩碎

右二味以水五升煮取一升盡服須臾當下便愈（同第二十四卷中）

姙娠子癇方二首

小品療姙娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦仍不醒者名爲痙病亦號子癇病亦號子冒葛根湯若有竹近可速辦者當先作瀝汁後辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦

湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸痙絕起死也非但偏療姙娠產婦絕死者有勁小兒忽癇痓金瘡療之亦驗

作竹瀝法

取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片以塼竝側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出以器承之取服

又主痙冒葛根湯療姙娠臨月因發風痓忽悶憒不識人吐逆眩倒小醒復發名爲子癇病方

貝母　葛根　丹皮去心　木防已

防風　當歸　芎藭　桂肉切熬

茯苓　澤瀉　甘草炙各二兩　獨活

石膏碎　人參各三兩

右十四味切以水九升煮取三升分二服貝母令人易産若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢（並出第七卷中）

姙娠水氣方三首

集驗療婦人姙娠手腳皆水腫攣急方

赤豆五升　商陸根一斤切　一方加澤漆一斤

右三味以水三斗煮取一斗常稍稍飲之盡更作（千金同出第十一卷中）

千金療姙娠腹大胎間有水氣生魚湯方

生鯉魚一斤　生薑五兩　白朮二兩　芍藥

當歸各三兩　茯苓四兩

右六味切以水一斗二升煮魚熟澄清取八升內藥取三升分二服忌桃李雀肉酢物等（集驗同出第　卷中）

崔氏療姙娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓　白朮各四兩　旋復花二兩　杏人去皮尖

黄芩各二兩

右五味切以水七升煮取二升半分二服飲之忌桃李雀肉酢物等（千金救急古今錄驗集驗同出第十卷中）

損娠方六首

廣濟療婦人因損娠下血不止方
當歸　白龍骨　乾地黄各八分　地榆
阿膠　芍藥　乾薑各六分　熟艾四分
牛角䚡十分炙令黄　蒲黄五分
右十味擣篩爲散空腹以飲服方寸匕日二服漸加至二匕差止不吐利忌生冷油膩猪魚蒜蕪荑出第三卷中
千金落娠胎墮下血不止方
丹參十二兩
右一味切以酒五升煮取三升分三服集驗文仲備急同出第二卷中
又方
地黄汁和代赭末服方寸匕

又方
桑蝎蟲屎燒酒服方寸匕並出第四卷中
救急療損娠方
取朱砂末一錢匕生雞子三顆打取白和朱砂頓服胎若死即出如未死即安出第五卷中
古今録驗療婦人墮娠血不盡來去喜煩滿鹿角屑豉湯方
鹿角屑熬一兩　香豉一升半
右二味以水三升煮令一沸漉去滓然後内鹿角屑攪令調頓服須臾血下出第三十七卷中
數墮胎方四首
删繁療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之源黄耆散方
黄耆　吳茱萸　乾薑　人參
甘草炙　芎藭　白朮　當歸
乾地黄各二兩
右九味擣散清酒服一匕半日再服加至兩匕爲劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等經心録同出第七卷中
千金療妊娠數墮胎方
妊娠三月灸臍下一寸七壯

又方
赤小豆末酒服方寸匕日二亦主妊娠數月月水尚來者並出第二卷中
經心録紫石門冬丸主風冷在子宮有子常落或始爲婦便患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悦令人有子方
遠志去心　澤瀉　肉蓯蓉　桂心各二兩
紫石英　天門冬去心　五味子二兩　禹餘糧
蜀椒汗　烏頭炮　卷柏　烏賊骨
寄生　石南　當歸各一兩　杜仲

甘草炙 石斛 柏子人 芎藭
人參各二兩 雲母一兩燒
右二十二味末之以蜜丸酒服二十丸如梧桐子稍加
至三十四十丸日三忌海藻菘菜豬肉冷水生葱鯉魚
千金同出第六卷中
妊娠得病欲去子方三首
小品療妊娠得病事須去胎方 通按麥芽消食墮胎如神凡有孕者不可妄用
麥蘖一升末和煮二升服之即下神效
又方
七月七日法麴三升煮兩沸宿不食旦頓服即下 並出第二

卷中
文仲療妊娠得病欲去胎方
取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出 此與阮河南療產難同肘後千金出第七卷中○經心錄同
落胎去胎方四首
廣濟療落胎方
栝樓四兩 桂心五兩 牛膝三兩 瞿麥二兩
右四味切以水七升煎取二升三合去滓分三服服別
如人行八九里進之無忌
又方
取牛膝六七莖綿纏搥頭令碎深內至子宮頭忌生
葱豬牛肉 並出第三卷中
小品療羸人欲去胎方
甘草炙 乾薑 人參 芎藭
生薑 桂心 蟹爪 黃芩各一兩
右八味切以水七升煮取二升分三服忌海藻菘菜生
葱 出第七卷中
千金欲去胎方
大麴五升清酒一升煮三沸去滓令盡分五服當宿
勿食旦再服其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳

出第三卷中
產乳序論三首
崔氏夫人生壽夭雖有定分中間枉橫豈能全免若調攝
會理或可致長生若將護乖方乃胎乳傷促且中人之性
識異弘遠言及產育情多鄙之都未知此道幽深博施處
廣僕妾帷之服頗敦經史逮乎藥術彌復闕懷今歷選群
方兼申短思苟非切要詎能載錄晚遘職孤城空莊四絕
尋醫訪道理闕多疑豈得坐而相守以俟其斃此書所記
故錄於此蓋擬備諸私室未敢貽厥將來必有以為要亦
所不隱也余因披閱崔公調氣方中見崔公北平陽道慶

者其一妹二女並皆產死有兒婦臨月情用憂慮入山尋余請覓滑胎方余報言少來多遊山林未經料理此事然當爲思量或應可解慶傳一宿余轍憶想畜生之類緣何不聞有產死者蛭女偷生賤婢獨產亦未聞有產死者此當由無人逼佐得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚居女婦輩當由兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其驚怖驚怖畜結生理不和和氣一亂痛切唯甚傍人見其痛甚便謂至時或有約髻者或有力腹者或有冷水潠面者努力强推兒便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致運絕更非他緣至且以此意語慶慶須受無所聞然猶苦見

逆同家乃更與相隨停其家十餘日日晡時見報云兒婦腹痛似是產候余便教屏除牀案遍一房地布草三四處懸繩繫木作衙度高下令得蹲當腋得憑當衙下敷慢氊恐兒落草誤傷之如此布置訖令產者入位語之坐臥任意爲其說方法各有分理順之則全逆之則死安心氣勿怖强此產亦解人語語訖閉戶戶外安牀余共慶坐不令一人得入時時隔戶問之何似答言小痛可忍至一更令爛煮自死牝雞取汁作粳米粥粥熟急手攪使渾渾適寒温勸令食三升許至五更將末便自產聞兒啼聲始聽人入產者自若安穩不異云小小痛來便放體長吐氣痛即

止盡任分和氣之効也慶問何故須食雞肉汁粥答云氣羸性滑而濡庶使氣滑故耳問何不與肉答云氣將下恐肉不卒消爲妨問何故與粥答云若飢[illegible]產理不欲令氣上故耳慶以此爲產術之妙所傳之處無不安也故知縱公隱思妙符神理然則日遊反支之類復何豫哉但以婦人性弱臨產驚遽若不導以諸法多恐志氣不安所以備諸家方法備題如左其間取捨各任量裁

凡婦人產雖必須先備此等推所設月日知犯忌各須豫愼不得犯之其交應須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經營入月即須使足若不豫備臨急用速事必致闕唯舊經

事者始達此言豫備不虞古之善教也

又凡產者雖是穢惡然將痛之時及未產已產皆不得令死喪污穢家人來視之必產難若已產者則傷子

又凡產法唯須熟忍不得逼迫要須兒痛欲出然後抱腰傍人不得驚擾浪作形勢但此事縱公法中已經商畧無用師巫妄述已能横相牽挽失其本性今故重述特宜防也

崔氏年立成圖法一首

女人年十三
行年在庚申反支在正月七月禍害在東方
禹絕命在東南巽生氣在西南坤宜巽西南
黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首
懸尸在庚戌日閉肚在辛八壯在申

女人年十四行年在巳亥反支在八月二月禍害在西南坤絕命在西南兌生氣在南方宜與南方赤衣師看產產婦著赤衣臥南首懸尸在卯酉日開壯在壬入壯在癸

女人年十五行年在戊午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜與北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首懸尸在寅申日開壯在癸八壯在壬

女人年十六行年在丁巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜與東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在丑未日開壯在申入壯在午

女人年十七行年在丙辰反支在五月十一月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜與東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在子午日開壯在乙入壯在庚

女人年十八行年在乙卯反支在六月十二月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜與西北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥西北首懸尸在巳亥日開壯在丙八壯在丁

女人年十九行年在甲寅反支在正月七月禍害在東南巽絕命在南方离生氣在西方兌宜與西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首懸尸在辰戌日開壯在丁八壯在丙

女人年二十行年在癸丑反支在二月八月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜與東南方青衣師看產產婦宜著青衣臥東南首懸尸在卯酉日開壯在庚八壯在乙

女人年二十一行年在壬子反支在三月九月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜與西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首懸尸在寅申日閉壯在辛入壯在甲

女人年二十二行年在辛亥反支在四月十月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方离宜與南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首懸尸在丑未日開壯在子入壯在癸

女人年二十三行年在庚戌反支在五月十一月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜與北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首懸尸在子午日開壯在癸八壯在壬

女人年二十四行年在巳酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣東方震宜與東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在巳亥日閉壯在甲八壯在辛

女人年二十五行年在戊申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜與東北黃衣師看產產婦著黃衣臥東北首懸尸在辰戌日閉壯在乙入壯在庚

女人年二十六行年在丁未反支在二月八月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜與西北方白衣師看產產婦宜著白衣臥西北首懸尸在卯酉日閉壯在丙八壯在丁

女人年二十七行年在丙午反支在三月九月禍害在東南巽絕命在南方离生氣在西方兌宜與西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首懸尸在寅申日閉壯在丁入壯在丙

女人年二十八行年在乙巳反支在四月十月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜與東南青衣師看產產婦宜著青衣臥東南首懸尸在丑未日閉壯在庚入壯在乙

女人年二十九行年在甲辰反支在五月十一月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜與西南黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首懸尸在子午日閉壯在辛入壯在甲

女人年三十行年在癸卯反支在六月十二月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方离宜與南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首懸尸在巳亥日開壯在壬入壯在癸

女人年三十一行年在壬寅反支在正月七月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜與北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首懸尸在辰戌日開壯在癸八壯在壬

女人年三十二行年在辛丑反支在二月八月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜與東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在卯酉日開壯在甲入壯在辛

女人年三十三行年在庚子反支在三月九月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜與東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在寅申日開壯在乙八壯在庚

女人年三十四行年在乙亥反支在四月十月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣臥西北首懸尸在丑未日閉肚在丙八壯在丁

女人年三十五行年在戊戌反支在五月十一月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首懸尸在子午日閉肚在丁八壯在丙

女人年三十六行年在丁酉反支在六月十二月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣臥東南首懸尸在巳亥日閉肚在庚八壯在乙

女人年三十七行年在丙申反支在正月七月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首懸尸在辰戌日閉肚在辛八壯在甲

女人年三十八行年在乙未反支在三月八月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首懸尸在卯酉日閉肚在壬八壯在癸

女人年三十九行年在甲午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首懸尸在寅申日閉肚在癸八壯在壬

女人年四十行年在癸巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產婦宜著青衣臥東首懸尸在丑未日閉肚在甲八壯在乙

女人年四十一行年在壬辰反支在五月十一月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在子午日閉肚在乙八壯在庚

女人年四十二行年在辛卯反支在六月十二月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在巳亥日閉肚在丙八壯在丁

女人年四十三行年在庚寅反支在正月七月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方白衣師看產產婦宜著白衣臥西北首懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

謹按八壯總作八肚雖下文

女人年四十四行年在己丑反支在二月八月禍害在西南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年四十五行年在戊子反支在三月九月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣臥東南首懸尸在寅申日閉肚在申八壯在甲

女人年四十六行年在丁亥反支在四月十月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年四十七行年在丙戌反支在五月十一月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬

女人年四十八行年在乙酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年四十九行年在甲申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在辰戌日閉肚在乙八壯在庚

凡禍害絕命上產婦不可向之大小便又不得向產犯者凶產後血不止

凡生氣之上宜產婦向之坐令兒長壽母子俱吉

凡閉肚之上臨月及已產未滿月皆不得向其處大小便及棄不淨水犯者令人閉塞難產失顏色腹痛面痿黃令臍絞痛咽喉不利凶

凡八壯之地產婦廬帳門不得向之開又不得於其處產令閉塞難產大凶

冝易入
産婦産

凡運鬼力士犯者令産婦遲悶至欲産日宜解袋口即易産吉

凡反支月不得使血露汚地或令子死腹中或産不順皆須先布灰草然後敷馬驢牛皮於其上産吉

凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉

凡行年本命相值也攀轡吉

十二月立成法一首 并圖

正月三月五月七月九月十一月福德在丙壬

二月四月六月八月十月十二月福德在甲庚

夫人臨産必須避諸凶神逐月空福德之地若神在外於舍内産若在内於舍外産令於 福德及空地爲産帳其舍内福德處亦依帳法

南
二月節
在甲庚
北
東
西

南
三月節
在丙壬
北
東
西


南
四月節
在甲庚
北
東
西

南
五月節
在丙壬
北
東
西

七月空
在丙壬
北
東

六月空
在甲庚
北
東
亥雷公

九月空
北
東

八月空
北
東
亥天狗天候

十二月空
在甲庚
北

在甲庚
北

大時招搖咸池吳時雷公豐隆軒轅月白虎大夫狂虎天
侯天狗運鬼力士等十三神日別具注如犯產婦犯之大
凶宜依月空處坐吉其兒衣亦依天德月空之處藏之吉
但臨產及未滿月皆不得在懸尸閉肚之上小便亦不得
棄浣衣不淨水慎之仍不得以雜物棄其上

推日遊法一首

日遊圖

常以癸巳日入內宮一十六日至巳酉日出癸巳甲午乙
未丙申丁酉在紫微北宮
戊戌巳亥庚子辛丑壬寅在南宮
癸卯一日在天廟西宮
甲辰乙巳丙午丁未戊申在御女東宮
右日遊在內產婦宜在外別於月空處安帳產吉
巳酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅在外東北維
乙卯丙辰丁巳戊午巳未在外東方
庚申辛酉壬戌癸亥甲子乙丑在外東南維
丙寅丁卯戊辰巳巳庚午在外南方

辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子在外西南維
丁丑戊寅巳卯庚辰辛巳在外西方
壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥在外西北維
戊子巳丑庚寅辛卯壬辰在外北方
右日遊在外宜在內產吉凡日遊所在內外方不可向
之產凶

體玄子為產婦借地法一首

東借十步　西借十步　南借十步
北借十步　上借十步　下借十步

辟方之中擬當四十餘步此中產婦安居無所妨礙無所

長忌諸神擁護百鬼速去急急如律

右借法及所投月郎寫一本貼著產婦所居正中北壁上更不須避日遊反支及諸神等此頻用有驗故錄耳

日曆法二首

甲子日在內西向東北西南二角吉

丙寅日在內西向西南西北二角吉

戊辰日在內西向西南西北二角吉

庚午日在內西向西北東北二角吉

壬申日在內西向東南東北二角吉

甲戌日在內西向東南西南二角吉

乙丑日在內西向西南西北東南三角吉

丁卯日在內西向西南西北二角吉

己巳日在內西向西北東北二角吉

辛未日在內西向西北東南東北三角吉

癸酉日在內西向西北東北東南三角吉

乙亥日在內西向東北西南二角吉

丙子日在內西向西南東北二角吉

戊寅日在外西向西北西南一角吉

庚辰日在內西向東北西北二角吉

壬午日在內西向西南東北二角吉

甲申日在內西向東南西北二角吉

丙戌日在內西向東北西南二角吉

戊子日在內西向西南東北二角吉

庚寅日在內西向東南西北二角吉

壬辰日在內西向西南東北二角吉

甲午日在外西向西南西北二角吉

丁丑日在內西向西南西北東南三角吉

己卯日在外西向東南西南西北三角吉

辛巳日在內西向西北西南東北三角吉

癸未日在內西向東南東北二角吉

乙酉日在內西向東南西北東北三角吉

丁亥日在內西向東北西南東南三角吉

己丑日在內西向東南西南西北三角吉

辛卯日在內西向東南西北二角吉

癸巳日在外西向西南東北西北三角吉

乙未日在外西向東南西北東北三角吉

丙申日在外西向西北東北二角吉

戊戌日在外西向東北西南二角吉

庚子日在外西向東南東北二角吉

壬寅日在外西向東南西南二角吉

甲辰日在外西向西南西北二角吉

丙午日在外西向西南東北南北三角吉

戊申日在外西向西北東北二角吉

庚戌日在外西向東北東南二角吉

壬子日在內西向東南東北西南三角吉

甲寅日在內西向東南西北二角吉

丁酉日在外西向西北東南東北三角吉

己亥日在外西向東北東南西南三角吉

辛丑日在外西向東南西北西南三角吉

癸卯日在外西向東南西南西北三角吉

乙巳日在外西向西北西南東北三角吉

丁未日在外西向西北東南東北三角吉

己酉日在外西向東南西北東北三角吉

辛亥日在內西向東南西南二角吉

癸丑日在內西向東南西南二角吉

乙卯日在內西向東南西南西北三角吉

丙辰日在內西向西南西北東北三角吉

戊午日在外西向西南西北東北三角吉

庚申日在內西向西北東南東北二角吉

壬戌日在內西向東南西北二角吉

丁巳日在內西向西南西北東北三角吉

己未日在外西向西北東南東北三角吉

辛酉日在內西向西北東南東北三角吉

癸亥日在內西向西南東北二角吉

凡日曆十二辰並有神殺禁忌不可向產日別須備看

凡甲乙日生子勿著白衣宜著黑衣吉臥無西首勿庚辛日起

丙丁日生子勿著黑衣宜著青衣臥無北首勿壬癸日起

戊巳日生子勿著青衣宜著赤衣臥無東首勿甲乙日起

庚辛日生子勿著赤衣宜著黃衣臥無南首勿丙丁日起

壬癸日生子勿著黃衣宜著白衣臥無西首勿戊巳日起

湛按舌青宜作舌赤血青爲死血之訛子安得活

安置産婦法二首

凡欲産時先以朱砂點産婦項後宛宛中又點鼻孔閒柱兩傍宛宛中牛穿据處即向産處呪之曰此地空閒安居産婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去與相觸忤三呪之訖即燒火於産處四方以井華水四器亦置産處四方各橫刀於水上其刀浮磨拭之又法捉一刀子先向産處呪曰一尺刀子七寸刄拒以反支而治遲如此三呪訖釘刀子著産處地上然後坐産 已上並出第十上卷中

産難方二十四首

崔氏凡婦人産難死生之候母面赤舌青者兒死母活母

面赤舌赤口中沫出者母死兒活母脣口青口兩邊沫出者母子俱死 文仲同出第十七卷中

廣濟療難産三日不出者方

取死鼠頭燒作屑井花水服 千金崔氏救急同

又方

槐子十四枚蒲黃一合內酒中溫服須臾不生更服之 千金集驗崔氏同

又方

吞生雞子黃三枚幷少苦酒 崔氏集驗備急文仲同

又方

吞皂莢子二枚亦効 千金崔氏小品同並出第三卷

小品療産難歷日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆二升 阿膠二兩

右二味以水九升煮豆令熟取汁內膠令烊一服五合不覺不過再服即産 崔氏千金同

又方

取馬銜一枚覺痛即令左手持之 崔氏同

又方

取槐東引枝手把之 崔氏同

又方

手捉鵄鷂頭甚驗 崔氏同並出第七卷中

集驗若日月未至而欲産者方

末知母蜜和兎屎大服一丸痛不止更一丸 千金崔氏小品同

又方

取夫衣帶五寸燒作灰酒服立下 崔氏廣濟文仲同並出第七卷中

備急療難産方

取槐子吞三枚 崔氏同

又方

取登柄入孔裏者燒末酒服之立下 崔氏同

又方

弓弦三寸箭簳二寸各燒末酒服之

又方

取羖羊角屑燒末酒服之千金崔氏

又若母已死兒子不出方

但以水銀如彈丸格口內喉中捧起令下食頃又捧令起子便落崔氏同

又方

擣蒲根絞取汁一二升灌口中此亦治母生子死驗崔氏同

又療母子俱死者產難及胎不動轉者方

榆白皮三兩　葵子五合　甘草炙　桂心各一兩

右四味切以水四升煮取二升服一升須臾不產更服一升忌海藻菘菜生葱崔氏小品同

又產難數日欲絕秘方

書奏作兩行字凡二十字文曰帝乙生子司命勿止即出其胞及其子無病其母封其中央以朱印之令產婦持之崔氏小品同

又產難六七日母困方

取好膠二兩清酒一升半微火烊膠內新雞卵一枚鹽一寸匕相和頓服即產不產更服崔氏同

又產難母如死不知人事方

用陳葵子末三指撮酒服口噤者去齒下藥即愈立驗崔氏同

又療婦人產難方

書紙曰坐為蒲卧為魚女屬母兒屬夫急急如律令即產婦吞之又書兩道兩手各執一凡書三本崔氏同並出第一卷中

救急療產難方

取厠前用草二七枚燒作屑服之千金崔氏同崔氏云日用驗

又方

取牛屎中大豆書一片作入字一片作出字還合吞之良崔氏同並出第四卷中

千金療難產方

令夫唾婦口中二七過立下集驗崔氏同出第十卷中

逆產方一十二首

小品療逆產方

鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上即愈崔氏千金集

又方

鹽和粉塗兒脚足下即順矣 千金崔氏同

又方

又彈丸二枚擣末三指撮溫酒服 集驗千金崔氏同並出第七卷中

集驗療逆產方

燒錢令赤內酒中飲之 崔氏同

又方

夫陰毛二七枚燒以猪膏和丸如大豆吞兒手即持丸出神驗 千金崔氏同

又方

朱書左足下作千字右足下作黑字 崔氏同

又方

生不出手足先見燒蛇脫皮末服刀圭亦云三指撮面向東酒服即順 崔氏千金同

又方

真丹刀圭塗兒蹠下 崔氏同

又方

以手中指取釜底黑煤交畫兒足下順出 千金文仲崔氏備急同並出第十一卷中

刪繁療逆產難產數日不出者方

取桃人中破書一片作可字一片作出字還合吞之

崔氏同

又療逆產方

取車肚中膏畫腋下及掌心 崔氏文仲備急小品千金集驗同

又療逆產胞衣不出方

取竈屋上黑塵酒服之 千金崔氏同並出第七卷中

橫產方四首

小品療橫產及側或手足先出方

可持麤鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當廻順 文仲備急千金崔氏集驗同

集驗療橫生方

取梁上塵三指撮酒服之 千金文仲崔氏同出第十一卷

文仲療縱橫不可出

用菟絲子末酒若米汁服方寸匕即出車前子亦好服如上法 千金崔氏同

又方

服水銀如大豆一枚 備急崔氏同

右以前橫產逆產二條條流雖別療法蓋同可以意量逐善參用也

子死腹中欲令出方一十五首

集驗療子死腹中方

真珠二兩酒服盡立出崔氏同

又方

取竈下黃土三指撮酒服之立出當著兒頭上千金崔氏文仲同

又療胎死在腹方

取三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合煮令產婦面東向飲之立出千金備急崔氏同

又方

取瞿麥一斤以水八升煮取二升分再服不出更服文仲千金崔氏同

又方

葵子一升阿膠五兩水五升煮取二升頓服出間日又服崔氏千金文仲備急同並出第十一卷中

崔氏療子胎在腹中恐死不下方

當歸　芎藭各二兩

右二味以好釅酢二升煮藥二十沸頓服之若胎已死即下如胎未死即便安穩也

又療子死腹中又姙兩兒一兒活一兒死令腹中死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪一升　甘草二尺炙切　阿膠三兩炙

右三味以東流水一斗先煮二味取三升去滓內膠令烊頓服不能頓服分再服若人困按口下藥入即汗煎藥宜東向竈以茅葦薪煮之集驗廣濟千金備急文仲同

又療姙身熱病子死腹中又出之方

烏頭一枚

右一味細擣水三升煮取大二升稍稍摩臍下至陰下胎當立出

又方

以苦酒濃煮大豆一服一升死兒立下不能頓服再服之亦得千金同

又療子胎在腹內已死方

甘草一尺炙　蒲黃一合　筒桂四寸　香豉二升　雞子一枚

右五味切以水六升煮取一升頓服胎胞穢惡盡去大良千金集驗同並出第十卷中

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不產血氣上搶心母面無顏色氣欲絕方

豬膏一升煎　白蜜一升　淳酒二升

右三味合煎取二升分再服不能隨所能服之備急肘後千金崔氏同

又子死腹中不出方
以牛屎塗母腹上立出 備急崔氏千金同
又方
榆皮切一兩 珍珠一兩
右二味以苦酒三升煮取一升頓服死兒立出 集驗千金備急崔氏同並出第二卷中
救急療子死腹中方
服水銀三兩立出 集驗千金備急文仲小品同
又方
取夫尿二升煮令沸飲之 集驗千金崔氏同並出第四卷中

胞衣不出方二十首
廣濟療胞衣不出方
末竈突中土三指撮以水服之 集驗千金備急文仲同
又方
取夫單衣蓋井上立出 千金集驗救急崔氏小品同
又療胞衣不出方
取苦酒服亦朱一兩 千金集驗崔氏同
又方
雞子一枚苦酒一合和飲之即出 集驗千金崔氏同
又方
當戶燒黍穰即出 崔氏同並出第二卷中
小品療胞衣不出方
取皂莢擣末著鼻孔中嚏即出 崔氏同
又方
鹿角末三指撮酒服之 崔氏同
又方
兒衣不出吞此符吉 [符]
延年療婦人傷娠及胎死腹中胞衣不出產後疾病及諸困竭欲死方
刺取羊血及熱飲之不能者人含吐與之能多益善若不能咽啜少鹽又水潠其面此方神驗 崔氏文仲備急同

又胞衣不出方
以洗兒水服半杯即出 崔氏同
又療胞衣不出腹中滿則殺人方
但多服豬膏又大豆一升苦酒一斗煮取三升分三服 崔氏同
又方
吞雞子黃兩三枚解髮刺喉中令得嘔即出若困極死者以水一升煮栝樓一枚三兩沸寫口中汁下即出 出第十四卷中崔氏云水一升煮螻蛄一枚三沸

通按牧草一作枚語一作效字

救急療胞衣不出并兒横到死腹中母氣欲絶方

半夏洗二兩　白斂二兩

右二味擣篩服方寸匕小難一服横生二服到生三服見死四服亦可加代赭瞿麥各二兩 廣濟集驗小品備急文仲崔氏同

又方

小豆小麥相和濃煑汁飲之立出 小品千金備急崔氏同

又療胞衣不出方

取牀簟當戶前燒之 廣濟集驗千金崔氏同出第四卷中

必効療胞衣不出令胞爛牛膝湯方

牛膝四兩　滑石八兩　當歸三兩　通草六兩

葵子一升　瞿麥四兩

右六味切以水九升煑取三升分三服忌牛狗肉 廣濟集驗千金崔氏同通草一方作莽草

又方

服蒲黄如棗大良 集驗千金崔氏同

又方

生男吞小豆七枚生女吞二七枚 千金崔氏並同

又方

生地黄汁一升苦酒三合煖服之不能頓服再服之 集驗千金崔氏同

又方

澤蘭葉三兩　滑石五兩　生麻油二合

右三味以水一升半煑澤蘭取七合去滓內滑石生麻油頓服之 廣濟集驗千金崔氏同並出第四卷中

魘 產難燒此符水和服之吉

出

䴩鬼 已上三符主產難產婦吞之吉

䴩 逆產倒產吞此符

右出崔氏產書

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十四卷目録 婦人產難數十八門

產婦忌慎法六首
令易產方六首
下乳汁方一十五首
妬乳瘡痛方一十四首
乳癰腫方一十八首
產後血暈心悶方一十首
產乳運絶方五首
產後血不盡腰脚疼惡露不下方七首
產後惡露不絶方四首

產後血氣煩悶方四首
產後心痛方三首
產後腹中絞刺痛方九首
產後虛熱方二首
產後虛勞方四首
產後風虛瘦損方四首
產後虛羸方三首
產後中風方三首
產後下痢方四首
產後赤白痢方五首
產後冷熱痢方二首
產後痢日數十行方二首
產後卒患淋方五首
產後小便不禁兼數方四首
產後小便數兼渴方二首
產後渴方二首
許仁則產後方一十六首
產後遺糞方三首
產後陰道開方二首
產後陰下脫方六首

八瘕方一十二首
肉瘕方二首
崩中方一十一首
崩中去血方一十三首
帶下方一十首
婦人虛羸及月病不能食方三首
陰蝕及疳方八首
陰中腫痛方四首
陰中瘡方五首
陰痒方五首

陰瘡有蟲方六首
陰下脫方四首
陰挺出方三首
女人傷丈夫頭痛方二首
交接輒血出痛方二首
童女交接他物傷方三首
小戶嫁痛方四首
坐藥方三首
婦人欲斷產方四首

唐王燾先生外臺秘要方第三十四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

產婦忌慎法六首

千金論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令死喪汚穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

又凡婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著地則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

又凡產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母子俱病庶事皆不稱心能依圖無犯觸母子即得無疾子即易養

又凡欲產時特忌多人瞻視唯得三二人在傍待總產訖即告語衆人也若人衆令人難產

又凡產婦第一不得忽怱忙怕傍人極須少靜皆不得預緩預急憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒廻轉未即生也兒生訖一切人及母皆忌問是男是女兒胎落地即急取口中惡物與新汲井水五合嚥忌與煖湯物亦勿令母看視穢汙

又產婦慎熱食熱藥熱麵食常識此飲食當如人肌溫溫也並出第七卷中

令易產方六首

千金令易產方

凡欲臨產時先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令至密即易生神驗

又方

生地黃汁半升生薑汁半合煎熱頓服

又方

燒兇藥杵令赤內酒中飲之 小品同並出第二卷中

小品預服散令易生母無疾病未生一月日前預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺甘草散方

甘草八分炙 黃芩 大豆黃卷 粳米
麻子人 乾薑 桂心各二分 吳茱萸二分

右八味擣散酒服方寸匕日三 千金同

又療婦人易生產飛生丸方

飛生一枚 槐子 故弩箭羽各十四枚

右二味擣末蜜丸桐子大以酒服二丸即易產

又方

取蛇脫皮著衣帶中繫鼻繫衣帶臨欲產時左手持馬銜右手持飛生毛令易產 並出第七卷中

下乳汁方一十五首

廣濟療婦人乳無汁方

以母豬蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常法著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少許汗佳乳未下更三兩劑甚驗 崔氏同出第三卷中

千金療乳無汁漏蘆湯方

漏蘆 通草各八分 鍾乳四分 黍米一升

右四味切將米宿漬研取汁三升煮藥三四沸去滓作飲服 經心錄同

又方

土瓜根末酒服半錢匕乳日下如流水 崔氏同

又療乳無汁單行石膏湯方

石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日盡良

又療乳無汁單行鬼箭湯方

鬼箭五兩水六升煮取四升去滓一服八合日三服亦可燒灰作末水服方寸匕日三

又下乳汁通草散方

通草　鍾乳研

右二味等分為散麵粥服方寸匕日三百日後可兼養兩兒

又麥門冬散方

麥門冬去心　鍾乳研　通草　理石各等分研

右四味擣散食前後酒服方寸匕日三

又下乳漏蘆散方

漏蘆二分　鍾乳五分研　栝樓五分　蠐螬三分熬

右四味擣散食後抄糖水下方寸匕日二

又方

母猪蹄一具麤切以水二斗煮令熟餘五六升汁飲之甚良崔氏同

又方

猪蹄二枚炙碎　通草八兩切

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作崔氏同

又方

栝樓根切一升酒四升煮三沸去滓服半升日三良崔氏同

又方

栝樓青色大者一枚熟擣以白酒一升煮取四升去滓溫飲一升日三若無大者用小者兩枚無青色者黃色者亦好崔氏同

又方

燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方

燒死鼠酒服灰方寸匕日三立下並出第三卷中

崔氏療乳汁不下方

鼠肉五兩　羊肉六兩　麞肉八兩

右三味合作臛噉之勿令食者知出第十卷中

妬乳瘡痛方一十四首

集驗論產婦人妬乳乳癰諸產生後宜勤擠乳不宜令汁蓄積不去便不復出惡汁於內引熱溫壯結堅掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也方

始妬乳急灸其手魚際各二七壯斷癰脈也便可令小兒手助捋擠則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯汁自下外以小豆散薄塗之癰處當差千金同

又產後不自飲兒及失兒無兒飲乳乳蓄喜結癰不飲兒令乳上腫者方

以雞子白和小豆散塗之乳房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大者子含水使漱口中冷為

𠲿取乳汁吐去之不含水漱令乳頭作瘡乳孔亦也
千金同
又療妬乳乳癰連翹湯方
連翹　升麻　杏人去皮尖　射干
防己　黄芩　大黄　芒消
柴胡各三兩　芍藥　甘草炙各四兩
右十一味切以水九升煮取三升分服忌海藻菘菜千金同
又方
取葵莖燒灰擣散服方寸匕日三即愈千金同

又療妬乳生瘡方
蜂房猪甲中土車轍中土各等分末苦酒和塗之又千金同一方又有車轂上脂一味
又療婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黄汁出侵淫為長百療不差者動經年月名為妬乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世論苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傅以黄芩漏蘆散及黄連胡粉散並佳方如左赤龍皮湯方
槲皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之秋冬溫之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傅膏散千金同

又天麻草湯方
天麻草切五升以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠尾花亦以洗侵淫黄爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散千金同
又飛烏膏散方
用燒朱砂作水銀上黑煙一名細粉者三兩　礬石三兩燒粉
右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三作散者不須和有汁自著可用散亦傅諸熱瘡黄爛侵淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疳蝕口邊肥瘡蝸瘡等並以此傅之千金同

又黄連胡粉膏散方
黄連二兩　胡粉十分　水銀一兩同研令消散
右三味擣黄連為末三物相和合皮裹熟挼之自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸濕痒黄爛肥瘡若著甲煎為膏千金同
備急小品妬乳方
黄芩　白歛　芍藥各等分
右三味下篩漿水服一錢五匕日三若右乳結將去左乳汁左乳結即將去右乳汁服即消千金同

又方

柳白皮酒煮令熱以熨上即消

又方

苦酒磨升麻若青木香或紫檀香以摩上並良一味

郎得佳

又方

已入腹者麝香薰陸香青木香雞舌香各一兩以水

四升煮取二升分再服忌蒜麪酒牛馬猪肉

必效療婦人妬乳癰瘡遲愈五物雄黃藺茹膏方

雄黃　白斂　雌黃　藺茹各一分並切

亂髮如雞子一枚

右以猪脂半斤合煎三沸去滓乃尭亂髮髮盡藥成以

塗瘡不過十日差

乳癰腫方一十八首

廣濟療乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍方

大黃　芍藥　楝實　馬蹄炙令黃各等分

右四味擣散酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫處散

只痛經宿乃消百無失一明晨更服一匕忌猪風熱食

深師療乳癰腫消核芍藥散方

芍藥　通草　桂心　昆布

白斂　附子炮　黃耆　人參

海藻　木占斯各一兩

右十味擣散以清酒服一錢七日三當先食并療頸下

氣結瘰癧

又乳癰眾醫不能療柏皮膏方

猪膏年多者佳柏皮三斤去黑皮以猪膏煎之當猶

猪煎柏皮熟黒便漉出更煎餘柏皮如初盡以塗瘡

甚驗

集驗療乳癰方

大黃二兩　莽草二分　伏龍肝十二分　乾薑二分

右四味擣末以酢和塗乳上即効止一方生薑極驗可

用也千金同

又方

取鹿角下篩散以猪頷下清汁服方寸匕不過再服

亦以醋漿服之良千金云猪脂上清汁

又療乳癰四物膠薄貼方

膠炙　大黃　莽草　細辛

右各等分擣末以雞子白和塗紙上貼腫頻易晝夜貼

之割紙穿如錢大出腫頭

又療乳癰三物桂心貼方

桂心三分　烏頭二分　甘草二分

右擣散以苦酒和塗腫上以小紙覆消其上將乳居其中以乾布蓋乳下須臾布當濕有膿水也佳范汪同

千金翼排膿散主乳癰方

鐵粉　茯苓　桂心　細辛

芎藭　人參　防風　乾薑

黃芩　芍藥各四兩　當歸　甘草炙各五分

右十二味擣散酒服方寸匕日三夜一加至一匕半服藥十日血出多勿怪是惡物除甚良出第五卷中

備急葛氏療婦人乳癰妬腫者或經久來療不差方

堅硬紫色則柳根皮擣熟熬令溫帛囊盛熨乳上冷更易甚良一宿即愈千金同

又方

研米槌二枚煮令熱以絮及巾覆乳上用二槌更互熨腫數十過差止已用大驗千金云多熨

又乳癰方

大黃　竈下黃土各一分末　生薑二分

右三味擣末醋和塗乳痛即止極驗劉涓子不用生薑用生魚三味等分余比用鯽魚妙

又療乳癰方

大黃　鼠屎　黃連各一分

右三味擣末合鼠屎更擣以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米並可用千金同

救急療乳癰腫痛如升椀大痛不可忍方

取白薑石擣末一二升用雞子白和如稀泥傅腫乾更易之此方頻試驗如雞子處界取榆白皮和擣傅即差

又療乳癰堅硬痛不可忍方

蔓菁子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水一大盞和頓服痛即止

又療乳癰腫方

以釅醋研地黃塗上乾即易不過三五遍服以酒研之

必効療婦人乳癰方

覺痛色未變時以飼猪米研汁飲之即差仍取猪槽木厚如匙面火炙數數熨上

又療婦人乳癰丹參膏方

丹參　白芷　芍藥各二兩

右三味㕮咀以苦酒淹經宿又取猪脂半斤微火上煎之白芷黃膏成去滓以膏塗上甚良

又療瘡上須貼膏方

黃耆八分　白芷　大黃各五分　當歸

續斷各四分　薤白二合切　松脂十二分　薰陸香

蠟各十分　豬脂一升　生地黃汁七合

右十一味切內地黃汁中漬半日內豬脂中微火上煎三上三下白芷色黃膏成布絞去滓剪帛如瘡大小塗帛貼瘡上日四五度易之終身無苦極効

產後血暈心悶方一十首

廣濟療產後血暈心悶不識人或神言鬼語氣欲絕方

荷葉二枚炙　蒲黃一兩　甘草二兩炙　白蜜一匙

地黃汁半升

右五味切以水三升煮取一升絞去滓下蒲黃蜜地黃汁煖服立差止

又療產後心悶血氣衝上血暈羚羊角散方

取羚羊角一枚燒成灰末以東流水服方寸匕若未差更服差

救急產暈心悶大困方

鯽魚剝皮作鱠以薤食三兩口止

又仲暈絕方

蘇方木三兩碎以水五升煎取二升分再服或無蘇木煮緋色衣取汁服亦驗

又方

取牆上青衣一抄以水四小升煮取二升分服又生薑汁一小升地黃汁一小升酒一大升相和煎五六沸分再服每割和大黃末一匙此方甚良

崔氏凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分娩者第一須先取驗醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞其氣兼細細飲之此爲上法如覺暈即以醋噴面穌來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之

又凡產後忽悶冒汗出不識人者是暴虛故也方

取破雞子吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者

又若久不識人或時復發者此爲有風因產血氣暴虛風行脈中故也若產後去血多者尤增此疾與雞子不醒者可急與竹瀝汁一服五合須臾不定復與五合頻得三五服立差　並出第十上卷中

近効療血暈絕不識人煩悶方

紅藍花三兩新者佳以無灰清酒半升童子小便半大升煮取一大盞去滓候稍冷服之新汲水一大升煮之良久

又方

赤父馬糞絞取汁一大盞濕者良若乾者取新汲水

半大盞和研絞取汁頓服亦主人血不止神驗 夏侯拯餘

産乳暈絕方五首

崔氏療産乳暈絕方

以惡血服少許良

又方

以服洗兒水三合良

又方

覺暈即用三股麻繩長五六尺繫産婦右脚膝上令

人捉兩頭急挽得醒徐徐解之 並出第十上卷中

又仲療産乳暈絕方

半夏一兩洗擣篩丸如大豆內鼻中即愈 崔氏同

救急療産乳暈絕方

生赤小豆擣爲散取東流水和方寸匕服之不差再

服 崔氏同

産後餘血不盡腰脚疼及惡露不下方七首

廣濟療産後三日患腹疼腹中餘血未盡并手脚疼不下

食生地黃湯方

生地黃汁一升 芍藥 甘草 丹參四兩

蜜一合 生薑汁半分

右六味切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜薑汁

微火煎一兩沸一服三合日二夜三利一兩行中間進

食與藥更進服

又療産後惡露不多下方

牛膝 大黃各八分 牡丹皮 當歸各六分

芍藥 蒲黃 桂心各四分

右七味擣散以生地黃酒服方寸匕日二血下止

救急療婦人産後餘血不盡血流人腰脚疼痛胷急氣滿

兩脅痛方

生薑一斤 淡竹葉一升切

右二味以水二升煮取一升去滓分再服

又療産後血不盡血痛悶方

取荷葉燒作灰煖水和服煮取汁亦良

又惡露不盡腹脹痛方

取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒末酒服

又方

取百斤秤錘一枚燒赤投酒五升中用此秤錘酒煮

當歸三兩取二升去滓分再服 千金同

又療一切宿血及損傷瘀血在腹內不問新久并婦人月

經不過產後惡血不下皆良方
大黃　芒消各三兩　桃仁四十枚去尖皮
右三味芒消桃仁合擣四五百杵以酢漿二升半漬一宿空腹攪調頓服之不能頓服者分作兩服良久先下糞次下如豆泥汁或黑血為驗強人日別服一劑弱人兩日服之下血盡便止不過三兩劑忌生冷茶葵並出第四卷中

產後惡露不絕方四首

廣濟療婦人產後血露不絕崩血不可禁止腹中絞痛氣息急療疹病三十六疾方

亂髮灰燒　阿膠各二兩炙　代赭　乾薑各三兩
馬蹄燒一枚　乾地黃四兩　牛角鰓五兩炙
右七味擣篩蜜和為丸如梧桐子空腹以飲下二十五丸日二至四十丸良

深師療產後虛冷下血及水穀下痢晝夜無數兼療惡露不絕龍骨丸方
乾薑　甘草炙　桂心各二兩　龍骨四兩
右四味擣篩蜜丸如梧桐子以酒下二十丸日三忌如常法此方甚良

文仲葛氏療血露不絕方
以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差

又隱居効方澤蘭湯療產後惡露不盡腹痛往來兼滿少氣
澤蘭八分　當歸三分　生地黃三分　芍藥十分
甘草六分炙　生薑十分　大棗十四枚
右七味切以水九升煮取三升分為三服欲死塗身得差

產後血氣煩悶方四首

廣濟療產後心胸中煩悶血氣澀肋下妨不能食方
生地黃汁一升　當歸一兩末　生薑汁三合　酒五合

童子小便二升
右五味和煎三四沸去滓分服一日令盡間食服

又血氣煩悶方
取生藕擣絞取汁飲一升未定更飲差止竹瀝亦得千金同

集驗療產後血氣煩悶方
取生地黃汁一升酒三合相和微溫頓服之千金同

千金療婦人產後氣欲絕心中煩悶不解必効方
竹葉切　麥門冬去心　小麥各一升　甘草一兩炙
生薑二兩　大棗十四枚

謹按此方名大嚴蜜湯方中并不用蜜蜀椒蓋內亦用實未詳何解

右六味切以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內餘藥
煮取三升去滓分服心虛悸加人參二兩少氣力加粳
米五合一方用竹皮若胷中氣逆加半夏二兩忌如常
法出第三卷中

產後心痛方三首

集驗大嚴蜜湯療產後心痛方

乾地黃　當歸　獨活　甘草炙
芍藥　桂心　小草　細辛各一兩
吳茱萸一升　乾薑三兩

右十味切以水九升煮取三升分三服良千金同

經心錄蜀椒湯療產後心痛此大寒冷所爲方

蜀椒二合　芍藥三兩　半夏洗　當歸
桂心　人參　甘草炙各二兩　生薑汁五合
蜜一升　茯苓二兩

右十味切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去
滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合漸至六合盡勿
冷食千金同

千金羊肉湯療產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若
中風乏氣力方

羊肉三斤　當歸　黃芩　甘草炙
芎藭　防風各二兩　芍藥二兩　生薑四分

右八味切以水一斗二升煮羊肉減半煮藥取三升分
溫三服忌如常法崔氏同出第三卷中

產後腹中絞刺痛方九首

廣濟療產後腹中絞刺痛不可忍方

當歸　芍藥　乾薑　芎藭各六分

右四味擣散以酒服方寸匕日二服

又療產後內虛寒入腹腹中絞痛下赤煩毒譫語見鬼羊
肉湯方

肥羊肉一斤　當歸　甘草炙　芍藥各一分

右四味切以水一斗煮羊肉取七升煮藥取二升分服

又療新產後腹中如弦常堅絞痛無聊方

蜜一升　當歸一兩

右一味末入蜜中煎融耳適寒溫頓服

千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸二兩　生薑五兩　芍藥二兩　羊肉一斤

右四味切以水八升煮取三升適寒溫頓服七合日三

又療產後疾痛桃人芍藥湯方

桃人半升去皮尖　芍藥　芎藭　當歸
乾漆熬　桂心　甘草炙各二兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服

又單行茱萸酒療產後腹內外疾痛方

吳茱萸一升酒三升漬一宿煎取半升頓服亦可再服差止 並出第三卷中

必効療產後腹痛方

羌活四兩切酒二升煮取一升分服

又方

兔頭炙令熱以熨產婦腹如刀絞痛者熨之立定

又療痛不可忍方

取一苦瓠蘆未經開者開之去子訖以沸酸酢投中

蒸熱踏痛發冷卽换極甚効

產後虛熱方二首

千金蜀漆湯療產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節疼及頭痛壯熱晡時輒甚又似微瘧方

知母 芍藥各二兩 蜀漆葉 甘草炙

桂心 黃芩各一兩 生地黃一斤 黃耆五兩

右八味切以水一斗先煮地黃取七升去滓下諸藥煮取二升半分三服此湯療寒熱不損人忌如常法 出第三卷中

千金翼療產後虛熱頭痛方

白芍藥 乾地黃 牡蠣熬各五兩 桂心三兩

右四味切以水五升煮取二升半分三服日三服不損人無毒亦療腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩甚驗大熱郎除 出第六卷中

產後虛勞方四首

千金增損澤蘭丸療產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭 甘草炙 當歸 芎藭各七分

附子炮 乾薑 白朮 白芷

桂心 細辛各四分 防風 人參

牛膝各五分 柏子人 乾地黃 石斛各六分

厚朴炙 藁本 蕪荑各二分 麥門冬八分去心

右二十味擣末蜜丸以酒下十五丸至二十丸良忌如常法 出第四卷中

延年增損澤蘭丸主產後風虛勞損黃瘦方

澤蘭七分 防風 乾地黃 當歸

細辛 桂心 茯苓 芍藥

人參 甘草炙 藁本 烏頭炮

麥門冬去心 石斛 紫菀 芎藭各五分

乾薑 柏子人 蕪荑人 厚朴炙

蜀椒汗各四分 白朮 黃耆各六分 紫石英研

石膏研各八分

右二十五味擣篩蜜和丸如梧桐子以酒下二十至三十丸忌如常法

刪繁療產婦勞虛或本來虛寒或產後血脈虛竭四肢羸弱飲食減少經水斷絕血脈不通虛實交錯澤蘭補虛丸方

澤蘭葉九分　石膏八分研　芎藭　甘草炙

當歸各七分　白芷　防風　白朮

藁本　蜀椒　厚朴炙　乾薑

桂心　細辛各五分

右十四味擣篩蜜丸如梧桐子酒下二十丸至三十丸日再忌如常法

古今錄驗澤蘭丸療產後風虛勞羸百病補勞方

澤蘭葉六分　白芷　蜀椒汗　蕪荑人

藁本　細辛各四分　白朮　栢子人

人參　桂心　防風　厚朴炙

丹參各五分　芎藭　甘草炙　當歸各七分

乾地黃十分

右十七味擣篩蜜和丸如梧桐子服二十丸至三十丸日再服忌如常法

產後風虛瘦損方四首

廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方

澤蘭七分　厚朴炙　人參　石斛

蕪荑人　續斷　防風　桂心各三兩

芎藭　白朮　栢子人　五味子

黃耆　遠志皮各四分　赤石脂六分　乾地黃六分

甘草六分炙

右十七味擣末蜜丸如梧子以酒下二十丸至三十丸日再忌如常法

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯主之

及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之方

獨活三兩以水三升煮取一升分服奈酒者亦可酒水等煮之用白鮮皮亦依此法

千金云凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也又產後七日內惡血不盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯痛甚切者不在此例後兩三日消息可服澤蘭丸比至滿月丸藥盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸又凡在蓐必須服澤蘭丸補服法必七日外不得早服也婦人因產取涼太多得風冷腹

中積聚百病羸起迄至於老以方療不能差桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年終常將服之

又桃仁煎療萬病婦人産後百病諸氣方

桃仁一千二百枚去雙人尖皮熬令香

右一味擣務令極細熟以上上酒一斗五升研三四遍如作麥粥法以極細為佳內小長項瓷瓶中令滿以麪逼封之務取密內湯中煮一伏時不停火使瓶口常出湯勿令沒藥成温酒和服一匙日再丈夫服亦極妙

延年澤蘭丸主産後風虛積瘦不能食令肥悅方

澤蘭七分 當歸十分 甘草七分炙 藁本三分

厚朴三分炙 食茱萸三分 蕪荑三分 白芷三分

乾薑三分 芍藥三分 石膏八分 人參四分

栢子人四分 桂心四分 白朮五分

右十五味擣篩蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸日九加至二十五丸忌如常法

産後虛羸方三首

廣濟療産後虛羸喘乏或乍寒乍熱狀如瘧名為蓐勞猪腎湯方

猪腎一具去脂四破 香豉一升 白粳米一升 葱白切一升

人參 當歸各二兩

右六味切以水一斗煮取三升去滓分服七合以意消息忌大肉熱麪蒜 出第三卷中崔氏云以水三斗煮取五升適寒温隨便飲之

救急療産後羸瘦不復令肥白方

烏豆肥大者淨拭熬熟如造豆黃法去皮擣為屑下篩以臘月猪脂成鍊者和丸如梧桐子以酒下五十丸日再服一月內肥白也無所禁

古今錄驗療産後諸病羸瘦欲令肥白飲食和調地黃羊脂煎方

生地黃汁一升 生薑汁五升 羊脂二斤 白蜜五升

右四味先煎地黃汁令餘五升下羊脂煎減半次下薑汁次下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒一升取煎如雞子大投酒中飲日三服

産後中風方三首

深師療産後中風口噤不知人小獨活湯方

獨活八兩 葛根六兩 生薑五兩 甘草二兩炙

右四味切以水九升煮取三升分三服微汗佳忌如常 出第六卷中

小品大豆紫湯主婦人産後中風困篤或背强口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風

冷濕所爲方

大豆三升炒預取器盛清酒五升沃熱豆中訖漉去豆得餘汁盡服之溫覆取微汗出身體纔潤則愈一以去風二則消血結云周德成妻姙胎因觸傷胎死在腹中三日困篤服此酒卽差後療無不佳千金用大豆五升酒八升又云更合獨活湯所以爾者產後多虛著風以獨活消風去血也重者十劑崔氏云如中風口噤加雞屎白二升和豆熬更佳

又療產後中寒風熱通身冷直口噤不知人方

白朮四兩酒二升煮取一升去滓頓服忌如常法

產後下痢方四首

廣濟療產後腹痛氣脹肋下妨滿不能食兼之微痢方

茯苓　人參　厚朴炙各八分　甘草炙

橘皮　當歸　黃芩各六分

右七味擣散以飲下方寸匕日三度漸加至一匕半

又療產後下痢赤石脂丸方

赤石脂三兩　甘草炙　當歸　白朮

黃連　乾薑　秦皮各二兩　蜀椒汗

附子炮各一兩

右九味擣篩蜜和爲丸如桐子酒服二十丸日三服忌如常法

深師療產後下痢膠蠟湯方

粳米一合　蠟如雞子一枚　阿膠　當歸各六分

黃連十分

右五味切以水六升半先煮米令蟹目沸去米內藥煮取二升入阿膠蠟烊溫分三兩服

千金療產後下痢腹痛當歸湯方

當歸　龍骨各三兩　乾薑一兩　白朮二兩

甘草炙一兩　附子炮一兩　熟艾一兩　芎藭二兩半

右八味切以水六升煮取二升半去滓分爲三服日三一日令盡出第三卷中

產後赤白痢方五首

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛方

當歸　芍藥　地榆　龍骨

黃連各八分　艾葉八分　甘草炙八分　厚朴炙八分

黃芩　乾薑各六分

右十味切以水八升煮取二升半去滓分溫三服卽差止忌如常法

又療產後赤白痢臍下氣痛方

當歸八分　厚朴炙　黃連各十二分　豆蔻五枚去皮

甘草炙六分

右五味切以水五升煮取二升去滓分溫三服差止忌如常法

又仲効方療產後赤白下痢腹中絞痛不可忍者

黃連四兩　黃蘗三兩　阿膠炙　梔子

蒲黃各一兩　當歸一兩半　黃芩二兩

右七味擣篩蜜和丸飲服六十丸日三夜一服立定破血止痢忌如常法

救急療產後下痢赤白腹中絞痛方

芍藥　乾地黃各四兩　甘草炙　阿膠

艾葉　當歸各二兩

右六味切以水一升煮取一升半去滓溫分三服忌如常法

必効療婦人新產後赤白痢心腹刺痛方

薤白一升切　當歸二兩　酸石榴皮三兩　地榆根四兩

粳米五合　一本加厚朴一兩　阿膠

人參　甘草炙　黃連各一兩半

右十味切以水六升煮取二升分三服忌如常法千金只用前五味

產後冷熱痢方二首

深師療產後冷熱痢黃連丸方

黃連三兩　烏梅肉一升　乾薑二兩

右三味擣末蜜丸如梧子以飲下二十至三十丸日再服忌豬肉

千金療產後忽著寒熱下痢生地黃湯方

甘草炙　黃連　桂心各一兩　生地黃五兩

大棗二十枚　淡竹皮　赤石脂各一兩

右七味切以水一斗煮竹皮取七升去滓內藥煮取二升半分為三服日三　集驗同出第三卷中

產後痢日夜數十行方二首

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血桂枝湯方

桂心　乾薑　甘草炙各二兩　赤石脂十兩

當歸三兩　附子一兩炮　蜜一升

右七味切以水七升煮取三升入蜜一兩沸分服一升日三

必効療產後痢日五十行者方

取木裏蠹蟲糞鐺中炒之令黃急以水沃之稀稠得所服之差止　獨孤祭酒論方

產後卒患淋方五首

廣濟療產後卒患淋小便磣痛乃至尿血方

冬葵子一升 石韋去毛 通草各三兩 滑石別研末湯成下

茯苓 子芩各二兩

右六味切以水九升煮取三升絞去滓一服七合差止

忌熱麵酢物

集驗療產後卒患淋石韋湯方

榆白皮五兩 石韋去毛 黃芩各三兩 通草三兩

大棗三十枚 葵子一升 白朮一兩

右七味切以水八升煮取二升半分為三服千金有甘草生

薑為九味

千金療產後淋澀葵根湯方

葵根乾者二兩 車前子一升 亂髮灰 大黃

桂心 滑石各一兩末後下 冬瓜汁七合 通草二兩

生薑六兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓分三服出第三卷中

又產後淋滑石散方

滑石五分研 通草 車前子 葵子各四兩

右四味以漿水服方寸匕至二匕為妙

千金翼療產後卒淋氣淋血淋石淋湯方

石韋去毛 黃芩 通草各二兩 榆白皮五兩

大棗三十枚 甘草一兩炙 葵子二升 生薑

白朮各三兩

右九味切以水八升煮取二升半分三服千金同

產後小便不禁兼數方四首

廣濟療產後小便不禁方

取雞尾燒作灰酒服方寸匕日三服

小品療產後小便不禁方

取雞子燒作灰酒服日三

又療產後遺尿不知出方

白薇 芍藥各等分

右二味擣散以酒服方寸匕日三千金翼各十分

千金翼論產後小便數桑螵蛸湯方

桑螵蛸三十枚炙 鹿茸炙 黃耆各三兩 人參

甘草炙 牡蠣熬各二兩 生薑四兩

右七味切以水六升煮取二升半分三服日再差止

產後小便數兼渴方一首

集驗產後小便數兼渴栝樓湯方

桑螵蛸炙 甘草炙 黃連 生薑各二兩

栝樓 人參各三兩 乾棗五十枚

右七味切以水七升煮取二升半分三服

產後淋方二首

集驗療産後渴栝樓湯方

栝樓四兩 麥門冬去心 人參各三兩 乾地黃三兩

甘草二兩炙 乾棗二十枚 土瓜根五兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服良

千金療産後虛渴少氣力竹葉湯方

竹葉切三升 甘草炙 人參 茯苓各一兩

小麥五合 生薑 半夏洗各三兩 乾棗十五枚

麥門冬五兩去心

右九味切以水九升先煮竹葉小麥生薑棗取七升去滓內藥再煎取二升半絞去滓一服五合日三夜一

許仁則産後方一十六首

第一産後若覺血氣不散心腹刺痛脹滿喘急不能食飲宜依此方

鬼箭羽折之如金色者佳 當歸 白朮 生薑各三兩

細辛 桂心各二兩 生地黃五合

右七味切以好無灰酒三升水四升和煎緩火煎取二升三合去滓溫分服三合忌如常法

第二産後若覺惡露下多心悶短氣貼然無力不能食宜依此方

當歸 艾葉 生薑各三兩 乾地黃四兩

人參一兩 地榆二兩

右六味切以水七升半煎取二升四合去滓分溫服八合日三

第三産後惡露下多少得所冷熱得調更無餘狀但覺腹內切痛可而後作宜依此方

當歸五兩 生薑六兩 桂心三兩 芍藥二兩

右四味切以水酒各三升半煮取二升三合去滓分三服之忌生葱

第四産後諸狀無所異但不能食者宜依此方

白朮五兩 生薑六兩

右二味切以水酒各二升緩火煎取一升半分溫二服忌如常法

第五産後更無他狀但覺虛弱欲得補氣力兼腹痛宜羊肉當歸湯方

肥羊肉一斤去脂 當歸五兩 生薑六兩 黃耆四兩

右四味切以水一斗緩火煮羊肉取八升澄清內藥煮取二升半去滓溫分服若覺惡露下不盡加桂心三兩惡露下多覺有風加芎藭三兩覺有氣加細辛二兩覺有冷加吳茱萸一兩覺有熱加生地黃汁二合

第六産後惡露雖下不甚通利遂覺心腹滿悶脅肋脹妨兼欬喘息急不能食飲大便不通眼澀坐起不穩心腹時時痛宜服此方

白朮　當歸　桑白皮　大黃各三兩

生薑四兩　細辛　桂心各二兩

右七味切以水八升煮取二升六合去滓分溫三服此湯當得利利又不宜過多事不獲已所以取微利緣初産舉體皆虛尚藉藥食補之豈宜取過利服未即止須斷之取三兩匙醋飲飲之即止適寒溫將攝任忌如常法

如利後諸候不減宜依後方

當歸十分　白朮八分　甘草七分炙　生薑六分

桑根白皮六分　桂心三分　人參三分　細辛四分

右八味擣篩蜜丸桐子大以酒下十五至二十丸忌如常法

第七産後患水痢宜依此方

神麴五合六月六日者　人參四兩　枳實六分炙　赤石脂十分

白朮六分

右五味擣散飲下方寸匕漸漸加之忌如常法

第八産後患血痢宜依此方

艾葉虎掌者三月三日五月五日者　黃蘗　芍藥

甘草六分炙各　阿膠十七分　黃連七分　地榆五分

右七味擣散以飲下方寸匕甚妙忌如常法

第九産後患腹痛宜依此方

附子炮　蜀椒汗　乾薑五分各　甘草六分炙

赤石脂　黃耆十分各　白朮七分

右七味擣散飲服方寸匕加一匕半日再忌如常法

第十産後諸痢方

取薤白煮食之唯多益好肥羊肉去脂作炙食之唯多益好以羊腎炒薤白食之良

第十一産後腹內安穩惡露流多少得所但緣産後日淺久坐視聽言語多或運勞力遂覺頭項及百肢節皮肉疼痛乍寒乍熱此是蓐勞宜依此方

豬腎一具去脂　當歸　芍藥　生薑各三兩

桂心一兩　葱白三合

右六味切以水八升緩火煮腎取六升澄清內諸藥煮取二升分溫再服

第十二産後覺患風手足不多隨和言語不多流利恍惚多忘精神不足宜依此方

獨活三兩　當歸　芍藥　防風

芎藭　玄參各二兩　桂心一兩半

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服如一劑覺安穩隔三日又服一劑若一兩劑後漸差但須適寒溫將息如未全差即以此方作丸有熱加乾葛五兩有冷加白朮五兩有氣加生薑六兩有痛加當歸芍藥各二兩不能食加人參二兩玄參四兩覺手足不穩加牛膝五加皮萆薢各三兩黃耆四兩丸服忌如常法

第十三產後更無餘苦但覺體氣虛宜服此方

當歸　乾地黃各十分　澤蘭八分　防風

黃耆　續斷各六分　桂心　人參

地骨皮　芍藥各七分　乾薑六分

右十一味擣末蜜丸桐子大酒下二十丸忌如常法

第十四產後不論服藥宜爾不宜食諸生冷陳又滑物若服藥彌須將息每方服藥後各既忌食法為欲錄其都要不能一一具言諸方有白朮忌桃李細辛忌生葱甘草忌松菜海藻枸杞忌狗肉附子黃連忌諸肉桂心忌生葱

第十五產後血氣不多通散當時不甚覺之在身雖小不和出則成痼結少腹疼硬乍寒乍熱食飲不為肌膚心腹有時刺痛口乾唾粘手足沉重有此狀宜依此方

當歸　芍藥　人參　甘草炙

鬼箭羽　牛膝各五分　牡丹皮六分　白朮六分

桂心　白薇　烏梅熬各四分　大黃八分

䗪蟲熬去翅足　水蛭熬各三分　蒲黃三分　朴消

赤石脂各十分　乾地黃七分　虎杖六分

右十九味擣末蜜丸桐子大酒服二十丸日再加二十五丸忌如常法

第十六產後膿血痢相兼宜依此方

赤石脂　五色龍骨　黃連各十分　阿膠炙

黃耆各六分　黃蘗四分　白朮五分

右七味擣末蜜丸桐子大飲下三十丸散服亦妙如前

服忌如常法

產後遺糞方三首

廣濟療產後遺糞方

取故鷰巢中草燒末以酒下半錢亦治男子

集驗療產後遺糞方

取礬石燒牡蠣熬各等下篩酒服方寸匕日三亦治男子

又療產後遺糞不如出時方

白歛　芍藥各二分

右二味擣為散以酒服方寸匕

產後陰道開方二首

廣濟療産後陰道開不閉方

取石灰一升熬令能燒草以水二升投灰中適冷煖入水中坐漬須臾復煖坐如常法用之

集驗療婦人產後玉門開不閉硫黃洗方

石硫黃研 蛇床子各四分 菟絲子五分 吳茱萸六分

右四味擣散以湯一升投方寸匕以洗玉門差止

產後陰下脫方六首

集驗療婦人產後陰下脫方

取蛇床子一升布裹炙熨之亦療陰中痛

千金療產後陰下脫方

以鐵精粉上推內之

又方

燒人屎末酒服方寸匕日三度

又方

臍下橫文灸二七壯

古今錄驗療產後陰下脫方

蜀椒一升 吳茱萸一升 戎鹽如雞子大

右三味擣以綿裹如半雞子大內陰中日一易二十日愈

又方

鱉頭五枚陰乾 葛根一斤

右二味擣散酒服方寸匕日三

八瘕方一十二首

素女經論婦人八瘕積聚無子斷絕不生令有子受胎養生并曾傷落夜月服藥去及陰閉生息肉陰痒生瘡陰痺淋瀝帶下陰子藏不正陰門挺出陰癰堅臍疾方

黃帝問於素女曰吾聞天下婦人產乳有子而病者未曾生子而病者又產乳後而中絕不復產者何也皆病作生而令婦人腹中有積聚胸脅背膂而痛久而生八瘕之

聚病深可畏不在腸胃療之或已復作此狀寧亦得聞之乎對曰婦人之病皆由於月病生産所致又從胞胎所起其病不同鍼灸食藥不得其方也

黃帝曰安心其要易形之為害受之良久詳思念其事曰何以療將奈何素女曰誠為之說婦人胞胎之數皆在陰裏萬物皆從生焉深血脈精氣所從行腎為陰陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持關元禁閉子精臍下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從上然婦人經脈俞絡合調則月水如時來至故能生

子而無病婦人榮衛經絡斷絶不通其人思惟邪氣便得往來入合於子藏若生後惡露未已合陰陽即令婦人經脉攣急令人少腹裏急支滿胷脅腰背相引痛苦四肢酸削飲食不調結牢惡血不除月水不如時或在前或在後下久不止因生積聚如懷胎狀邪氣甚令人恍惚多夢寒熱四肢不欲時動陰中生氣腫肉生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黄黑歲月病即不復生子黄帝曰吾家所憂也療之柰何可得愈病令人有子願拜受非其人不敢妄傳何以神良耳素女曰今詳而聞

一曰黄瘕黄瘕者婦人月水始下若新傷墮血氣未止卧

寢未定五藏六腑虚羸精神不定因向大風便利陰陽開閉關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虚則生黄瘕之聚令人病苦四肢寒熱身重淋露卧不欲食左脅下有氣結牢不可得抑苦病腰背相引痛月水不利則善令人不孕少腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黄汁病苦如此令人無子療當刺關元氣衝行以毒灸有法療治瘕當下即愈矣

又療黄瘕皂莢散導之方

皂莢一兩炙去皮子　蜀椒一兩汗　細辛六分

右三味擣散以三角囊大如指長二寸貯之取內陰中閉則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

二曰青瘕青瘕者婦人新生未滿十日起行以湯浣洗太早陰陽虚玉門四邊皆解散子戶未安定骨肉皆痛手臂不舉飲食未復內藏吸吸又當風卧不自隱障若居濕地及濕席令人苦寒洒洒入腹中心腹煩悶沈淖惡血不除結熱不得散則生青瘕之聚在左右脅下藏於背膂上與肩甲腰下攣急兩足腹下有氣起喜唾不可多食四肢不欲動搖恍惚善夢手足腫面目黄大小便難其候月水不通利或不復禁狀如崩中此自過所致令人少子療之當

刺胃管行以毒藥有法瘕當下即愈矣

又療青瘕導藥方

戎鹽一升　皂莢半兩去皮子炙　細辛二兩六銖

右三味擣散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但以瘕當下青如葵汁養之如産法

三曰燥瘕燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虚憊而以夏月熱行疾步若舉重移輕汗出交流氣力未平而卒以恚怒致腹中猥咽不泄經脉攣急內結不舒煩滿少力氣上逆隔中背膂少腹壅急月水與氣俱不通利而反以飲涕水快心月水横流溢入他藏不去有熱則生燥瘕之聚

大如半杯上下腹中苦痛在兩脅下上引心而煩害飲食
食欲嘔吐胸及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足酸疼
久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便澀
難有此病者令人少子療之以長鍼按而刺之法度行以
毒藥瘕當下即愈矣

又療燥瘕方

大黃如雞子許　乾薑二兩　雞膍胵中黃膜一枚炙

黃連二兩　桂心一尺　䗪蟲二枚熬　厚朴十銖炙

郁李人一兩去皮尖熬

右八味擣散早朝空腹以溫酒一盞和三錢匕頓服瘕
當下畢養之如産婦法三月勿
合陰陽

四曰血瘕血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲
食過度五穀氣盛溢入他藏若大飢寒呼吸不足呼吸未
調而自勞動血下走腸胃之間流落不去內有寒熱與月
水合會則生血瘕之聚令人腰痛不可以俛仰橫骨下有
積氣牢如石少腹裏急苦痛背膂疼腰股下痛陰裏若生
子風冷子門僻月水不時乍來乍去有此病者令人無子
療之瘕當下即愈矣方闕

崔氏療婦人血瘕痛方

乾薑　烏賊魚骨各一兩炙　桃人一兩去皮尖熬

右三味擣散酒服二方寸匕日二

又方

取古鐵秤鎚或大斧頭或鐵杵以炭火燒令赤投好
酒二升中稍稍飲之

又方

桂末溫酒服方寸匕日二　並出第十下卷中

古今錄驗療婦人血瘕攻刺腹脅時痛導藥方

大黃　當歸各半分　山茱萸一兩　皂莢一兩去皮子炙

細辛　戎鹽二六銖

右六味擣以香脂丸如指大每以綿裹內陰中正坐良

久瘕當下養如乳婦之法

五曰脂瘕脂瘕者婦人月水新下若生未滿三十日其人
未復以合陰陽絡脉分胞門傷子戶失禁關節散五藏六
府津液流行陰道瞤動百脉關樞四解外不見其形子精
與血氣相遇犯禁子精化不足成子則生脂瘕之聚令人
支滿裏急痛痹引少腹重腰背如刺四肢不舉飲食不甘
臥不安席左右走腹中切痛或差時甚或時少氣頭眩身
體疼解苦寒惡風膀胱脹月水乍來乍去不如常度大小
便血不止有此病者令人無子療之當刺以長鍼行以毒

藥瘕當下卽愈矣

又療脂瘕方

皂莢十八銖去皮尖　礬石六銖燒　五味子　蜀椒汗　細辛　乾薑各半兩

右六味擣散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘕乃愈

又療婦人絕不復生及未曾生皆以脂瘕陰中有塊以湯員自下尚不受子導散方

皂莢炙去皮子　吳茱萸　當歸各一兩　蜀椒汗各二兩　細辛灸　礬石燒　五味子各二分　大黃

戎鹽各一兩　乾薑二兩

右十味擣散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中坐臥隨意勿行走小便時去之別換新者

六曰狐瘕狐瘕者婦人月水當日數來而反悲哀自恐若以遠行逢暴風疾雨雷電驚恐被濕罷音疲倦少氣心中恍惚未定四肢解墮振寒若瘀痱脈氣絕精神遊亡邪氣入於陰裏不去則生狐瘕結聚食人子藏令人月水閉不通少腹瘀滯胷脅腰背痛陰中腫小便難胞門子戶不受男精五藏氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多所思如有身狀四肢不舉有此病者終身無子其瘕有手足卒成形者殺人未者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下卽愈矣

又療狐瘕方

取新死鼠一枚裹以新絮塗以黃土穿地坎足沒鼠形置其中桑薪灼其上一日一夜出分去絮內桂心末六銖酒服二方寸匕病當下甚者不過再服差止

七曰蛇瘕蛇瘕者婦人月水已下新止適閉未復胞門子戶勞動陰陽未平榮衛分行若其中風暴病羸劣飲食未調若起行當風及度泥涂因衝寒大早若坐濕地名曰陰陽亂腹中虛若遠行道路伏飲汚井之水不潔之食吞蛇鼠之精流落不去則生蛇瘕之聚上食人之肝心若病

長大條條在臍下上還絞左右脅不得吐氣兩股脛間苦疼少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中攣急腰背俱痛難以動作喜發寒熱月水或多或少有此病者不復生子其瘕手足成形者殺人未者可治之療有法度行以毒藥瘕當下卽愈矣

又療蛇瘕方

大黃　黃芩　芒硝各半兩　甘草大如指半尺炙　烏賊魚骨二枚　皂莢六枚去皮子尖

右六味擣以水六升煮之三沸下絞去滓下硝適寒溫服之十日一劑空腹服之當下

八曰鼈瘕鼈瘕者婦人月水新至其人劇作罷癆勞汗出衣服潤濕不以時去之若當風睡足踐濕地恍惚覺悟蹶立未安顏色未平復見所好心爲開蕩魂魄感動五內脫消若入水浣洗沐浴不以時出而神不守水氣與邪氣俱入至三焦之中又暮出入玉門先閉津液妄行留落不去則生鼈瘕之聚大如小柈令人少腹內切痛惡氣左右走上下腹中苦痛若存若亡持之躍手下引陰裏腰背亦痛不可以息月水不通面目黃黑脫聲少氣有此病者令人絕子其瘕有手足成形者殺人未者可治之療有法度以長鍼按療之行以毒藥瘕當下即愈矣

又療鼈瘕方

大黃六分 乾薑 側子各半分 附子 人參各九銖 䗪蟲一寸七枚熬 桂心一兩六銖 細辛 土鼈各十八銖 白术一兩

右十味冶散以酒服方寸匕日三以上八般瘕疾出古今錄驗第三十卷中

肉瘕方二首

集驗療婦人臍下結堅大如杯升月經不通寒熱往來下痢羸瘦此爲癥氣不可療未生癥者可療方

生地黃三十斤取汁 乾漆一斤熬

右二味擣漆爲散內地黃汁中微火煎令可丸酒服如梧子大三丸至七八九即止

删繁療女人子門不開血聚腹中生肉癥築如物此乎爲癥氣藏寒所致生地黃煎破血丸方

生地黃汁一升 生牛膝汁一升 乾漆一斤半熬

右三味擣漆爲散內地黃等汁中攪微火煎取堪爲丸止停攪丸如梧子一服三丸以酒服日再若覺腹內痛食後乃服之

婦人崩中方一十一首

小品療婦人崩中晝夜十數行醫所不能療方

芎藭八兩

右一味切以酒五升煮取三升分三服不飲酒水煮亦得

千金療崩中方

白茅根二斤 小薊根五斤

右二味切以酒五升煮取四升分稍稍服

又療婦人白崩中方

芎藭 阿膠炙 桂心 赤石脂 小薊根各二兩 乾地黃四兩 伏龍肝如雞子大七枚

右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓內膠令烊

分爲三服日三 並出第四卷中

千金翼療婦人白崩中馬通方

白馬通汁二升 乾地黄四兩 伏龍肝如雞子大七枚 桂心

芎藭 阿膠炙 小薊根 白石脂各二兩

右八味切以酒七升合馬通汁煮取三升去滓内膠令烊分服日三

又療婦人崩中及痢一日一夜數十起大命欲死多取諸根煎丸得入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多仍合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得二斛爲佳薔薇根煎方

懸鈎根 薔薇根 柿根 菝葜各一斛

右四味剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煮使三分減一去滓無大釜稍煮如初法都畢會汁煎取可丸丸如梧桐子酒服十丸日三良 並出第八卷中

文仲療婦人崩中漏下去青黄赤白使人無子方

禹餘粮研 赤石脂研 牡蠣熬研 桂心

烏賊魚骨 竈下黄土各等分

右六味爲散以清酒服方寸匕日二服忌生葱

又方

鹿茸炙 當歸各二兩 蒲黄五合

右三味擣散酒服五分匕日三度

又方

取好書墨爲末二匕若燒露蜂房末三指撮酒服之

又方

常炙豬腎食之 並出第九卷中

必効療崩中方

丁香一百顆 好酒一大升

右二味煮取三兩沸去滓頓服

又療婦人崩中無久近悉主之方

伏龍肝一斤先於盆中以水二斗研令泥澄取一斗二升用煮諸藥 小薊根

桑寄生 續斷 地榆 艾葉各三兩

阿膠 當歸 赤石脂研 厚朴炙各二兩

生薑五兩

右十味切以伏龍肝水煮取三升絞去滓分三服 忌如常法

崩中去血方一十三首

廣濟療崩中去血日數升方

龍骨研 赤石脂研各六分 烏賊魚骨 牡蠣粉

肉蓯蓉各五兩 龜甲炙 芍藥 續斷各八分

右八味擣散飲服方寸匕日三漸加之加乾地黄十分佳

又療崩中下血不止并主男子卒衄血方

取東南引桃枝三握細剉以水四升煮取一升頓服

未差更服良

删繁療婦人崩中泄血不斷淋瀝連年不絕黃瘦傷損芍

藥散方

芍藥四分 牡蠣熬 乾地黃 白朮

乾薑 烏賊魚骨 附子炮 桂心

黃耆 龍骨各八分研

右十味擣散酒服方寸匕良

小品療崩中去血方

春生薊根汁一升溫服之亦可以酒煮隨意用之

又療婦人暴崩中去血不息方

牡蠣熬令赤 兔骨炙令十分

右二味擣篩為散以酒服方寸匕妙

集驗療婦人女子忽暴崩中血不斷或如鵝鴨肝者方

小薊根六兩 阿膠炙 當歸 芎藭

續斷 青竹茹各三兩 竈中黃土 地榆根各四兩

生地黃八兩 赤馬通汁一升

右十味切以水八升合馬通汁煮取二升半分為三服

未全止服三四劑後服此丸方

續斷 甘草炙 鹿茸炙 小薊根

丹參各五分 乾地黃十分 芎藭 阿膠炙

赤石脂 當歸 地榆各六分 柏葉四分熬

𤛇牛角鰓炙黃 龜甲炙令黑各十二分

右十四味擣篩蜜丸如梧子以酒服十丸日再加至三

十丸忌如常法千金同

千金療婦人崩中去血積時不止起死人方

肥羊肉三斤去脂 乾薑 當歸各三兩 生地黃汁二斤

右四味切以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁合

藥煮取三升分為四服尤宜羸瘦之人服妙

又療崩中去血產後餘疾丹參酒方

艾五斤 生地黃 地榆各五斤 丹參五斤

忍冬五斤

右五味合擣之以水漬三宿去滓煮取汁以糯米一石

釀酒飲服之

又溫經湯療崩中去血一斗服之即斷月水過期不來者

服之亦佳方

吳茱萸三兩 麥門冬一升去心 半夏八兩 當歸

芎藭 人參 芍藥 牡丹

桂心 阿膠炙 生薑 甘草各二兩炙

右十二味切以水一斗煑取三升分服忌如常法並出第四卷中

千金翼療婦人崩中去血不止薊根酒方

大小薊根各一斤酒一斗漬五宿任意多少服之良

又療婦人崩中下血櫸柳葉湯方

櫸柳葉三斤　麥門冬一兩去心　乾薑各二兩　甘草一兩炙

乾棗十枚

右五味切以水一斗煑櫸柳葉取八升去滓內藥煑取三升分三服日三並出第八卷中

救急療崩中下血數斗氣欲絶方

伏龍肝五兩　人參一兩　麝香二兩　生薑四兩

右四味切以水一大斗煑取二升下藥煎取一升半更別研伏龍肝一雞子許并香內湯中攪令調分服

帶下方一十首

廣濟療帶下病方

芍藥七大兩熬令黄黑爲散以酒服三錢匕

千金療帶下方

枸杞根一斤　生地黄五斤

右二味切以酒一斗煑取五升分爲三服

又方

燒牛角末酒服方寸匕日三

又方

桑耳燒令黑酒服方寸匕日三

又方

豉酒亦佳

又方

燒馬左蹄末酒服方寸匕日二

又方

燒狗頭骨灰亦佳

又方

以水煑甑帶汁服之亦佳並出第四卷中

救急療帶下方

以竈下黄土水和爲泥作彈子丸百枚暴乾以火燒熱極以三年酢漬一丸綿裹內玉門中唯深待冷即易之新患者二十丸差久者五十丸餘皆自知即佳

必効療婦人帶下方

取兎皮燒令煙斷爲末酒服方寸匕妙

婦人虛羸及月病不能食方三首

千金療婦人虛羸短氣胷脅逆滿風氣石斛生地黄煎方

石斛　甘草炙　紫菀各四兩　桂心二兩

生地黃汁　淳酒各八升　茯苓一斤　大黃八兩
麥門冬二升去心　桃人半升去皮尖熬
右十味擣末合盛銅器中加炭火內鹿角膠一斤數攪
之得一升次內飴三斤白蜜三升合和調更於銅器中
釜湯上煎攪之以生竹抄無令著器攪令盡相得藥成
先食酒服如彈丸日一服
又鍾乳澤蘭丸主婦人久羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷
不能食面目瘀黑憂恚百病悉主之方
澤蘭九分　芎藭　甘草炙　山茱萸
白芷　牛膝　當歸　署預

藁本各五分　栢子人　人參　乾地黃
麥門冬去心　石膏　石斛各六分　細辛
桂心各四分　蕪荑二分　艾葉三分
右十九味擣篩蜜和丸如梧子大服二十丸加四十丸
酒下忌如常法並出第四卷中
又急療婦人月病不調或一月不來或隔月不來或多或
少臍絞痛面色痿黃四體虛敗羸瘦不能食方
當歸　牛膝　桃人去皮尖　牡丹皮
大黃三兩別漬　芎藭　土瓜根各二兩　芍藥
朴消　桂心各二兩　虻蟲去足翅熬　水蛭熬各十枚

右十二味切以水九升煮取三升分溫服忌如常法
婦人陰蝕及疳方八首
千金療陰蝕瘡方
當歸二兩　地榆三兩　甘草炙　芎藭
芍藥各二兩
右五味切以水五升煮取二升洗之日三夜一
又方
蒲黃一升　水銀一兩
右二味研之以粉上
又方

肥豬肉三十斤以水三石煮取熟去肉入盆中浸之
冷即易不過三二度並出第三卷中
崔氏療陰蝕洗搨湯方
甘草炙　乾漆各一兩熬　黃芩　乾地黃
芍藥　當歸各二兩　龜甲五兩炙
右七味切以水七升煮取半去滓以綿帛內湯中以搨
瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即裛乾捻
取甘濕散薄付瘡上使遍可經半日又以湯搨搨訖如
前傅藥其內甘濕散是蚺蛇膽等六味者是在前療甘
濕卷中余家婢遇此疾百方療不差蝕處作兩瘡深半

寸余於涓子方中檢得此甘草湯方仍以白處蚺蛇脂散用不經七日瘡乃平復甚効凡救十八人手下郎活遇斯疾者請廣流布傳之出第十卷中

又療疳瘡用大効方

蚺蛇膽真者研　青木香　石硫黄研　鐵精

麝香各四分　舊用五月五日蝦蟆麝香臨時分之多少入用緣麝香辟蛇毒若先以相和蛇膽即無力也

右六味等分擣篩為散更細研有患取如三棊子和井花水日再服服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取散如二棊子內竹管裏深吹入下部中亦日

再老小量減其熏法每日一度不用再為之甚良

又療疳蟲食下部及五藏方

取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿緾之又擣石硫黄為末將此綿緾桃枝撚轉之令末少厚又截一短竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝熱燃熏之

並出第三卷中

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟆兔屎等分末傳之良

古今錄驗療婦人陰蝕苦中爛傷狼牙湯方

狼牙三兩㕮咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如雞子中黃一枚煎沸適寒温以綿濡湯以瀝瘡中日四五度即愈

陰中腫痛方四首

肘後療陰中腫痛方

灸枳實以熨之

經心錄療婦人陰中腫痛不可近者湯洗方

防風三兩　大戟二兩　艾五兩

右三味切以水一斗煮取五升温洗陰中日可三度良

古今錄驗療婦人陰腫堅痛礬石散方

礬石二分熬　甘草半分炙　大黄一分

右三味擣篩取棗大綿緾導陰中二十日即愈

又療婦人陰腫若瘡爛麻黄湯洗之

麻黄去節　黄連　蛇牀子各一兩　酢梅十枚

右四味切以水一斗煎取五升洗之

陰中瘡方五首

集驗療婦人陰中痛生瘡方

羊脂一斤　當歸　杏人去皮尖　白芷

芎藭各一兩

右五味細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆一枚綿裹藥內陰中日一度

肘後療女子陰中瘡方

末硫黃傅瘡上

又療女子陰中瘡方

杏人燒末　雄黃　礬石各二分燒　麝香半分

右四味和傅之日三度

古今錄驗療婦人陰中生瘡黃芩湯洗方

當歸　黃芩　芎藭　大黃

礬石各二分　黃連一分　雄黃二分

右七味切以水五升煮取四升洗瘡日三度

又療婦人陰中生瘡雄黃散方

芎藭　藜蘆　雄黃研　丹沙研

蜀椒汗　細辛　當歸各一分

右七味擣篩散取方寸匕綿裹內陰中又傅外瘡方忌如常法

陰痒方五首

廣濟療苦產門痒無計方

蚺蛇膽研　雄黃研　石硫黃研　朱砂研

峭粉研　藜蘆　蕪荑各二分

右七味擣細篩重羅令細以臘月猪脂和如泥取故布作缘子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易時宜以猪椒根三兩煮湯洗乾拭內藥佳

崔氏療陰痒痛不可忍方

取蒜隨多少水煮作湯洗之日三

又方

取狼牙蛇牀子煮作湯洗日三

又方

取杏人燒作灰乘熱綿裹內陰中良　並出第十卷中

經心錄療陰痒方

枸杞根一斤水三升煮十沸適寒溫洗之

陰中痒有蟲方六首

千金療人陰蟲瘡方

以肥猪肉一斤以水煮肉令爛去肉以湯令極熱便灑瘡上冷易之

又方

取狼牙兩把以水五升煮取一升洗之日五六度　並出第三卷中

崔氏療陰痒似有蟲狀煩悶眞丹散方

眞丹研一分　礬石燒研二分　芎藭四分

右三味爲散以穀囊盛著陰中蟲當死盡

又陰痒有蟲方

取雞肝去脂及熱內陰中蟲當盡死 並出第十卷中

古今錄驗療陰痒有蟲方

取牛肝截五寸繩頭內陰中半日蟲入肝出之猪肝亦得

又療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少氣思美食方

用生鯉魚長一尺去頭肉取骨擣末熬黃黑以猪脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛處卽止

陰下脫方四首

廣濟療陰下脫出方

皂莢去皮子炙 半夏洗 大黃 細辛各四分

蛇牀子六分

右五味擣散薄絹袋盛如指大內陰中日二易又以羊脂煎訖適塗上以鐵精傅脂上多少令調以火炙布合熨以熨之研礬石酒服方寸匕日三服

集驗療婦人陰下脫散方

當歸 黃芩 牡蠣熬各二兩 芍藥一兩半

猬皮一兩切熬

右五味擣散酒服方寸匕日三服禁舉重良 千金同

千金療陰下脫硫黃散方

硫黃研 烏賊魚骨各二分 五味子三銖

右三味擣散以粉上日三 出第三卷中

千金翼療諸婦人陰下脫方

細研礬石末服方寸匕日三服 出第六卷中

陰挺出方三首

廣濟療婦人子藏挺出數痛洗方

蛇牀子一升 酢梅十四枚

右二味以水五升煮取二升半洗痛處日夜十過良

又方

烏頭炮 白及各四分

右二味擣散取方寸匕以綿裹內陰中令入三寸腹內熱卽止日一度著明晨有熱更著以止爲度

集驗療婦人陰下挺出方

蜀椒 烏頭 白及各二分

右三味擣篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱明旦更著差止 千金同

女人傷丈夫頭痛方二首

集驗療女人傷於丈夫四體沉重噓吸頭痛方

生地黃八兩 芍藥五兩 香豉一升 蔥白一升切

生薑四兩 甘草二兩炙

右六味切以水七升煮取二升半分三服不得重作慎
房事千金同

千金翼療諸婦人傷丈夫若頭痛欲嘔悶桑白皮湯方

桑根白皮半兩 乾薑半兩 桂心五寸 大棗二十枚

右四味切以酒一斗煮三四沸去滓分溫服之適衣無
令汗出千金同出第八卷中

交接輒血出痛方二首

千金療女人交接輒血出方

桂心二分 伏龍肝二分

右二味擣末以酒服方寸匕差止出第三卷中

崔氏療合陰陽輒痛不可忍方

黃連六分 牛膝 甘草炙各四分

右三味切以水四升煮取二升洗之日三四度差止出第十卷中

童女交接他物傷方三首

集驗療童女交接陽道違理及他物所傷犯血出流離不
止方

取釜底墨斷葫蘆以塗之

又療童女交接陽道違理血出不止方

燒髮并青布末為粉塗之

又方

割雞冠取血塗之

小戶嫁痛方四首

千金療小戶嫁痛連日方

甘草三分炙 芍藥二分 生薑三分 桂心

右四味切以酒二升煮取三沸去滓分溫服之神良出第三卷中

千金翼療小戶嫁痛單行方

牛膝五兩

右一味切以酒二升煮再沸分三服

又療婦人嫁痛單行大黃湯方

大黃三兩

右一味以酒一升煮一沸頓服

又療婦人小戶嫁痛烏賊魚骨散方

烏賊魚骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三並出第八卷中

坐藥方三首

通真論療婦人子門冷坐藥法

蛇床子四分 茱萸六分 麝香一銖

右三味擣散蜜丸綿裹如酸棗內之下惡物為度

近効坐藥主下冷子門痒悶方

吳茱萸　蓴薹子（熬各二分）　蛇牀子（三分）　無食子（一枚）

右四味爲散以綿裹如棗許內子宮中令熱爲度

又方

遠志（二分）　蛇牀子　五味子（各四分）　乾薑

蓮花葉（各三分）

右五味擣散以口中玉泉和兎矢大內陰門中去玲內熱良夏侯拯錄

婦人欲斷產方四首

小品斷產方

故布方圓一尺燒屑以酒飲服之終身不產（千金云覆子故布）

又療姙身欲去之并斷產方

栝樓　桂心（各三兩）　豉（一升）

右三味切以水四升煮取一升半分服之

又方

附子二枚擣爲屑以淳苦酒和塗右足去之大良

千金斷產方

油煎水銀一日勿息空肚服棗大一丸永斷不損人

廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

唐王燾先生外臺秘要方第三十四卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十五卷目録（小兒諸疾上三十六門）

小兒方序例論一首

小兒初生將護法一十七首

小兒初生將息法二首

小兒初受氣論一首

小兒變蒸方二首

相兒命長短法並論二十八首

小兒藏衣法五首

浴兒法一十一首

剃兒頭法一首

哺兒法三首

搖謝法一十二首

揀乳母法一首

小兒驚癇啼壯熱不喫妳吐不已不小便方五首

小兒將息衣厚薄致生諸癇及諸疾方並灸法二十八首

小兒驚悸方二首

小兒夜啼方一十首

小兒驚夜啼方七首

小兒客忤方一十首
小兒癥瘕癖方六首
小兒痰結方二首
小兒因食痞滿羸瘦不下食肚脹方四首
小兒食不下及不消不嗜食方四首
小兒霍亂方一十二首
小兒霍亂雜療方六首
小兒吐痢方四首
小兒噦方二首
小兒口噤方四首

小兒重舌方並灸法方十三首
小兒鵝口鷰口方六首
小兒口瘡方五首
小兒口中涎出方三首
小兒舌上瘡唇腫方五首
小兒咽喉生瘡方二首
小兒喉痺方四首
小兒停耳方四首
小兒鼻塞方四首

唐王燾先生外臺秘要方第三十五卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
弟位道素行父校閱

小兒方序例論一首

千金論曰夫生民之道莫不以養小為大若無小卒不成大故易稱積小以成高大詩有厥初生民傳云聲子生隱公此之一義卽是從微至著自少及長人情共見不待經史故今斯方先婦人小兒後丈夫耆老者則是崇本之義也小兒氣勢微弱醫人欲留心救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜而言之可為太息者矣小品方云凡人年六歲以上為小十六以上為少三十以上為壯五十以上為老其六歲以下經所不載所以乳下嬰兒有病難療者皆為無所承據也中古有巫妨者立小兒顱顖經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心於少小詳其方意不甚深細小有可採未為至秘今博撰諸家及自經用有效者為上下兩卷可披而尋之凡百

君家皆宜達茲養小之術則無夭橫之禍也出第五卷中

小兒初生將護法一十七首

崔氏療小兒初生便以綿裹指拭口中及舌上青泥惡血此為之玉衡衡一作衡若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

又療兒生落地不作聲方

取煖水一器灌之須臾自當啼

又兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發

又方

以葱白徐徐鞭之即啼

又方

小兒初生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴之然後速斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼將煖氣呵七遍然後纏結所留臍帶當令長至兒足趺上短即中寒令兒腹中不調常下痢若先斷臍然後浴者則臍中水中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中若有蟲宜急剔撥去之不爾當入兒腹成疾矣

又兒中水及中冷則令兒腹中絞痛夭糺啼呼面青黑此是中水之過兒尿清一云糞青者冷也與兒臍中水即同方

當灸粉絮熨之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯若輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者但擣當歸末和胡粉敷之仍灸絮日日熨之至百日乃愈以啼呼止為候

又兒初生法

宜用父故衣裹之若生女宜以母故衣勿用新帛切須依之令兒長壽

又一期之內兒衣皆須用故綿帛為之善兒衣綿帛特忌厚熱慎之慎之

又兒洗浴斷臍訖𦁖抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯取甘

草可中指一節搥碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之可得一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胷中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得吐可消息計如饑渴須臾復與之若前所服及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止得吐去惡汁令兒心神智慧無病也吮一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與之乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也

又小兒初生三日中須與朱蜜只不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變噤痓而死也與朱蜜法

以真經飛鍊朱如大豆以赤蜜一蜆殼和之以綿纏

沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三
日與之則用三豆許也亦勿過此則傷兒與朱蜜
訖可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精
神止驚辟惡氣除小兒百病三月後應開腸胃助穀
神可研米作厚飲如乳酪厚薄以大豆粒多與嚥之
嚥三豆許止日三與之滿七日乃可與哺也
又兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百
日如棗若乳汁少不得依此法當用意少少增之若
至二十日而哺者令兒無病兒若早哺之及多者令
兒頭面身體喜生瘡愈而復發令兒尫弱難長乳兒

不用太飽飽則令吐候兒吐者乳大飽也當以空乳
乳之即消夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒
欬痢乳母妳兒當先以手按散其熱氣勿令乳汁奔
出以令兒噎如噎即便奪其乳令得氣息定復乳之
如是十反五反視兒饑飽以節度之一日之中幾乳
而足以為常準又常捉去宿乳也乳母與兒臥當以
臂與兒枕之使乳與兒頭平乃可乳之令兒不噎母
欲睡即奪去其乳勿令填兒鼻口乳不知饑飽忌之
又兒初生著口噤不開不收乳方
赤足蜈蚣半枚去足炙令焦末研之絹篩以猪乳二
合和之分三四服與之差
又兒著口噤體熱者方
煖竹瀝二合分四五服之
又兒新生慎不可逆灸灸之忍痛動其五脉因喜成癇是
以田舍小兒任其自然皆無此夭也
又兒初生有鵝口者其舌上有白屑如米劇者鼻外亦有
療之法
以髮纏筋頭沾井花水撩拭之三旦如此便去不著
可煮栗荴汁令濃以綿纏筋頭沾拭之無栗荴煮栗
木皮如井花水法千金同並出第十上卷中

又仲療兒生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下
漸斷囊令兒聲不發不轉法
以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作
末以敷之即止千金同
又兒初生六七日後血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨
也若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者若懸癰有脹起者
以綿纏長針留刃處如粟米許大以刺決之令氣洩去青
黃赤血汁也一刺之止消息一日若不消又刺之不過三
刺自消或餘小小未消三刺之亦止自然消也有著舌下
如此者名重舌有著頰裏及上齶如此者名重齶有著齒

斷上者名垂斷皆剃之去血汁悉止千金同

又療兒初生出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血阻一作沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼一作不啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也喜不育如此者宜與龍膽湯方在客忤部中十味者是也千金同

兒初生將息法二首

千金兒初生不可令衣過厚熱令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃又小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也天和暖無風之時令母將於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏於幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日軟脆不堪風寒也出第五卷中

小兒初受氣論一首

崔氏論曰凡小兒初受氣在娠一月結胚二月作胎三月有血脉四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月藏腑具九月穀氣入胃十月百神能備而生矣生後六十日目瞳子成始笑應和人百五十日百脉生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三

百日髕骨成能獨倚三百六十日爲一朞膝骨成乃能行此其定法若有不依期者必有不平之處

小兒變蒸論二首

崔氏小兒生三十二日一變六十四日再變兼蒸九十六日三變百二十八日四變又蒸百六十日五變百九十二日六變又蒸二百二十四日七變二百五十六日八變又蒸二百八十八日九變三百二十日十變又蒸此小變蒸畢也後六十四日又蒸蒸後六十四日又一大蒸蒸後百二十八日又一大蒸此大小蒸都畢也凡五百七十六日乃成人所以變蒸者皆是榮其血脉改其五藏故一變畢輒覺情態忽有異也其變蒸之候令身熱脉亂汗出目睛不明微似欲驚不乳哺上脣頭小白泡起如珠子耳冷尻亦冷此其診也單變小微兼蒸小劇先期四五日便發發後亦四五日歇凡蒸平者五日而衰遠至七日九日而衰當變蒸之時慎不可療及灸刺但和視之若良久熱不已可微與紫丸熱歇便止若於變蒸中加以天行溫病或非變蒸而得天行者其診皆相似唯耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當歇便就差若猶不都除乃與紫丸下之其間節度甚多恐悠悠不能備行今略疏其經要者如此

又黑散方

麻黄一分去節 大黄一分 杏人二分去皮尖熬令變色

右三味先擣麻黄大黄為散杏人別擣如脂乃細細內散又擣令調和訖內密器中一月兒服如小豆大一枚以乳汁和服之抱令得汗汗出温粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之為度

又紫丸方

代赭 赤石脂各一兩 巴豆三十枚去心皮熬 杏人五十枚去尖皮熬

右四味擣代赭等二味為末巴豆杏人別擣如膏又內二味合擣三千杵自相和若硬入少蜜更擣密器中盛

封之三十日兒服如麻子一丸與少乳汁令下喉食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減也小兒夏月多熱喜令發疹二三十日輒一服甚佳此丸無所不治代赭須真者若不真以左顧牡蠣代之忌豬肉蘆筍 並出第十上卷中

相兒命長短法並論二十九首

千金翼兒生枕骨不成者能言而死 膝骨不成者能倨而死 掌骨不成者能匍匐而死 踵骨不成者能行而死 臏骨不成者能立而死 身內不收者死 魚口者死 股間無生肉者死 頤下破者死 陰不起者死 陰囊下白者死赤者死

相法甚博略述十數條而已

兒初生陰大而與身色同者成人 兒初生頭上有旋毛早貴妨父母 兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽 兒初生汗血者多厄不壽 兒初生目視不正數動者大非佳人 兒初生自開目者不成人 兒初生通身軟弱如無骨者不成人 兒初生髮稀少者不聽人 兒初生臍小者不壽 兒初生早坐早行早語早齒生惡性者非佳人 兒初生頭四破者不成人 兒初生

頭毛不周匝者不成人 啼聲散不成人 啼聲深不成人 汗不流不成人 小便凝如脂膏不成人 常摇手足者不成人 無此狀候者皆成人

兒初生臍中無血者好卵下縫通達黑者壽鮮白長大者壽

論曰兒三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其夭壽兒小時識悟通敏過人者多夭則項橐顏回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神彫琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭則楊脩孔融之徒是也由此觀之夭壽大略可知也亦由梅花早發不覩歲寒甘菊晚榮終於年事是晚成就者壽之兆也 並出第十一卷中

小兒藏衣法五首

崔氏凡藏兒衣法

兒衣先以清水洗之勿令沙土草汙又以清酒洗之仍內錢一文在衣中盛於新瓶內以青綿裹之其瓶口上仍密蓋頭且置便宜處待滿三日然後依月吉地向陽高燥之處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸惟須牢築令兒長壽有智慧若藏衣不謹為豬狗所食者令兒癲狂蟲蟻食者令兒病惡瘡犬鳥食之令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水洿池令兒溺死近故竈傍令兒驚惕近井傍者令兒病聾盲弃

道路街巷者令兒絕嗣無子當門戶者令兒聲不出耳聾著水流下者令兒青盲棄於火裏者令兒生瘡瘡著林木頭者令兒自絞死如此之忌皆須慎之

又安産婦及藏衣天德月空法

正月天德在丁 月空在丙壬 二月天德在坤 月空在甲庚 三月天德在壬 月空在丙壬

四月天德在辛 月空在甲庚 五月天德在乾 月空在丙壬 六月天德在甲 月空在甲庚

七月天德在癸 月空在丙壬 八月天德在艮 月空在甲庚 九月天德在丙 月空在丙壬

十月天德在乙 月空在甲庚 十一月天德在巽 月空在丙壬 十二月天德在庚 月空在甲庚

凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋之若有過反支者宜以衣內新瓶盛密封塞口掛於宅外福德之上向陽高燥之處待過月然後依法埋藏之大吉

又法

甲寅旬日十日不得藏埋兒衣以瓶盛密封安置空處度十日卽藏埋之

又法

甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通掛著兒生處過此五日卽埋之亦不得更過此日

又法

甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊巳日藏

衣吉戊巳日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生兒壬癸日藏衣吉 並出第十上卷中

浴兒法一十一首

崔氏初生浴兒良日此謂初生浴兒以後重浴亦吉寅卯酉日大吉壬午丁未癸巳日凶

又浴兒虎頭骨湯主辟除惡氣兼令兒不驚不患諸瘡疥方

虎頭骨五兩 苦參四兩 白芷三兩

右三味切以水一斗煮為湯內猪膽汁少許適寒溫以浴兒良

又療兒若卒客忤中人吐下不乳哺面青黃色變弦急者以浴之方

取錢七十文以水三斗煮令有味適寒溫浴兒良

又療兒生三日浴除瘡方

桃根　李根　梅根各八兩

右三味切以意著水多少煮令三四沸以浴兒

又療少小卒寒熱不佳不能服藥六物莽草湯浴兒方

莽草　丹參　蛇床子　桂心各三兩

菖蒲半斤　雷丸一斤

右六味㕮咀以水三斗煮三五沸適寒溫浴兒避日向陰處

又療少小身熱一物李葉湯方

李葉無多少以水煮去滓以浴兒良 忌如前

又方

白芷煎湯浴兒佳根苗皆得

又方

苦參湯浴兒良

又凡尋常浴兒不緣別療諸病只就浴者方

湯熟添少許清漿水一捻鹽浴兒浴訖以粉摩兒既不畏風又引散諸氣

又兒不用數浴數浴多背冷令兒發癇其湯必適寒溫得所

又療少小壯熱不能服藥宜此十二物寒水石粉散方

寒水石　芒消　滑石　石膏

赤石脂　青木香　甘草炙　大黃

黃芩　芎藭　麻黃去節　牡蠣熬

右藥各等分擣篩以粉一升和藥屑三合復下篩以粉粉兒日三熱退即止 本方有防風無牡蠣

又少小盜汗三物黃連粉方

黃連　牡蠣熬　貝母

右藥各等分擣篩以粉粉兒良 出第十上卷中

剃兒頭法一首

崔氏初剃兒頭良日寅丑日吉丁未日凶

哺兒法三首

崔氏初哺兒良日以平定成日大吉其哺不得令鹹

又方

寅丑辰巳酉日良

又方

男戊巳日不得女丙丁日不得

擇謝法一十二首

遊按相一作

崔氏軒轅者乾神天公相使者風伯犯之令兒驚啼可療梁杖六寸埋生處大吉

雷公者震神太陰使者天馬犯之令兒頸悶狼聲辟之以三冒家肉酒餅於產處謝之大吉

咸池者坎神天之雨師使者犯之令兒啼不止用羊脯酒於生處謝之吉

豐隆者艮神天之東明使者天候也害氣犯之令兒乍寒乍熱大腹以白魚二枚於生處謝之又大豆一升投井中亦大吉

招搖者坤神天上使者犯之令兒驚空瘈不止以酒脯生處謝之即愈

天候者巽神天一執法使者犯之令兒腹脹張眼以白魚二枚於生處謝之吉

吳時者離神天一將軍逆擊使者犯之令兒驚癇用馬蹄五寸於生處謝之吉又以白魚五枚并棗餅埋其生處吉

大時者兌神小時北斗使者犯之令兒腹脹下痢餅之以酒脯於生處謝之又以大豆一升投井中吉

犯月殺者小兒驚啼用丹雄雞血於生處謝之吉

犯白虎者用稻米一升雞子三枚於生處謝之吉黍米亦得

犯大夫者用羊脂三枚及稻米一升於生處謝之吉又用雞毛羊皮黍米亦得

犯日遊者令兒口噤色變欲死者用三居家肉麥餅於生處謝之吉

揀乳母法一首

崔氏乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉血氣所生其乳兒者皆須性情和善形色不惡相貌稍通者若求全備不可得也但取不狐臭瘿瘻氣嗽瘑疥癡瘙白禿癧瘍瀋唇耳聾齆鼻癲癇無此等疾者便可飲兒師見其身上舊灸瘢即知其先有所疾切須慎之耳

小兒驚癇啼壯熱不喫妳吐不已不小便方五首

劉氏療小兒眠睡不安驚啼不喫妳虎睛丸方小兒熱甚

犀角十二分屑　子芩五分　梔子人　大黃各十分

虎睛一枚研

右五味擣篩蜜和如梧子大餅服七丸大小量之以增忌熱麪小兒熱風癇以乳汁或竹瀝研三丸服之漸增以差為度小兒百日以下痺內壯熱以妳汁研四丸與服即差

又療小兒初生不喫妳方

以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與喫即能喫

乳立効以綿纏灌之

又療小兒喫妳不穩三日至七日以來覺壯熱顏色赤及鼻孔黃即恐作撮口及孩子牙關裏有蟲似蝸牛亦似黃頭白蟀螺者方

燒竹取瀝半合和少許牛黃與喫即差又以豬肉拭口即引蟲出或自消便差

又療小兒初生吐不止方

人乳二合　蘧蒢茂少許　鹽兩粟米大

右三味煎三兩沸牛黃兩米許研和與服即差止

又小兒初生不小便方

人乳四合　葱白一寸

右二味相和煎分為四服即小便利神効

小兒將息衣裳厚薄致生諸癇及諸疾方并灸法二十八首

廣濟療小兒驚癇體羸不堪療子母五癇煎方

鈎藤二分　知母　子芩各四分　甘草炙

升麻　沙參各三分　寒水石六分　蚱蟬一枚去翅炙

蜣蜋三枚炙

右九味擣篩以好蜜和薄泔著銅鉢於沸湯上調之攪不停手如飴糖煎成稍稍別出少許一日兒啜之一枚棗核大日夜五六過服不妨五六日兒啜之三枚一百日兒啜四枚二百日兒至三百日兒啜五枚三歲兒啜七枚以意量之

小品云玄中記曰天下有女鳥一名姑獲又名鈎星鬼也喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來也是鳥純雌無雄不産喜落毛羽於中庭置入兒衣中便使兒作癇必死即化為其兒也是以小兒生至十歲衣裳不可露七八月尤忌之

千金夫癇病小兒之惡病也或有不及求醫而致困者然氣發於內必先有候常宜審察其精神而採其候也手白

肉魚際脉黑者是癇候魚際脉赤者熱脉青大者寒青細者為平也

又鼻口乾燥大小便不利是癇候　又眼不明上視喜陽是癇候　又耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癇候脉青大刺之令血出　又小兒髮逆上啼哭面暗色不變是癇候　又鼻口青時小驚是癇候　又意氣下而妄怒是癇候　又身熱小便難是癇候　又吐痢不止厥痛時起是癇候　又身熱目時直視是癇候　又目閉青時小驚是癇候　又咽乳不利是癇候　又身熱頭常汗出是癇候　又目瞳子卒大黑於常時是癇候　又身熱目視不精是癇候　又喜欠目上視是癇候　又臥惕惕而驚手足振搖是癇候　又身熱吐哯而喘是癇候　又臥夢笑手足動搖是癇候　又弄舌搖頭是癇候

以上諸候二十條皆癇之初也見其候便當爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒啼及足脉絕亦依方與湯

又直視瞳子動　腹滿轉鳴　下血身熱　口噤不得乳

又張脊強　汗出發熱　為臥不悟　手足掣瘲喜驚

凡八候癇之劇也如此非復湯爪所能救便當時灸之

又小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解慎不可針灸爪之動其百脉仍因驚成癇也惟陰癇噤痓可針灸爪之凡灸癇當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人也

又癇平旦發者在足少陽　黃昏發者在足太陰　日中發者在足太陽　夜半發者在足少陰　人定發者在足陽明　晨朝發者在足厥陰

右癇發時節病所在視其發早晚灸其所也

又五藏之癇六畜之癇或在四肢或在腹內審察其候隨病所在灸之雖少必差若失其要則為害也

肝癇之為病面青目反視手足搖 灸陽明太陰各三壯

心癇之為病面赤心下有熱短氣息微數 灸心下第二肋端宛宛中此為巨闕也又灸手心主及少陰各三壯

脾癇之為病面黃腹大泄痢 灸胃管三壯俠胃管傍各一壯足陽明太陰各二壯

肺癇之為病面目白口沫出 灸肺俞二壯又灸太陰二壯

腎癇之為病面黑目正直視不搖如尸狀 灸心下二寸二分三壯又灸肘下動脈各二壯

膈癇之為病目反四肢不舉 灸風府又灸頂上鼻人中下唇承漿皆隨年壯

腸癇之為病不動搖 灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中可五十壯

右五藏癇證候

又馬癇之為病張口搖頭馬鳴欲反折 灸項風府臍中二壯病在腹中燒馬蹄末服

牛癇之為病目正直視腹脹 灸鳩尾上及大椎各三壯燒牛蹄灰末服

雞癇之為病延頸反折喜驚自搖 灸足諸陽各三壯

羊癇之為病喜揚目吐舌 灸大椎上三壯

豬癇之為病喜吐沫 灸完骨兩傍各一寸七壯

犬癇之為病手屈拳攣 灸兩手心一壯灸足太陽各一壯灸肋戶兩腳脈兩穴各一壯良

右六畜癇證候

凡諸反張大人脊下容側手小兒容三指者不可療也又若目反上視瞳子動當灸頸中取之法橫度口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從額上髮際上行度之灸度頭一處正在額上未合骨中隨手動者是此最要處也次灸當額上入髮際二分許直望鼻為正也次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許次灸頂上迴毛中次灸客主人穴在眉後際動脈是也次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷中是也次灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也一法大人當耳上橫三指小小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脈亦可以針刺令血出次灸玉枕項後高骨是也次灸兩風池穴在項後兩轅筋外髮際陷中是也次灸風府當項中髮際亦可與風池三處高下相等次灸頭兩角兩角當回毛兩邊起骨是也

右頭部凡二十九處兒生十日可灸三壯三十日灸五壯五十日灸七壯病重者具灸之輕者唯灸顖中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷無益也

又若腹滿短氣轉鳴 灸肺募穴在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取之當瞳子是也次灸膻中次灸胸堂次灸臍中次灸薜息薜息在兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨闕穴巨闕在人鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之次灸胃管次灸金門穴金門在穀道前囊之後當中央是也從陰囊下度至大孔前中分之

右腹部一十二處胸堂巨闕胃管十日兒三炷一月以上可五炷陰下縫三炷或云隨年壯以灸之

又若脊強反張 灸大椎并灸諸藏俞及督脊上當中從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸度

丁頭　督也

右背部一十二處十日兒灸三壯一月以上灸五壯

又若手足掣瘲驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次灸心主

次灸合谷次灸三間穴次灸少陽

右手部一十六處其要穴陽明少陽心主尺澤合谷少

商也壯數如上

又灸伏兎次灸三里次灸腓腸次灸解溪次灸陽明次灸少陽次灸然谷

右足部一十四處皆要可灸如上壯數手足陽明謂人

四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣瘲者盡

灸手足十指端又灸本節後

又論曰若病家始發便來告師師可診候所解為法作次

序療之以其節度首尾取差也病家已經雜療無次序不

得制病病則變異其本候後師便不知其前證虛實直依

其後證作療亦不得差也要應精問察之為前師貴者所

配依取其前踐績以為療乃無逆耳前師處湯本應數劑

乃差而病家服一兩劑未効便謂不驗已後更問他師師

不尋前人為療寒溫次序而更為療而不依次前師療則

毙也或前已下之後須平和療以接之而得差也或前人

未下之或不去者或前療寒溫失度後人應調理之是為

療取病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必反

更毙也又茵芋丸療少小有風癇疾至長不除或遇天陰

節變便發動食飲堅強亦發百脈攣縮行步不正言語不

便者服之不發方

茵芋炙　鉛丹熬　鉤藤炙　杜蘅

防葵　石膏研　秦艽各四分　菖蒲

黄芩各六分　松蘿二分　蜣蜋十枚炙　甘草十四分炙

右十二味擣篩丸如小豆三歲以下服五丸三歲以上

服七丸五歲以上服十丸十歲可至十五丸大小量之

又神農本草經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異

於常便是癇候也初出胎血脉不斂五藏未成稍將養失

宜即為病也則不成人其經變蒸之後有病餘證並寬難

中風最暴卒也

又小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癇

又凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛

但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益及變

蒸日滿不解者並宜龍膽湯也方在客忤中若不時下則成大

病病成則難療矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以

去疾若四味紫丸不得下者以赤丸下之赤丸不下當倍

之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并

摩赤膏風癇亦當下之後以豬心湯下之驚癇但按圖灸

之及摩膏不可大下也何者驚癇心氣不定下之內虛益
令甚耳驚癇甚者特為難治如養小兒常慎驚勿令兒聞
大聲抱持之間當安徐勿令怖也又天雷時便掩塞兒耳
幷作餘細聲以亂之
凡養小兒皆微驚以長血脈但不欲大驚大驚乃灸驚脈
若五六十日灸者驚復重甚生百日後灸驚脈乃善
治少小心腹熱除熱丹參赤膏方
丹參　雷丸　芒硝　戎鹽
大黃各三兩
右五味切以苦酒半升浸四種一宿以成鍊豬脂一斤

煎三上三下去滓內芒硝膏成以摩心下冬夏可用一
方但丹參雷丸亦佳 並出第五卷中
千金翼凡小兒之癇有三種有風癇有驚癇有食癇然風
癇驚癇時時有耳十人之中未有一二是食癇者凡是先
寒後熱發癇者皆是食癇也驚癇當按圖灸之風癇當與
豬心湯下之食癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風者
緣衣暖汗出風因而入也風癇者初得之時先屈指如數
乃發作此風癇也驚癇者起於驚怖先啼乃發作此驚癇
也驚癇微者急療勿復驚之或自止也其先不哺乳吐變
熱後發癇此食癇也早治則差四味紫丸逐澼飲最良去

癖速而不虛人赤丸差駃病重者當用之
小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酢臭此欲為
癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從小起常令大便
稀勿使大下也稀後便漸減之屎不酢臭乃止藥
又凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不
下後腹中當小脹滿故當節哺乳將紫丸數日又乳哺小
兒常令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者此腹
中已有小不調也便微服藥停哺但與乳甚者十許日微
者五六日止哺自當如常若不肯哺而欲乳者此是癖為
重要當下之無不差者不下則致寒熱或反吐而發癇或

更致下痢此皆病重不早下之所為也此為難療
又凡小兒有熱不欲哺乳臥不安又數驚此癇之初也服
紫丸便愈不差更服之兒立夏後有病療之慎勿妄灸不
欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又
臍中以膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之
又凡小兒屎黃而臭者此腹中有熱宜微將服龍膽湯若
白而酢者此寒不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚
者小增令小下皆須節乳哺數日令胃氣平和若不節乳
哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚
可過此傷矣 並出第十一卷中

備急療少小百二十種癇病胷中病蛇蛻皮湯方
蛇蛻皮三寸炙 細辛 甘草炙 鉤藤
黃耆各二分 大黃四分 蚱蟬四枚炙 牛黃五大豆許
右八味切以水二升半煮取一升一合百日兒一服二
合甚良窮地無藥物可一二味亦合不可備用然大黃
一味不得常用效
又療少小二十五癇大黃湯方
甘草炙 大黃 甘皮 當歸各一兩
細辛半兩
右五味擣篩以指撮著水一升煮取二合一歲兒服一

合日二
古今錄驗赤湯療二十五種癇吐痢寒熱百病不乳哺方
大黃五兩 當歸 芍藥 黃芩
栝樓 甘草炙 桂心 人參
赤石脂 牡蠣熬 紫石英 麻黃去節各二兩
右十二味擣篩令調盛以韋囊八歲兒以乾棗五枚擘
水八合煮棗取五合兩指撮藥入湯中煮取三沸去滓
與兒服之取利微汗自除十歲用棗十枚三指撮藥水
一升煮二沸服之此湯療小兒百病及癇神驗
又療未滿月及出月兒壯熱發癇鉤藤湯方

鉤藤一分 蚱蟬一枚去翅 柴胡 升麻
黃芩各二分 蛇蛻皮二寸炙 甘草炙 大黃各三分
竹瀝三合 石膏三分碎
右十味切以水二升煮取三合半和竹瀝服一合得利
兒湯色出停後服至五十六十日兒一服一合乳母忌
海藻菘菜等崔氏云若連發不醒加麻黃一分去節
又療百日及過百日兒發癇連發不醒及胎中帶風體冷
面青反張宜服麻黃五癇湯方
麻黃去節 羌活 乾葛 甘草炙
枳實各二分炙 杏人二十枚 升麻 黃芩

大黃四分 柴胡 芍藥各三分 鉤藤皮一分
蛇蛻三寸炙 蚱蟬二枚去翅炙 石膏六分碎
右十五味切以水二升并竹瀝五合煎取六合每服一
合佳
小兒驚悸方二首
必効鉤藤湯療小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出方
鉤藤 人參 蚱蟬炙 子芩各一分
蛇蛻皮三寸炙 龍齒四分 防風 澤瀉各二分
石膏一兩碎 竹瀝三合
右十味切以水二升并竹瀝煎取七合細細服之以差

爲度

又方

牛黃(許研)兩大豆 蚱蟬(二分)(炙各) 龍齒 麥門冬(去心各四分)

人參(三分) 鈎藤(二分) 茯神 杏人(十二枚)

蛇蛻皮(三寸炙)(末入)

右九味切以水二升煎取六合去滓下牛黃末分六服消息服之令盡差

小兒夜啼方一十首

小品療小兒夜啼一物前胡丸方

前胡(隨多少)

右一味擣篩蜜丸如大豆服一丸日三加至五六丸以差爲度(千金同)

又方

以妬娠時食飲偏有所思者以哺兒則愈(千金同)

千金療小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼糞中骨燒作灰水服如黍米粒一枚即定

又療小兒夜啼至明不安寐芎藭散方

芎藭 防已 白朮(各二分)

右三味擣篩以乳和之與兒服之量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和之服如麻子一丸

又方

交道中土 伏龍肝(各一把)

右二味以絹篩水和少許服之瘥

又方

取馬骨燒灰敷乳上飲兒啼即止(並出第五卷中)

備急或常好啼方

取犬頭下毛以絳囊盛繫兒兩手立効

必效小兒夜啼方

以日未出時及日午時仰臥著於臍上橫文屏氣以

朱書作血字其夜即斷啼効

古今錄驗小兒夜啼如腹痛方

䗪蟲(熬令煙盡) 芍藥(炙) 芎藭(熬各等分)

右三味擣末服如刀圭日三以乳服之

又療小兒夜啼不止腹中痛宜以乳頭散方

黃耆 甘草(炙) 當歸 芍藥

附子(炮) 乾薑(各等分)

右六味爲散以乳頭飲兒丸可胡豆三丸大小量之

小兒驚夜啼方七首

廣濟療小兒五驚夜啼龍角丸方

龍角　黄芩　大黄各二分　牡丹皮一分
蚱蟬一枚炙　牛黄五枚小豆大
右六味擣篩蜜和丸如麻子少小以意增減之甚良千金
牡丹作牡蠣崔氏名五驚丸
千金療小兒驚啼方
以雞屎白熬末以乳服少許
又方
以臘月縛猪繩燒灰服之
又方
燒猬皮三寸灰著乳頭飲兒

又方
車轄脂如小豆許內口中及臍中差
又小兒因宿乳不消腹痛驚啼牛黄丸方
大附子二枚炮去皮　牛黄三銖　巴豆去心皮熬　杏人去尖皮
真珠各一兩研
右五味擣附子真珠下篩別擣巴豆杏人合如膏內附子及牛黄擣一千二百杵若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之腸上下悉當微轉藥完出者病愈散出者更服並出第五卷中

文仲隱居效方小兒夜啼不安此腹痛故至夜輒劇狀似鬼禍五味子湯方
五味子　當歸　芍藥　白朮各四分
甘草炙　桂心各二分
右六味切以水一升煮取五合分服之增減量之
小兒客忤一十首
千金論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人為客忤也雖是家人或別房異戶或乳母父母從外還衣服或經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆為忤也發作喘息乳氣未定者皆為客忤其乳母遇醉及房勞後乳兒最劇能殺兒也不可不慎

又論曰凡中客之為病皆頻吐下青黄白色水穀解離腹痛夭糺面色變易其候似癇但眼不上插耳其脉急數者是也宜與龍膽湯下之
又龍膽湯療嬰兒出腹血脉盛實熱温壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此為例若必知客忤及有鬾氣者可加人參當歸各如龍膽秤分多少也一百日兒加半分二百日兒加一分一歲兒加半兩

餘藥皆準爾
龍膽　鈎藤皮　柴胡　黄芩
桔梗　芍藥　茯神　甘草炙各一分
蜣螂二分炙　大黄四分
右十味切以水一升煎取五合為劑也服之如後節度
藥有虚實虚藥宜足數合水也兒生一日至七日分取
一合為三服生八日至十五日分取一合半為三服生
十六日至二十餘日至四十日者盡以五合為三服十
歲亦準此得下即止勿復服也
又少小卒客忤不知人者方
取新熱馬屎一枚絞取汁飲兒下便愈亦治中客忤

而啞啼面青腹強者
又少小見人來卒不佳腹中作聲者二物燒髮散方
用向來者人頭生髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細
末和乳飲兒即差
又少小中忤人一物馬通浴湯方
用馬通三升火燒令煙盡以酒一斗煮三沸去滓以
浴兒即差
又凡乘馬行還得汗氣臭又未盥洗易衣裝而便向兒邊
令兒中馬客忤兒忽卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物
馬氣皆令兒中馬汗氣及客忤慎護之特重一歲兒也
又凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病欲防之法諸
有從外來人及有異物入戶當將兒迴避之勿令見也若
不避者即燒牛糞令有煙氣置戶前則善
又方
吞麝香如大豆許立愈
又療少小客忤二物黄土塗頭方
以竈中黄土蚯蚓屎等分合擣如雞子黄大塗
兒頭上及五心良一方雞子清和如泥
又療小兒犯客忤發作喘將方

取母月衣覆兒上大良
又療卒客忤方
剪取驢前膊胛上旋毛大如彈丸以乳汁煎之令毛
消藥成著乳頭飲之下喉即愈
又療小兒卒客忤方
銅鐵鼻燒令赤投少許酒中大兒飲之小兒不能飲
者含與之即愈並出第五卷中
小兒癥瘕癖方六首
廣濟療少小及大人腹中宿食積成癥癖兩脅妨滿氣息
喘急不能食面黄日漸瘦腹大服便除百病紫葳丸方

代赭 研　丹砂 研　大黃 各八分　青木香
當歸 各五分　桂心 四分　犀角 屑三分　巴豆 六分
右八味擣篩蜜和丸如梧子大人小兒量之十歲兒服大豆二丸六歲者小豆許二丸以下臨時斟酌要瀉病出為度久疾日一丸以溏泄而已不在猛瀉忌如常法

又療小兒痃癖發腹痛不食黃瘦鼈甲丸方

鼈甲 炙　郁李人 各八分　防葵　人參 各五分
訶黎勒 皮七顆　大黃 四分　桑菌 三分
右七味擣篩蜜丸大小量之以酒飲乳服五丸至十丸

千金牛黃鼈甲丸療小兒癖實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃 一分　鼈甲 炙　麥麴 熬　柴胡
大黃　枳實 炙　芎藭 各二兩　厚朴 炙
茯苓　桂心　芍藥　乾薑 各半兩
右十二味擣篩蜜丸如小豆日三服以意量之

又療小兒心下生痞痰澼結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳芫花丸方

芫花　黃芩 各四分　大黃　雄黃 細研各十銖
右四味擣篩為末蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲以下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避良

又療小兒痰實結聚宿癖羸露瘦不能飲真珠丸方

真珠 半兩研　麥門冬 一兩去心　蕤人 五十枚一云二百個
巴豆 七枚去心皮熬一云四十枚
右四味擣篩蜜和丸朞歲兒服二丸小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為度當下病赤黃白黑葵汁勿絕藥病盡下自止又服令小兒肥白無病已試驗 並出第五卷中

劉氏療小兒冷癖痃癖氣不下食瘦時時肋下痛方

防葵　當歸　枳實 炙　厚朴 炙
枳實　人參　黃耆　茯神
白朮　訶黎勒皮 各八分　郁李人 去皮
柴胡　大麻人　芍藥　橘皮
防風　紫菀 洗去土　薏苡人 各六分　鼈甲 炙
三稜根 各十二分　桂心 七分　仙鼠糞 二枚如無以二合代
大附子 二枚炮　乾薑 二分末　甘草 炙　乾地黃 各十分
大黃 十分　五味子 四分　檳榔 四顆　牛膝 二分
右三十味擣篩蜜丸如梧子大小增減以意量之須飲服之良

小兒痰結方二首

千金療少小宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦芒消紫丸方

芒消四分熬　大黃四兩　半夏洗二兩　代赭一兩

甘遂二兩熬　巴豆三百枚去心皮熬　杏人一百二十枚

右七味擣篩別治巴豆杏人令如膏擣數千杵令相和如強內少蜜百日兒服如胡豆十丸過百日至一歲服二十丸隨兒大小以意節度之當候兒大便中藥出爲愈若不出復與加初　出第五卷中

古今録驗療八歲以上兒熱結痰實不能下食方

大黃十二分　柴胡九分　黃芩　知母各十二分

升麻十分　枳實炙　杏人各六分　芍藥

梔子各八分　細辛二分　竹葉切一升

右十一味切以水六升煮取一升八合分四服十歲兒分三服以下以意消息多少量之　千金有桔梗黃連無枳實杏人

小兒因食痞滿羸瘦不下食肚脹方四首

小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食羅惡辛苦乳汁不起兒哺不爲肌膚心腹痞滿痿黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之令充悅方

芍藥十分炙令黃　黃耆　鼈甲炙　人參各四分

柴胡八分　茯苓六分　甘草炙　乾薑各二分如熱以枳實代

右八味擣篩蜜和爲丸如大豆服五丸日二服忌如常法　千金有大黃無黃耆云服二丸一歲以上乳服三丸七歲兒服十丸日二

千金療少小傷寒久病不除差復劇羸瘦骨立五味子湯方

五味子十銖　大黃六銖　芒消五分　麥門冬六分去心

石膏一兩　甘草炙　當歸　黃芩

黃連　前胡各一分

右十味切以水三升煮取一升半服二合下利即止効

又療小兒羸瘦惙惙常服不妨乳方

甘草五兩炙

右一味擣篩蜜丸如小豆一歲兒服十丸日三盡即更合　並出第五卷中

劉氏療小兒肚脹漸瘦不食四肢熱不調方

甘草炙　鼈甲炙　柴胡　茯神

子芩各六分　訶梨勒皮十分　檳榔皮三顆研　芍藥

橘皮各三分　生薑　當歸各四分　知母五分

大黃八分

右十三味切以水一升半煎取七合分爲數服得瀉病差

小兒食不下及不消不嗜食方四首

廣濟療小兒心腹滿喫食不下地黃飲子方

生地黃汁三合 生薑汁三合 訶黎勒末四分 白蜜一匙

右四味相和調勻分溫服之微利尤良

小品療小兒宿食不消發熱九味當歸湯方

當歸 甘草炙 芍藥 人參

桂心 黃芩 乾薑各一分 大棗五枚

大黃二分

右藥切以水一升半煎取六合去滓分服

千金療少小五六日不食氣逆桂心橘皮湯方

桂心半兩 橘皮三兩 薤白五合切 黍米五合

人參半兩

右五味切以水七升先煮藥取二升次下薤米米熟湯成稍稍服之

又療少小胃氣不調不嗜食生肌肉地黃丸方

乾地黃 大黃各五分 茯苓三分 當歸

柴胡 杏人各二分

右六味末之以蜜丸如麻子大服五丸日三服並出第五卷中

小兒霍亂方一十二首

廣濟療小兒霍亂心腹刺痛吐痢方

茯苓 桔梗 人參各六分 白朮五分

甘草炙 厚朴炙各四分

右六味切以水二升煮取六合去滓溫服之

又療小兒霍亂嘔吐不止方

人參六分 厚朴炙三分 陳倉米三合

右三味切以水三升煮取七合去滓分服之

千金療小兒吐痢霍亂方

人參四分 厚朴炙 甘草炙各二分 白朮三分

右四味切以水一升二合煮取五合六十日兒服一合百日兒分三服朞歲兒分再服乳母忌油膩等

備急療小兒霍亂吐痢方

人參四分 厚朴炙 甘草炙各二分 乾薑一分

白朮三分

右五味切以水一升煮取四合分服之

又療孩子霍亂已用有効方

人參 蘆籜各二分 扁豆藤二兩 倉米一撮

右四味切以水二升煮取八合分服

又方

人參四分 生薑三分 厚朴炙 白朮

甘草炙各二分

右五味切以水一升煮取四合分服

又方

人參四分　木瓜一枚　倉米一撮

右三味切以水煮分服以意量之立効

必効主小兒霍亂方

取厠屋戸簾燒灰研以飲服一錢匕

又方

訶黎勒一枚

右一味先煎沸湯研一半許與兒服立止再服神效

古今録驗療小兒霍亂吐痢人參白朮湯方

人參六分　白朮　茯苓各四分　厚朴炙

甘草炙各三分

右五味切以水一升半煮取六合分温服立効

劉氏療百日以來及蘧內兒霍亂方

以人乳半合及生薑汁少許相和煎服入口定

又療小兒霍亂方

生薑兩分　香薷一兩　薄荷一兩

右三味以水煎分温兒與母俱服之甚良

小兒霍亂雜病方六首

劉氏療小兒霍亂空吐不痢方

人參六分　生薑四分　厚朴二分炙　橘皮一分

兎骨一兩炙碎

右五味切以水一升二合煎取四合服之即利下部又以杏人鹽少許皂莢末少許熬和硬溲如棗核大以綿裹內之便通妳母忌熱麪大効

又療小兒霍亂空利不吐方

烏牛菴草團一　生薑　人參各三兩

右三味切以甜不醋漿水一升半煎取五合分服之如孩子渴取由礴糞燭籠骨一兩以漿水煎澄清與兒喫即差

又療小兒霍亂不吐不痢肚脹妨滿上下不通方

甘草炙四分　當歸二分　石鹽三分

右三味切以漿水一升半煎取六合去滓牛黃麝香各半錢匕研蜜半匙相和以下灌之即通妳母與漿水粥喫勿喫麪肉等

又小兒乾霍渴熱及壯熱眼色慢四大困悶方

以烏豆一升淨乾擇生薑一兩切以水三升煎烏豆皮欲爛即濾取汁二合和少許蜜喫即覺吐如人行六七里又與喫無問大人小兒並與服之効

又療小兒熱霍諸藥不差方

以蘆葉二大兩糯米三大合水三升先煮葉入米煮

取一升入蜜少許和服即差不足即取桑葉二升生
薑半兩切以水三升煮取一升著一匙白米爲飲服
又療小兒霍亂吐痢不止方
以人乳汁二合生薑汁粟米許荳蔻取人碎似蒜麥
大二七枚溼蒢一小把龍骨六分以乳煎取一合著
少許牛黃麝香兎毛灰等和分爲三服如渇以糯米
汁著蜜與喫即差
小兒吐痢方四首
千金療小兒吐痢方
以亂髮灰二分鹿角一分作末以米飲服一刀圭日
三

又方
以熱牛矢汁灌之
又方
燒特猪矢水解取汁少少飲兒
劉氏療百日以下痵內兒吐痢方
麪炒一兩 乳汁兩合 龍骨六分
右三味煎龍骨和炒麪服之即差
小兒噦方二首
備急療小兒噦方
以生薑汁五合牛乳五合
右一味合煎取五合分二服
又方
以羊乳一升煎減半分五服無用牛乳代之
小兒口噤方四首
千金療小兒口噤方
以鹿角粉之大豆末之等分和乳塗乳飲兒
又方
以驢乳二升猪乳一升合煎得一升半服如杏人三
四服差

備急療小兒鵝口并噤方
礬石燒末 朱砂末各半分
右二味和研令極細敷兒舌上日三以亂髮洗舌上垢
頻頻令淨即差
古今錄驗療小兒噤其病在咽中如麻豆許令兒沫不能
乳哺方
取水銀如黍米與服覺病無早晩水銀下咽便愈以
意量之不過小麻子許與可也
小兒重舌方一十三首
千金療小兒重舌方

炙行間隨年壯穴在足大指岐中是

又方

取田中蜂房燒灰酒和薄㨾下愈

又方

以竈中黄土末苦酒和塗舌上

又方

以赤小豆末和醋塗舌上

又方

取簸箕舌燒灰敷舌上

又方

黄蘗竹瀝漬取細細點舌上良

又方

兒重舌舌强不能收唾燒蛇脫末以雞毛蘸藥掠舌下愈

千金蘇療小兒重舌方

取三屠家肉各如指大以摩舌上兒立能乳便啼

又方

以衣魚燒作灰以敷舌上千金云衣魚塗舌上

又方

兒重舌舌强不收唾者鹿角末如小豆許著舌下數數與之

又療小兒重舌口中瘡涎出至多方

以蒲黄敷舌上不過三度愈

古今錄驗療兒重舌欲死方

灸右足踝三壯立愈又灸左右並良千金云灸兩足外踝

又方

取亂髮燒灰末敷舌上甚佳

小兒鵝口鷰口方六首

千金療小兒心臟熱口爲生瘡重舌鵝口方

取柘根剉五升無根只以弓材佳

右一味以水一斗煮取二升以汁更煎取五合細細拭齒數次良

又方

口生瘡白漫漫取桑木汁先以父髮拭口次以桑汁塗之

又療小兒鵝口不能飲乳方

取白鵝屎汁瀝口中良

又方

取黍米汁塗之

又方

取父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井華水東向日以髮
拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三朝作之
救急療小兒鵞口兩吻生瘡方
取髮灰以猪脂和塗之千金同
小兒口瘡方五首
小品療小兒口爛瘡方
取羊乳細細瀝口中不過三度差
千金療小兒口瘡方
大青三分 黄連二分
右二味切以水三升煮取一升二合一服一合日再夜

一
文仲支太醫療小兒口瘡方
桑木白汁 生地黄汁各一合 赤蜜半合
右三味和煖敷兒口中瘡便差
救急療小兒口瘡方
以蛇蛻皮水漬令濕軟拭口內瘡一兩過即差
劉氏療小兒口瘡方
黄蘗皮一兩切 烏豆一升
右二味以水二升煮取兩合去滓重煎如餳入少許龍
腦香研和敷之甚良

小兒口中涎出方三首
千金療小兒口涎出方
以白羊屎內口中差
又方
以東行牛口中沫塗兒口中及頤上
又方
以桑白汁塗之差
小兒舌上瘡脣腫方五首
小品療小兒脣腫及口赤生白瘡爛方
清旦研桑木白皮取汁以塗兒脣口即差

又小兒舌上瘡方
烏賊魚骨燒末以雞子黄和塗之至喉咽舌下遍敷
即差止
千金療小兒舌瘡方
蜂房燒灰屋間塵各等分和先洗瘡使乾敷之効
又方
羊蹄骨中生髓和胡粉敷上日三取差
又舌腫強滿口方
滿口含糖醋少時熱氣通愈
小兒咽喉生瘡方二首

千金療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入者膏方

當歸　射干　升麻各一兩　附子半兩

白蜜四兩

右五味切以猪膏四兩先煎之令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色黃藥成去滓投蜜更上火一兩沸以器盛之取杏人許含之日四五咽之無妨大人小兒並用妙

又療口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪脂一斤　黃連一兩　白蜜一升

右三味合煎令成膏去滓含半棗大日四五夜亦含之

小兒喉痺方四首

千金升麻湯主小兒喉痺痛若毒氣盛便咽塞並大人喉痺不利方

生薑　升麻　射干各三兩　橘皮一兩

右四味切以水六升煎取二升分溫三服

又療小兒卒毒腫著喉頸壯熱妨乳方

升麻　射干　大黃各一兩

右三味切以水二升半煮取八合一歲兒分三服餘滓敷腫處冷更煖而薄大兒以意加之

又方

煮桃皮汁三升服之又燒荊瀝汁並良

劉氏療小兒喉痺熱塞方

升麻五兩切　馬蘭子一合

右二味以水一升煎取二合入少白蜜與兒服之甚良

小兒聤耳方四首

千金療小兒聤耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一差

又療少小聤耳方

桃人熟末以故緋裹塞耳中

古今錄驗小兒聤耳方

青羊屎暴乾以綿裹塞中即差

又小兒聤耳有瘡及惡肉散耳雄黃散方

白麻楷取皮一合　花燕脂十顆

右二味擣篩細研敷耳中令滿一兩度差　方無雄黃未詳其名

小兒鼻塞方四首

千金療小兒鼻塞不通濁涕出方

杏人二分　椒出汗　附子去皮　細辛各一分

右四味切以醋五合漬藥一宿明旦以猪脂五合煎令附子色黃膏成去滓待冷塗絮導鼻孔中日再兼摩頂上

又療小兒鼻塞生息肉方

通草　細辛各一兩

右二味擣篩以綿纏如棗核大藥如豆著綿頭著鼻孔中日二

古今録驗療小兒鼻塞不通細辛膏方

細辛　通草各一分　辛夷人一分半　杏人二分去皮

右四味切以羊髓三合猪脂三合緩火煎之膏成絞去滓取一米粒許大以内鼻孔中頻易差

劉氏療小兒鼻塞不通喫乳不得方

醍醐三合　青木香　零陵香各四分

右三味切和煎成膏取少許以膏和拱所兒或以膏塗兒頭上及塞鼻中以通佳

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十五卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十六卷目錄小兒諸疾下 五十門

小兒中風方四首
小兒欬嗽方八首
小兒欬逆上氣方七首
小兒傷寒方三首
小兒天行方八首
小兒諸黃方四首
小兒諸瘡方九首
小兒眼赤痛方八首
小兒諸淋方六首

小兒小便不通方五首
小兒遺尿失禁方五首
小兒大便有血方三首
小兒大便不通方四首
小兒赤白痢方七首
小兒蠱毒血痢方九首
小兒熱渴痢方四首
小兒疳痢方七首
小兒無辜疳痢方三首
小兒諸雜痢方四首

小兒忽衄血方六首
小兒齒不生方二首
小兒頭熱盜汗方三首
小兒顖開不合方四首
小兒解顱方二首
小兒月蝕耳瘡方三首
小兒臍中汁出并瘡腫方一十一首
小兒癰癤方二首
小兒丹毒方七首
小兒禿瘡方七首

小兒頭瘡方三首
小兒頭面熱瘡方七首
小兒瘰癧方二首
小兒侵淫瘡方三首
小兒蠼螋瘡方二首
小兒惡瘡方五首
小兒火灼瘡方二首
小兒風瘙癮疹方五首
小兒疝氣陰㿗方八首
小兒陰瘡及腫方八首

小兒脫肛方六首
小兒䘌蟲蝕下部方四首
小兒瘑濕瘡方六首
小兒蚘蟲方七首
小兒蟯蟲及寸白方五首
小兒瘻瘡方四首
小兒疥瘡方六首
小兒癬瘡方六首
小兒誤吞物方四首
小兒雜療方六首

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十六卷
宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
小兒中風方四首
千金療少小中風手足拘急二物石膏湯方
石膏雞子大　真珠一兩研
右藥以水二升煮取五六沸內真珠煮取一升去滓稍稍分服之
又療少小中風脉浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔方
甘草炙　芍藥一　桂心　生薑各一兩
大棗四枚
右五味切以水三升煮取一升去滓分溫三服忌如常法此張仲景桂枝湯但劑分小異

又療少小新生中風二物驢毛散方
驢毛鬐頭毛一把　生麝香大豆許二枚
右藥以乳汁和於銅器中微火上煎令焦熱出研末之
小兒不能飲以乳汁和之於葦竹筒中盛瀉入咽中然後飲乳汁令入腹
又療少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中

大風手足驚掣五物甘草等生摩膏方
甘草　防風各一兩　白朮　桔梗各二十銖
雷丸二兩半
右藥切以不中水豬脂一斤煎取成膏合諸藥於微火上煎之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病常以少膏摩顖上及手足心甚辟風寒良翼同並出第五卷中
小兒欬嗽方八首
小品療少小欬嗽腹脹七物小五味子湯方
五味子碎　紫菀各一分　黃芩　甘草炙
麻黃去節　生薑　桂心各一分

右藥㕮咀以水一升煮取七合分五服忌如常法
又療少小欬嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物欵冬丸方
欵冬花　紫菀各一兩半　伏龍肝一分　桂心二分
右藥擣篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之日三千金同
又療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯方
桔梗　紫菀各三分　甘草炙一分　麥門冬去心七分

右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差爲度千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳

又療小兒中冷及傷寒暴欬嗽或上氣咽喉鳴氣逆者或惡寒鼻塞清水出紫菀湯方

紫菀　杏人去皮尖　甘草炙　黃芩
麻黃去節　橘皮　桂心　青木香
當歸各一兩　大黃三分

右十味切以水三升煮取九合去滓一歲以上至五歲兒以意量之分服千金云兒六十日以至百日一服二合半百日以至二百日一服三合餘同

千金療少小欬嗽八物生薑煎方

生薑七兩　乾薑四兩　桂心二兩　甘草三兩
杏人一升去尖皮　欵冬花　紫菀各三兩　蜜一升

右藥末之以蜜合諸藥微火煎之使如飴餔量其大小多少與兒含咽之百日小兒含如棗核許日四五甚良出第五卷中

備急療少小欬嗽上氣杏人湯方

麻黃八分去節　杏人四十枚去尖

右二味切以水一升煮取七合去滓分服百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之忌如常法

又療少小欬嗽方

紫菀六分　貝母三分　欵冬花一分

右三味擣爲散取豆許著乳頭令兒飲之日三妳母忌如常法

劉氏療小兒欬嗽不得眠方

甘草六分炙　桔梗四分　桑白皮　貝母
茯苓各三分　大青　吳藍　五味子
人參各二分

右九味切以水二升煮取八合去滓量多少大小與服忌如常法

小兒欬逆上氣方七首

千金杏人丸主大人小兒欬逆上氣方

杏人三升

右一味熬擣如膏蜜一升分爲三分以一分內杏人擣合強更內一分擣之如膏又內一分擣熟止先食含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也

又射干湯主小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干二兩　麻黃去節　紫菀　甘草炙
生薑各一兩　桂心五寸　半夏五枚洗　大棗二十枚去核

右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分爲

服二合忌餳羊肉生葱
又方
半夏四兩洗 生薑三兩 桂心 紫菀
細辛 阿膠各二兩炙 甘草二兩炙 款冬花二合
蜜一合
右九味切以水一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升量大小多少加減之
又五味湯主小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜不息食則吐不下方

五味子二分 麻黃一分去節 當歸二分 人參一分
細辛半分 乾薑一分 桂心二分 紫菀一分
款冬花半分 甘草一分炙 大黃六分
右十一味切以水二升半煮取九合去滓兒六十日至百日服二合半百日餘至二百日一服三合一方無款冬大黃有大棗三枚出第五卷中通按食則吐乃吐食也不下不大便也故用大黃以不之氣降而吐自止喘自定
千金翼療小兒寒熱欬逆膈中有澼乳吐不欲食
乾地黃四兩 麥門冬半升去心 五味子五合 大黃
消石各一兩 蜜半升
右六味切以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮令沸服二合日三胷中當有宿乳一升許出兒大者服五合
又療小兒大人欬逆短氣胷中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方
燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服大人服一升不妨食息乳哺並出第十一卷中
劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得方
鼈甲一兩炙令極熟擣爲末 燈心一握
右二味以水二升煎取八合以意量之與服
小兒傷寒方三首
千金論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解

脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳
又療小兒傷寒方
生葛汁 淡竹瀝各六合
右二味相和二三歲兒分三服不宜煮生服佳
又療少小未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥門冬湯方
麥門冬三分 桂心八銖 寒水石 石膏碎
甘草炙各二分
右五味切以水二升半煮取一升分服一合日三

謹按雷丸止汗之藥粉亦撲汗之藥不汗之不字疑本字當作出汗乃是

又療少小傷寒芍藥四物解肌湯方

芍藥　黄芩　升麻　葛根各二分

右藥切以水二升煮取九合去滓分四服春夏以上分三服並出第五卷中

小兒天行方八首

廣濟療小兒天行壯熱欬嗽心腹脹妨方

人參　甘草炙各一分　生地黄　麥門冬去心　茅根各六分

右五味切以水二升煮取七合去滓以意量之分溫與服忌如常法

又方

麥門冬去心　茅根各六分　甘草炙　人參各一分

紫菀　升麻　貝母　竹瀝各二分

右八味切以水二升煮取八合分服忌如常法

千金療少小有熱不汗二味通汗散方

雷丸四兩　粉半斤

右藥擣篩以粉兒身以差為度

又療小兒生一月至五月乍寒乍熱方

細剉柳枝煮取汁以洗兒立效若渴絞冬瓜汁服之

又療小兒寒熱及赤氣中人豬蹄散方

取豬後脚懸蹄燒灰末以乳汁飲一撮立效並出第五卷中

劉氏療小兒天行頭痛壯熱方

青木香六分　白檀香三分

右二味擣散以清水和服之以水調塗頂頭痛立差

又方

吳藍　大青各十分　甘草炙　生麥門冬去心

生薑各六分　茵蔯三分　梔子人十枚　蘆根一握洗

右八味切以水二升煮取九合分溫服之忌如常法

又療小兒天行五日以後熱不歇方

棗葉一握　麻黄一兩去節　葱白一合切　豉一合

右四味切以童子小便二升煎取九合去滓分服之

小兒諸黄方四首

千金療小兒黄方

擣土瓜根汁澄清滴兒鼻中如大豆許日服三合

又方

擣麥青汁服之

又方

擣韭根汁以滴兒鼻中少許即出黄水差

又療諸黄方

小豆二七粒　瓜蔕十四枚　糯米四十粒

右三味擣散吹鼻中差（並出第五卷中）

小兒諸瘧方九首

廣濟療小兒瘧方

取蛇皮燒灰一錢匕和冷水服之

又方

取驢軸下垢膩刮取和麪作燒餅與喫以差止

備急療小兒瘧或自能飲或不能飲母含藥與飲之常山酒煎方

常山二兩　桂心一兩　甘草半兩

右三味切以酒一升煎取七合去滓分服取吐差止

千金常山湯主小兒溫瘧方

常山四分切　淡竹葉一握切　小麥三合

右三味以水一升半煮取五合一日至七日兒一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日至二十日兒二合為三服四十日至六十日兒六合為三服六十日至百日兒一服二合半百日至二百日兒一服三合其一歲至七八歲兒增藥水並以此為率

又方

灸兩乳下一指各三壯

又方

燒雞膍胵黃皮末和乳與服男雄女雌

又方

生鹿角末發時與一錢匕服之

又方

燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕（出第五卷中）

劉氏療小兒瘧方

黃丹半錢匕以蜜水和與服若冷以酒和與服之良

小兒眼赤痛方八首

古今錄驗療小兒眼痛方

取淡竹瀝拭之

又方

取鯉魚膽點之

又方

取車前草汁和竹瀝點之

又方

以人乳浸黃連點之

劉氏療小兒赤眼方

黃連二分　朴硝一分令乾

右二味以婦人妳汁浸之點眼良

劉氏療小兒瞖內赤眼方

明乙牡本曰特

生地黃薄切冷水浸以貼之效

又方

取羊子肝薄切以井花水浸以貼之妙

又方

取黃蘗以乳浸點之

小兒諸淋方六首

千金療小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服之 一方用車前草

又方

以冬葵子煮汁服之

又方

取蜂房亂髮燒灰以水服一錢匕日再服

文仲療小兒淋兼石淋方

取特牛陰毛燒灰以漿水服一刀圭日再服

又方

榆皮 瞿麥各六分

右二味切以水一升煮取半升去滓分溫服之

又方

小麥一合 葱白一握

右二味以水一升煮去滓取一半分服之

小兒小便不通方五首

廣濟療小兒熱極病小便赤澁或不通尿輒大啼呼滑石湯方

滑石十六分 子芩十四分 冬葵子八分 車前草切一升

右四味以水二升煮取一升一歲至四五歲服一合日再服甚良

小品療小兒小便不通地膚子湯方

地膚子一分 瞿麥 冬葵子各三分 知母

黃芩 猪苓 海藻 橘皮

升麻 通草各一分半 大黃八分

右十一味切以水二升煮取一升大小多少量與服忌如常法 千金有枳實無橘皮

千金療小兒小便不通方

車前草切一升 小麥一升

右二味以水二升煮取一升二合去滓以煮粥服日三四服良

又方

冬葵子一升

右一味以水二升煮取一升入滑石末一分溫分服

劉氏療小兒忽不得小便急悶方

葱白一握 通草一兩 冬葵子一合

右三味切以水二升煮取一升去滓量服

小兒遺尿失禁方五首

千金療小兒遺尿方

瞿麥 龍膽 石韋去毛 桂心 皂莢炙去皮子各二分 雞腸草四分 車前子五分 人參二兩

右八味擣篩蜜丸如小豆每服五丸加至六七丸忌

又方

灸臍下一寸半隨年壯

又方

灸大敦三壯

又方

小豆葉擣汁服佳

又療失禁不覺尿出方

以豆醬和竈突黑如大豆許內尿孔中佳

小兒大便有血方三首

救急療小兒大便訖血出方

鼈甲一枚炙末五分

右一味以木和量多少大小服日三忌如常法千金去當頭一枚

又方

以車釭一枚燒令赤內水中與服差千金同

又方

燒鼉帶灰塗乳上與飲之差千金同

小兒大便不通方四首

千金紫雙丸主小兒身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾唯飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱唯此丸治之不差復可再服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方

巴豆去心皮熬十八銖 蕤核人各十八銖別擣 麥門冬去心十銖 甘草炙五銖 甘遂二銖 眞珠二銖 牡蠣熬 臘各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研以新布絞去油別擣甘遂甘草牡蠣麥門冬細篩畢擣巴豆蕤人令極熟乃內諸藥散更擣三千杵如藥燥入少蜜足之半歲兒可服如荏子一雙一二歲兒服如半麻子作一雙三歲兒服如麻子一枚作一雙四歲兒服如麻子二丸五六歲兒服如大麻子二丸七八歲兒服如小豆二丸九歲十歲兒微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者飲熱粥汁數合即下丸皆雙出也下甚者飲冷粥止之

必効療小兒大便不通方

灸口兩吻各一壯

又方

猪苓一兩

右一味以水少許煮雞矢白一錢匕與服立差

又主小兒大小便不通妨悶方

白蜜一合

右一味煎爲丸内下部中即通小便不通嚼生葱以綿裹少許内小便道中即通

小兒赤白痢方七首

廣濟療小兒赤白痢腹痛方

赤石脂 龍骨 地榆 黄連各四分

厚朴炙 人參各三分 當歸 乾薑各三分

右八味擣散以飲汁服半錢匕日再服之蜜丸以乳汁下三丸至七丸亦佳此方甚效以意量之

又療小兒客冷白痢方

人參六分 厚朴炙 甘草炙各四分 茯苓

桔梗各五分 橘皮八分

右六味切以水三升煮取一升量其大小可一合爲度以差止忌如常法

救急療二百日小兒赤白痢日夜五十行方

白朮 乾薑各四分 茯苓 甘草炙各四分

附子二分炮

右五味切以水三升煮取一升分温服之

必効療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久不差雞子餅方

雞子二枚取白 胡粉兩錢 蠟一兩

右三味熬蠟消下雞子胡粉候成餅平明空腹與喫可三頓痢止

劉氏療小兒赤白痢方

油麻子一撮許炒令香

右一味擣末以蜜作漿調與服大人亦療之

又療小兒赤白痢咽脹不出方

黄蘗半兩炙 當歸六分

右二味切以水一升煮取六合分温服之佳

又方

莨菪子 羊肉薄切布上

右二味以綿裹内下部中不過再差

小兒蠱毒血痢方九首

廣濟療小兒熱毒膿血痢方

羚羊角　地榆　阿膠　赤石脂
黄連、　當歸各八分　吳藍　茜根
甘草炙各六分　黄芩五分
右十味切以水六升煮取二升半量大小服之甚效
又療小兒熱毒血痢方
犀角十分　地榆六分　蜜三分　地麥草五合
右四味切以水三升煮取二升去滓量大小服之
又方
葱白三兩　香豉三合　梔子七枚綿裹　黄連一兩
右四味切以水二升煮取九合去滓分服

又療下鮮血方
取梔子人燒灰末水和一錢匕服之量其大小加減
服之
小品療少小熱痢不止梔子丸方
梔子人七枚　黄連五分　黄蘗炙三分　礬石四分燒
大棗四枚炙令黑
右五味末之以蜜丸空腹服小豆許七丸差如未除更
服忌如常法
右今錄驗療小兒熱痢子芩湯方
子芩十二分　知母　女萎各六分　竹葉切八

黄蘗　甘草炙各四分
右六味切以水二升煮取一升分服甚效
又療小兒痢血犀角櫸皮煎方
犀角十二分屑　梁州櫸皮二十分炙切
右二味以水三升煮取一升量大小服之神良崔氏同
又療小兒蠱毒痢血蘘荷湯方
蘘荷根　犀角屑　地榆　桔梗各二分
右四味切以水二升煮取九合去滓服一合至再服
劉氏療小兒血痢方
地榆　黄蘗　黄連　黄芩各六分

馬藺子二分　茜根一兩　生薑三分
右七味切以水二升煮取一升分服大小量與之一合
至二合爲度
小兒熱渴痢方四首
小品療少小壯熱渴痢八味龍骨散方
龍骨研　甘草炙　赤石脂　寒水石
大黄　石膏　桂心　栝樓各三分
右藥擣散以水及酒五合煮散三合量大小分服之效
又療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴唯可飲麥門冬湯
方

麥門冬去心 甘草炙各四分 枳實炙 黃芩
人參各三分 龍骨六分
右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服
又今錄驗療小兒渴痢樺皮飲子方
檕州樺皮十二分 栝樓 茯苓各八分
人參六分 粟米二合
右五味切以水三升煮取一升二合去滓分服並大小
與服之
劉氏療小兒痢渴不徹肚脹不能食方
訶梨勒皮六分 桑葉炙末十分
右二味切以水一升煮取五合去滓分服之亦治大人

小兒疳痢方七首
廣濟療老小一切痢久成疳方
白龍骨六分 黃連 白石脂 雞矢白熬
胡粉熬 茯苓 阿膠炙各四分
右七味擣篩蜜丸以飲汁下五丸漸加至七丸十丸大
小增減服之雞矢一作雞屎礬
又療小兒疳痢渴瘦方
取樁木根乾末之 粟米泔粉
右二味以蜜和作丸服五丸至七丸十丸以差為度崔氏
同
又療大人小兒久痢成疳方
豉三升 葱白一握 桃葉一握 鹽二十顆
苦參五寸 青黛一抄
右六味切以水三升煮取一升二合去滓仰臥灌下部
中極妙
又療小兒疳痢困垂死方
益母草
右一味煮食之取差止崔氏同
劉氏療小兒痢大孔開并有疥疳痢經四五月吹藥止痢

療疳神驗方
黃連二分 麝香少許
右二味相和以竹筒吹下部中三兩度差止
又療小兒疳痢三歲以上口裏有瘡身壯熱及手足心煩
大便極臭即是疳痢方
黃連 黃蘗 地榆炙 白頭翁
高良薑 酸石榴皮 生薑 當歸各二分
白朮一分 龍骨四分
右十味切以水二升煮取八合分服大小量之其口中
瘡以盧會末赤地麥擣末相和塗之下部末蚺蛇膽黃

進麝香擣散之兼以竹筒吹少許內下部中差止亦主

小兒疳蟨

必效療小兒久痢無問冷熱疳痢悉主之方

棗一枚去核勿令皮破內胡粉令滿

右於炭火中燒令如炭於瓷器中研之以米飲和分服之一歲以下分服之不過三服差王郎中處得之此方傳用甚妙

小兒無辜疳痢方三首

備急療小兒無辜疳痢方

龍骨　當歸　黃連　人參

墨食子　甘草炙各一兩

右六味擣散蜜丸服三丸日再以差爲度大小增減服之

救急療小兒瘦頭乾無辜兼痢方

馬齒莧

右一味擣絞汁服三合以差止

劉氏療孩子頭乾肚中有無辜者蓋膽散方

地榆六分　蝸牛十二分熬　青黛三分　麝香一分

人糞燒灰　蘭香根灰燒　蚺蛇膽各一分　龍腦香兩豆許

右八味擣散以飲下半錢匕量大小與服之忌如常法

小兒諸雜痢方四首

劉氏療小兒臌痢直從春至秋冬以來不差者方

薤白切一合　生薑　蕪荑各一分　子芩

黃蘗　阿膠　芍藥　厚朴炙

人參各二分　地榆　當歸各三分　香豉一合

右十二味切以煮銀水重濾者一升半煮取九合分服以差爲度秋末冬末加赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

又療小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之方

橘皮　生薑各三分

右二味切以牛乳半升煎取四合去滓分溫服之

又療小兒水痢不止方

厚朴炙　黃連各十兩

右二味切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

又療小兒久痢方

甘草炙　茯苓各六分　人參四分　黃連各四分

厚朴炙　生薑各二分　龍骨八分

右七味切以水一升煎取三合欲臥先取鹽豉麝香爲小丸內下部中後服此飲分服甚妙忌如常法

小兒蛔蟲方六首

深師療少小衄血方

桂心十分 亂髮灰洗燒 乾薑炮各六

右三味擣篩爲散服方寸七日再

又方

燒桑耳令焦

右一味擣散以內於鼻孔中爲丸以內亦得

小品療少小未滿百日傷寒身熱衄嘔逆五味麥門冬湯

方

麥門冬去心 石膏 寒水石各三分 甘草二分炙

桂心一分

右藥切以水一升煮取六合分服効

古今錄驗療小兒鼻衄不止方

以馬屎絹裹塞鼻孔中

又方

燒髮灰末吹鼻孔中亦佳

又方

單服白馬屎汁三合甚良

小兒齒不生方二首

小品療少小齒落不生方

取牛屎中大豆二七枚小開豆頭小許以次注齒根

敷處即當生千金同

又方

取雄鼠屎三七枚以一枚拭齒根處盡此止二十一日齒當生雄鼠屎頭尖是也千金同

小兒頭汗及盜汗方三首

千金療少小頭汗二味茯苓粉散方

茯苓 牡蠣各四兩熬

右藥以粉八兩合治下篩有熱輒以粉頭汗即止

又此由心藏熱之所感宜服犀角飲子方

犀角三分 茯神四分 麥門冬六分 甘草二分炙

白朮一分

右五味切以水九合煎取四合分再服即定又加龍齒四分佳

延年療小兒盜汗方

麻黃根 雷丸 牡蠣各三兩熬 甘草二兩炙

乾薑一兩 粱米一升

右六味擣粉以粉身汗即止

小兒顖開不合方四首

廣濟療小兒顖開不合方

防風六分 白及 柏子人各四分

右三味擣末以乳汁和塗顖上以合爲度(千金同)

范汪療少小腦長頭大顖開不合臂脛小不能勝頭三歲不合發藥方

半夏 芎藭(各一升) 細辛(二兩) 桂心(三尺) 烏頭(十枚淨)

右五味切以淳酒四升漬之晬時温之以絮染兒顖門上朝暮各二三二十日自强急(千金桂一尺又有生薑一升)

千金療小兒顖陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

又方

取猪牙車骨煎取髓塗顖上愈生用亦得

小兒解顱方二首

千金療小兒解顱方

蛇蛻皮(熬末)

右一味和猪頰車骨中髓以塗顱上日三

又療小兒解顱三味細辛敷藥方

細辛 桂心(各一分) 乾薑(三分)

右藥擣散以乳汁和塗於顱上乾復塗兒面赤即愈

小兒月蝕耳瘡方三首

集驗療小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡㖞瘡悉差黃連胡粉膏散方

黃連(二兩) 胡粉 水銀(各一兩研入)

右三味擣爲散相和水銀研令相得以敷瘡上縱黃汁引成瘡亦以粉之即差一方有白礬一兩燒蛇牀子一兩末入用亦甚妙至耳邊到項上並用

又療小兒耳瘡方

燒馬骨灰粉敷之

又方

敷雞屎白佳

小兒臍汁出并瘡腫方一十一首

廣濟療小兒臍汁出不止兼赤腫白石脂散方

以白石脂一兩研成粉熬令温以粉臍瘡甚良(千金同)

備急療小兒臍中生瘡方

以桑汁塗乳上使兒飲之(千金同)

又方

取羖羊乳飲兒(千金同)

又方

取東壁土末以敷之甚良(千金云若汁不止燒蒼耳子敷之)

又方

燒甑帶灰和膏敷之(千金同)

又兒生百日臍汁出方

燒絳灰敷臍中 千金同

又兒臍赤腫方

杏人二分 猪牙車骨中髓

右二味先研杏人入此髓和令調以塗臍上 千金同

古今錄驗療小兒風臍汁出甘草散方

甘草炙 螻蛄熬各三分

右二味擣散以安臍中若止甚妙

又療小兒臍中汁不差黃蘗黑散方

黃蘗炙一兩 釜底墨四分

右二味擣和作散以粉臍中即差

又療小兒臍著濕瘡鹽豉餅方

鹽 豉等分

右二味擣作餅如錢許安新瓦上炙令熱用熨臍上差止亦用黃蘗末以粉之妙

劉氏療小兒初生至七日者臍欲落封藥方

雄鼠屎七顆 乾薑棗大許 胡粉三分熬 麝香少許

燒綿灰

右五味擣研為粉看臍欲落不落即取藥以敷之是以不令風入故也若乾薑恐痛不著亦得

小兒癰腫方二首

千金漏蘆湯主小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡癤方

漏蘆一分用莖 升麻一分半 連翹一分 白斂一分

甘草炙一分 芒消一升 枳實炙一分半 麻黃去節一分半

黃芩一分半 大黃四分

右十味以水一升煮取五合兒生一日以上至七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取一合分三服生二十餘日至三十日取三合分三服

又五香連翹湯主小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走遍身中白疹搔不已方

青木香 薰陸香 沉香 雞舌香

黃芩 麻黃去節各一分 連翹 海藻

射干 升麻 枳實炙各一分 麝香半分研

大黃八分 竹瀝三合

右十四味切以水四升煮取二升內竹瀝煮取一升二合兒生百餘日至二百日一服三合生二百日至朞歲一服五合 一方不用麻黃

小兒丹毒方七首

廣濟療小兒丹毒方

青藍汁五合　竹瀝七合

右二味相和分爲二三服大小量之一合至三合

千金療小兒數十種丹皆主之搨湯方

大黃　甘草炙　當歸　芎藭

白芷　青木香　獨活　黄芩

芍藥　升麻　沉香　木蘭皮各一兩

芒消三兩

右十三味切以水一斗二升煮取三升去滓內消以綿

搵湯以搨之乾則易之取差止

又療小兒溺竈丹初從兩髀及臍間起走入陰頭皆赤方

以水二升煮桑根皮取一升以浴之

取小豆擣末以雞子白和塗之以差爲度千金亦療久丹

救急療小兒赤丹一名丹溜方

古今錄驗療月內兒發丹方

升麻　黄芩　犀角　大黃別浸

柴胡各二分　石膏三分　藍葉切三合　梔子八分

甘草一分炙

右九味切以水一升二合煮取八合下竹瀝兩合更煎

取一半去滓分二服甚妙

又療小兒丹毒方

取愼火草擣以封之差止

又方

擣藍汁塗之又藍澱塗之妙

小兒禿瘡方七首

千金療小兒頭上禿瘡方

取雄雞屎白陳醬汁苦酒和以洗瘡敷之日一度

又方

取不中水蕪菁葉燒灰和猪脂敷之

千金翼療小兒禿瘡無髮苦癢方

野葛一兩　猪脂　羊脂各一合

右三味合煎令消待冷以敷之不過三上千金同

備急療苦頭生瘡白禿不生髮有汁出或無汁乾燥痛方

煮雞子七枚剝去白

右一味取黃於銅器中急火熬乾末以敷之取差爲度

又方

取春秋桃葉心無問多少擣汁塗之千金并翼治小兒頭不生髮取

楸葉擣汁以敷頭上差

又方

燒鯽魚末以醬汁和塗之上同

又方

取臘月猪屎乾末以敷之差爲度

小兒頭瘡方三首

千金療小兒頭瘡方

胡粉一兩　黃連二兩

右二味爲末先洗瘡去痂拭乾敷之即愈更發如前敷之

又方

胡粉二兩　白松脂二兩　水銀一兩研　猪脂四兩

右四味合煎去滓內胡粉水銀攪令和調敷之大人同

具同

救急療小兒頭瘡經年不差差而復發方

雄黃研　大黃　黃蘗　黃芩

薑黃　雌黃研　白芷　當歸

青木香各四分

右九味切㕮咀以苦酒浸一宿以猪脂一大升煎候白芷色黃膏成去滓入水銀一兩以唾於手中研令消入膏攪相得於瓷器中收貯以皂莢湯洗瘡乾拭以膏塗之日夜再換以差爲度

小兒頭面瘡方七首

廣濟療小兒頭面生熱瘡方

黃連　蛇床子　黃蘗各八分　胡粉四合

右四味擣散以麻油和塗瘡遍敷之佳

千金療三日小兒頭面瘡起身大熱方

升麻　柴胡　石膏各一兩　大黃

甘草二兩　當歸二兩

右六味切以水三斗煮取一斗去滓以浴小兒瘡上乾敷黃連散

又療小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮乾者多少任用

右一味擣末以醋和塗之綿覆上蟲出立差亦可以猪

脂和塗之

千金翼苦參湯主少兒頭面熱瘡方

苦參八兩　黃芩二兩　大黃　芍藥

黃連各二兩　蛇床子一升　黃蘗五兩　菝葜一斤洗

右八味切以水二斗煎取一斗以洗兒日三即差千金云治上下徧身生

又方

石南草　大黃　黃芩　黃蘗

礬石　澤蘭各一兩　戎鹽二兩真者　蛇床子二合

右八味切以水七升煮取三升以絮內湯中洗拭兒日

三度差

備急療小兒三歲患頭上起熛漿如釘蓋一二日及胸背皆生仍成瘡方

水銀　朱砂各半兩　石硫黃一兩研　臘月猪脂

右四味煮桑葉湯洗以敷之勿令豬犬婦人小兒等見之無效

古今錄驗療小兒頭瘡面上亦有日益甚者方

黃連　赤小豆各等分

右二味擣末以臘月猪脂和塗之即差止

小兒瘰癧方二首

千金連翹丸主小兒無辜寒熱彊健如故而身體項頸結核瘰癧及心脅腹背裏有堅不痛名爲結風氣腫方

海藻洗二分　連翹　桑白皮　牡丹

白頭翁　防風　黃檗　桂心

香豉　獨活　秦艽各四分

右十一味擣篩蜜丸如小豆三歲以飲服五丸至十丸五歲以上以意加之

必効療小兒項上瘰癧方

以榆白皮爛擣如泥封之頻易

小兒侵淫瘡方三首

謹按又秘卷即父足如世千金方者

備急療小兒侵淫瘡方

取竈中黃土亂髮灰各三分研成粉以猪脂和塗之差亦治身赤痍起千金同

又方

燒艾作灰敷之千金同

又方

以牛屎燒作灰敷之千金同

小兒𤸇螋瘡方二首

備急療小兒𤸇螋瘡繞身匝即死方

擣灰菜葉敷之無葉子亦可千金同

又方

取燕巢土研成粉以猪脂和塗之乾易千金同

小兒惡瘡方五首

文仲療小兒身中惡瘡方

取笋煮汁洗之又燒笋皮作灰敷之

古今錄驗療小兒惡瘡方

取豆豉熬令焦黃末以敷瘡差止千金同

又療小兒惡瘡匝身衆藥所不能療之方

取父根洗取汁以浴兒勿使母知良

又療小兒面及身上生瘡如火燒方

取黃米一升末以𥁞水和塗之差爲度

又方

以赤地利擣末以粉之佳

小兒火灼瘡方二首

千金療小兒火灼瘡者一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍痒方

甘草　芍藥　白歛　黃芩

黃連　黃蘗　苦參各半兩

右七味擣末以蜜和敷之日二夜一亦可作湯洗之

千金翼療小兒火瘡方

煑大豆濃汁温洗之差亦令無瘢

小兒風瘙癮瘮方五首

廣濟療小兒風瘙浴湯方

柳木空中屑二升　蒴藋根切二升　鹽二合　愼火切一升

右四味切以水二斗煮取一斗入鹽以洗浴頻爲之以差止

又療小兒壯熱隱瘮已服湯丸不消宜服竹瀝湯方

淡竹瀝一升二合　葛根汁五合　牛黃三粒三顆研

右三味相和與兒服一歲至五六歲一合至三合五合再服以意增減之

千金療小兒風瘙癮瘮方

蒴藋十切一　防風　羊桃　石南

蓁椒　升麻　苦參　茵芋

芫花一作芫蔚　蒺蔾子　蛇床子　黃礬石燒

枳實各一兩

右十三味切以酢漿三斗煮取一斗內礬石令少沸以浴之

又療小兒風搔癮瘮方

牛膝末酒服方寸匕瀉瘡多年不差擣末敷之王冑疽癩病瘰癧絶妙

千金翼療癮瘮方

巴豆五十粒去皮以水三升煮取一升半以綿內湯中拭病上隨手減神良

小兒疝氣陰㿗方八首

小品療少小陰㿗白頭翁敷之神效方

生白頭翁根不問多少擣之隨病處以敷之一宿當作瘡二十日愈一方三月生陰日取之

千金療小兒狐疝傷損生㿗方

半夏洗　芍藥　茯苓各三分　防風一作防葵

大黃各二分　桂心　椒各一兩汗

右七味擣散蜜丸如大豆以湯飲下一丸至二丸三丸日五服以差爲度

又方

桂心三分　地膚子一分　白朮五分

右三味擣蜜丸如小豆白酒服七丸日三服亦治大人

千金翼療小兒氣㿗方

土瓜根　芍藥　當歸各一兩

右三味切以水二升煮取一升去滓分服五合日三

備急療小兒㿗方

以蜥蜴一枚燒灰末以酒服之

又方

灸足厥陰大敦左患灸右右患灸左各一壯即當差千金同

古今錄驗療小兒陰㿗方

狐陰一具炙　飛生蟲十四枚　桂心　附子炮

乾薑　蒺藜　消石一作滑石　細辛各二分

卷栢　桃人去尖各六分

右十味擣散蜜丸大豆許以飲下五丸至七丸再服差止

劉氏療小兒㿗氣陰囊核腫痛灸法

如一歲兒患向陰下縫子下有穴灸三壯差五歲以上即從陰上有穴灸之即愈

小兒陰㿗及腫方八首

千金療小兒陰㿗及腫方

取狼牙濃煮汁洗之

又方

黄連　胡粉等分

右二味末和以香脂油敷之差

備急療小兒陰㿗方

人屎燒作灰以敷之即差千金同

又方

猫兒骨燒作灰敷之即差千金云狗骨灰敷之

又療小兒肢股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛十日五日自差一月二十日復發連年不差者方

灸瘡搔去痂以綿拭令乾以蜜敷麵作燒餅熟即以錫塗餅上熨之冷即止再度差千金同

又治小兒陰腫方

猪尿五升水煮沸布裹安腫上千金同

又方

灸大敦七壯差千金同

臣按尾翠當是尾閭

又方

擣蕪菁菜葉根薄之

小兒脫肛方六首

備急鼈頭丸療少小積痢久下下後餘脫肛不差腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鼈頭一枚炙令焦　小形蝟皮一枚炙焦　磁石四兩　桂心三兩

右四味擣篩蜜丸如大豆三歲至五歲服五丸至十丸日三兒漸大以意加之千金同

又療小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯卽入

又方

灸尾翠三壯愈千金同

又方

灸臍中三壯愈千金云隨年壯

古今錄驗療小兒久痢脫肛方

東壁上土五分　鼈頭一枚炙焦　五色龍骨五分　卷栢四分

右四味擣散以粉敷之按內之卽差

又方

取鐵精粉敷內之差

小兒䘌蟲食下部方四首

臣按 [illegible]

千金療小兒蟲食下部方

胡粉熬　雄黃末各等分

右二味以著下部穀道中卽差

又除熱結腸丸斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛生䘌蟲方

黃連　蘖皮　苦參　鬼臼

獨活　橘皮　芍藥　阿膠各二分炙

右八味擣篩以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸冬天無藍汁可用藍子一合舂蜜和丸丸二歲以下服三丸三歲以上服五丸五歲服十丸

又杏人湯方

杏人五十枚去皮尖　鹽一合

右二味以苦酒一升煮取一半量與服之

又療小兒下部被蟲食大腸赤瘡爛方

水銀一兩以棗水煮之取少許以唾研安著竹筒中吹入下部中三度差

小兒疳濕瘡方六首

備急療小兒疳濕瘡方

以鐵上衣少許內下部中卽差千金同

又方

自大椎數至第十五椎夾脊兩傍灸七壯不差加七

六株以大朋分在十六卷下也

壯千金同

又方

艾葉一兩水一升煮取四合分三服差千金云艾葉切五升以水一斗煮取一升半分三服

又小兒疳瘡方

胡粉熬入分豬脂和塗之差爲度油亦得千金同

又方

嚼栗子塗之差千金云嚼麻子敷之日六七度

又方

羊膽二枚以醬汁和灌下部中豬膽亦得千金同

小兒蛕蟲方七首

千金療小兒蛕蟲方

楝木削上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少爲此有小毒

又方

大麻子研取汁與飲之

又方

石榴根一把水五升煮取一升分二服

又小兒羸瘦有蛕蟲方

雚蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服之

又方

萹蓄三兩水一升煮取四合分服之擣汁服亦佳

又方

東引茱萸根白皮四兩　桃白皮三兩

右二味切以酒一升二合漬之一宿漸與服取差

又方

蕪荑六分　狼牙四分　白歛二分

右三味擣末以苦酒和量與服之

小兒蟯蟲及寸白方五首

千金療小兒蟯蟲方

取豬膏服尤妙

又方

擣生桃實內下部中差爲度

又主寸白蟲方

東行石榴根一把水一升煮取三合分服

又方

桃葉擣絞取汁服之

又小兒蟲方

雷丸　芎藭各等分

右二味擣散服一錢匕日三

小兒瘻瘡方四首

千金療小兒瘻方

塚中石灰研敷之厚著之良

又方

燒桑根灰敷之并燒烏羊角灰和敷之

又療小兒痛瘻方

丹砂　大黃各五分　雌黃　雄黃

藺茹各四分　礬石燒如馬齒者佳　莽草各三分　黃連六分

右八味㕮咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成

去滓下諸藥末攪凝塗之差

備急若患瘻瘡頭盡開出膿後復合者方

大附子一顆內鯽魚腹中於炭火上燒灰研以敷之

更擣蒜以封之良

小兒疥瘡方六首

范汪療小兒疥瘡雄黃膏方

雄黃研　雌黃研各一兩　烏頭一枚　松脂

亂髮各一雞子許　猪脂一升

右六味和煎之候髮消烏頭色黃黑膏成去滓以敷之

熱塗之

千金療疥方

以臭蘇和胡粉敷之差爲度

備急療疥方

燒竹葉灰以鷄子白和塗之以差爲度

又方

以亂髮灰以猪膏和敷之效

救急療疥瘡及小兒身上熱瘡並主之方

黃連　黃蘗　赤小豆　臭黃各一兩

水銀半兩研相和

右五味爲散以麻油和先淨洗瘡然後塗之甚佳

又療小兒瘡疥等神驗方

黃連　糯米粉各十二分　水銀八分研　胡粉六分

吳茱萸　赤小豆各一兩

右六味擣散水銀手中和唾研如泥以猪脂并水銀成

膏先洗瘡乾拭令淨以塗藥三兩度差　忌猪鷄魚肉

小兒癬瘡方六首

集驗療小兒癬方

以蛇床子末以白膏和敷之

千金療小兒濕癬方

枸杞根擣末和臘月猪膏敷之　一云酢和亦生

又方

又方
桃青皮擣末以酣和敷之日二
又方
煎馬尿洗之
又方
揩破以午鼻上津塗之
又方
狗屎灰和猪脂以塗之
小兒誤吞物方四首
小品療小兒誤吞鐵珠子如狸豆大者經年不以爲害後病瘦瘠食不生肌膚時下痢或寒熱服諸藥自療來反劇

不效有師診之云是吞物不消作法服枲藥所吞物不去終不差令其家中察之云兒近歲常弄十六貝鐵珠覓失一顆慮是吞之從來積歲實不以爲疑之師大診乃信是故令病矣爲處湯藥所患即差復與將療其兒肌膚充悅而忘說其方且記之又有一宋女子六七歲許患腹痛其母與摩按之覺手下有一横物在兒肉裹正平横爾問兒曰那得鍼在肉中大驚怪脫衣看之肉完淨無有刺處按之兒亦不患鍼痛惟覺腹裏痛耳其母即以爪甲重重介之乃横物折爪下兩段亦不偏痛廼師診之共察若吞鍼刺物者其嬰兒時不經穢惟恐養兒時母常帶鍼繫掛横兒體鍼入兒肌膚中兒纔覺痛啼呼與乳母息便止遂或不覺今因腹痛摩之知耳鐵得土木濕皆生衣易朽鐵在人肉中經數歲肉得血氣皆朽也故介之即折令患腹痛不安但療腹痛服溫中湯下心腹病差後長大嫁因産乳不關道鍼處爲患故記之
千金療小兒吞錢方
取磁石如棗核大吞之其錢立出
又誤吞錢等物方
艾蒿一把剉以水五升煮取一升頓服之即下
肘後療小兒誤吞梅李方

以少許水灌小兒頭承其水與飲之即出良
近効療小兒誤吞錢在喉中不出方
取麩炭末指彈入喉中其兒當便咯出效
小兒雜療方六首
劉氏療小兒上冷下熱上熱下冷難將息方
犀角末　甘草　生地黄各六分　芍藥五分
白朮　茯苓　梔子各三分　柴胡
人參　大黄　生薑各四分　黄芩二分
桂心一分
右十三味切以水三升煮取一升分溫服之

又療小兒身體猯氣急卧不得方
郁李人一合擣末和麪溲作餅子如常法與兒喫微
利卽差
又方
郁李人末六分以水七合和調去滓煮粥與兒喫之
又療小兒油丹赤腫方
栝樓三大兩以釅醋擣藥以敷之佳
又方
取蕎麥麪以醋和塗之差
又療小兒野雞下部痒悶方 通按野雞未詳
枳實二兩　鬼箭　青木香　鬼臼各二兩
右四味擣爲末以釅醋和以青布裹以熨之有頭卽破
熨訖令根拔去之差止甚佳
右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔　校勘
重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十六卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十七卷目錄 乳石論十九門

乳石論序
薛侍郎服乳石體性論一首
李補闕研鍊鍾乳法一首
曹公草鍾乳丸法二首
崔尚書乳煎鍾乳餌法二首
雜餌鍾乳丸散補益法二首
東陵處士鍊乳丸餌并補乳法二首 內缺一首
雜餌鍾乳酒法二首
周處溫授侍郎鍊白石英粉丸等餌法并論紫
石白石英體性及酒法五首 內缺一首
雜煮石英和金銀草藥餌及鐵鐺煮水飲法三首
同州孟使君餌石法一首
羊肉中蒸石英及石汁蒸豬肉兼作羹豉服法
三首
豬肚中煮石英及飼牛乳兼石英和磁石浸酒
服餌法三首
服石後有不可食者有通食而無益人者有益
人利石者藥菜一十條
張文仲論服石法要當違人常性有五乖七急

入不可兼傳不虞藥并論二十二條
乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十七首
銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條
飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條
餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條
癰疽發背證候等論并方五十四首

唐王燾先生外臺秘要方第三十七卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

乳石論序

按古先服餌賢明繼踵合和調鍊道術存焉許其羽化太淸則素遇仙骨若以年留許域必資靈助此蓋金丹乳石之用豈流俗淺近而能知所患其年代浸深訣辭微密世有傳習罕能詳正更加服石之士精麤不同雖志貪補養而法未精妙遂使言多鄙褻義益繁蕪每加披覽實長疑惑既子弟不得親授亦家童莫能曉了存諸左右殆謂闕如余宿尚谷神栖心勿藥旋月云久經書粗通知文字之一失乃性命之深誤是以會集今古考量論訣取斷名醫都凡纂要建題篇目并五藏合氣經絡受病入風所中形候論訣兼諸家會同將息妙術及乳石丹與雜石壓埋之法錄定倫次即以時代爲先後今刪略舊論纂集新要分成上下二卷可謂價重千金比肩萬古冀之於後學豁若冰消者乎

薛侍郎服乳石體性論一首

中書侍郎薛曜論曰夫金石之性堅剛而急烈又性淸淨

而惡淬擬凡服乳石訖即須以意消息尋撿齋法不可無備忌也但人性或冷或熱或寬或急皆須量性將衛不可輕有犯觸凡乳石一服之後常在腸胃若人氣力衰石氣強即發動若人氣力盛石氣安即強健謹按古法皆令五十以上始服乳石殊謂不然今驗所見年少服者得力速兼無病患何以言者年少筋力滿盛飲食飽飫彌益精明壯健終無發理年歲遲暮氣候衰竭食飲失宜此石氣勝人無不發動歷觀得失莫過於此夫人年少縱不喫飲食血氣自強年老力微縱肉精細猶不可徙以此言之足明古法疎矣凡人身血脈經行不絕如血脈微有滯處便於

其處發瘡或發熱神氣昏悶必欲防之每朝及暮溫一兩盞清酒或可以生薑剉碎和少茱萸飲之令遍體熱薰薰又作熱羹粥飲之使腸胃通利即石氣流行其初服石一二百日尤宜作此將息是古法服石不取夏月只取冬月所以然者石有發動與服時皆背此又殊乖通論今驗服石飲食失時勞役過度立即發動豈得背時今歷見將衛得宜並不發動復見名醫平章服石之人常作熱將息微發調適乃易耳脫若石氣發動腎須宜泄服少冷藥使得轉瀉若得通暢熱氣併除若常作冷將息脫若石氣發動用冷藥無由得轉此一曲之說今古存之但欲廣聞見爾

通按君子以此為意一本作君子所以為意

其將息皆須自量本性冷熱為俗務取安穩不可拘執古論捨已從人庶通曲君子以此為意也按本草石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊食之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時蛇牀子為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石蘘草少室猶連嵩山也今第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有之唯通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者為善長挺乃有一二尺者黃色以苦酒洗刷則白仙經用之少

通按郴州一本作陳州康硤州嶺山南康道陵州陵河南信

俗法所重亦甚貴之謹按鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今硤州清溪房州三洞出者惡本草作亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴只可擣篩白練裹之合諸草藥酒浸服之耳陶云鍾乳一二尺者謬說也

李補闕研鍊鍾乳法一首

研鍊鍾乳法

通按千金翼云置金銀鍋中

取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊唯黃赤兩色不任用欲鍊亦不限多少置鍾乳於金銀器中即以大鐺中著水沈金銀器於鐺中用

可鎮心益氣定志亦可用

火煎之常令如魚眼沸水減即添若薄乳三日三夜即得若麤肥厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煎滿十日最佳煮訖出金銀椀其鐺內煮乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者食猪肉即愈弃此黃水訖更著清水準前更煮經半日許即出之其水色清不黃即止乳無毒矣即於瓷盆鉢中用玉鎚著水研之盆鉢及鎚須夾白練袋籠口稍長作之使鎚得轉盆鉢上下每日著水攪令調勻勿使著鎚鉢即封繫練袋自作字記勿使人開一即免纖塵入

中二免研人竊喫研覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀泔狀乳細者皆浮在上麤者沈在下復繞鎚鉢四邊研之不著者即麤細不勻爲此每日須一開或二開攪刮不勻勿使著鎚即得勻熟免有麤細研至四五日狀若乳汁研揩覰之狀如書中白魚膩即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落爲限熟訖澄取暴乾任將和藥及和酒空腹服佳 千金翼同

曹公草鍾乳丸法二首

主五勞七傷肺損氣急療丈夫衰老陽氣絕手足冷心中

謹按千金翼石斛作一兩吳茱萸半兩

少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能食服之安五藏補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中方 唐尚書用之

鍾乳二兩別研十日 吳茱萸二分 石斛 菟絲子各一兩酒浸別擣

右四味擣篩蜜丸如梧子空腹服七丸日再服訖行數百步溫酒三合飲之復行二三百步口胷內熱熱如定即食乾飯豆醬過一日食如常須暖將息不用聞見屍穢等氣亦不用食麤臭陳惡食初服七日內勿爲事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所患欲多陽事者加雄蛾三十枚若患渴加蓯蓉花三兩佳 千金翼同

又鍾乳丸法

成鍊鍾乳二十四分 石斛 蛇牀子各五分 人參 桂心各四分 乾薑三分 椒三分汗去目幷合口者

右七味擣四十八分計一十二兩以鍊白蜜和之擣三千杵藥成丸如梧子空腹溫無灰清酒下二十五丸日再服如性飲宜加飲少許仍行三數百步即乳氣溜下任食若能節量甚佳古法云令食乾飯得丸力速如覺熱衝上進一兩口飯行步消息良久任食若能節食甚佳古法云令食乾飯豆醬不得過多不可依古法終是節食忌行陽事最要能依此法將慎補益之功不可具

延終妙也

崔尚書乳煎鍾乳餌法二首

療風虛勞損腰脚弱補益充悅強氣力法

鍾乳三兩研如麪以夾絹練袋盛稍寬容急繫頭內牛乳一大升中煎之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服爲再服亦得若再服即待曉間食消時服之如能頓服即平朝盡服之不吐不利若稍虛冷人即微下少糖利亦無所苦明朝又以一大升牛乳準前煎之依法服之其鍊袋每煎訖即以少許冷水灌不然氣不通泰如此三十度以上四十度以下即

力盡其袋中滓和麪飼母雞取其生子食亦好不然用淺藥酒亦得若有欲服白石英並依此法若患冷人即用酒煎患熱人即用水煎若用水及酒例須減半乃好若用牛乳三分減一分補益虛損無以加之永不發動 千金翼同忌在別卷中

服乳粉法

乳小秤一兩分爲兩服朝服夜盡無問多少一準此法一兩爲度凡服乳皆須溫清酒服之常令酒氣不絕爲佳不得使醉吐唯須少食日食一升許飯得消三日不出即乳不隨食下化爲度三日外任意作美

通按千金有罷硬之

食將息其乳多少任人貧富服之師云服一斤百病自除二斤疵及三世三斤臨死之時顏色不變在土下滿五百年後乃成强壯人 通按三日不出謂三日不大便使乳氣不下泄也

雜餌鍾乳丸散補益法二首

千金鍊鍾乳散療虛羸不足六十以上人瘦弱不能食息百病法能多得常服益佳

鍾乳一斤取白淨光明色好者即任用之非此者不堪用一味先泥一鐵鐺受四五斗者爲竈貯水令滿去口二寸內乳著金銀瓷器中任有者用之使得沈之於鐺中令水沒器留一寸餘即得常令如此勿使

出水也微火煮之日夜不絕水欲竭即添成煖水每日一周時輒易水洗鐺并淘乳七日七夜出之淨淘訖內甆鉢中玉鎚縛格著水研之一日一夜多著水攪令大濁瀉取別澄爲粉其乳麤者自然沈底可研之凡三日三夜皆細逐水作粉畢澄取暴乾更於鑊鉢中研之一日候入水洗不落爲佳可分秤入散藥服之取鍊成乳粉三兩

上人參 上石斛 乾薑 各三分

右三味擣篩與乳令相得均分作九貼早朝空腹溫酒服一貼晝後服一貼三日內準此服之三日後還須

進舊服如前盡此一斤乳訖其氣力當自知耳不能具述也 新撰英乳論同

延年秘錄鍾乳散主補虛勞益氣力消食法

防風 人參各一分 鍾乳二分研 細辛半分

桂心二銖 乾薑一銖

右六味為散分作三貼每晨溫酒服一貼食時服一貼食時進不用過飽亦不得過饑常令飲酒使體中熏熏有酒氣若熱煩以冷水洗手面不用熱食亦不得冷食忌法如常

雜餌鍾乳酒法二首

廣濟記鍾乳酒主風虛氣上安五藏通百節利九竅益精明目補下焦傷竭腳弱疼久服延年益壽肥健好顏色不老法

鍾乳三兩細研兩重綿練袋盛內六升清酒中用白瓷器盛密封安湯中煎令三分可減二分即出湯還添酒滿元數封頭七日取飲一服三合 忌如藥法

又和酒服餌鍾乳法

成鍊鍾乳三兩以無灰新熟清酒一斗於不津器中相和密封閉冬七日夏二日空腹溫服三合日再服漸加以知為度十五日令盡亦有用此三兩和酒服三日令盡 並令節食忌房事猶慎如藥法 千金翼同

東陵處士鍊乳丸餌并補乳法二首

鍾乳無問州土但白薄光潤者即堪以疎布袋盛懸於釜中勿令著底炭火煮之日三度易水出釜水淨洗訖內釜中發火如前候水色不變為度將乳袋出於新汲清水中洗去乳袋上浮味更以牛乳五升緩火煮之一日欲服乳先飲此牛乳任和酒飲之其袋中乳傾出於盤中以水淨洗入缽即研研滿七日七夜常添水令如牛乳狀勿令乾燥使麤細不勻候白光可焚水

其四色英今不復用謹按

白石英所在皆有今澤州虢州洛州山中俱出虢州者乃大徑三寸長五六寸者今通以澤州所出為勝採之妙

又經云紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山谷採無時長石為之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句

蠶今第一用太山石色重岩下有根次出菴零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏心有一物如眼只與石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今敝家採擇唯太山最餘處可作丸酒耳仙經不正用而爲俗法所重也採時依此

又鍊服石英法周司戶處溫傳授云於艮侍郎處得甚妙

白石英五大兩 微擣碎以醶酢五大升於不津甆器中蓋頭埋屋北陰處經七十日出瀉除酢擣碎研以水飛如出粉法澄清瀉之更研飛之可經二七日以餘

酢三小升還置不津甆器中蓋頭又埋可經二十日出以水洗去酢味盡研之極細即以好騂乳三大升安不津器中重湯煮令乳竭止依方用和後丸

又丸法

生乾地黃 茯苓華州者 人參潞州者 蜀天門冬去心

枸杞白皮取時月州土者各三兩

右五味擣篩爲散入前石粉令相得勻調鍊蜜和丸如梧子初服十九加至二十九日一服以後地黃酒服之

又酒法

生地黃切五小升 烏豆二小升

右二味以無灰清酒漬經五宿取服

雜煮石英和金銀草藥餌及銀鐺中煮水飲法三首

千金翼煮石英服餌法

石英五大兩澤州光淨無點瑕者取石英打碎如小豆粒麥許大去細末更於水中濤洗令淨重練袋盛之以繩子繫頭取五大升清水於不津鐵鐺中煮之煮時石袋不用著鐺底恐沙石煎壞先以一杖橫鐺口挂石袋著杖上去底三二分許煮取一升汁置椀中經宿澄取清平朝空腹頓服若以此汁煮豬粥服之亦佳每服後可行五百步并飲三兩盞清酒又更

依前法煮石二十度者石即無力以布裹埋南牆下深三尺滿百日又堪用服之然終不如新者

又石英和金銀人參煮服餌法

金一大斤 銀四大兩 白石英五大兩 人參二大兩

右四味取一鑌釜淨洗即下前件藥於釜中先下水三大升立一杖入釜中令至底水所浸者處即刻記之更下水二大斗七升通前總三大斗煎之如魚眼沸漸減至杖所刻處即停火急取還上置釜底取其汁貯以不津器中其金銀石等漉出收取其人參隨藥汁細細喫却其汁每朝空腹服三大合夜間又服二大合欲作食

餌亦任每服之後隨性多少酒使行藥氣忌如常法

纂靈記銀鑵煑白石英服水法

白石英五大兩（通按搥底多開小孔四旁亦然欲令上上者大氣通入鑵內而不又不佳布也）

右以銀鑵盛石受可一小升鑵底開小孔子令遍側黕匝下又兩行開孔達遍於鐵鐺中著水五大升則內銀鑵水中炭火上煎取二小升去鑵澄清分再服服訖飲少酒睛行一二百步許其石三遍煎一廻打碎一片作兩片乃至麻米大卽休棄之不堪服也無所裓忌

同州孟使君餌石法一首

服石法

取白石英一大斤敲碎狼拉如酸棗核大不用全取白石顆先砂盤中和麤細砂使壯兒仍少著水和挼二三千下訖卽淨洗取石又於砂盤中和砂更挼一二千下依前淨洗卽安柳簸箕中蒿葉兼少許水熟挼訖以水淨淘出曬令乾又以手細細挼之令滑碎總盡熟挼使光滑卽盛於夾帛練袋中若出將行若於家內安當門牀上每日平明未梳裹前取七顆含於口中以酒或水下之一顆一廻咽七廻吞訖令到小腹下以兩匙飯壓著卽依大家食一無所忌死生穢惡白酒牛肉但是石家所忌皆總不忌所以然苦料理使光滑者恐有浮碎薄人腸胃作小瘡子亦無他疑卽每日亦起梳裹前依前服之值冷熱都總無忌比至日午左側卽便轉出為新石推陳石下下訖還依大家食時卽飧飯若自知病癖至夜食前又服七顆依前法吞一夜令在小腹下溫齊腳明日平明先便轉陳石總與石下訖又朝法夜法服之此石常在小腹內仍附倉門但小腹溫熱於四肢膀胱兩目髓腦膚體之內元無石氣欲發從何而作丈夫婦人多有積冷若下熱必須上冷若上下俱冷冒口不下食便成消渴致死若上下俱熱頭面生瘡唇乾眼

赤手腳枯槁皮毛浮起不久成骨蒸凡人必須上下焦冷熱氣息調和筋脈通達若上熱下冷必有痼積服石之後卽下熱自然上冷骨氣堅實腰腎強健萬病自除若不得力十斤亦須常喫若得力訖一斤卽止也

自

羊肉中蒸石英及石汁焦豬肉兼作薑豉服餌法三

羊肉中蒸石英服餌法

精羊肉一斤　白石英三兩

右二味先取肉擘作兩段鑽作孔內石著肉中還相合

卽用荷葉裹又將膩紙裹又將布裹於一石米飯中蒸之候飯熟卽出抑石後取肉細切和葱椒薑等絲小作餛飩子熟煮每旦空腹冷漿水中呑一百子呑訖將冷飯壓之百無所忌宜春夏服大驗其石永不發勿令餛飩破碎其石三兩廻用之乃換之

又石汁中煮猪肉餌法

白石英一大兩

右一味絹袋盛以水三斗煎取四大升去石以猪肉一斤細切椒葱鹽豉一如食法煮之任意服隔十日一度打碎煮之一無所忌甚妙

又石英汁作羹豉服餌法

白石英二大兩 肥猪肉三斤 通按中破者打作兩塊也

右二味以水八升煮石英取五升盡煮猪肉得爛熟爲度取猪肉汁下葱豉切肉作羹豉食之一劑可六七日喫令盡二兩石英三度煮之第一度全用第二度中破第三度擣碎煮之每煮皆用白練袋盛之其石經三度煮卽須換新者二月以前八月以後皆可作餌也千金翼同

猪肚中煮石英及飼牛取乳兼石英和磁石浸酒服餌法三首

千金翼猪肚煮石法年四十以下服二大兩年四十五十乃至六十以上加二兩常用四月以後服之者緣石性重服經兩月以後石力若發卽接秋氣石力下入其藏腰腎得力終無發理

白石英二大兩以生絹袋盛縫却口 人參末 生地黃切 生薑細切各三大兩 葱七莖細切 豉一抄 椒四十九顆去目合口者 羊肉半斤細切 猪肚一具淨料理如食法 新粳米一合和前件藥并石英袋內著猪肚中急縛口勿使少洩氣及水入

右十味以水二斗煮至八升卽停出藥肚著盤上使冷然後破之如熱破恐汁流出先出石袋訖取煮肚汁將作羹服之每年三度服每服石英依舊餘藥換之分數

一依初法每服隔一兩日不得食木耳竹笋

又石英飼牸牛取乳服餌法

白石英三大斤取好者以上亦得

右一味擣篩細研三兩日研了取一牸牛十歲以上養犢者雖瘦甚佳每日秤一大兩石末和剉豆與服經七日卽得取乳每朝空腹熱服一二升餘者作粥喫任意食之百無所忌以五月上旬起服大好如急要亦不待時節終無發也牛糞糞地隨意種菜供服乳人喫之

又石英和磁石浸酒餌法

白石英五大兩澤州上好者
磁石五兩去毛不引鍼多者十兩亦得二物各擣令碎各用兩重帛練袋盛之
右二味以好酒一斗置不津器中懸藥浸經五六日以後每日飲三兩盞常令體中微有酒氣欲加牛膝丹參杜仲生地黃吳茱萸黃耆等藥者各自量冷熱及所患并隨所有者加之仍隨所加有忌者禁之餘百無所忌一年以後鬚髮變黑腰疼耳聾悉差其酒三五日已後即斟添一二升常令瓶滿所加草藥覺力盡者任換之經三四箇月覺石力稍微即更出擣碎還以袋盛經半年以後棄之準前更合

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥菜等一十條

不可食者油脂其性精滑而令人不能食穀麥勿煎炙也
又蕪荑能生瘡發石氣　又脊芫一云發石亦云損石
又芥子及芥菜皆能發熱　又莧青菜發氣損石也
又葵菜滑而且冷亦不可食　凡不可食者勿食為佳
若欲食者皆須報鍊雜以葱椒然可通食者蘇其物澀滯而能行石氣
又冬瓜龍葵此二味甚壓石亦多食　又蔓菁作虀和酢作粥始可少食亦須椒　又葵不可空喫腹胃燥澀可取三五葉入肉時煮雜之

食一頓也

張文仲論服石法要當違人常性五乖七急八不可兼備不虞藥并論二十三條

五乖

重衣更寒一乖凡人寒衣即暖服石人宜薄衣若重衣更寒經云熱極生寒故云一乖
飢則生臭二乖平人飲食不消作生食氣服石人忍飢失食飽有生食氣與常人不同故云二乖
極即自勞三乖平人有所疲極即須消息恬養服石人久坐久臥疲極唯須自勞動散石氣即得暢故云三乖
溫則泄利四乖平人因冷乃利得暖便愈服石人溫則泄冷即差故云四乖
飲食欲寒五乖平人食溫暖則五內調和服石人食飲欲寒乃得安穩故云五乖千金翼名六反云

癰瘡水淡六反也餘同此但有五條各五乖

七急

當洗勿失時一急若寒身體頭疼關節強直翕翕發熱煩憒心悶即須洗浴若初寒先用冷水後用生熱湯若初熱先用暖水後用冷水浴訖可以二三升冷水淋頭故云一急
當食勿飢二急須食便食不得忍飢故云二急
酒必淳清令溫三急無問冬夏常須飲多少在性熱飲尤佳故云三急
衣溫便脫四急
食必極冷五急
臥必褥薄六急
食不厭多七急

入不可
冬寒欲火一不可
飲食欲雜二不可
當疵自疑三不可凡服石常須消息節度覺小不安將息須依法不得自生狐疑
畏避風濕四不可若覺頭風熱悶憤憤心煩則宜當拭頭以冷水洗手面即好不比尋常風濕依此尤佳
極不欲行五不可若久坐久臥有所疲極必須行役自勞
飲食畏多六不可
居貪厚席七不可
所欲從意入不可不用從意所遂石性將息節度爲妙

凡藥石發宜浴浴便得解浴訖不差者乃可餘療若浴不差即得依後服葱白麻黃等湯諸隨身備急藥日新附
紫雪 金石凌未詳何也 茸草 萎蕤
黃芩 大黃 狗白糞 芒消
朴硝二加 蘆根 麥門冬 香豉
石膏 犀角 胡豆 露蜂房
白鴨通 大麥奴
右以上諸藥皆乳石所要仲嗣令與名醫擇之常用隨身備急
寒食諸法服之須明節度明節度則愈疾失節度則生疾愚者不可強強必失身智者詳而服之審而理之曉然若秋月而入碧潭豁然若春韶而泮冰積實謂美矣凡將理解折法具在中卷參而行之

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十七首

延年秘錄論曰乳者陽中之陰石者陰中之陽乳石從來陰陽精體處至陰之裏有正陽伏其中正陽之中復在至陰之裏故陽生十一月甲子後服乳陰生五月甲子後服石陰陽發明互相爲用而服之皆理於內不泄於外也夫人腑虛皆帶風氣處人全軀常經含象理之有法則禍害

不生乖於時候則危療立至竊覽古法皆云四月服石此謂淨學不曉由來按鬮承開服石倉曰四月雖開而未平六月謂得氣之節他皆倣此常以不全實其府不全虛其臟即入風之道無所觸焉或有藥觸成病飲食發疾今并倫次詳而行之通按此論而未五字疑有闕
備論曰神農桐君深達藥性所以相反畏惡備於本草但深師祖學道洪道洪所傳何所依據云
鍾乳動術令人頭痛目疼術動鍾乳即胸塞氣短海蛤動乳即目疼氣短雖患不同其療一矣如與上患相應速服葱白豉湯其五石大散自後人發動將療亦非古法乃云

[illegible]

鍾乳與朮更互相動本草既無成文但學者穿鑿今但依頭疼目痛胸塞氣短證候速服葱白豉湯方 千金云鍾乳對栝樓 又

葱白切去青一斤　香豉綿裹三升　吳茱萸二升　甘草炙切三兩

右四味以水一斗半先煮葱白澄清取八升內藥煮取三升分三服訖令人按摩搖動口中嚼物然後仰臥覆以暖衣汗出去衣服湯熱歇即便冷淘飯醬脯等物任意食之 千金用葱半斤豉二升甘草人參各三兩無吳茱萸若服此不解復服甘草湯方

甘草炙三兩　桂心二兩　豉二升　葱白半斤

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣復服桂心湯方

桂心　麥門冬去心三兩各　人參

甘草炙各二兩　葱白半斤　豉二升

右六味合服如前法 出千金

防風細辛動硫黃令人煩熱脚疼腰痛或瞋忿無常或下痢不禁防風細辛能動硫黃而硫黃不能動彼纔覺發便服杜仲湯方

杜仲三兩　枳實炙　甘草炙　梔子十四枚

李核人去皮各二兩　豉二升

右六味合服如上法若不解復服大麥奴湯方

大麥奴四兩　甘草炙　人參　芒硝

[illegible]

桂心各二兩　麥門冬去心半斤

右六味合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣或冷復服人參湯方

人參　乾薑　甘草炙　當歸各一兩

附子炮一枚

右五味合服如上法 出千金

附子白石英兩更相觸若白石英先發令人煩熱腹脹若附子先發令人嘔逆不食或口噤不開或言語難手足酸疼初覺宜服生麥門冬湯方

生麥門冬去心四兩　甘草炙二兩　麻黃去節二兩　豉二升

右四味切先以水一斗煮麻黃掠去沫訖內諸藥煮取三升分三服服訖若按摩臥覆取汗候藥氣散溫飯醬菜脯等任食若熱未退更服大黃湯方

大黃別漬三兩　甘草炙二兩　梔子擘二十九枚　豉二升

右四味切以水九升煮甘草梔子取二升半然後下大黃煎三四沸去滓分三服得下便止不下當盡服一法若煩熱加細辛一兩若熱勢未除視瞻高而患渴復服栝樓湯方

生栝樓　大麥奴各四兩　甘草炙二兩　葱白半斤

豉一升

右五味合服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許便可食少糜動熱若已解胃中有餘熱後服芒硝湯方

芒硝　桂心各二兩　通草　甘草炙各三兩

白术一兩　大棗二十枚擘　李核人二十一箇去皮

右七味合服如上法若腹脹去芒硝加人參二兩出千金

人參動紫石英令人心急而痛或驚悸不得卧或恍惚忘誤失性發狂或惛惛欲眠或憒憒喜嗔或差或劇乍寒乍熱或耳聾目暗又防風雖不動紫石而紫石猶動防風為藥中亦有人參緣防風動人參轉相發動令人心痛煩熱頭項強緩覺發宜服麻黃湯方千金服後人參湯

麻黃二兩去節　人參一兩　甘草二兩炙　葱白一升切

豉一升　大麥奴一把

右六味切以酒五升湯三升煮取二升分三服良

又解服人參湯法

人參二兩　細辛一兩炙　白术二兩　桂心二兩

豉三升

右五味以水一斗煮取三升去滓分三服若瞋盛加大黃黃芩梔子各三兩出千金有甘草二兩

若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方在後礜石發下

若心有餘熱氣更服人參湯方

人參　防風　甘草炙各三兩　桂心二兩

生薑切　白术各二兩

右六味合服如上法出千金

桔梗動赤石脂令人心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗令人頭痛目赤身體壯熱始覺發宜溫清酒飲之隨能解須酒勢行則解亦可服大麥麨方

大麥熬令汗出燥止勿令大焦舂去皮細擣篩以冷水和服之入窨亦佳千金翼云炒去皮熬令熟暴乾香擣篩

礜石無所偏對發則令人心急口噤骨節疼強或節節生瘡將食太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五六石灌之食少煖食飲少輸酒行步自勞即服麥門冬湯

方

麥門冬半斤去心　豉二升　葱白半斤切

右三味以水七升煮取三升分三服覆暖衣汗出即差一法加甘草三兩人參一兩半千金又有桂心二兩云始覺發即服葱白豉湯用葱白半斤豉二升甘草二兩炙三味以水六升煮取二升半分三服若散發身體卒生瘡即服麥門冬湯

銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條

薛侍郎曰服石之後一二百日內須喫精細飲食粳粥酒

等使血脉通利羹法

取麞鹿兔雉鵝鴨肉等以水淨洗切如指大於鐺中炒令欲熟即多下葱白少下椒鹽熬令香即下少水煮次下粳米摻次下豉清醬汁調鹹酸適口欲食先須歠十數口羹汁令胃口開通皮膚津潤然後進諸食縱啖炙肉亦無所慮作此將養食多且徒縱啖

餺飥亦須多啜臛汁

又若覺體氣沉滯石勢不行慎勿喫麵若覺虛假任餌薯蕷餺飥方

取大薯蕷刮去皮薄切日暴乾承潤接作粉不粉者更暴依前接粉訖下篩以煖湯及鹽如麵細切作餺飥肉造臛如前羹法用流餺飥任食此肉補益強筋骨止瀉

又若覺渴及熱盛慎勿食炙肉羊麞尤惡自外肉性平冷者通食仍勿熱進恐成消渴

又若欲知體實而痓者先看脚拇指甲肉滿及肉色赤是實也實即畏熱發當須服藥微瀉

又若覺四肢筋強脊背重或頭痛如刺眼睛欲脫者宜以香湯浴須虛靜大屋內適寒溫先以湯淋大椎及顖上三五十椀然後乃浴勿令見風浴訖覆被安臥擬取汗仍須

喫葱根葛豉粥法

葱根一大握 乾葛六兩切 豉三合 葱白一大握劈

生薑少許切 椒十五顆

右六味先以水五大升煮葱根減半去滓下葛及豉煮取二大升去滓細研少米作稀粥并着葱白等煮熟承熱啜服之訖依前覆被取汗訖令婦人以粉遍身揩摩使孔合半日許始可出外其病立差如不損可重為之

又若覺大熱者可服紫雪或金石凌或絳雪或白雪等但溫半大升水取次研一大兩香湯浴後頓服之僁一兩行利熱乃退矣凡此救急紫雪為上如不得通洩宜服黃芩飲子法

黃芩二大兩 梔子人二七枚 乾葛二大兩 芒硝半大兩

右四味切以水三大升煮取軟一大升絞去滓下芒硝調之分溫兩服快利即差止

又若發熱但依法次第將息及服藥後得微汗微利為佳不要多利利多即反其不勢又加虛人

又若覺體氣惛惛不痛不痒小便赤澀即擣茅根汁服之

又若口乾即擣蕺汁服之其蕺能利大小腸如先利即勿喫蕺在下卷口乾法中

又若少覺不下食服生薑汁酒等法

生薑汁一合 白蜜一匙 清酒倍生薑汁

通按惰百草音覽因袖也

右三味相和温頓服之半日乃效甚佳

又若覺食不下兼嘔宜服麥門冬飲子法

麥門冬一大兩去心　甜竹茹一大握　生薑半大兩切

小麥四合淘去土

右四味以水二升煮取一升半分温兩服

又若不下食體弱乏氣力卽宜食鮮鯽鱠法

取鮮鯽魚剥去鱗破去腸血勿洗之但用新布一二尺淨拭令血脉斷名曰上鱠餘依常鱠法美作蒜虀仍食瓜虀等醬尤益人下食亦療氣痢赤痢

又若發瘡及腫有根無根但服五香連翹等湯及丸其法

在此卷末癰疽法中

忌食豬肉蒜生菜等唯宜食兎肉仍須熟喫甚佳

又若腫有根堅如鐵石帶紫赤色者服湯後仍以小小艾炷當腫上灸之日一兩炷爲佳養如常法

又若觸犯必不善四體㥘懔飲食無味亦可含香丸如不瘥服一盞五香湯取微利一行佳則不煩沐浴也

飲酒發熱諸候將息補餌論幷法一十條

古今錄驗論曰飲酒則石勢敷行經絡氣力強溢腎氣堅王卽頻爲陽事陽事過多便腎虛腎虛則上熱熱盛則心下滿口乾燥飲隨嘔吐胃府不和宜服茯根飲安穀神除

熱嘔止爲也且石酒相得遞相爲用若石勢不行則須少飲如石氣調歇不復須飲

又若熱盛充滿經絡心腹少服欲心下痞癖不消或時聚如堅隨復消者宜服秦艽湯得利便差秦艽湯法

秦艽三兩細切　以牛乳一大升煮取一小升去滓頓服之得利卽差若老弱可量氣力進之其飲食亦宜清冷不得觸熱觸熱則使石勢壅塞不行喜嘔吐病堅結也亦能發黃或小便赤心堅痛者亦宜服秦艽湯得溏泄差熱氣散後黃色絲微皮膚是差候勿怪熱散後慄慄寒顫若因頓黃復出外者是謂餘熱欲散也

勿厚覆但使肌膚中少寒顫卽止

又若熱解寒不解者可飲三合熱酒使解

又若寒解後頭重耳鳴滿眼溟溟心下痛者可飲二合許清酒便差寒温宜依此法

又若心下結硬腹脹大小便不利者急服前胡大黃湯下之法在下卷小便淋法中

又若欲狂癡失常者與白薇湯下之法在下卷痰澼乾嘔法中

又若酒熱歇石熱亦不復行心下熱結已消黃絲未歇亦無所苦但冷飲食勿進辛辣菜及熱補食若不欲進清冷

者可和煖餌勿令大熱
又若飲熱歇後石勢虛損飲食入口自覺諸脈中痛痛如
冷水入者是酒石俱退經絡空虛故也宜積日調冷食兼
依服進豬蹄羹通養諸脈自差止
又若頭眩耳聞空中有人語心怯恐懼兼憂悸不安四肢
如痺或起腳即輒驚如被虎狼所逐威勢所攝者方
服淡竹瀝一二升乃至三升差止亦可進白薇湯下
之消息稍與令飲粥常令有食力時進雞心酸棗湯
常令對偶安慰之以美言相悅慎不可以惡事怒之
又雞心酸棗湯療飲後悶多腎虛發熱積日不食胃中虛
熱飲食不已氣入百脈心藏虛甚令人失常法 出古今錄驗

雞心十枚 酸棗半升 人參一兩 茯神
芍藥各二兩 白薇 枳實炙 知母
甘草炙 栝樓各二兩 生地黃八兩
右十一味切以水一斗煮藥半熟內心煮取三升冷分
三服
餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條
小品論曰凡服五石散及鍾乳諸石丹藥等既差節度觸
動多端發狀雖殊將攝相似比來人遇其證專執而療之
或拟定古法則與本性有違或取決庸醫則昧於時候皆
爲自作逆推石過深者其理未曰合宜宜尋古賢互相發
見直言沐浴寒未探微寒溫適情蓋須自度隨時之義易
所通焉故陶正白云昔有人服寒食散檢古法以冷水淋
身滿二百罐登時羅斃又有取汗乃於狹室中四角安火
須臾則殞據茲將息豈不由人追之肯專守株何甚今列
篇章率擇長而錄用耳寒食藥得節度者一月輒解或二
十日解堪溫不堪寒即已解之候也其失節度者或頭痛
欲裂爲服藥食溫作癖宜急下之
又若手腳疼患須癖者爲犯熱經久故也急與冷水洗飲
熱消酒進冷食即止一法飲冷清酒亦止

又若胸上生瘡結氣腰痛不得動者爲自勞太過也宜服
香豉飲法
香豉三升 葱白一虎口
右二味以水三升煮三沸服之不止乃至三四劑自止
又若腹痛欲折兩目欲脫者爲熱上肝膈腰腎冷極故也
宜服黃連飲法 腹痛欲折兩目欲脫千金翼作二條
黃連 甘草炙各一兩 萎蕤二兩
右三味切以水三升煮取一升去滓內朴硝一兩頓服
得微利止
又若肢目欲倒者爲衣厚犯熱故也宜冷水淋頭并洗之

有四十上條與千金異大約其大有小異耳

是反救字

須臾即愈千金翼云宜洗頭
又若脚疼欲折者爲久坐溫處故也宜常須單牀行役并
以冷水洗浴即止
又若腰脹欲裂者爲久坐下熱衣溫失食故也宜數冷食
冷洗當風取冷須臾即差
又心痛如刺者爲應食不食應洗不洗寒熱相搏氣結不
通塡於心中故也宜數飲熱酒任性多少酒氣行經絡通
達淋以冷水又冷淹手巾搭著痛處溫復易之須臾解也
解後仍速與冷食食多益善於諸痛之中心痛最急宜速
救之法在下卷心痛法中

又若發急逼身熱如湯火或氣結不識人時倒口噤不開
不自覺知者救之要以熱飲隨其性酒之卒不得下者當
打去齒灌之咽中塞盛酒入必還出但灌勿止半日許以
酒下氣徹乃蘇酒亦不下者難可救矣
又若下痢如寒中者爲行止食飲犯熱所致宜速脫衣冷
食冷飲冷水洗即差
又若百節酸疼者爲臥處太厚又蓋覆被衣溫不脫故也
但單牀薄被單衣或以冷水洗勿著新衣著故垢衣雖冬
寒常須散髮受風仍以冷石熨其衣勿緊帶若犯此酸悶
者急入冷水浴勿忍病而畏冷兼食冷飯

又若戰顫惡寒或發熱如溫瘧者爲失食忍飢失洗不行
又食臭穢故也宜急飽冷食冷水洗數行即愈
又若惡食臭如死物氣者爲食溫作癖故也宜急以三黃
湯下之若不下終不差法在下卷解壓法中
又若咽中痛鼻中塞清涕出者爲衣溫近火故也但速脫
衣取冷當風以冷石熨咽鼻當自差不假洗也
又若胸脇滿氣上嘔逆者爲飢而不食藥氣上衝故也速
與冷水洗食冷飯止
又若食便吐出不得安住者由癖故也宜急以甘草飲下
之不下當危人命兩甘草飲法

甘草二兩炙　大黃三兩別漬　黃芩二兩
右三味切以水三升煮三兩沸去滓分服以利爲度
又若大便難腹中堅如盤蛇者爲犯溫積久腹中有乾糞
不去故也宜銷酥蜜膏服一二升津潤腹內即下若不可
服大黃朴硝等下之
又若患淋者爲久坐溫處或乘鞍馬坐處大熱熱入膀胱
故也但冷食冷水洗冷石熨腹不過一日即差止千金翼云若不
止可下之不下殺人
又若寒慄頭掉不自支持者爲食少藥氣溢於肌膚五藏
失守百脈搖動與正氣相競故也宜強飲熱酒以和其脉

強食冷食以定其藏強行以調其關節強洗以宣其壅滯
即差
又若小便稠數者為熱食及噉諸熱餅肉之膈故也宜冷
水洗腹兼服梔子湯法
梔子人二兩　甘草炙　芒硝湯成下　黃芩各二兩
右四味切以水五升煮取二升分溫二服取利即差
又若失氣不可禁止者為犯溫不時洗故也但冷水洗之
即差
又若遺糞不自覺者為熱氣入胃大腸不禁故也當冷洗
即差

又若目痛如刺者為熱氣衝肝上眼故也但數冷食清朝
溫小便洗之不過三日即差止
又若耳鳴如風聲又有汁出者為自勞過度陽事不節氣
上耳故也宜數飲食補之節禁陽事即差
又若口中傷爛舌強而燥不得食味者為食少穀氣不足
藥氣積在胃管故也宜急作豉湯服之豉湯法
香豉二升　葳蕤　甘草炙各二兩　麥門冬去心
小麥各三兩
右五味切以水六升煮取二升分溫三服能頓服益佳
再合為度

又若關節強直不可屈伸為久停息不自勞洩藥氣不散
漸侵筋血故也出力使溫冷洗即差止
又若得傷寒溫瘧者為犯熱故也宜以常癖藥救之無咎
但勿服熱藥耳其傷寒瘧藥等皆除熱破癖不與寒食相
妨故通服也凡服寒食雖已熱解而更病者要先以寒食
救之終不中冷其法在下卷解壓法中
又若飲酒不解食不得下乍寒乍熱不洗便熱洗之復寒
其者數十日輕者數日晝夜不得寢寐愁悲恚怒自驚跳
悸恍惚忘誤者為犯溫積久寢處失節食熱作癖內熱與
藥併行寒熱交爭雖以法救之終不可解也昔皇甫氏曾

噉此散數發即欲自刑尊親制之乃免斯禍強令飲食其
熱漸除縱家有寒熱藥發急皆忘雖素聰明發皆顛實告
令難喻為茲斃者不可勝數遂關家兄士元救急之法合
三黃湯服之大下便差止而錄之法在下卷解壓法中
又若脫衣便寒著衣便熱為脫著之間失適故也小寒自
可著小溫便可脫即止洗之則爽然差慎勿忍之使病成
也小品云洗則了然差矣應洗勿忍之忍則病成也
又若齒斷腫脣爛牙齒搖痛頰車噤為坐犯熱故也宜時
救之可當風張口使冷氣入咽漱寒水即差
又若脈洪實或斷絶不足似死脈或細數弦駃其所犯非

一此脉無醫不識也熱多則弦駃有癖則洪實急痛則斷
絶凡寒食藥熱率常如此自無所苦非死唯勤節度爲妙
又若大便稠數爲坐久失節度將死之候也如此難療矣
可與前大黄黄芩梔子芒硝湯下之儻十有一生耳可爲
必死之療不可不利致死令人恨也
又若人已困而脉不絶爲藥氣盛行於百脉人之真氣已
盡藥氣尚自行故不絶非生氣也死後體因温如生人肌
腹中雷鳴顔色不變一兩宿乃作死人也
又若周體患腫不能廻轉者爲久坐不行又不飲酒藥氣
滯在皮膚之内血脉不通故也宜飲酒冷水洗自勞即差

若不能行者遣人扶持强行使肢節調暢乃止亦不得令
過度使反發熱或反熱者還當洗之
又若食患冷不可下者爲久冷食口中不知味故也當作
白酒糜多著蒜熱食一兩頓若小悶者還令冷飲食即差
止
又若下部臭爛者爲坐薦席厚熱故也當坐冷水中即差
又若夜眠不得睡者爲食少熱在内故也服梔子湯方
梔子人十四枚　大黄三兩　黄芩二兩
右三味切以水五升煮取三升去滓分三服微利又當
數進飡食自得眠睡

又若嘔逆咽喉中傷清血出者爲卧温及食熱故也但飲
冷水冷石熨咽喉即差
又若藥發輒安卧不與人語者爲熱盛食少失其性故也
但與熱酒冷洗冷食自勞便差千金翼云藥發輒尸卧不識人由熱氣盛食少不充邪忤正性故也
又若四肢面目浮腫者爲飲食温久不自勞力藥與正氣
相隔故也但飲熱酒冷食自勞洗浴即差千金翼云藥氣與正氣相併
又若鼻中有氣如爛雞子臭者爲著衣温故也或陰囊臭
爛爲坐熱故也入冷水中即差宜脱衣洗浴即自差
又若卒目臨無所見者爲飲食居處太温故也但脱衣冷

洗冷食須臾差止
又若身肉痛痛無常處如遊風者爲犯熱所作非風冷也
宜冷洗以冷石熨之自差
又若服藥心悶亂者爲服温藥與疾爭力故也法當大吐
如或不吐病當至死若吐不絶可食冷食飲自然差也若
絶不識人口復不開者亦當斵齒以熱酒灌之入咽吐出
者更與之但得酒氣下通不半日即便蘇矣
又若嗜寐不覺者爲久坐熱悶故也宜冷洗冷食即差
又若肌膚堅如石不可屈伸爲熱食温卧作癖五藏隔閉
血脉不通故也急服前三黄湯下之食冷食飲熱酒自勞

即差
又若臂脚偏急痛苦者爲久坐臥溫熱不自移轉氣入肺
脾胃故也宜勤以二布巾淹冷水搭之冷溫則易如此不
過三日即差千金翼云熱入腹附骨故也
又若患腹背熱如子如杯如盤許大者以冷石隨處熨之
又若脚指間生瘡者爲履襪大溫故也當以脚踏冷地以
冷水洗足差
又若口熱痛須悶者方
生雞子五枚
右一味頓服之即便愈

癰疽發背證候等論并法五十四首

夫二儀含象三才貫形五體以類於五行六府乃同於六
呂人之肉也則脾之所主人之皮膚則肺之所管肉受
病皆由滋味而與衣服衣服厚暖則表之呼寒滋味失度
則府藏皆熱府藏既擁則血脉不流血脉不流則毒氣偏
注湊於俞穴俞穴之所陰陽會津承虛伏守必煮其血血
敗肉潰肉腐而成膿實則爲癰浮則爲腫也若兼腎肝
虛熱遂成疽成癰矣且疽則附骨瘻則著筋凡曰癰疽脉
皆有狀有浮有滑有數有澀有弱有沉浮爲陽虛滑爲陽
實數爲陽燥澀爲陰寒弱爲陰虛沉爲陰堅三陽三陰之
脉也若三部之中脉有一陰一陽後結爲失常經者癰疽
之候也且脉法心洪肺浮肝弦腎沉若肺肝心俱至即發
癰疽何以言之爲一陰一陽水火競焉舊論寒熱客於經
絡血澀不通其理乖也論熱盡發於內而形於外未有外
熱能入於內而成其癧皆由表虛客寒所搏故衣厚暖呼
其寒是其義也凡癰發生皆由自召一呼吸失度二喜怒
不調三飲食愆時四陰陽乖候犯此四者則六府不和榮
衛不利榮者血也衛者氣也血傷寒則澀氣傷熱則益氣
則爲火血則爲水水火相搏遂形癰疽故加虛則氣攝心
伋四肢顫掉若有失而悖此爲膿不出盡之候久即成瀉

經若終發宜服排膿補養藥即無咎也癰疽之名大體相
似發有深淺療有虛盈然攝之於藥物殊途而同歸也
凡人強壯之年少陽氣者皮膚疏薄滋味恨情腸胃壅塞
因壅發熱即受其寒寒氣纔至受有深淺隨處爲證淺即
內陽尚壯中即少虛深即虛竭病在陽即易去在陰即難
除其有決生死之神功辨形色之宗旨明劉涓之術藝爾
凡癰疽膿出後不可療者有五一眼白睛青黑而小二咽
藥而嘔三傷痛渴甚四髆項中不仁五音嘶色奪此爲極
也
又凡食諸生果皆召其病養生法云勿食不成核之果勿

食和汚粒之食背為瘡癰略為綱舉以曉將來耳
千金論曰凡發背皆餌服五石寒食更生散所致亦有單
服鍾乳而發者又有生平不服石而自發背者此是上代
有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或
痒仍作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂至
不救及其臨困時瘡方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔
以手按之諸孔之中膿皆反出尋即失音不言所以養生
者小覺背上痛痒有異即取淨土水和作泥捻作餅子徑
一寸厚二分貼著瘡上以麤艾大作炷灸之一炷一易餅
子腫若粟米大時可灸七餅即差若如榆莢大灸七七炷

即差若至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及
鐵漿諸藥攻之乃愈
又五香連翹湯方
青木香　沉香　獨活　連翹
升麻各二兩　麝香半兩　薰陸香攻頭痛不著亦得
射干二兩一去一兩　大黃二兩別漬　淡竹瀝二升　雞舌香各二兩
桑寄生二兩　通草二兩
右十三味切以水九升煮藥待水減半後內竹瀝更煮
取二升分溫三服甚佳千金本方有丁香無雞舌香
又五香丸療心腹鼓脹冷瀉鬼氣疰忤方亦名沉香丸

沉水香　青木香　丁香　硃砂別研各一兩
麝香別研　犀角屑錯取　薰陸香　梔子人
連翹　石膏別研各二兩　芒硝熬　蜀升麻
大青　乾藍　栝樓　乾葛
茵蔯　黃芩　肉桂　芎藭
茯苓各三兩　巴豆三兩去心皮熬令變色別研如脂　大黃二兩
右二十三味擣篩蜜和更擣一千杵封以油臘紙每在
有患時溫熱疰病鬼疰病心腹鼓脹疸黃垂欲死者可
服四五丸丸如梧子大或至六七丸但取三兩行快利
為度利止即差

又療發背陽癰乳癰一切毒腫服之膿化為水神驗方
犀角屑十二分　大黃五分　蜀升麻　梔子人
黃芩　防風　蜀當歸　甘草炙
乾藍　人參　黃連　黃耆各四兩
巴豆二十顆去心皮熬別擣
右十三味擣篩蜜和為丸初服十丸取快利三兩行如
不快利更服三兩丸以快利為度若利多以冷酢飯止
之已後服每減丸常取溏利腫消乃止一方有蔓實
又療一切腫初覺痛不可忍神效方
取麩溲如十指許麤繞腫令匝滿中布生椒又以一

片瘥可椒上蓋之當中以艾炷如酸棗大灸少壯瘥
欲焦即換著新瘥痛停止
又療風毒及一切腫塗散方天后賜會稽王岑十夫延於
嶺南見郭詢駙馬患腫發背會稽與蘆黃門等親與藥須
臾平復岑偶因得此法
大黃五兩　白斂三大兩　寒水石　紫葛
青木香各一大兩　礜石　黃芩各二大兩　大青三兩
苦參一兩
右九味擣散和牛乳塗故布上搨腫上隨著即消乾復
易之若腫在骨節即搨近骨節好肉處移取腫搨即消

又方效陰靈明府說傳云甚驗
水銀一斤
右一味以紙分為兩裹蜜繫頭更以帛重裹勿令走失
遞互將搨上覺溫即易不過十數度熱毒歇即消矣
神効
又發背神驗方
狗白糞半兩
右一味暖微作腫者以暖水一升絞取汁分再服以滓
敷上每日再為之瘥止
又方

通按千金從

狗牙灰皆可封日三四易

通按救急方之猪脂貼作片人水反餘損易之五六十片瘥此遍即瘕痕定新難好

凡腫起於背胛中頭白如黍粟四相連腫赤黑令人
悶亂者名發背也宜禁房事酒蒜麪若不灸療即入
內殺人可當瘡灸七八百壯有人不識多作雜腫療
皆乃死
又方
取三年酢滓微火煎和牛脂封上日一易之
又方
取亂髮灰酒服一方寸匕亦治癰疽
又方
狗牙灰酢和封之瘥

又方
飲鐵漿三升下利即瘥
又方
猪羊脂封之亦療乳癰妙
又方
鹿角灰酢和塗之佳
又療石氣在皮膚癰熱膏方
生麥門冬去心　萎蕤　鼠李皮　石膏碎
凝水石　沙參各一兩　青葙子　露蜂房各一分
竹瀝一大合　杏人油一大合　牛酥五大兩　生地黃汁三合

右十二味切內酥油瀝中微火上煎令魚眼沸一炊久
膏成覺有熱處卽摩之差止

又療發背及癰疽潰漏幷未潰膿毒方

栝樓　榆皮　胡燕窠　鼠坌土
女人潮信帛水洗取汁

右五味等分潮信汁和如泥塗腫上乾卽易之潰者四面封亦覺卽封之三五日差

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方

防風　茯苓　白芷　桔梗
遠志去心　甘草炙　人參　芎藭
當歸　黃耆各一兩　附子炮二枚　桂心二分
厚朴二兩炙　赤小豆五合熬

右十四味擣散酒服一方寸匕日三服夜一服

又排膿止痛利小便散方

瞿麥一兩　芍藥三兩　赤小豆熬微　桂心
芎藭　麥門冬去心　白斂各二分　黃耆
當歸各二兩

右九味擣篩先食溫酒服一方寸匕日三

又療癰腫令自潰長肉薏苡人散方

薏苡人　桂心　白斂　當歸
肉蓯蓉　乾薑各二兩

右六味擣篩爲散先食溫酒服一方寸匕日三夜再之

又療諸虛不足發背及癰疽差後經年復發背由太風聚於中冷氣在內閉塞得夏月出攻背不治積聚作膿血或爲內漏內塞排膿散方

山茱萸　五味子　茯苓　乾薑各六分
當歸　石韋去毛　芎藭各四分　附子炮二分
肉蓯蓉　巴戟天去心　遠志去心　麥門冬去心
乾地黃各八分　菟絲子酒漬　地麥各三分取未者　石斛
人參　甘草炙　芍藥　桂心各五分

右二十味擣散服一方寸匕日三夜一稍加至二匕長服令身不發癰癤

又療癰疽發背婦人發乳諸癤已潰未潰者便消不消者速潰疾愈內補散方

木占斯　敗醬　細辛　乾薑
厚朴炙　桔梗　甘草炙各一兩　人參六分一法二兩
栝樓子六分　防風六分

右十味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜二間食長服去敗醬

又療癰疽發背豬蹄湯方

豬蹄一具　黃耆　黃連　芍藥

黃芩各二兩　薔薇根　狼牙各八兩切

右七味切以水三斗煮豬蹄令熟澄取三升漬諸藥煮取一升洗瘡一食頃以帛拭乾著生肌膏日二生肌止

瘡痛者加當歸甘草各二兩

又蝕惡肉散方

馬齒礬石燒研　藺茹　麝香研　丹砂研

雄黃研　雌黃研　白礬各三分燒汁盡研

硫黃研三分

右八味細作散傅之先蝕惡肉令盡即封生肌膏

又癰疽蝕惡肉膏方

大黃　附子去皮　莽草　芎藭

雄黃研　雌黃研　真珠研各一兩　白斂

礬石燒研　黃芩　藺茹各二兩

右十一味先以豬膏一升半煎六種草去滓內膏茹礬石末攪之塗瘡中惡肉盡即止

又散方

藺茹者根頭　礬石燒研　雄黃研　硫黃研各二分

右四味為散內瘡孔中惡肉盡止勿使過好肉也

又療癰疽發十指或起膀胱及發背去惡肉方

豬蹄一具治如食法　當歸　大黃　芎藭

芍藥　黃芩　獨活　莽草各一兩

右八味以水三斗煮豬蹄取八升汁內藥煮取四升去滓洗瘡兩食頃拭令燥以後麝香膏封之

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背去惡肉方

麝香　礬石燒　雄黃　真珠各一兩研作末

右四味以豬脂攪令如泥塗惡肉盡即止更敷生肌膏

又生肌膏主癰疽發背已潰方

甘草　當歸　白芷　椒去目

乾地黃　細辛　續斷各三兩

烏喙去皮六枚　肉蓯蓉三兩　薤白二十莖　蛇銜一兩

右十一味切以好酢半升和漬一宿取豬膏三斤微火煎之令三上三下候白芷黃膏成用塗之佳

又療發背逆腫癰黃耆湯方

黃耆　人參　麥門冬去心　石膏碎

芎藭　當歸各二兩　生地黃八兩　甘草炙

芍藥各三兩　生薑五兩切　大棗三十枚擘　半夏四兩洗去滑

竹葉一握

右十三味切以水一斗煮竹葉取九升去滓內藥煮取

三升分四服日三夜一
又療服石之人患癰腫等單服牛蒡方
無忌三撮
又方
每食訖含生乾地黄丸如胡桃大除熱補益也
又療年四十以上強壯常熱發瘡無定處大小便不通大
黄湯方
大黄 黄芩各三兩 升麻二兩 梔子五枚
芒硝一兩湯成下
右五味切以水五升煮取二升四合去滓下芒硝攪令

調分三服得利為度不過三劑即差
又療散發生瘡腫赤爛方
取赤石白一片燒令赤置酢中擣作末敷之如燥更
易以差為度又取糞中蠐螬蟲擣如泥塗腫上不過
三度即合口甚妙
又主腹内癰方
大黄四兩 牡丹三兩 芥子半升 硝石三合
桃人五十枚去皮尖碎
右五味切以水六升煮取一升五合分再服膿即下無
膿者下血

又若大熱背腫身多生瘡下諸石方
露蜂房六兩 木綿帛一尺 亂髪二兩 升麻二兩
右四味先用綿帛裹蜂房等以麻纏使遍於炭火上燒
令烟盡及熱擣碎作黑灰篩之取末候熱時空腹酒和
服一方寸匕日再服此藥五六日即常以小便及大便
下石黄赤汁及黑物極滑而腥臭者此石下候三五度
下即休若多恐令瘦損若不大急因但煮五加木汁服
亦療丁腫
又療背上初欲作腫方
大黄 升麻 甘草炙 黄芩各三兩
梔子人百枚

右五味切以水九升煮取二升半分服快利便止不下
便進
又凡發背為癰疽腫已潰未潰方
香豉三升
右一味少著水和熟擣節強泥作餅子厚三分依腫大
小貼之以艾布其上灸其豉餅使温温熱而已勿令破
肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡孔勿
令豉餅著却但四面著灸孔中汁出即差止
又療惡瘡腫著陰卵或偏著一邊疼痛攣痛牽入小腸痛

不可恐一宿後人方

茴香草

右一味擣取汁飲一升日三四服又取滓敷腫此外國
神汯從元嘉末來用之神効起死人

又生魚薄主乳癰方

生鯉魚長七寸 大黃 莽草 竈中黃土各六兩

右四味別擣魚如膏三味下篩更擣令調以生地黃汁
和敷腫上日五六夜二三即愈

又療動散背腫已自利虛熱不除宜服竹葉黃耆湯方出古今錄驗

竹葉切三升 黃耆四兩 小麥一升 芍藥三兩
甘草炙二兩 石膏碎二兩 人參三兩 升麻一兩
茯苓二兩一法七分 桂心六分一法二分 當歸三兩 乾棗十四枚
五味子三兩 生薑三兩 乾地黃一兩 麥門冬三兩去心
知母一兩

右十七味切以水一斗二升煮竹葉小麥取九升去滓
內藥煮取三升溫分四服

又商陸貼諸腫方

商陸二兩 黃芩 黃連 白芷
白歛 大黃 莽草各一兩 白芨二兩

右八味擣篩消膠汁和如泥塗紙貼癰乾即易之

又有患癰破下膿訖著兌藥塞瘡孔乃瘡痛煩悶困極有
人為去兌藥以楸葉十重以布帛褁緩急得所日再三易
之痛悶即止此法大良無比勝於衆法此主癰疽潰後
及求瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以塩湯
沃令潤用之亦佳薄削楸白皮用之亦得

又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大
小便不利方

芒硝湯成下 甘草炙各二兩 黃芩 知母各三兩
大黃四兩別漬 梔子人七枚

右六味切以水五升煮四味減半下大黃煮取一升八
合去滓內芒硝分三服

又療癰疽發背後小瘵癰李根散方

李根切一升 甘草炙 桔梗 黃芩各二兩
葛根 當歸各三兩 桂心 芍藥各四兩
芎藭六分 通草 白歛 厚朴炙
附子炮各一兩 栝樓子一升 半夏洗一升

右十五味擣篩為散酒服一方寸匕日三瘥大困者夜
再有人發背骨出十餘節服此即差

又主癰瘡發背方

蜀椒汗　黄芩　人參各一兩　乾薑
附子炮　白歛　防風　桂心
甘草炙各一兩　芎藭二兩　赤小豆一合半
右十一味爲散酒服一方寸匕日三夜再服之
又内補散療癰疽發背已潰未潰排膿生肉方
當歸　人參各二兩　桂心　芎藭
厚朴炙　防風　白芷　桔梗
甘草炙各一兩
右九味爲散以酒服一方寸匕日三夜再瘥未合服勿
停

又瞿麥散主諸癰末潰瘡中疼痛膿血不絶法
瞿麥　白芷　黄耆　當歸
細辛　芍藥　芎藭　薏苡人
赤小豆一兩各
右九味先以清酒一升漬小豆出銅器中熬之乾復漬
漬復熬五遍止然後擣諸藥下篩酒服一方寸匕日三
夜二服三五日後痛者痒肌肉生一法以春酒漬小豆
多痛倍瞿麥痛未開倍白芷多膿倍黄耆薏苡人芍藥
甚妙
又黄耆散主癰疽擬膿方
黄耆五分多膿倍　赤小豆一分口乾倍　芎藭二分肉不生倍
芍藥三分痛不止倍　白歛三分　栝樓三分小便多倍之
右六味擣散酒服方寸匕日三服之一方有甘草三分
又療發背及癰腫熱瞰已熟者即膿出未熟者自然消除
神驗方
牛蒡根欲者洗去土勿令見風細切一大升
右一味以水三大升煮令爛絞去滓更盛於瓷器中重
湯煮之使如稀糊以塗爛帛貼腫上熱則易之驗
右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張　寔
較正

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十八卷目錄 乳石上十八門

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

石發熱嗽衝頭面兼口乾方六首

石發兼虛熱痰澼乾嘔方五首

石發吐血衄血方七首

石發熱煩及渴方一十六首

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首

諸石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

石發熱目赤方一十首

石發痰結大小腹留壅老小虛羸方六首

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

石發兩脚卒冷兩脅腋卒熱并口噤方三首

石發苦熱解折下石方四首

服石後將息飲食所宜法二首

紫餺飥并食飲將慎法三首

服石後防慎貯雜藥等一首

唐王燾先生外臺秘要方第三十八卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等　上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

論曰夫乳石之性緩而且遠能掉風寒逐暑濕導經脉行飲食之氣在陰即補其不足在陽即能發其炎陰盛陽虛則二儀亢位所以炎上府之受邪則表熱氣隔至陰之伏也脉形陽浮而數陰伏而沈理之於經自然通泰若灸之於孫絡即血脉逸流或金抑之則乖於石性理而兼助所

表裏用藥若遇小發可自勞力按摩不可即治熱不已者別法隨事擇用解散方

療寒熱胸中塞面腫手足煩疼是鍾乳發宜服生麥門冬湯方

生麥門冬四兩去心　豉三升綿裹　葱白一斤切

右三味以水八升煮取三升分服體氣熱是客熱當自漸加示物雖似惡加之後必佳忌如常法此方甚良千金同

又壓丹石發方天台山國清師所傳用

杏人一百枚去皮尖

右一味以水一升於盤中研之絞取汁令盡以白麪二升用杏人汁溲作餺飥還以杏人汁煮務令極熟其病者量性多少噉之令盡訖又取美酒數升煮十餘沸候熱訖病者量性多少飲之徐令盡蓋覆安卧初覺心悶頭悶四體輕虛一服三年不發大効

又療乳石發方

甘草炙 麻黃一兩去節各

右二味切以水三升煮取半升和清酒半升其患者先須火邊炙熱徹欲汗承熱服令盡蓋衣卧須臾大汗即差千金翼同

又若因食倉米臭肉動乳方

必須葱豉湯細細服之五六度即差千金翼同

又食飲損者方

於葱豉湯中加當歸一兩煎之去滓分服即差若未可即服蘆根湯千金翼同

又若已服安和藥仍不退者此小觧動服葱豉等湯不解者可服蘆根湯解壓之方

蘆根 地榆 五加根各一兩

右三味切以水三升煮取一升服之即解千金翼同

又若得時氣冷熱不調動乳者皆是寒熱所致其狀似瘧久久不療損人性命縱服湯藥必終難差宜作生熟湯浴之方

以大器盛湯若大熱投少冷水即於湯中坐勿動須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即定久乃出湯以衣被覆蓋豁然平復如患太重者不過三兩度即差千金翼同

又解一切石發方借法味

胡豆十升

右一味擣研之以水八合絞取汁飲之即差虛弱人半升中平以意量之

又大黃丸方

大黃五兩擣末 大麻子五兩熬勿令焦作於袋中以手挼去皮取人研如膏

右二味合治令匀以蜜和丸如梧子大以湯飲下十丸至二十丸以宜利為度此方甚妙通陽塞秘服之尤良忌如常法

華陀薺苨湯療石毒卒發者慄慄如寒或欲食或不欲食若服紫石英發毒者亦熱悶惛惛喜卧起止無氣力或寒皆是腑臟氣不和所生療之方

薺苨四兩 甘草 藍子各一兩 茯苓

黃芩各二兩 蔓菁子一升 人參一兩 芍藥二兩

不知

謹按此條有小字

右八味切以水一斗煮蔓菁子取八升去滓內餘藥煮
取三升去滓分三服日三若虛弱倍人參若氣上加茯
苓蒡苊一兩甚良千金翼云若體疾者倍人參減黄芩若氣上倍茯苓加蒡苊一兩
應楊州所得异故單葱白湯藥療沈體中數年或更發宜
服之方
葱白一斤切
右一味以水五升煮取二升半去滓服盡未定更作服
之至三劑即差止
又療乳石發樊尚書傳蕭亮常服良驗余因熱重盛切慮
不安遍於李虔祐寧更與昇諮議處求解法亦稱此味奇

絶方
甘草二兩炙 生犀角一兩末屑 萎蕤三兩
右三味切以水四升煮取一升半分服甚効
又方
烏豆二升
右一味以水九升煮取五升去滓以銅鉢重湯煮取一
升每服一匙盡即差未定更作佳
又若盛熱發方
取無灰酒煮三五沸承稍熱服之以布手巾兩箇浸
水以搨熱處取差爲妙更互用之

謹按此方千金翼療服石散發瘡癥丸補皮不同

又療諸乳石發動口乾寒熱似鬼神爲病方
麥門冬八分去心 五加皮 犀角屑 黄芩各四分
萎蕤四兩 梔子四分 升麻四兩 大黄五分
芍藥四分 大青 甘草炙各三分 苦參六分
右十二味擣篩蜜丸食後以蜜水服十四丸漸加至二
十丸日再以意加減千金翼同
又療諸石發熱困苦方
豬脂五合成鍊者 芒硝四分 葱白五合切 豉心二合
右四味以水三升煮葱豉取一升二合去滓下豬脂芒
硝分三服未差再服千金翼同

又療石發熱盛充實四體煩滿脉急數大小便赤澀升麻
湯方
升麻 黄蘗 黄連 甘草炙各三兩
黄芩四兩 芍藥六兩 白鴨通五兩 淡竹葉切一升
梔子十四枚 豉一升 大黄三兩
右十一味切以水二斗煮竹葉鴨通取一斗一升去滓
澄清取一斗內諸藥煮取四升去滓分三服若上氣者
加杏人五合滿加石膏二兩千金同
又常防備熱發法方
麥門冬三兩去心 甘草一兩 人參二兩

謹按此方千金翼治服石發動

右三味擣篩蜜和丸如彈丸一日服三丸甚良(千金同)

又三黃湯折石熱通氣泄腸胃解肌方

大黃三兩別漬　黃芩二兩　梔子七枚　甘草二兩炙

豉一升　麻黃一兩去節

右六味切以水九升煮麻黃去上沫下諸藥煎取三升半下大黃三五沸去滓分服得利以差止(千金翼同)

又方

黃芩二兩　豉五合熬　葱白五合　梔子七枚

右四味切以水四升煮取一升八合去滓分服三劑差止(千金翼同)

又療石發身熱如火燒黃芩湯方(法翼同)

黃芩三兩　枳實二兩炙　厚朴炙　栝樓

芍藥各一兩　梔子人十四枚　甘草一兩炙

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌如常法(千金翼同)

又療熱氣結滯經年數數發方

胡荽半斤五月五日採陰乾如此物可先收貯備之

右一味以水七升煮取一升半去滓分服未差更作服春夏取葉秋冬取根莖用

又療膈上熱方

柴胡　黃芩　甘草炙　茯苓

麥門冬去心　枳實炙　生地黃各三兩　竹葉切一升

右八味切以水一斗煮取三升去滓分服

又方

取河中石不限多少燒令赤投小便一大升候冷頓服之良

又方

取寒水石長含以差爲度

又方

取黃連水漬服一升最良

又療心下煩熱悶內熱不安冷石湯方

冷石半兩細研之

右一味以水攪如白飲頓服不差更作

又去石毒麻黃湯方

麻黃二兩去節　甘草二兩炙　豉一升綿裹

右三味切以水五升煮取一升去滓分溫再服之

又豬膏湯解大散方

豬膏二兩炸之　豉一升

右二味以水三升煮豉取汁一升內豬膏服七合日三

服石人飲食宜清冷不宜熱熱即氣擁痞石唯酒一種

須熱也千金翼同
又療乳石發如寒熱狀似瘧方
前胡半升 黃芩 甘草炙 生薑
知母各三兩 牡蠣熬 石膏各六兩 大棗二十枚擘
右八味切以水一斗煮取四升去滓分為四服取差為
度此方甚良
又療胷背頭中遊熱補虛方
黃耆 芍藥各三兩 甘草炙 桂心各一兩
茯苓 人參 石膏 生乾地黃
生薑 麻黃去節 麥門冬去心各二兩 大棗三十枚擘

竹葉切一升
右十三味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去滓下諸
藥煎取三升去滓分服之一方無茯苓有大黃
又療石發諸藥療不差方
以硝石含之效
又方
若熱盛可向冷地臥腰下以厚物薦之腰以上令薄
使受稍似涼即起不得過度
又三黃丸療虛熱氣壅不通方
黃連 黃芩各三兩 大黃二兩

右三味擣篩蜜丸以湯飲下十五丸至二十丸如梧子
以利即差
又療精神如失氣攻上骨熱方
柴胡 升麻 黃芩 澤瀉各三兩
淡竹葉切一升 生地黃切二升 乾藍 芒硝各二兩
右八味切以水八升煮取三升去滓下芒硝分服取利
止忌如常法
又療石熱將行體微筋嗇郎此方從叔汾州刺史河東公
口受此法余又服石每服此飲頗甚為効方
茱萸 葳蕤各一兩 豉心一升 葱白一握

右四味切以水四升煮取減半分服
又療服諸藥石後或熱不禁多向冷地臥又不得食諸熱
麪酒等方
五加根皮二兩
右一味切以水四升煮取二升半候石發之時便服未
定更作服
又療諸石盛熱不除心腹滿小便赤大便不利吐逆氣衝
胷口焦乾目赤重熱三黃湯方
黃連 芒硝各二兩 甘草炙 大黃一兩
黃芩二兩

右五味切以水五升煮取二升半去滓下芒硝分服以利爲度甚良妙

又療天行丹石發動上下痞隔不通頭痛口苦不能食立効方溫泉杜主簿傳

青木香　紫葛　紫參　玄參

丹參　苦參　人參　石膏

代赭　細辛　桂心　獨活

茯苓　乾薑　寒鹽　吳鹽各一分

巴豆二分去皮心熬

右十七味擣篩蜜和丸如梧子有患服三丸强者服五

丸餘郎量與之以飲下得快利三兩行即差忌如常法

又療石發內有虛熱脅中痞滿外風濕不解肌肉拘急方

香豉一升　梔子十四枚　葱白一握　黃芩二兩

右四味切以水七升煮豉五六沸去豉內藥煮取三升分三服之不止更爲之千金翼同

又療熱腫初起始欲作癰便宜服升麻湯方

升麻　大黃　黃芩　芍藥

枳實　甘草炙　當歸各二兩

右七味切以水八升煮取三升分三服腫即消散如熱加黃芩三兩千金翼同

又淡竹葉湯方

淡竹葉一升切　茯苓　白朮　甘草炙

枳實炙　梔子　人參各一兩　大黃一斤

黃芩三兩

右九味切以水七升煮取三升分服以差止

又療服散不得力食不下飲酒解散嘔吐七味三黃湯方

豉五合綿裹　梔子十四枚　枳實八分炙　甘草炙

前胡　大黃各一兩　芒硝二兩

右藥切以水七升煮取三升分服

又增損竹葉湯解散下氣方

黃連　麥門冬去心　竹葉切　人參各二

枳實炙　梔子各一兩　甘草炙　茯苓各二兩

右八味切以水八升煮取三升分服之差止

又療心悶熱煩悶如火氣上方

石膏八兩　茯神　萎蕤　黃芩各四兩

橘皮　五味子　乾薑　麻黃去節

甘草炙　犀角屑各二兩　杏人去皮尖　梔子各三兩

右十二味切以水八升煮取三升分服之差止

又療虛勞下滯虛熱脅節煩疼肌肉急內痞小便不利大

便數而少吸吸口燥少氣折石熱方

大麻人五合研 豉二升

右二味以水四升合煮取一升五合分三服三劑即止千金翼同

又療內熱結不除或更服散或以飲酒冷食澡洗猶不解或腹脹頭痛眼眶疼或先有癖實不消或連飲不食或時心肩服此湯皆愈方

甘草炙 黃芩 大黃各二兩

右三味切以水五升煮取二升分三服千金翼同

又散熱白鴨通湯方

白鴨通五升以沸湯二斗半淋之澄清取一斗 麻黃四兩去節 豉二升

冷石二兩 梔子人二十一枚 甘草五兩炙 石膏三兩碎

右七味切以鴨通汁煮取六升去滓內豉煮三沸一每服五合若覺冷小便利濶其間若熱猶盛小便赤促服之不限五合宜小小勞漸漸進食不可令食少但勿頓多耳千金同

又下氣除熱前胡湯方

前胡 黃芩 甘草炙 茯苓各二兩

梔子人 枳實炙 大黃各一兩 杏人六十枚去尖皮

生薑三兩切

右九味切以水九升煮取二升半分服

又麻黃湯下氣解肌折熱方

麻黃四兩 黃芩 甘草炙 石膏各三兩碎

升麻二兩 梔子人一兩

右六味切以水一斗煮取三升半分三服之

又療服升麻湯內解外不解者宜此麻黃湯方

麻黃去節 升麻 大黃 黃芩

石膏各三兩碎 甘草一兩炙 梔子人三合

右七味切以水九升煮取三升分服之差止

又療腹中無妨直患虛汗方

澤瀉 知母 石膏各二兩碎 當歸

甘草炙 人參 桂心 黃芩

茯苓各三兩 麥門冬三兩去心 竹葉切三升

右十一味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去滓下諸藥煮取四升分服差忌如常法

石發熱敷衝頭面兼口乾方六首

論曰五藏之尊心雖為王而肺最居其上也肺為華蓋覆其因藏合天之德遁達風氣而肺母火也性慣受温而惡寒心火更炎上熱其肺肺金被火傷則葉萎倚著於肝肺發痒即嗽或因石熱心所虛弱不能傳湯至下焦遂被

正陽俱虛變成欬矣或爲發背或作癰頭也夫言惡興則
何以知也肺主皮毛皮毛遇興即慄而栗起其肺衰亦萎
敝若肝而成病亦由木能剋金興鳴也凡如此先食養肺
抑心肝虛熱和其腎即愈矣
療肺發熱衝頭面兼口乾欬方
生麥門冬（去心）　萎蕤　石膏（各三兩碎）　生地黃汁（七合）
葱白（一握和鬚）　乾葛（四兩）　豉心（三合）
右七味切以水七升煮取三升分三服忌如常法
又療熱欬方
取生豉漬汁溫之纔免冷食服訖即臥勿令大服巾

故也以意消息之
又天門冬煎主定肺氣去風熱明目止欬喘癰血腥乳石
發冷而補之方（通發天冬性冷而能補痛虛熱者宜服）
天門冬汁（一升）　生地黃汁（二升）　生薑汁（二合）　杏人（五合去皮尖研如膏）
白蜜（八合）　牛酥（五合）　款冬花　升麻
百部根　紫菀　麻黃（去節）各二兩　甘草（四兩炙）
右十二味切以水八升煮麻黃去沫下諸藥煎取二升
去滓澄濾銅器中微火煎去半下天門冬等汁次第下
之煉成煎取一匙含咽之日三五度取差忌如常法
又療上氣肺熱呼嗽沸唾方

[illegible]

麥門冬（十分去心）　杏人（三十枚去皮尖研）　貝母　生薑（各六分切）
石膏（八分碎）　黃芩（五分）　甘草（炙）　五味子
白朮（各四分）　淡竹葉（切一握）　白蜜（一匙）
右十一味切以水四升煮取一升二合去滓內蜜分服
若須利人芒硝
又療肺脹氣急呼欬喘癰眠臥不得極重恐氣即絕紫菀
湯方
紫菀（六分）　甘草（炙）　茯苓（各八分）　檳榔（七枚碎）
葶藶子（三分熬末之）
右五味切以水六升煮取二升去滓分再服

又宜服此主上氣呼欬不得臥臥即氣絕方
芸薹子　葶藶（熬各十二分）　馬兜苓（顆）　紫菀
人參　杏人（去皮尖）　皂莢（去皮子炙）　白前
甘草（各六分炙）　漢防已（八分）
右十味搗篩蜜和丸如桐子大服十丸至二十丸增減
量之
石發腎虛熱痰澼乾嘔方五首
論曰凡人有五藏合則脾胃爲水穀之府且國府足穀則
民食足兵也人胃足食則榮衛不厥若人能食則能悅也
陰陽和平有何患乎若服食之人皆增於飲失時不食則

胃口乾焦胃口乾焦則上不足或因飲酒水而食少變爲痰結酒水流下逆令上昇下焦無陽即陽虛也中府無穀上焦漸炎致陽嘔痰經曰陽數即嘔吐又曰嘔痰發下焦之間此之義也可以破痰結通水殺塡胃府則無咎也夫通塡之義不可虛其虛實其實岐伯曰瀉虛補實聊去其空他藏皆倣此

療因飲空腹飲酒飲水食少痰帶心頭乾嘔方

枳實三兩炙　梔子人一兩　香豉半升　大黃二兩別浸

右四味切以水六升煮取二升分再服忌如常法

又療結熱擗心下腫胸中痞塞嘔逆不止鴈肪湯方

鴈肪二其　甘草炙　當歸　桂心

芍藥　人參　石膏各二兩碎　桃人三十枚去皮尖

大棗二十枚擘　大黃二兩

右十味切以水一斗二升煮鴈肪取汁一斗煮諸藥取五升去滓分服無鴈肪以鴈肉無鴈以鴨代之雞亦得

又療嘔不止不下食方

薤白一握　橘皮一兩　豉半升　麥門冬二兩去心

粟米一合

右五味切以水三升煮取一升去滓細細服之差止

又療結發胸中痰[illegible]乾嘔煩熱方

半夏洗　白薇各一兩　乾薑一兩　甘草半兩炙

右四味切以苦酒五升煮取三升分服夫苦酒能令石折澀故用之

又療數振動煩悶嘔逆人參湯方

人參　甘草炙　栝樓　麥門冬各二兩去心

黃芩　蘆根各一兩

右六味切以水四升煮取二升分四服差止

石發吐血衄血方七首

論曰五藏所藏心藏血也血之傷盛則心脫力制固無守自然流溢爲陽氣傷故也或有衄血者加以肺風熱之謂

也若發之於服石則客熱復盛榮衛增勞旋周無度則投竅而出出而多則傷榮氣色弊而黃久不療則氣攝攝傷損先須破污血留好血調經絡平腑藏則愈也

療石發熱盛吐血方

生地黃五兩擣碎　小薊根一升切　黃芩二兩　豉一升

梔子人三七枚

右五味切以水五升煮取二升分溫服之

又衄血方

生地黃汁　小薊汁

右二味隨多少以點鼻中兼服之良

又療心脈中熱甚鼻中衄血不止方

胡粉熬 光墨末 釜下墨末 乾薑

髮灰 伏龍肝末等分

右六種但得一物以兩碁子許以竹筒吹令入兩鼻孔中即止

又方

橘皮 蒼耳莖葉 苑蓮莖葉 生地黃

雞蘇苗

右五種但得一味擣絞汁服五六合即止如未定即更服之

外臺秘要 〈三十八卷〉 六 經餘居

又療頭痛壯熱鼻衄血心上硬過身疼痛四肢煩悶兩脾舉不得方

小薊四兩 青竹茹 生麥門冬去心碎 雞蘇各三兩

生薑切二兩 生地黃汁半斤

右六味切以水九升煮取三升去滓分服之以止爲度忌如常法

又療卒吐血一二升口鼻俱出至一二斗者方

生地黃汁 小薊汁 生麥門冬汁 伏龍肝十雞子

右地黃等三味汁相和每服五合著伏龍肝末一匙許和攪服之以止爲度忌如常法

又療心悶吐血方

生麥門冬八分去心 生地黃十四分碎 甘草四分炙 蒲黃

乾薑各六分 茅根十分 香豉五合以綿裹

右七味切以水五升煮取二升去滓分服之忌如常法

石發熱煩及渴方一十六首

論曰凡人陽處其表陰處其裏則非純陰在其下亦非純陽在其上皆須陰陽通于陰陽通平則五氣不乏五氣不乏則人無病只如服石之人多爲陰虛而服攝之過溫則經脈淩溢或遭陽時亦發其證也正陽本自浮并石力更藏陽氣客主兩陽併蒸肺肝故患渴也或藏實腑虛而生

外臺秘要 〈三十八卷〉 七 經餘居

發背亦渴不獨兩陽爲禍也且肺是庚辛庚辛畏火即皆其子其子腎腎爲壬癸雖子投而性惡寒陽雖得水暫寒而水潛灌於下客水正水足爲滂沱渴乃未除更增腎冷凡遇此候皆先泄清濁致陰氣於腎微理其石氣執不瘥乎

療解散失度飲食冷熱不消虛脹吐清水而渴悶欲死方

人參 栝樓 枳實炙 甘草炙

白朮各一兩 大棗二十枚擘

右六味切以水六升煮取二升半分溫二服差止

又療發癰虛熱大渴方

生地黃八兩　竹葉切三升　小麥二升　黃耆
黃芩　通草　前胡各三兩　栝樓四兩
芍藥　升麻　甘草炙　大黃別浸
知母　茯苓各二兩　人參　當歸各一兩
右十六味切以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓內餘藥煮取四升去滓分服之　復利除通草大熱者去人參當歸忌如常法
又療客虛熱衝上焦胷中口乾燥頭面熱赤丹渴方
生葛汁　生地黃　生麥門冬汁白蜜各一升
棗膏八合　生薑汁二合

右六味和煎之內蜜候如稀餳食後漸漸含之其功甚妙
又療消渴止小便方
黃連一斤金色者　麥門冬八兩去心　生地黃汁　羊乳
栝樓汁各三兩
右五味擣上二味爲末以汁相和藥末衆手一時丸如梧子食後以飲服二十丸忌如常法
又療熱渴竹葉湯方
淡竹葉切五升　茯苓　石膏各三兩碎　小麥三升
栝樓二兩

右五味切以水二斗煮竹葉取八升下諸藥煮取四升去滓分溫服忌如常法
又療發癰盛患渴口乾排膿止渴方
黃耆　梔子人　栝樓　生乾地黃
升麻各二兩　麥門冬去心　芍藥各二兩　黃芩一兩半
右八味切以水一斗煮取三升服之差止忌如常法
又療消渴方
取螺二升
右一味以一石江水浸養之傾澄取汁飲之經日放却更取新者養之准前服

又方
竹根濃煮汁飲之
又方
煑青粱米汁飲之
又方
擣冬瓜汁飲之
又方
冬麻子二升
右一味擣以水煮三四沸飲之
方

以水浸雞子取清生服甚良
又方
黃蘗一斤
右一味切以水一斗煮汁飲之
又方
桃人五升去尖熬　研白米三升
右二味以水一斛煮取三升渴即飲之良
又方
石膏碎　枳實炙　茯苓各三兩
右三味切以水九升煮取四升分服之

又方
茯苓半斤　澤瀉四兩　白朮　乾薑
桂心各三兩　小麥三升　甘草二兩炙
右七味切以水一斗煮小麥取八升入藥煮取五升分
服之
石發熱風頭痛心煩寒熱方三首
論曰五行五藏皆互相生肝雖處中而爲藏首位在甲乙
懷養懷仁故應春而王也爲心之母餘藏循而次生爲心
爲王主身神殺而無纖不察四藏爲四鄰四鄰有憂王必
懷憂四藏和平則王有悅悅則榮衛不錯憂則經絡患生
心不受邪所病者爲憂樂能致也肺爲風府施於太虛爲
呼吸之門氣息之道也諸藏紊亂氣息皆形誰能出不縣
戶耳若熱風盛心憂即頭痛若過憂即心煩熱盛必寒寒
盛必熱倚伏之道足可明焉皆縣風狂邪熱之謂也但平
風熱邪狂邪榮衛自然通泰也
療熱如火燒頭痛心煩悶乍寒乍熱胷中熱嘔逆方
升麻　前胡　甘草炙　黃連各二兩
黃芩　生地黃各三兩　枳實炙　梔子人
栝樓各一兩　豉五合綿裹
右十味切以水八升煮取三升分服忌如常法

又療食訖心煩悶欬心下胷中不安方
茵陳四兩　大黃二兩　梔子人二十枚
右三味切以水五升煮取二升分服取差
又療頭疼欲裂方
取當歸二兩清酒一升煮取六合飲至再服
石發口瘡連胷面及身上心痛方一十四首
論曰夫人痒者爲虛痛者爲實在表爲虛在裏爲實心肺
虛熱衝胷口乾乾久乃成瘡生膿則痒矣自然虛極非是
實也藏者藏也爲不能含藏陽氣使陽氣妄出發則日虛
若獨肝家有風即木氣搏心故痛亦非眞心痛苦眞心痛

只得半日而死爲心不受邪故也
療乳石熱發頭痛心痛胷脇脹滿寒熱手足逆冷或口生瘡爛或乾嘔惡聞食氣氣上欲絶久虛者方
前胡　芍藥　黄芩　大黄
甘草炙各二兩　大棗擘二十枚
右六味切以水八升煮取三升分服若堅實加茯苓二兩若胷滿塞加枳實一兩炙若吐逆加乾薑二兩若口燥加麥門冬二兩增減以意量之忌如常法
又療食失度口中發瘡欬之湯方
黄芩三兩　升麻　甘草炙各二兩　石膏碎五兩

右四味切以水五升煮取三升去滓冷含漱口吐却仍十數過差止
又療口瘡方
子蘗四兩　龍膽二兩　黄連二兩　升麻一兩
右四味切以水四升煮取二升别取子蘗冷水浸投湯中令相得絞取汁稍稍含之取差忌如常法
又若熱發腹内胷悉有瘡方
升麻二兩　烏梅十枚　黄芩　黄連
栝樓　甘草炙各一兩
右六味切以水五升煮取半去滓含之咽亦不妨

又療體赤熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛不能食方
黄芩三兩　梔子二十一枚　香豉二升　大黄二兩
右四味切以水四升煮取一升半去滓分服
又名飛雪湯方
麻黄去節四兩　石膏碎二兩　黄芩三兩　芒硝四兩
右四味切以水八升煮取四升去滓内生雞子白二枚及芒硝攪令勻以拭瘡上取瘡差即止
又療熱不散體生細瘡并熱不止方
黄連　芒硝各五兩

右二味切以水六升煮取三升去滓内硝以拭瘡上取差爲限
又療紫石發動惡寒壯熱口舌乾焦方
烏豆二兩
右一味以水四升煮令稀稠得所如傷去豆下蜜二合更一兩沸以匙抄細細含之如腹中鳴轉欲利即停得利即差忌熱食陳臭物千金翼有石發熱瘡癰疽
又療石氣發熱身體微腫而生瘡方
升麻　葳蕤各六分　黄芩　紫雪各八分成下
甘草炙　犀角各四分　梔子十四枚
右七味切以水五升煮取二升内雪分服之以飛雪湯

熬作用寒水石令水研熬汗令丸

塗之即差千金翼同

又療體卒熱生瘡麥門冬湯方

麥門冬五兩去心　豉二升　桂心　人參各二兩

甘草三兩炙　葱白一斤

右六味切以水一斗煮取三升去滓分服之忌如常法

又療表裏俱熱身體生瘡或發癰癤大小便不利方

芒硝湯成下　黃芩　知母　甘草各二兩

梔子人二七枚　大黃四兩

右六味切以水五升煮取二升下芒硝分服忌如常法

又療兩鼻生瘡熱痒內亦熱兼頭痛方

麥門冬去心　知母　澤瀉　甘草炙各二兩

粳米五合　竹葉一升切　小麥二升

右七味切以水一斗半煮竹葉小麥取九升去之內諸藥煮取四升去滓分服日三夜一忌如常法

又療生瘡熱氣奔冒方

豉一升　葱白切　梔子人各十四枚

右三味以水二升煮取九合去滓分服之忌如常法

又療石熱發煩熱滿脹及體生瘡兼氣力弱方

黃芩　芒硝　麥門冬去心各二兩　大黃三兩

梔子十四枚　甘草一兩炙

右六味切以水六升煮取二升分再服之

石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

論曰服石之人發狀非一或發於外陽則頭角皮膚作瘡癰腫頭痛是也或發於內陰則反冷藏虛口瘡吐血是也凡氣內溫五藏外榮經絡石性清淨不喜煩穢目所視鼻所聞皆欲馨香不顧鬱腐因成種種之病也或食臊臭生酸之物貯於胃腑胃腑不受推諸藏諸藏不受即肝膈痞滿或為臚脹而堅積便發心痛亦非心自然而痛為穢觸神氣也覺此候者可速滌腸胃無令留壅不然即成痰澼其心轉痛豈能不勉哉

靳邵療寒過度成痰澼水氣心痛百節俱腫者大黃丸方

大黃　葶藶子熬　豉各一兩　杏人去尖皮熬

巴豆各三十顆去皮心熬

右五味大黃擣篩末四味別擣如膏入少蜜和更擣一千杵以飲下一丸如麻子稍強至二丸三丸以意量之忌如常法

又療赤石脂發心痛飲熱酒不解方

葱白半斤切　豉二升綿裹

右二味以水六升煮取二升半分服之良

又療大熱心腹滿脹方

石膏半斤碎　黄芩　麻黄　芍藥各二兩
大青　續斷各三兩
右六味切以水八升煮取四升去滓分服之
又療心腹痛不解若通身顫寒者榮衛不通人參湯方
麻黄三兩去節　人參　枳實炙　黄芩
甘草炙　茯苓各一兩
右六味切以水五升煮取二升分服之
又療散發心痛腹脹兼冷熱相搏甘草湯方
甘草炙　枳實炙　白术　梔子各二兩
桔梗二兩

右五味切以水六升煮取二升分再服之忌如常法
又療腹脹頭痛眼瞎疼先有癖實不消或飲酒下食肉熱或時時心急痛方
甘草炙　黄芩　大黄別浸　麥門冬去心
芒硝各二兩　梔子三十枚
右六味切以水七升煮取三升分服之忌如常法
又療石發動上氣熱實不除心腹滿小便赤大便不利痞逆衝胸口乾燥目赤痛方
大黄一兩別浸　黄芩三兩　黄連　甘草炙
芒硝　麥門冬去心各二兩

右六味切以水五升煮取二升入大黄更煎三五沸去滓分再服之
石發熱目赤方一十一首
論曰凡人五藏盡有風而發有高下動有深淺則腎風發腳氣肝風目淚而暗肺風鼻齆噎而嗽脾風肉緩而重心風恍惚而忘若加於熱亦隨藏觀候即肝風奢滿而怒喜靜加之熱即目漠漠而暗若石氣兼之則赤而益痛或生努肉及腫而爛速可隨輕重瀉之不然喪明矣經曰肝王則目赤若兼石則冬愼勿食熱熱既不散遂成伏氣遇春必發預宜法防之即非石藥之過豈不惜哉黄帝曰形受

味精受氣皆爲飲食寒溫呼吸之召也諸藏倣此
療眼久赤痛方
乾棗一枚接長一尺切　黄連一相接長一尺擘
右二味以水一升煎三合綿裹夜臥緊眼背中以差爲度忌如常法
又瀉肝湯不服石人亦主之方
大黄　黄連　石膏碎各二兩　甘草炙
黄芩　細辛　生薑　半夏洗各一兩
梔子十四枚擘
右九味切以水八升煮取三升分溫服忌如常法

又療眼赤閉目不開煩悶熱胷中澹澹瀉肝湯方
前胡　大青　秦皮　乾薑
子芩　細辛各三兩　決明子三枚　梔子人二兩
石膏八兩碎　淡竹葉　車前葉各一升切
右十一味切以水一斗煮取三升去滓分服或加朴硝三兩得利即差忌如常法
又療眼腫痛不開方
精猪肉薄切以貼眼上熱即易之一方用子肝又以井花水淩更再用之取差
又療又風目赤兼胎赤方

光明鹽六分　杏人油五合又云半雞子
右二味以淨銅器一尺闊者一枚內鹽油即取青柳枝如筯大者一握急束截令頭齊用研之三日候如稠墨即先劚地作一小坑置瓦于底又取熟艾一雞子許于瓦上燒火即安前藥器覆坑上令烟熏之勿令火滅候火盡可收置於銅合子或瓷合子中每夜用點目眥取便臥頻點之取差通按前目痛胎赤用此方
又主眼生赤脉息肉磣痛不開者方
大棗七枚取肉　黃連二兩碎綿裹　淡竹葉切五合
右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗肉

黃連煎取三合去滓以點眼眥中差止
又療目痒赤方
黃連半兩碎　丁香二七枚碎　黃蘗皮半兩切　青錢七文
蕤人二七枚碎
右五味以水二升煮取一升去滓以綿纏杖子頭點之妙
扁鵲療令人目明髮不落方
取十月上巳日槐子去上皮不限多少於瓶中封口三七日初服一枚再服至二枚十日十枚還從一起甚驗

又療發熱心腹脹滿小便赤大便難逆衝胷中口燥目赤痛方
黃芩　大黃各二兩　梔子一兩　豉三合
右四味切以水三升煮取一升二合去滓分服
又療目瞖方
乾藍二分　雄黃二分研
右二味相和以少許點上三五度即便差
石發痰結大小腹留壅老小虛羸方六首
論曰夫老小虛羸爲和氣不足寒氣獨積于地炎氣獨散于天天地不交故體成否觸成否則肌肉不潤腠理不通

胷腸氣急腸胃招滿爲陰氣衝陽陽不接也或膀胱堅積
支足沉痾爲陽氣不能下營陰氣獨盛也致大腸留擁湯
藥不下或水穀不消更加短氣若不利關格塞不得其死
也
療羸劣老弱體性少熱因服石散而寒氣盛藥伏胷膈冷
熱不調煩悶短氣欲死者藥既不行又不能大便作害於
人急宜吐之方
甘草四兩生用
右一味切以水五升煮取折半去滓令頻服之當大吐
藥亦與病俱去便愈矣夫散家患心腹痛服諸藥不差

者服此甘草湯諸膈即通大便亦利甚驗
又療其虛務去熱益氣力方
竹葉切一升 大棗二十枚擘 黃耆四兩 芍藥三兩
甘草炙 人參 乾地黃 升麻
生薑各二兩 桂心 黃芩 茯苓各一兩
右十二味切以水一斗五升煮竹葉取一斗去竹葉入
諸藥煎取三升分溫服之忌如常法
又療散發後虛熱羸乏或腳疼腰痛本是虛勞人并挾風
宜腎瀝湯方
羊腎一具去脂膜切 五味子二兩 當歸 甘草炙

芎藭 遠志去心 芍藥 麥門冬去心
茯苓各一兩 乾地黃 生薑各四兩切 黃芩
桂心各一兩 大棗二十枚擘
右十四味切以水一斗煮腎取八升內諸藥煎取三升
半去滓分服忌如常法
又療性熱虛羸補益方
生地黃二石細切蒸之極熟
右一味以好酒一升灑之暴乾擣衆併手丸之每食前
令一丸如胡桃大咽令盡日三五度甚妙
又療人身體黃瘦不能食及服藥腰背拘急痛眠臥牀

流重不能起行宜秋夏中服之方
半夏洗 茵陳各四兩 生薑 茯苓各三兩
黃芩 土瓜根 梔子各二兩 大黃一兩別漬
右八味切以水八升煮取三升去滓分溫服
著變易療人風勞虛損補髓令人健方
麻油一升 牛酥一斤 葱白一握 胡麻人一升研
豉二升以水二升煑一枚取汁 蜜一升 上酒二升
右七味先於鍋中入油煎令沸著葱白令色黃下酥蜜
豉汁麻人沸下酒成煎收不津器中盛之日服一匙酒
匙或和酒服亦妙冷卻加牛黃一斤取汁乾薑末亦可

用之

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

論曰夫言大小便澀者皆繇大腸虛受邪氣所致也且府有高下而肺府係在天上中接土府名之大腸爲傳導之府也有風氣熱結即大便乾澀而不通順或發癰腫口鼻乾燥或腎府有虛則心肺俱熱使小便赤而澀也或腎氣虛熱膀胱不足加之以渴飲即小便淋澀皆繇藏虛不能主其府也且形能受味氣能致精氣散則精虛味益則體實體實之人筋骨有餘因勞精氣精氣既衰即招其病故石氣流入膀胱作其淋疾則非正石氣而行此肺遭熱盛

傳之於腎腎爲精竭純陰自孤石氣擢陰不入便投其膀胱膀胱受邪遂成淋也淋狀合澀數赤熱而痛何以知之澀至故知肺傳於子也數至爲子哉毋逼水急奔下也熱赤至爲心與石氣相傳也痛至爲本藏自虛客氣衝擊也所以服石藥者損其少滋味而助精氣即神門之因病邪不能入也何以知因石虛竭虛竭之人其陰好怒而交接雖畢其病名强中或不交接其精自流也或爲消利爲作消竭皆由少服諸石用之傷勞也夫遇茲候等可救其病失時不療便至夭枉不可全服補虛之藥恐變諸疾常以不虛不實於大腸不寒不燥於腠理能調神氣有何患乎

療小便淋澀少腹痛方

大黃　芍藥　茯苓各一兩　麻人四兩

右四味切以水五升煮取二升去滓分服之良

又方

桑螵蛸二十枚熬　黃芩一兩

右二味切以水一升煮取四合頓服之

又療熱淋澀痛方

車前草　葵根各切一升　通草三兩　芒硝八分

右四味切以水五升煮取二升去滓入芒硝分服之

又療血淋不絕方

雞蘇　竹葉各一握　葵子末一　石膏各八分碎

蜀椒四分末

右五味切以水二升煮取九合後下葵末服之

又療初患淋方

滑石五兩　通草二兩　石韋拭去毛　瞿麥各二兩

芒硝二兩湯熱下　冬葵子二升

右六味切以水九升煮取三升分服之忌諸熱物

又療淋積年醫不能愈或十日五日一度發即可時或頻發不定方

冬葵子　滑石各八分　茯苓　芍藥

子芩　蒲黄　芒硝各六分　石韋去毛
瞿麥各五分　陳橘皮四分
右十味擣散空腹煮後飲子和服一方寸匕加至二匕
以小便通利為度忌如常法
下散飲子方
桑白皮六分　白茅根十分　通草八分　甘草四分炙
滑石十分
右五味擣散煎湯服前散
又卒患淋方
取缸底青苔如雞子大以水一升煮服之

又主熱淋方
白茅根四斤切
右一味以水一斗半煮取五升適寒溫飲之差止
又石淋狀如碎沙石下者方
車前子二斤絹囊盛
右一味以水八升煮取三升經宿空腹服之即下
又療煩熱身體微腫不能食飲小便不利方
茯苓三兩　甘草炙　栝樓根　人參
黃芩　桂心　白朮各一兩　枳實二兩炙
右八味切以水六升煮取三升去滓分服三合盡即差

甚妙
又療氣上不得食嘔逆大小便澀氣滿須臾悶折熱下氣方
前胡　黃芩各三兩　梔子　大黃各一兩
甘草炙　茯苓　生薑各二兩　杏人四十枚去尖皮碎
右八味切以水八升煮取三升分服之忌如常法
又療熱小便數少如淋葵子湯方
冬葵子一升
右一味以水三升煮取一升半分服之忌如常法
又若大小便塞不通或淋澀尿血陰中疼痛此是熱氣所
致先以冷物熨之小腹又以熱物熨更互冷熱若小便數

亦是取冷所致即暖將息也
療發熱熱氣昏昏不痛不痒小便赤澀方
生茅根五大斤淨洗擇擣絞取汁服之差
又若發熱口乾小便澀方
取甘蔗去皮盡足嚼之咽汁若口痛擣取汁服之
又方
取蔓菁五兩煮汁飲之差
石發後變霍亂及轉筋方一十六首
論曰服石之人體常多熱熱即引飲飢復加餐水穀既傷
腸府失度土既衰損木必來乘故也熱入胃即泄或嘔上

按腎氣虛恐作腎肝俱虛腎氣虛

而不吐是肝乘之盛也水既爲土尅逆必宜二氣俱虛而肝必怒陽氣既乏則發轉筋變色加腎肝之病也宜速止之仍温足而秤後調以五味其病必痊矣

療卒發霍亂絞痛不可忍方

茱萸一升

右一味以酒三升煮取一升强服之得下差

又療霍亂吐多者必轉筋不渴卽臍上築者腎氣虛先療其築理中湯方

人參 桂心 甘草各三兩炙 乾薑二兩

右四味切以水八升煮取三升分服又加白朮三兩

又療霍亂轉筋入腹方

取雞屎白乾者一方寸匕以水和頓服之

又療轉筋入腹痛方

灸脚心下當拇指上七壯

又方

灸足大拇指下約中一壯

又乾嘔方

灸手腕後中指兩筋間左右各七壯名間使

又若吐止而下痢不止方

灸臍下一跌約上二七壯

上當脫一跌字按一跌之長約于臍下也然則長一尺二寸跌長大字而天字之誤也

又嘔不息者方

薤白一虎口

右一味切以水一升煮取六合頓服之

又吐痢不止轉筋入腹欲死方

生薑三兩切

右一味以酒一升半煮三沸頓服之良

又方

藿香一把

右一味以水四升煮取一升服之差艾亦佳

又療轉筋不吐不下氣息急方

木瓜一枚

右一味切以水二升煮取一升服之差

又方

高良薑五兩搥碎

右一味以酒二升煮取一升服亦主腹痛

又方

桑葉二升切

右一味以水三升煮取一升三合去滓服之

又療腹滿痛不可忍方

取鹽一合熬以水二升煮取一升頓服卽得吐止若

遲按茱萸當是吳茱萸

吐痢止心中煩悶及渴不止取竹瀝一升分服即止

不止心中復似冷取茱萸一兩於鐺中炒擣末以水

二升煮取一升著少鹽澄清服之取差

又療霍亂吐瀉不止方

粟米多少任研

右一味以水攪如乳服之即差

又療脚轉筋方

灸兩大拇指爪甲後連肉處當中尖三壯

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

論曰凡石性剛烈氣多炎上理之傷溫即火轉為熾內煎

脾肺脾肺苦熱逆成其渴飲水過量即渡腸胃胃得水則

吐腸得水即金寒藏雖寒火炎不滅水漸洗下而為行液

逆變攤腸胃虛冷水穀不消在腸蓋氣不流在陰腸鳴而

泄久將不差有成痢者經言嘔噦發下焦之間其斯之謂

歟療下痢乾嘔服香豉多服之佳如不損更發宜服此方

香豉二升 乾薑三兩 甘草二兩炙 葱白一升切

右四味切以水五升煮取二升去滓溫分服之甚良

又方

乾薑五兩

右一味切以水二升煮取一升去滓頓服之

又療白赤痢兼熱悶方

梔子人十四枚 薤白一握切

右二味以水三升煮取一升二合去滓分服之良

又療白痢方

黃連一兩碎綿裹 白蜜一合

右二味以童子小便二升漬一宿煮取一升去滓入蜜

分服之

又方

黃連一兩碎 薤白一升切 烏梅一握

右三味以水二升煮取一升分溫服之

又療解散已經快利熱尚不退兼痢不斷黃連湯方

黃連一兩碎 白粱米二合

右二味以水五升煮取二升分服之

又療癰腫熱盛取冷過多寒中下痢食完出方

甘草炙 乾薑 附子炮各六兩 蜀椒二百三十枚汗

右四味切以水六升煮取三升分服之忌如常法

又療天行兼有客熱下血痢止血斂指起死黃連湯方

黃連四兩 黃蘗三兩 梔子人十五顆 阿膠一兩炙

乾薑 枳實炙 芍藥各二兩

右七味切以水六升煮取三升分服之忌如常法

又療解散除熱止痢黃連湯方

甘草炙 升麻各一兩 黃連三兩 豉五合

梔子人十四枚

右五味切以水三升煮取一升分溫服之

又解散因痢宜服甘草湯方

甘草炙 人參 黃連各一兩 梔子人二十一枚

右四味切以水五升煮取二升分服之

又療熱毒赤白痢方

羊肝去膜切以水洗二十遍血盡以粟米飯和作餅

右一味以水煮熟漉著漿水中淘之乾漉以美蒜虀候

極飢食之不過三兩頓即差

又療水穀痢方

取鯽魚無問多少治如食法以新布乾拭斷血脈切

作膾以蒜虀食之取足候至夜要以白粥並事喫之

即得差忌如常法

石發兩脚卒冷兩脅腋卒熱并口噤方三首

論曰經言脉有陰蹻陽蹻有陰摶陽摶此在三陰位也脉足大陰脾脉也脾爲中州含藏陽氣壓本脉若夾若人之和平則脾能行陽氣暖其三陰三陰暖則足能舒適若脾虛不能含藏則地氣漸泄陽上騰則三陰堅塞足使冷也

或有踵緩急不仁者則加之以腎肝之氣不足使少陰厥陰之閉也所以足無載遲之功乃不能蹻捷其力是陰摶其陽此由殘虛所生陽氣傷狂而陰不能獨理有因發熱口噤及腋下熱不可近者即三陽傷盛之所致也況服石之徒飡餌失度在陰爲疾可外溫其足內置陽氣於三陰則愈也在陽爲疾可微冷於外又以寒藥散其內熱其病豈能逃乎

療兩脚卒冷方

以醋漿溫置盆中以浸脚即差

又療口噤氣上欲絕方

蔓菁子二升 茯苓三兩 葶藶子 人參

薯蕷 甘草炙 黃芩 白术各一兩

右八味切以水二斗煮蔓菁子取八升去滓內餘藥煮

分服若口噤以物嚯之即差

又療兩腋熱不得相近方

滑石一斤 寒水石三斤 芒硝一升

右三味擣散取絹一尺分作袋盛散藥結口更互於腋

下夾之多住取涼冷止

石發若熱解折下石方四首

論曰五形之人其性各別則土形之人骨聳氣清水形之

人體薄氣長木形之人筋骨纖壁圓而長火形之人性急氣尖而散其有固疾者則先服草藥病愈後始服石必逆應也凡土火二形人性躁氣高而肥盛多火氣若更服石益之於炎物盛必衰自焚之名也若覺稍發速宜下之只如固疾之人服石者病氣久强石熱尚薄不能破其病但增其熱亦能損人若熱不濟者亦可速下自餘形人服之若如有發動但以石投之自然而差不可見小熱卽求大冷爲山九仞終虧一簣醫者意也詳而行之（臣僖等按論中五形少金別無本校今闕）

蠐螬飲解石餘方

露蜂房（三兩）

右一味以水三升煮取一升去滓頓服不定三五日更服如熱悶服後方（千金翼要方石發熱悶苦宜下石方露蜂房一升切以水二升煮取一升一服五六合日三服石從小便下如細沙盡停無所忌）

又下石方

葛根 紫草（各八兩） 犀牛角（十二兩屑） 露蜂房（十二兩炙）
芒硝 太黃（各二兩） 薺苨 人參（各七兩）
玄參 甘草（炙） 銀屑（細研各一兩） 猪脂（十二兩臘月者）

右十二味以無灰酒漬經十日其猪脂用酒一升煎取脂三兩取銀屑和研内藥中每日空腹服之一匙前合

藥未得本法元本如此可求別定本細而勘之（千金翼方中更有升麻萎蕤各七兩黃芩八兩梔子十四枚計十六味以無灰酒八升漬經十日猪脂用酒一升煎取三兩與銀屑和研内藥中每日空腹服之量力多少忌熱麪炙肉海藻菘菜等）

又療散發不可堪忍欲下之方

肥猪肉（五斤） 葱白 薤白（各半斤）

右三味並擣研合器中蒸之令熟早朝啖之盡爲度

又療雖服乳石等而常患冷此由不先服瀉湯而服石等以其病藥各在一處丹石不行則病所以依舊患冷宜依此法瀉之冷自差石勢行方

人參 茯苓 乾地黃 當歸
桔梗 甘草（炙） 芍藥（各二兩） 大黃（四兩）

右八味切以水三升煮取一升二合去滓分服之

服石後將息飲食所宜法二首

論曰服石所宜飲食時宜以自調護隨所取適者一一依方愼之則動成滯礙能依此法庶得通濟方

取少脂猪肉一月二服百沸餺飥任性無妨新熟白酒少飲亦好及白羊頭蹄并猪肉作韲豉任作食之

壓石肥肉猪柿等甚佳

凡欲喫熱羊肉餺飥宜先食三五匙冷飯後喫之卽不畏熱喫訖乃速以飯壓之行步適散乃可不慮致損生菜亦

然芸薹胡荽等亦不宜多食服石人有性好麪醬醋不能
禁慎者宜食淡糠醋百沸紫餺飥及水溲餅即不慮熱冷
韭羹亦大補特時宜食之諸飲食品類既多不可一一但
言不得服所不宜者服石人亦不宜多飲酒飲酒多則失
食味失食味則不多食不多食則令人虛熱虛熱則令石
發發惡寒寒沉又損石力為酒能壓石故也多飲則損石
勢亦令人風虛脚弱此緣飲酒致之耳若能飲食者大佳
也妙其方藥如右服石特忌熱麪陳臭豉蒜哭泣憂恚大
蒜生蒜蕓薹芥醬雞犬肉老牛肉鮑魚肉飴銜蕪恐飢冷酒
有灰酒蕎麥小豆胡麻餺飥枸杞羹倉米臭魚膩勿令飢

虛熱沐浴夏月不宜喫豬肉冷水恐致滑痢不止傷冷飲
食不消或成霍亂特宜消息慎之

紫餺飥并食飲將慎法三首

千金紫餺飥方

烏豆任多少煮取濃汁

右一味以和麪稍鹽和之依常法作餺飥以此豆汁中
熟煮可三二十沸澄漉冷為豆汁以豬羊肉為臛亦精
好或以山芋粉尤妙

又宜食麪餅方

取麪溲如家常作餅法細切如小豆許以麪於鐵銚

中拌令圓煮之令極熟承熱任以諸肉作臛食之大
宜補腰脚又夏月冒熱遠行早食晚失飢石氣發動

作大麥餅將行在路食之亦壓得石氣

凡患瘡腫無問大小或如黍米即須加意專精療之或以
冷水淋或鹽湯洗以指爬破即以指甲細細掐傍邊亦以
藥塗之或以蒼耳湯淺洗之或以冷石熨之即差夫服石
將慎至難若不能將息特宜勿服非但服之若發熱更增
他疾性行躁暴雖多忿恚飲食日減形體日消妻子不能
供承卑下何其能濟此皆由將慎失度致使然也人之無
檢慎勿輕服至於背圻腦裂藥物無及也婦人則發乳癰

腹帷癖不脩特宜審慎自量其力將息尤佳

服石後防慎貯備雜藥等一首

凡服石人當宜收貯藥等

人參　朴硝　苦竹瀝　大黃
梔子　大麥麪　好豉　薺苨
黃連　升麻　石膏　荊瀝
葛根并粉　豬膏　酥　蜜
紫蘇子　白鴨屎　粳米　前胡
冬葵子　生薑　冬瓜　大豆
車前　地膚　五加皮　大小麥奴

天門冬　葱白　萎蕤　麥門冬
生地黄　蘆根　紅雪　紫雪
黄芩　露蜂房

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十八卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十九卷目錄 明堂灸法七門

明堂序
論邪入皮毛經絡風冷熱灸法
論疾手足腹背灸之多少及補瀉八木火法
不宜灸禁穴及老少加減法
年神傍通并雜忌傍通法
五藏六腑變化流注出入傍通
十二身流注五藏六腑明堂
第一肺藏人 一十八穴
第二大腸腑人 四十二穴
第三肝藏人 二十二穴
第四膽腑人 一百四穴
第五脾藏人 四十八穴
第六胃腑人 九十一穴
第七心藏人 一十六穴
第八小腸腑人 二十六穴
第九心包絡人 一十六穴
第十腎藏人 七十七穴
第十一膀胱腑人 一百四十兩穴
第十二三焦腑人 五十六穴

唐王燾先生外臺秘要方第三十九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等

上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

明堂序

夫明堂者黃帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙并取三部爲定如此則明堂甲乙是醫人之秘寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣之流通外勞肢節內連藏府是以原

明堂之經非自古之神解孰能與於此哉故立經以言疾之所由圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脉俞之會合有圖而無經則不能論百疾之要也繇是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差差之豪氂則孔穴乖處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身（千金方云七尺六寸四分）今半之以爲圖人長三尺七寸五分（千金方云三尺八寸二分）其孔穴相去亦半之五分爲寸其尺用古尺其十二經脉皆以五色作之奇經八脉並以綠色標記諸家並以三人爲圖今因十二經而盡圖人十二身也經脉陰陽各隨其類故湯藥攻其內以灸攻其外則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其針法古來以爲深奧今人卒不可解經云針能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今並不錄針經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸朱點者灸病爲良具注於明堂圖人並可覽之黃帝素問撿孔穴原經脉窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

素問岐伯曰夫邪之客於形必先入於皮毛留而不去入於孫絡又留而不去入於經脉內連五藏散於腸胃陰陽

俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入於五藏之次也如此則療其經今邪客於皮毛入於孫絡留而不去閉塞不通不得入於經溢於大絡而生奇病焉（出第二卷中）

夫五藏六府精靈之氣順脉而出附經而入絡而後始如環無端若越其數者則傷脉而損經變爲異病也

岐伯曰凡欲療風則用火灸風性浮輕色或赤或白痒多者風熱也寒性沉重色或青或黑痛多者寒也濕性養潤色黃鮮痹痺多者濕也此三種本同而末異也風爲百病之長邪賊之根一切衆病悉因風而起也欲灸風者宜從少以至多也灸寒者宜從多以至少也至多者從三壯五

壯七壯又從三十五十七十壯名曰從少至多也灸寒濕者宜從多以至少也從七十五十三十又從七百五百三百名曰從多以至少也灸風者不得一頓滿一百若不灸者亦可以蒸藥熨之灸寒濕者不得一頓滿千若不灸亦可蒸藥熏之風性浮輕則易散故從少而至多也寒性沉重則難消故從多而至少也

論疾手足腹背灸之多少及補寫八木火法

[illegible]義云凡手足內脉皆是五藏之氣所應也手足外脉皆是六腑之氣所應也四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑出入其灸疾不得過頓多也宜依經數也若頓

多血脉絶於火下而火氣不得行隨脉遠去也故云三壯五壯七壯者經曰乃更添灸以差爲度其手足外皆是陽脉也不得過於二壯腹中者水穀之所盛風寒之所結灸之務欲多也脊者身之梁 太陽之所合陰陽動作冷氣成疾背又重厚灸之宜多經脉出入往來之處故灸能引火氣凡灸皆有補寫補者無吹其火須炷自滅寫者疾吹其火傳其艾須其火至滅也其艾炷根下廣三分長三分若減此不覆孔穴不中經脉火氣不行亦不能除病也

凡灸忌用松柏桑棗竹柿楓榆八木以用灸人害人肌肉筋脉骨髓可用陽燧火珠映日取火若陰無火鑽槐木以菊莖延火亦可甜石以艾蒸之取火用灸大良了無忌宜以香油布纏及艾莖別引取火則去疾不傷人筋骨皆欲得膿傷其痛根瘡若不壞則病不除也甲乙丙卷云灸腧不發者灸故履底令熱熨之三日即發也得發則病愈矣

不宜灸禁穴及老少加減法

甲乙經

頭維 下關 承光 腦戶 氣衝 脊中 伏兎

乳中 地五會 風府 泉腋 瘖門 天府 [illegible]梁

白環輸 鳩尾 迎香 石門女子 絲竹空 承泣

耳門 人迎 瘈脉 少商 尺澤 陰市 陽關甲乙經

少海 小海 睛明 關衝

右三十二穴並禁不宜灸千金翼[illegible]同出第二卷中

凡灸有生熟候人盛衰及老少也衰老者少灸盛壯肥實者多灸

凡孔穴皆逐人形大小取手中指頭第一節爲寸男左女右又一云三寸者盡一中指也

凡人年三十以上若不灸三里令人氣上眼闇所以三里下氣也出第三十七卷中

黃帝問曰凡灸大風大雨大陰大寒灸事既不得灸有何損吝岐伯答曰大風灸者陰陽交錯大雨灸者諸經絡脉不行大陰灸者令人氣逆大寒灸者血脉蓄滯此等日灸乃更動其病令人短壽大風者所謂一役時不可加火艾大寒者所謂盛冬凌辰也大雨者但雨日即不得雖然有卒得又逢大雨此止可灸之大陰者謂諸雲霧愁合凡人初患卒得終是難下手經云當其盛也慎勿毁傷即是初得重病之狀候

年神傍通法

論曰此等諸法並散在諸部不可尋究故集之一處造次

易知所以省披討也

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須灸者即灸之不宜灸者經穴了注其名並爲良法但恨下里間知者鮮爾所以學者深須解之皆須㸃解知灸知藥因是良醫

通按 此欵出千金本文言鍼言灸言藥合治方用凡法今刪去鍼單言灸藥應覺文理欠顯又云經穴注了其灸似誤或是了注其名

臍 心 肘 咽 口 頭 脊 膝 足

年									
一	十	十九	二八	三七	四六	五五	六四	七三	八二
二	十一	二十	二九	三八	四七	五六	六五	七四	八三
三	十二	二一	三十	三九	四八	五七	六六	七五	八四
四	十三	二二	三一	四十	四九	五八	六七	七六	八五
五	十四	二三	三二	四一	五十	五九	六八	七七	八六
六	十五	二四	三三	四二	五一	六十	六九	七八	八七
七	十六	二五	三四	四三	五二	六一	七十	七九	八八
八	十七	二六	三五	四四	五三	六二	七一	八十	八九
九	十八	二七	三六	四五	五四	六三	七二	八一	九十

以上人神所在當須慎忌之

右件九部入神歲移一部周而復始不可灸百

心 喉 頭 肩 背 腰 腹 項 足 膝 陰 股

年							
一	十三	二五	三七	四九	六一	七三	八五
二	十四	二六	三八	五十	六二	七四	八六
三	十五	二七	三九	五一	六三	七五	八七
四	十六	二八	四十	五二	六四	七六	八八
五	十七	二九	四一	五三	六五	七七	八九
六	十八	三十	四二	五四	六六	七八	九十
七	十九	三一	四三	五五	六七	八十	九一
八	二十	三二	四四	五六	六八	八一	九二
九	二一	三三	四五	五七	六九	八二	九三
十	二二	三四	四六	五八	七十	八三	九四
十一	二三	三五	四七	五九	七一	八四	九五
十二	二四	三六	四八	六十	七二	八五	九六

月殺一作戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉

直後千金要十月午十一月巳

通前八日千金作足小指

十日千金作背腰

右件十二部人神所在並不可灸及損傷慎之

推月忌日忌傍通法

月忌法

	正二三四五六七八九十十一十二	
血忌	丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子	凶
月厭	戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥	凶
四激	戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未	凶
月殺	丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰	凶
月刑	巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌	凶
六害	巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午	凶
天醫	卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰	吉

右于天醫上取師療病吉餘不得灸及取師凶

日忌法

一日在足大指　二日外踝

三日股內及脚腨　四日腰及髀

五日口齒舌根咽懸　六日手小指少陽及脚下

七日內踝　八日足腕一云在脚

九日尻及龜尾手陽明　十日腰眼及足拇指

十一日鼻柱及眉　十二日面髮際

十三日牙齒　十四日胃脘咽喉足陽明

十八日千金作股內及脚　二十一日千金作小指　二十四日作足陽明　二十八日作內踝　二十九日千金作膝頭

十五日遍身　十六日胸乳

十七日氣衝及脇　十八日腹內

十九日足趺足下及項　二十日膝以下一云踝又膊

二十一日唇舌足小指　二十二日失兌分踝一云腋竈中

二十三日肝俞足趺兩股　二十四日手陽明兩腸及小腸

二十五日足陽明心腹一云肺足　二十六日手足腸

二十七日膝內踝一云肩脾踰中丁及兩足升陰囊中　二十八日陰中及耳頰

二十九日膝頭頸額兩手足脛　三十日足趺上及頰膝頭又云關元下至足心又云遍身

右件人神所在上件日並不宜灸

十干人神所在法

甲日在頭　乙日在項

丙日在肩背　丁日在胸脇

戊日在腹及頸　己日在背

庚日在膝及脾腰　辛日在脾及心肺

壬日在腎及手　癸日在足

十二支人神所在法

子日在目系一云在肩口　丑日在耳及腰

寅日在胸面係云在口

卯日在胃系云在鼻　辰日在腰

巳日在頭目系云在手

午日在心腹　未日在兩足心云在足

申日在手頸係云在頭腰

酉日在腰係云在背　戌日在咽喉係云在頭一作項

亥日在臂頸又云在膝一云在項

十二時人神所在法

謹按千金反與建日無申時除日禁酉時朔收至閏[日]禁未時

子時在踝　丑時在頭　寅時在耳孫云在目

卯時在面孫云在目　辰時在項孫云在口　巳時在乳一云在肩

午時在胸脇　未時在腹　申時在心

酉時在膝孫云在背胛　戌時在腰孫云在陰左右　亥時在股

十二祗人神所在法

建日不治足一作頭禁晡時　除日不治眼一作膝禁日入

滿日不治腹禁黃昏　平日不治腰背禁人定

定日不治心禁夜半　執日不治手禁雞鳴

破日不治口禁平旦　危日不治鼻禁日出

成日不治唇禁食時　收日不治頭一作足禁食時

開日不治耳禁日中　閉日不治目禁日斜

又法

甲乙日忌寅時不灸頭　丙丁日忌辰時不灸耳

戊己日忌午時不灸髮鬢一云不灸膝脾　壬癸日忌酉時不灸足

又方

每月六日十五日十八日二十四日小盡日

甲辰　庚寅　乙卯　丙辰　辛巳　五辰　五酉

五未　八節日前後各一日

若遇以上日並凶不宜灸之

又法

正月丑　二月戌　三月未　四月辰　五月丑

六月戌　七月未　八月辰　九月丑　十月戌

十一月未　十二月辰

又法

男忌　壬辰　甲辰　己巳　丙午　丁未

女忌　甲寅　乙卯　乙酉　乙巳　丁巳

又法

男忌　除日　女忌　破日

又法

男忌　戊日　女忌　辰日　孫氏方忌巳日

又法

丙子日天子會　壬子日百王會　甲子日太子會

丁巳日三公會　丙辰日諸侯會　辛卯日大夫會

癸卯日人臣會　乙亥日以上都會

又法

木命人　行年在木不宜鍼及服青藥

火命人　行年在火不宜汗及服赤藥

土命人　行年在土不宜吐及服黃藥

金命人　行年在金不宜灸及服白藥

水命人　行年在水不宜下利及服黑藥

凡不知此法下藥若遇命厄會深者下手即死

又法

立春 春分 脾 立夏 夏至 肺 立秋

秋分 肝 立冬 冬至 心 四季十八日

腎

又法

春左脇 秋右脇 夏在臍 冬在腰

以上人神並不宜灸之傷神殺人

五藏六腑變化流注出入傍通宜傍看從肝藏至天并三焦出入止

凡五藏六腑變化無窮散在諸經其事隱沒難得具知今

表裏相附以為傍通令學者少留意推尋則造次可見

論曰假令肝心脾肺腎為藏則膽小腸胃大腸膀胱為腑足少陰為腎經足太陽為膀胱經下至五藏五菓五菜皆爾觸類長之他皆倣此出千金方第二十九卷中並附二十四條

五藏

肝 心 脾 肺 腎

六腑

膽 小腸 胃 大腸 膀胱

三焦

五藏經

足厥陰 手少陰 足太陰 手太陰 足少陰

六腑經

足少陽 手太陽 足陽明 手陽明 足太陽

手少陽

五行各主一藏

木 火 土 金 水

五藏數五行數配五藏

三八 二七 五十 四九 一六

五行色五藏所象

青 赤 黃 白 黑

五行相生

水 木 火 土 金

五行相剋

金 木 土 水 火

五藏胎月不宜灸吐利

八月 十一月 五月 二月 五月

五藏相月不宜補養

冬三月木相 春三月火相 夏三月土相 季夏六月金相 秋三月水相

五藏旺月有疾可宜瀉

春三月木旺 夏三月火旺 季夏土旺 秋三月金旺 冬三月水旺

五藏廢月宜補不宜寫
夏三月木廢　季夏火廢　秋三月土廢　冬三月金廢　春三月水廢
五藏囚月宜補不宜瀉
季夏木囚　秋三月火囚　冬三月土囚　春三月金囚　夏三月水囚
五藏死月宜補
秋三月木死　冬三月火死　春三月土死　夏三月金死　季月水死
五藏旺日五藏王日不灸不服藥
甲乙　丙丁　戊巳　庚申　壬癸
五藏旺時不灸
寅至辰　巳至未　辰戌丑未　申至戌　亥至丑

五藏困日宜補養
戊巳土也　庚辛金也　壬癸水也　甲乙木也　丙丁火也
五藏困時宜補養
食時日昳土也　晡時日入金也　人定夜半水也　平旦日出木也　禺中日中火也
五藏忌日忌此日得疾病
庚辛　壬癸　甲乙　丙丁　戊巳
五藏忌時忌此時得病
申至酉　亥至子　寅至卯　巳至午　辰戌丑未
五時
春　夏　季夏　秋　冬

羅按六十四羅數學六十二絲十八絲數是四十五絲名以九數相乘也未知第否

五音配五行應五藏
角絲六十四　徵絲五十四　宮絲八十一　商絲七十二　羽絲十八
五星一星各象一藏
歲東方　熒惑南方　鎮中央　太白西方　辰北方
五常各從五藏出
仁肝　禮心　信脾　義肺　智腎
五樂外象五行內應五藏
竽　笙　鼓　磬　瑟
五兵
矛　戟　鈹　鉞　弩

五味五藏所宜
酸　苦　甘　辛　鹹
五宜平來益身
苦　甘　辛　鹹　酸
五不宜
辛　鹹　酸　苦　甘
五事隨藏所感
貌恭　視明　思睿　言從　聽聰
五咎
狂　豫　蒙　僭　急

六情出五藏
好喜　怵慮一作惠好樂　威怒一作感怒惡　哀[illegible]
八性各稟之性
慈惠　怒　愛　公私怒　氣正　欲忌
生各隨物生長
華　肉　髓　骨　膚
形外應五行之形內法五藏之象
直　銳　方　圓　曲
五發各從五藏所發
筋　血脈　肉　皮毛氣　骨精
外臺秘要　三十九卷　圭　經餘居
五液各隨藏所生
泣一方　汗　涎　涕　唾
七神脾腎各二神故七神
魂　神　意智　魄　精志
五竅
目左目甲右目乙　舌[illegible]　脣口為戊舌為巳　鼻左孔庚右孔辛　耳左胃壬右腎癸
五聲五藏若中風有此聲應
呼　言　歌　哭　呻噫
五響
謳詠　肆　唱　歌　吟

五氣有疾各隨其藏消長其法在調氣論
呵　吹呼　唏　嘘　呬[illegible]
五惡氣之惡
風　熱　濕　寒　燥
五惡味之惡
辛　鹹　酸　苦　甘
五有餘病實則此疾見
怒　笑不止　腹滿鳴　喘欬氣上　脹洩欠
五不足病虛則此疾見
悲　憂　少氣　息短　厥
外臺秘要　三十九卷　十六　經餘居
五積
肥氣　伏梁　痞氣　息賁　賁豚
生疾將息失度乃生此疾
疥氣　憂恐　食飲　風寒　強爆
五傷
久行傷筋　久觀傷心　久坐傷肉　久臥傷氣　久立傷骨
五氣一本作五臭五藏各有此氣
臊　焦　香　腥　腐
五方神象五藏
青龍　朱雀　黃龍　白虎　真武

五畜各主本藏所宜

虎兔（千金云雞） 蛇馬（千金云羊） 龍牛 羊犬 猴雞 鼠猪

五穀 各五藏

麻 麥 稷 黄黍（千金云稻） 大豆

五果 各五藏

李 杏 棗 桃 栗

五菜 各五藏

韭 薤 葵 葱 藿蓼

五木 宜動五藏

榆 栗 桂 桑 梧桐

五藏斤兩 五藏輕重數

四斤四兩 十二 二斤二兩 三斤三兩 一斤一

六腑斤兩 六腑輕重數

三斤三兩三銖 二斤十四兩 三斤十四兩 二斤十二兩 九兩二銖

六腑尺寸 六腑長短數

三寸三分 二丈四尺四分（一云二丈四寸） 二丈六寸（一云大二丈六寸） 一丈三尺（一云九寸） 九寸（一云七寸）

六腑所受 六腑受盛數

三合（一云一合） 二斗四升 三斗五升 一斗二升 九升九合（一云九升二合）

五藏官

尚書（一云將軍 一云尚書） 帝王 諫議大夫 上將軍（一云大尚書） 後宮列女

六腑官

將軍（通按一云尚書） 決曹吏 監倉吏（內嗇吏） 監倉掾 水曹掾

五藏俞

九椎下兩傍 五椎下兩傍 十一椎下兩傍 三椎下兩傍 十四椎下兩傍（各兩傍各一寸五分）

六腑俞

十椎下兩傍 十八椎下兩傍 十二椎下兩傍 十六椎下兩傍 十九椎下兩傍

十三椎下兩傍（各兩傍各一寸五分是穴）

五藏募

期門 巨闕 章門 中府 京門

六腑募

日月 關元 太倉 天樞 中極

百門三焦（通按大倉中際）

五藏脉

弦長 洪盛 緩大 浮短 沉濡

五藏流注傍通

所出為井 木

大敦 中衝 隱白 少商 涌泉

通按：中衝心包絡穴少衝心經穴不云少衝而云中衝者以心藏另為一絡也

所流為滎 火

行間 勞宮 大都 魚際 然谷

謹按藏井俱木後木工少衝者木也匠云井金木詳 通按六曾當六穴非但五穴者所以說五藏另綱三焦一條不前心臟也

所注為俞 土

太衝 太陵 太白 大淵 太谿

所行為經 金

中封 間使 商丘 經渠 復溜

所入為合 水

曲泉 曲澤 陰陵泉 尺澤 陰谷

謹按銅人鍼經甲乙經九墟經並無五藏所通為原穴惟千金外臺秘要集有之今列穴名于左

中都 即中郄 內關 公孫 列缺 水原 即水泉

心之藏主出入

少衝 金 出井 少府 木 流榮 神門 木 注俞 通里 過原 靈道 火 行經 少海 土 入合

六腑流注傍通 六腑出入

所出為井 金

竅陰 少澤 厲兌 商陽 至陰

所流為榮 水

俠谿 前谷 內庭 一云間谷 二間 通谷

所注為俞 木

臨泣 後谿 陷谷 三間 束骨

所過為原

丘墟 腕骨 衝陽 合谷 京骨

通按藏井屬木腧井屬金木火土金水金水木火土參以火相注 通按少商見一壯又云不宜灸損陰勿灸

所行為經 火

陽輔 陽谷 解谿 陽谿 崑崙

所入為合 土

陽陵泉 小海 三里 曲池 委中

三焦流注傍通 三焦出入

關衝 金 出井 液門 水 流榮 中渚 水 注俞 陽池 過原 支溝 火 行經 天井 土 入合

十二身流注五藏六腑明堂

肺人肺者藏也 兩傍一十八穴 通按本經十一穴兩傍共二十二穴今移中府雲門二穴入胃經止共一十八穴又按中府雲門屬胃行胃經周榮穴上移肺穴入肺經論行不論經也

甲乙經

肺出于少商 少商者木也 在手大指端內側去爪甲如韭葉手太陰脈所出也冬月宜灸

流于魚際 魚際者火也 在手大指本節後散脈中手太陰脈所流也為榮夏月宜灸

注于太淵 太淵者土也 在掌後陷者中手太陰脈所注也為俞夏月宜灸

行于經渠 經渠者金也 在寸口陷者中手太陰脈所行也為經禁灸

入于尺澤 尺澤者水也 在肘中約紋上動脈手太陰脈所入也為合秋月宜灸

少商 通按聖濟總錄少商穴下云唐刺史成君綽忽頤頷腫大喉中閉塞三日水粒不下鍼之立愈不宜灸

在手大指端內側去爪甲如韭葉灸一壯主瘧寒熱煩心善噦心滿汗出而寒唾沫唇乾引飲手腕攣指支痛肺脹上氣耳中生風咳喘痺臂痛嘔吐食飲不下膨膨然病象瘧振慄鼓頷腹脹喉中鳴耳前痛甄權云在下大拇指甲外畔當角一韭葉白肉際宛宛中是也此脈脾肺之候不宜灸忌生冷熱食

魚際

在手大指本節後內側散脈中灸三壯主虛熱洒淅毛
起惡風寒舌上黃身熱欬嗽喘痺走胸背不得息頭痛
甚汗不出寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒腹痛
不下食飲肘攣支滿喉中焦乾渴痓上氣熱病振慄鼓
頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也膈中虛食飲嘔身熱汗
不出數唾涎嘔吐血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也
唾血時寒時熱厥心痛臥若徒居心間痛動作痛益甚
色不變者肺心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂易霍亂
胃氣逆

大淵

在手掌後陷者中灸三壯主胸痺逆氣寒厥煩心善噦
噫胸滿欬呼胃氣上逆心痛欬逆煩悶不得臥胸中
滿喘背痛肺脹滿彭彭臂厥肩膺胸滿痛目生白翳眼
青赤筋掌中熱作寒作熱缺盆中相引痛數欠喘不得
息臂內廉痛膈飲煩滿病溫身熱五日以上汗不出
心痛臥若徒居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛
也嘔乳噫胃氣上逆心痛唾血
振寒嗌乾口辟肘中痛痛攣痺

經渠

在寸口陷者中不可灸傷人神明主瘧寒熱胸背痛
中彭彭然甚則交兩手而瞀為暴痺喘逆喉痺掌中熱
欬逆上氣喘息數欠熱
病汗不出心痛欲嘔

列缺

手太陰絡去腕上一寸半灸五壯甄權云腕後臂側三
寸交叉頭兩筋骨罅宛宛中是也主偏風口喎半身不
隨腕勞灸三壯主瘧甚熱驚癇如有見者欬唾中身熱
虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀為口
沫出實則肩背熱痛汗出四肢暴腫身濕搖時寒熱飢則
煩飽則面色變口噤不開惡風泣出瘈瘲欬上氣數欠
四肢厥逆善笑溺白熱病先手臂痛身熱瘈瘲唇口聚
鼻張目下汗出如速珠小便白熱痛溺孔下三寸堅膨
下滿悸善忘
口中沫出

孔最

手太陰郄去腕上七寸灸五壯主熱病
汗不出此穴可灸五壯汗卽出厥頭痛

尺澤

在肘中約紋上動脈灸二壯甄權云在臂屈橫紋中兩
筋骨罅陷者宛宛中不宜灸主喉痺上氣舌乾脇痛心
彭彭痛欬逆上氣心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘振
慄瘛瘲欬嗽吐濁氣膈苦嘔欬不得汗煩滿身痛因
為縱躬唾血時寒時熱胞中有水疝瘕積與陰相引痛
若冗溼上下出咳痺要寒熱實則肩背膝痛汗不出四
嘔暴壓虛則肩背寒短氣癲疾
涎沫手肘不得上頭肘痛

俠白

在天府下去肘上五寸動脈手太陰
之別灸五壯主心痛欬乾嘔煩滿

天府

在腋下三寸臂臑內廉動脈手太陰脈氣所發禁不可
灸使人逆氣主欬上氣喘不得息暴痺內逆肝肺相搏
口鼻出血身脹逆息不得臥風汗出身腫喘喝
多睡恍惚善忘者哭不覺甄權千金醫操肩

甲乙經

大腸人大腸者肺之府也 兩傍四十二穴并下三 單穴共四十五穴

大腸出于商陽商陽者金也

一名絕陽在手大指次指內側去爪角如韭
葉手陽明脈之所出為井冬三月宜灸之

流于二間二間者水也

一名間谷在手大指次指本節前內側陷者
中手陽明脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于三間三間者木也

一名少谷在手大指本節後內側陷者中
手陽明脈之所注也為腧夏三月宜灸之

過于合谷

合十二穴又加五處少澤水腧經交三牢天井留十五穴

一名虎口在手大指歧骨間
手陽明脉之所過也爲原

行于陽谿陽谿者火也
一名中魁在腕中上側兩筋間陷
者中手陽明脉之所出也爲井

入于曲池曲池者土也
在肘外輔骨屈肘曲骨之中手陽明脉之所入也爲
合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

商陽
一名絶陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三
壯右取左左取右如食頃立已主氣滿胸中喘息支脇
熱病汗不出耳中生風耳鳴耳聾時不聞熱瘧口乾下
齒痛臂痠引口中惡寒頗腫肩痛引缺盆喉痺青盲

二間
一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中灸三壯
主多臥善驚肩髃痛寒鼻鼽赤多血浸淫起面身熱喉
痺如哽背痛傷忽
振寒背痠齒齲

三間
一名少谷在手大指本節後內側陷者中灸三壯主喉
痺咽如哽齒齲痛瘧多臥善驚胸滿腸鳴洞泄寒熱
脣口乾身熱喘息
目眥急痛善驚

合谷
一名虎口在手大指歧骨間灸三壯主寒熱瘧狂易
鼻鼽衄熱病汗不出目目痛瞑頭痛齒痛驚噤鼻痱
痿臂腕不舉唇吻不收耳中不
通痛不能言口噤不開

陽谿
一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中灸三壯主熱病
煩心瞶目目痛泣出厥逆頭痛胸滿不得息寒熱瘧疾
喉未善笑見鬼痂疥耳聾鳴齒痛驚掣瘛寒甚熱病腸
澼臑肘臂痛虛熱寒瘧痛肩不舉吐舌戾頸妄言痂疥

近後壅言語目痛也

在腋下三寸宛宛中舉臂取之主胸滿馬刀臂不舉禁
不可灸灸之不幸生腫馬瘍內潰者死寒熱生馬瘍可療

大包
脉出淵腋下三寸脾之大絡布胸脅中九肋間及季脇
端灸三壯主腹有大氣不得息息即胸脇中痛實則其
身盡寒虛則
百節皆縱

輒筋
在腋下三寸復前行一寸著脇足少陽脉
氣所發灸三壯主胸中暴滿不得臥喘息

天池
一名天會在乳後一寸腋下三寸著脇直腋撅肋間手
心主足少陽脉之會灸三壯主寒熱胸滿頸痛四肢不
舉腋下腫上氣胸
中有聲喉中鳴

章門

脾募也一名長平一名脅髎在大橫外直臍季肋端足
厥陰少陽之會側臥屈上足舉臂取之灸三壯主腹中
腸鳴盈盈然食不化脅痛不得臥煩熱口乾不嗜食胸
脅支滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽身黃羸瘦腹痛不
得反食賁豚腹腫脊強四肢懈惰善怒欬少氣
腰痛然不得息厥逆肩不舉馬刀身瞤石水胃脹

帶脉
在季肋下一寸八分灸五壯
主婦人少腹堅痛月水不通

五樞
在帶脉下三寸一云在水道下一寸半灸五壯主男
子陰疝兩丸上下入腹痛婦人下赤白裏急瘛瘲

京門
腎募也一名氣府一名氣輸在監骨腰中季脇本俠脊
灸三壯主痓脊反折腰痛不可以立俛仰寒熱䐜脹引
背不得息溏泄水道不通溺
黃少腹裏急腫洞泄髀痛引背

通按臂臑平手取之

臂臑 在肘上七寸䐃肉端手陽明絡會灸三壯主寒熱頸項拘急肩臂痛不可舉

臑會 一名臑髎在肩前廉去肩頭三寸手陽明之絡灸五壯主項癭氣瘤臂痛氣腫喉痹

肩髎 在肩端臑上陷中舉臂取之灸三壯主肩重不舉臂痛

通按肩髃穴上…之交…與…門…中陷…會…同

肩髃 在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之手陽明蹻脈之會灸三壯主肩中熱指臂痛

巨骨 在肩尖端上行兩叉骨陷者中灸三壯手陽明蹻脈之會主肩背痛胸中有瘀血肩臂不得屈伸而痛

扶突 一名水穴在曲頰下一寸人迎後一寸五分手陽明脈氣所發仰而取之灸三壯主欬逆上氣咽喉鳴喝喘息暴瘖氣哽

天鼎 在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半手陽明脈氣所發灸三壯主暴瘖氣哽喉痹咽腫不得息飲食不下

通按禾髎一名頗一名長頻

禾髎 一名䪼在直鼻孔下俠水溝旁五分手陽明脈氣所發主鼻窒口僻清涕出不可止鼽衄有瘡口噤不可開

水溝 在鼻柱下人中督脈手陽明脈之會直脣取之灸三壯主寒熱頭痛癲疾互引水腫人中盡滿脣反者死振寒手捲前僵鼻鼽不能息不知香臭欬不止口噤喎僻瞑目

通按本經十三穴此兌端明入經乎月入隨此十一穴左右又二十一穴

兌端 在脣上端手陽明脈氣所發灸三壯主寒熱互引脣吻強上齒齲痛消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止

齦交 在脣內齒上齦縫灸三壯主痓煩滿寒熱口僻癲疾互引目痛不明齒間出血者有傷酸齒尖落痛口不可開引鼻中鼻中息肉不利鼻頭額頞中痛鼻中有蝕瘡 千金翼同

甲乙經

肝人肝者藏也兩傍二十二穴

肝出於大敦大敦者木也

在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

溜於行間行間者火也

在足大指間動脈應手陷者中足厥陰脈之所溜也為榮春三月宜灸之

注於太衝太衝者土也

在足大指本節後二寸或一寸半陷者中足厥陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於中封中封者金也

在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所行也為經

入於曲泉曲泉者水也

在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中 千金翼甲乙經同

大敦

在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中灸三壯主卒心
痛汗出陰跳遺溺小便難而痛陰上入腹中寒疝陰挺
出偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂小兒癇瘈遺溺淋癃
則病諸瘕癩實則閉癃少腹中熱善寐尸厥死不知人
脈動如
故痓

行間
在足大指間動脈應手陷者中灸三壯主欬逆上氣唾
沫溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不
可以俛仰面蒼黑熱腹中脹滿身熱厥痛心痛色蒼蒼
如死狀終日不得太息肝心痛也月事不利見赤白而
有身反敗陰寒腹痛上支心心下滿癃莖中痛怒瞋不
欲視泣出長太息癲疾短氣嘔血胸背痛喜驚悲不寐
厥脛足下熱面盡熱嗌乾
渴腫痺口喎痃咽如狂狀

太衝
在足太衝本節後二寸中或一寸半陷者中灸三壯主
環臍少腹痛小便不利如癃狀羸瘦意恐懼氣不足腹

中悒悒狂疝環臍陰跳兩足腫腹堅不得臥黄疸熱
中善渴女子疝及少腹腫溏泄癃遺溺陰痛面蒼黑目
下皆痛暴疝腋腫支滿足寒大便難面唇色白時時嘔
血男子精不足女子疝乳難嘔嚬寒時有微熱脇下
支滿喉痺痛嗌乾膝外廉痛淫濼厥脛酸腋下馬刀瘍
瘻唇腫肝傷痛肝脹心痛色蒼蒼然如死狀終日不得
太息者肝
心痛也

中封
在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃得之灸
三壯主色蒼蒼然太息如死狀振寒小便白便難疝厥
身體不仁手足偏小癃疝陰暴痛痿厥少腹引腰中
痛身黄時有微熱不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身湛
重女子少腹大乳難
嗌乾嗜飲俠臍疝

蠡溝
在足厥陰絡在內踝上五寸灸三壯主女子疝少腹腫赤
白淫時多時少陰跳腰腹痛實則挺長寒熱攣暴痛遺

[illegible]

痛偏大虛則暴痒氣逆睾腫卒疝小便不利如癃狀數
噫恐悸氣不足腹中悒悒少腹痛嗌中有熱如息肉狀
背攣不
可俛仰

中都
一名中郄足厥陰郄在內踝上七寸䯒骨中灸五壯主
瘕疝崩中腹上下痛腸痛卒止帶

膝關
在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脈氣所發灸五壯主膝
內廉痛引髕不可屈伸連腹引喉咽痛

曲泉
在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸
三壯主女子疝按之如湯沃兩股中少腹腫陰挺痛痙
青赤下血陰中腫或痒漉青汁若葵血閉無子陰跳痛
引臍中不得尿陰痿腹脇下支滿癃閉後時少泄四肢
不舉實則身熱頭眩痛汗不出目䀮䀮膝痛筋攣不可屈
伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽痛泄下血

陰包
在膝上四寸股內廉兩筋間足厥
陰別走灸三壯主腰痛少腹痛

五里
在陰廉下二寸去氣衝三寸陰股中動脈灸二壯主少
腹中滿熱閉不得溺

陰廉
在羊矢下去氣衝二寸動脈主婦人絕
產若未曾產灸三壯甄權千金揚操同

膽人膽者肝之腑也 兩傍一百四穴

甲乙經
膽出於竅陰竅陰者金也
在足小指次指之端去爪甲如韭葉足
少陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

通谷主人穴胃胃并入三焦日肓入脉多肓頭緣二焦絕骨絡竹空脈天谷沿甘天站府取門及肓會之發陂肯瘀所刺歷穴陽會穴走始穴十二穴共五十四穴也

流於俠谿俠谿者水也

在足小指次指岐骨間本節前陷者中足少陽脉之所留也爲榮春三月宜灸之

注於臨泣臨泣者木也

在足小指次指間本節後間陷者中去俠谿一寸半足少陽脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過於丘墟

在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸足少陽脉之所會也

行於陽輔陽輔者火也

在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸足少陽脉之所行也爲經

入於陽陵泉陽陵泉者土也

在膝下一寸外廉陷者中足少陽脉之所入也爲合秋七月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

竅陰

在足小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主脇痛欬逆不得息手足清煩熱汗不出轉筋頭痛如錐刺之循循然不可以動動益煩心喉痺舌卷口乾臂內廉痛不可及頭耳聾鳴

俠谿

在足小指次指岐骨間本節前陷者中灸三壯主脇中支滿寒如風吹狀寒熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛寒逆出多汗耳鳴聾痛痒胸中痛不可反側痛無常處痛狂疾

地五會

在足小指次指本節後陷者中不宜灸灸使人瘦不出三年死主內傷唾血不足外無膏澤乳癰

臨泣

在足小指次指間本節後去俠谿一寸半陷者中灸三壯主厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛

足外皮痛脇中滿腋下婦人少腹痛自觸頰天牖中腫淫濼脛酸頭眩枕骨頷顱痛目澀身痹洒淅振寒季脇下支滿寒熱胸脇腰腹膝外廉痛月水不利見血而有身則敗及乳腫胸痹心下痛不得息痛無常處人風目外眥痛身熱痱瘧中痛瘧日西發

丘墟

在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸灸三壯主目視不明振寒目翳瞳子不見腰脇痛腳痠轉筋胸脇痛善太息胸滿彭彭然狂疾寒疝腹下腫痿厥寒足腕不收痿坐不能起髀樞腳痛大疝腹堅寒熱頸腫狂疾

懸鍾

足三陽大絡在外踝上三寸動者中按之陽明脉絕乃取之灸五壯主腹滿胃中有熱不嗜食小兒腹滿不能飲食

光明

足少陽絡在外踝上五寸灸五壯主身體寒少熱甚惡心胃熱生與絕骨穴疼痹目功主麻痹脛膝熱病汗不出狂病虛則痿躄坐不能起實則厥脛熱膝痛身體不仁手足偏小善齧頰不能傷人痊

外丘

足少陽郄少陽所生在外踝上七寸灸三壯主膚痛痿痹胸脇滿頸痛項內寒熱癲疾吐沫

陽輔

在外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前三分許去丘墟七寸灸三壯主寒熱腰痛如小錘居其中沸然腫不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常處寒熱酸痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻髀膝脛骨搖酸痹不仁喉痺

陽交

一名別陽一名足窌陽維郄在外踝上七寸斜屬三陽分肉間灸三壯主寒厥癲疾喉痺驚狂喉痺胸滿面腫寒熱髀脛下不收脊不能言

陽陵泉 在膝下一寸外廉陷者中足少陽脉氣所發灸三壯主太息口苦咽中介介數唾脇下支滿嘔吐逆髀痺引膝股引膝痛不仁筋急腨痛汁凡善瘧如人將捕之膽脉

陽關 在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中不宜灸主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

中瀆 在髀外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脉氣所發灸五壯主寒氣在分肉間痛攻上下筋痺不仁

環跳 在髀樞中側臥伸下足屈上足取之足少陽脉氣所發灸五十壯主髀樞中痛不可舉腰脇相引急痛痺筋瘈脛痛不可屈伸痺不仁

本神 在曲差傍一寸半髮際上四分直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胸脇相引不得傾側癲疾嘔沫小兒驚癇

頭維 在額角髮際本神傍一寸五分禁不可灸主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言

臨泣 當目上眥直上入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰青不得視口沫泣出兩目眉頭痛小兒驚癇反視

目窗 一名至營在臨泣後一寸足少陽陽維之會灸三壯主頭痛目瞑遠視䀮䀮上齒齲腫

正營 在目窗後一寸足少陽陽維之會灸五壯主牙齒痛唇吻急強齒齲痛惡寒

承靈 在正營後一寸半足少陽陽維之會灸五壯主腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通

腦空 一名顳顬在承靈後一寸半俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會灸五壯主頭痛身熱引兩頷急腦風目瞑頭痛風眩目痛鼻管疽發為厲鼻癲疾大瘦

風池 在顳顬後髮際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主寒熱癲疾僵仆溫熱病汗不出頭眩痛痎瘧頸項痛不得顧目泣出多氣多鼻鼽衄目內眥赤痛氣發耳塞目不明喉痹傴僂引項筋攣不收

顱息 在耳後青絡脉間足少陽脉氣所發灸三壯主身熱頭重脇痛不可反側小兒癇喘不得息耳鳴

懸顱 在曲角顳顬上廉足少陽脉氣所發灸三壯主熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛

頷厭 在曲角顳顬上廉足少陽陽明之會灸三壯主善嚏頭痛身熱目眩無所見偏頭痛引目外眥而急耳鳴

懸釐 在曲角顳顬下廉手足少陽陽明之會灸三壯主熱病偏頭痛引目外眥耳鳴善嚏

陽白 在眉上一寸直瞳子灸三壯主頭目瞳子不可以視頸項強急不可以顧

絲竹空
一名目髎，在眉後陷者中，足少陽脈氣所發，不可灸，不幸使人目小及盲，眩頭痛互引目中赤痛，眩，偏風目上插，痓及目瞶風，癲疾狂煩滿。

瞳子髎
一名後曲，在目外去眥五分，手足少陽之會，灸三壯，主青盲無見，遠視䀮䀮，目中膚翳白膜。

天衝
在耳上如前三寸，灸九壯，主頭痛，癲疾，下嘔沫，痓互引善驚。

率谷
在耳上入髮際一寸五分，嚼而取之，灸三壯，主醉酒風發，兩角弦痛，一云兩目眩，不能飲，煩滿嘔吐。

曲鬢

在耳上入髮曲隅陷者中，鼓頷有空，足太陽少陽之會，灸三壯，主頸頷支滿，引牙齒口噤不開，急痛不能言。

浮白
在耳後入髮際一寸，下曲頰後，灸三壯，主足緩不收，痿不能行，不能言，寒熱，喉痺，欬逆，疾沫，胸中滿不得喘息，胸痛，耳聾，嘈嘈無所聞，頸項癰腫不能言，及癭氣，肩背不能舉，齒牙齲痛。

竅陰
在完骨上枕骨下，手足太陽少陽之會，灸五壯，主管疽發厲，項痛引頸，癰腫。

完骨
在耳後入髮際四分，足太陽少陽之會，灸三壯，主風頭耳後痛，煩心，足痛不收，失履，口喎僻，頭項搖瘈，牙車急，癲疾，僵仆，頭面虛腫，齒牙齲痛，小便赤黃，喉痺，項腫不可俛仰，頰腫引耳，瘧痓狂易。

淵腋

偏歷
手陽明絡，在腕後三寸，灸三壯，主寒熱瘧汗不出嗌，目目䀮䀮，癲疾多言，耳鳴，口僻，頰腫，實則聾，喉痺不能言，齒齲痛，鼽衄，虛則痺膈。

溫溜
一名逆注，一名虵頭，手陽明郄，在腕後小士五寸，大士六寸，灸三壯，主腸鳴而痛，傷寒寒熱，頭痛，噦，衄，肩不舉，癃，面赤腫，口齒痛，癲疾，吐舌，鼓頷，狂言見鬼，狂目，喉痺不能言，虛氣而腫。

下廉
在輔骨下，去上廉一寸，輔兌肉其分外斜，灸三壯，主眼痛，溺黃。

上廉
在三里下一寸，陽明之會，灸三壯，主小便黃，腸中鳴，咽逆。

三里
在曲池下二寸，按之肉起，兌肉之端，灸三壯，主腹脹，胃寒，腰痛不得臥，齒痛，頰頷腫。

曲池
在肘外輔骨屈肘曲骨之中，灸三壯，主肩肘中痛，難屈伸，手不可舉，喉痺不能言，目不明，腕急，身熱，驚狂，躄痿痺重，瘈瘲，癲疾，吐舌，胸中滿，耳前痛，齒痛，目赤痛，頸腫，寒熱渴，飲輒汗出，不飲則皮乾熱，傷寒餘熱不盡。

肘髎
髎窌同
在肘大骨外廉陷者中，灸三壯，主肩肘節戾重，痺痛不可屈伸。

五里
在肘上三寸，行向裏大脈中央，灸十壯，主風勞驚恐，久吐血，肘不欲舉，風痺嗜臥，四肢不欲動搖，身黃，寒熱，頸瘰，欬嗽，呼吸難，目䀮䀮，少氣，寒瘧，心下脹滿痛，上氣，左取右，右取左。

維道

一名外樞在章門下七寸三分足少陽帶脉之會灸三壯主欬逆不止三焦有水氣不能食

居髎

在長平下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽之會灸三壯主腰痛引少腹在腋前兩筋間主肩前痛與胷相引臂裏攣急手不得上舉至肩欬摇千金揚操同

後腋

在腋後廉際兩筋間主腋外相引而痛手臂拘攣急不得上頭

轉穀

在傍二骨間陷者中主胷脇支滿不欲食穀入穀不化嘔吐復出舉腋取之

飲郄

在食門下一寸骨間陷者中主腹滿臚脹痛引脇下腹鳴濯濯若中有水聲仰腹取之

應突

在飲郄下一寸主飲食不入腹中滿大便不得節腹鳴泄注仰腹取之

脅堂

在腋陰下二骨陷者中主胷脅支滿臚脹貢秋噫噦逆喘目黄舉腋取之

旁庭

在脅堂下二骨間陷者中舉腋取之灸三壯主卒暴中惡尸遁及胷脅支滿時上搶心嘔吐喘逆兩乾脅痛

始素

在腋脅下蓋下二寸骨陷者中主脅下支滿腰痛引腰筋攣陰氣上縮舉臂取之

脾人脾者藏也兩傍四十八穴

甲乙經

脾出於隱白隱白者木也

在足大指端內側去爪甲角如韭葉足太陰脉之所出也為井冬三月宜灸之

流于大都大都者火也

在足大指本節後陷者中足大陰脉之所留也為榮春三月宜灸之

注于太白太白者土也

在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也為輸夏三月宜灸之

行于商丘商丘者金也

在足內踝上微前陷者中足太陰脉之所行也為經

入于陰陵泉陰陵泉者水也

在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金揚操同

隱白

在足大指端內側去爪甲角如韭葉灸三壯主腹中有寒氣起厥氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得臥氣滿胷中熱暴泄仰息足下寒膈中悶嘔吐不嗜飲食尸厥死不知人脈動如故氣滿身體痛多唾

大都

在足大指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也腰不知所苦風逆暴四肢腫濕則噦然寒飢則煩心飽則眩

太白

在足內側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重頰痛
究身熱腹痛不可以俛仰腹滿兩頷痛甚暴泄善飢而
不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔泄有膿血苦
嘔無所出先取三里後取太白章門厥心痛腹脹滿心
尤痛甚者胃心痛也胷脅支滿腹中切痛霍亂逆氣
大便難身重骨痿不相知熱病滿悶不得臥脾脹

公孫

在大指本節之後一寸別走陽明太陰絡也灸三壯主
瘧不嗜食多寒熱汗出實則腹中切痛厥頭面腫煩心
狂言多飲不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲
霍亂

商丘

在內踝微前陷者中灸三壯主癲疾狂多食善笑不休
發於外煩心中渴瘧寒腹中痛已汗出腹滿響響不便
心下有寒痛陰股內痛氣逆狐疝走上下腹痛脾虛令
人病寒不樂好太息喉痺寒熱善嘔骨痺煩滿癇瘛手
足擾癲疾目昏口禁痛黃筋攣痛痛善厥夢者絕
子厥頭痛面腫起欬而泄不欲食痔疾骨疽蝕

漏谷

在足內踝上六寸骨下陷者中亦足太陰絡灸三壯主
腹中熱若寒腸鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿脹而
氣快然引肘脅下皆主之少腹
脹急小便不利厥氣上頭巔

三陰交

在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會灸
三壯主足下熱脛疼不能久立濕痺不能行腹中熱苦
寒膝內痛心悲氣逆腹滿小便不利厥氣上及崩脾病
者身重苦飢足痿不欲行善瘛脚下痛虛則腹脹腸鳴
溏泄食飲不化脾胃
肌肉痛此出素問

地機

一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝
下五寸灸五壯主癲疝溏瘕腹中痛藏痺

陰陵泉

在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之灸三壯主溏
飧穀不化腹中氣脹嗌嗌脅下滿腹中氣盛腹脹逆不
得臥腎腰痛不可俛仰氣癃尿黃寒熱不節女子疝瘕
按之如似湯沃其股內至膝飧泄婦人陰痛少腹堅急
痛重下不嗜食心下滿寒
中小便不利霍亂足痺痛

血海

在膝下臏上內廉白肉際二寸中足太陰脈氣所
發灸五壯主婦人漏下惡血月閉不通逆氣腹脹

箕門

在魚腹上越筋間動應手陰市內足太陰脈氣所發
云在股上起筋間灸三壯主淋遺溺鼠鼷痛小便難

期門

期門肝經所募也在第二肋端不容傍一寸五分上直
兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之灸五壯主婦人
產餘疾飲食不下胷脅支滿目眩足寒小便難心切痛
善噫聞酸臭痿痺腹滿少腹尤大息賁胷下氣上下胷

中有熱目青而霍亂泄痢疰腹大堅不得息欬脅下
積聚喘逆臥不安席時寒熱心大堅奔豚上下腫遺溺
鼠鼷痛小便難
面白瘖不能言

日月

日月膽經募也在期門下五分灸五壯主太息
善悲小腹有熱欲走多唾言語不正四肢不收

腹哀

在日月下一寸半足太陰陰維之會灸
五壯主便膿血寒中食不化腹中痛

大橫

在腹哀下三寸直臍傍足大陰陰維之
會灸五壯主大風逆氣多寒善悲

腹結

一名腸窟在大橫下一寸三分灸
五壯主繞臍痛搶心膝寒泄痢

府舍
在腹結下三寸足太陰陰維之會灸五壯主疝瘕髀中急痛循脅上下搶心腹滿積聚厥逆霍亂

衝門
一名慈宮去大横五寸在府舍横骨兩端約中動脉足太陰陰維之會灸五壯主寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積痛陰疝乳難子上衝心

雲門
雲門中府肺經在巨骨下氣户傍各二寸陷者中動脉塞手手太陰脉氣所發舉臂取之灸五壯主喉痺胸中暴逆先取衝脉後取三里雲門皆寫之欬喘不得息坐不得臥呼吸氣索咽不得胸中熱暴心腹痛疝積時發上衝心肩痛不可舉引缺盆脉代不至寸口四逆脉鼓不通

中府

肺募也一名膺中俞在雲門下一寸一云一寸六分乳上三肋間動脉應手陷者中手太陰之會灸五壯主肺系急胸中痛惡清胸滿悒悒然嘔膽熱喉逆氣相追逆多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫鬲食噎不下喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿

周榮
在中府下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿不得俛仰飲食不下欬唾陳膿

胸鄉
在周榮下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿却引背痛臥不得轉側

天谿
在胸鄉下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胸中滿痛乳腫賁膺欬逆上氣喉鳴有聲

食竇

通按本經原四十五穴今[illegible]二穴

在天谿下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發舉臂取之灸五壯主胸脅支滿膈間雷鳴常有水聲膈痛
千金翼同

胃人
胃者脾之府也兩傍九十三穴去下承漿一單穴共九十二穴

甲乙經
胃出于厲兌厲兌者金也
在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脉之所出也爲井冬三月宜灸之
流于內庭內庭者水也
在足大指次指外間陷者中足陽明脉之所留也爲滎春三月宜灸之
注于陷谷陷谷者木也
在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于衝陽
一名會骨在足跗上五寸骨間動脉上去陷谷三寸足陽明脉之所過也爲原
行于解谿解谿者火也
在衝陽後一寸半腕上陷者中足陽明脉之所行也爲經
入于三里三里者土也
在膝下三寸胻外廉足陽明脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

厲兌
在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸厥口噤氣絶脉動如故其形無知如中惡狀瘧不嗜食腹脹滿熱病汗不出鼽衄眩前仆面浮腫足脛寒惡人與木音瘈瘲齲齒惡風鼻不利多臥善驚

內庭

在足大指次指外間陷者中灸三壯主四肢厥逆足
寒者使人灸持之逆冷脛痛腹脹滿皮膚痛善伸數欠
惡人與木音振寒嗌中引痛熱病汗不出下
齒痛惡寒目急喘滿寒慄口噤僻不嗜食

陷谷

在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三
壯主熱病面腫目癰腫善嚙脣善噫腹痛脹滿腸鳴熱
病汗不出水腫
留飲胸脅支滿

衝陽

一名會原在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸灸
三壯主足先寒熱病汗不出口熱痛胃管痛時寒熱皆
主之齒齲痛瘧大不嗜食振寒而欠狂妄而行
登高而歌棄衣而走足下緩失履風水面胕腫

解谿

在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸三壯主熱病汗不
出善瘈瘲腹脹滿胃熱譫言風水面胕腫顏黑厥氣上支

腹堅大下重瘈瘲驚膝重脛轉筋頭眩痛癲疾厥
寒熱欠煩滿悲泣出狂易見鬼與火霍亂風從頭至足
面目赤腫
瘖瞀痛

豐隆

足陽明絡也在外踝上八寸下廉胻外廉陷者中灸三
壯主厥逆胸痛如刺腹中切痛大小便澀難厥頭痛面
浮腫煩心狂見鬼善笑不休發
於外有所大喜喉痺不能言

巨虛下廉

足陽明與小腸合在上廉下二寸灸三壯主少腹痛飧
泄出糜次指間熱若脈陷寒熱身痛唇乾不得汗出毛
髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛
暴驚狂言非常女子乳癰驚痺脛腫足跗不收跟痛

條口

在下廉上一寸足陽明脈所發灸五壯主脛寒
不得卧脛疼足緩失履濕痺足下熱不能久立

巨虛上廉

足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主飧泄大腸
痛狂妄走善欠大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘
不能行立胸脅支滿惡聞人木音風水面
腫頸摧云生大氣不足偏風腲腿腳不隨

三里

在膝下三寸胻外廉灸三壯主陽厥悽悽面寒少腹堅
頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔瘧中有寒腹中寒
脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛食不化心下脹
熱病汗不出喜嘔口苦痓身反折口噤喉痺不能言
寒熱陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言胃中寒
血胸脅支滿癲痛不能久立膝痿寒水腹脹皮腫乳癰
有熱五藏六府脹狂歌妄言怒恐
惡人與火罵詈霍亂遺失失氣

犢鼻

在膝臏下胻上骨俠解大筋中足陽明脈氣所發灸三
壯主犢鼻潰先熨主之其赤堅勿攻攻者死膝中痛不

仁難跪起諸腫潰
者死不潰可療也

梁丘

足陽明郄在膝上二寸兩筋間灸三壯主
大驚乳痛脛苦痺膝不能屈伸不可以行

陰市

一名陰鼎在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽明脈
氣所發不可灸主寒疝下至腹腠膝腰痛如清水大腹
諸疝按之下至膝上伏兔中
寒痛腹脹滿痿厥少氣

伏兔

在膝上六寸起肉足陽
明脈氣所發禁不宜灸

髀關

在膝上伏兔後交分中灸三壯
主膝寒痺不仁痿不得屈伸

承泣
一名谿穴一名面髎在目下七分直目瞳子陽蹻脉任脉
足陽明之會甄權云在眼下八分禁不宜灸無問多少
三日以後眼下大如拳息肉長桃許大至三十日即定
百日都不見物或如升大目不明淚出目眩瞢瞳子痒
遠視䀮䀮昏夜無所見目瞤動
與項口參相引喎僻口不能言
四白
在目下一寸足陽明脉氣所發灸
七壯主目痛口僻淚出目不明
迎香
一名衝陽在禾髎上鼻下孔傍手足陽明之會主
鼻鼽不利窒洞氣塞喎僻多涕鼻衄有癰不宜灸
巨髎
在俠鼻傍八分直瞳子蹻脉足陽明之會主面目惡風
寒頰腫痛招搖視物瞑瘛瘲口僻青盲無所見遠視䀮䀮

目中淫膚
白膜覆瞳子
地倉
一名胃維俠口傍四分如近下蹻脉手足陽明之會
灸三壯主口緩不收不能言語手足痿躄不能行
承漿
一名天池在頤前下脣之下足陽明任脉之會開口取
之灸三壯主寒熱悽厥鼓頷癲疾嘔沫寒熱痓互引口
乾小便赤黃或時不禁消渴嗜飲
目瞑身汗出衄血不止上齒齲
頰車
在耳下曲頰端陷者中足陽明脉氣所發灸三壯
開口有空主頰腫口急頰車骨痛齒不可用嚼
大迎
一名髓孔在曲頷前一寸二分骨陷者中動脉足陽明
脉氣所發灸三壯主寒熱頸瘰癧厥口
噤口僻失欠下牙痛頰腫惡
寒口不收舌不能言不得嚼
上關
一名客主人在耳前上廉起骨開口有空灸三壯主瘛
身強上齒齲痛口僻噤不開耳痛聾聤瘈瘲口沫出寒
熱痓青盲瞇
目惡風寒
下關
在客主人下耳前動脉下空下廉合口有空張口而閉
灸三壯主失欠下齒齲下牙痛頰腫耳聾鳴痓口僻耳
中有乾擿聤耳
有膿不可灸之
耳門
在耳前起肉當耳中缺者灸三壯主耳中有膿及
底耳聤耳皆不灸主耳痛鳴聾頭頷痛上齒齲
人迎

一名天五會在頸大脉動應手俠結喉傍以候五藏之
氣足陽明脉氣所發禁不可灸灸之不幸殺人一云有
病可灸三壯主陽逆霍亂陽逆頭痛胷滿不得息胷滿
呼吸喘喝窘不得息刺人迎入四分不幸殺人
水突
一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脉氣
所發灸三壯主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不
通
氣舍
在頸直人迎俠天突陷者中足陽明脉氣所發灸
三壯主欬逆上氣癭瘤氣咽腫肩腫不得顧喉痹
氣戶
在巨骨下俞府兩傍各二寸陷者中足陽明脉氣所發
仰而取之灸五壯主胷脅支滿喘逆上氣呼吸肩息不
知食
味

庫房 在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血

屋翳 在庫房下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身體重皮膚不可近衣淫濼瘈瘲不仁

膺窗 在屋翳下一寸六分灸五壯主胸滿脣腫乳癰寒熱短氣臥不安

乳中 禁不可灸灸之生蝕瘡瘡中有膿血清汁者可療瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根 在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胸下滿痛膺腫乳癰淒索寒痛不可按抑

不容 在幽門傍各一寸半去任脈二寸直四肋端足陽明脈氣所發灸五壯主嘔血肩息脅下痛口乾心痛與背相引不可欬引腎痛

承滿 在不容下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主腸鳴相逐不可傾側肩息唾血

梁門 在承滿下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脅下積氣結痛

關門 在梁門下五分一云一寸太一上足陽明脈氣所發灸五壯主遺溺腹脹善滿積氣身腫

太一 在關門下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

滑肉門 在太一下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

天樞 一名長谿一名穀門去肓俞一寸半在俠臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍疝繞臍而痛時上衝心共子疝絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腸中痛濯濯冬月重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重夾臍急瘧振寒熱盛狂言腹脹四肢重不能勝氣瘧頰腫面腫大腸脹

外陵 在長谿下五分大巨上足陽明脈氣所發灸五壯主腹中盡痛

大巨 一名腋門在長谿下二寸足陽明脈氣所發灸五壯主腹滿痛善煩癲疝偏枯四肢不用善驚

水道 在大巨下三寸足陽明脈氣所發灸五壯主少腹脹滿痛引陰中腰背中痛胞中瘕子門有寒引髖髀三焦約小便不通

歸來 一名谿穴在水道下五寸灸五壯主少腹痛賁豚卵上入痛引莖中女人陰中寒

氣衝 在歸來下一寸鼠鼷上一寸動應手足陽明脈氣所發灸三壯主腸中大熱不安腹有逆氣女子月水不利或

通按本無原九穴此多青靈入小腸只入穴左右共計十六炙

閉塞暴瘖脹滿癃淫濼身熱瘳中發熱痛小腹脹引臍

于上搶心若腹不出衆氣霍亂腹滿不得反息腹痛疰

攣少腹及股卒俛不得仰腋下石水無子少腹痛陰

痿莖中痛兩丸騫痛不可仰臥甄權千金楊操同

心人心者藏也兩傍一十六穴

甲乙經

心出于少衝少衝者木也

一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉

手少陰脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于少府少府者火也

在手小指本節後陷者中直勞宮手少

陰脉之所留也爲榮春三月宜灸之

注于神門神門者土也

一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者

中手少陰脉之所注也爲腧夏三月宜灸之

過于通里

手少陰絡在

腕後一寸

行于靈道靈道者金也

在掌後一寸半或云一寸手

少陰脉之所行也爲經

入于少海少海者水也

一名曲節在肘內廉節後手少陰脉之所入也爲

合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少衝

一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉灸一壯

主熱病煩心上氣心痛而冷煩滿少氣悲恐善驚掌中

熱肘腋胸中痛口中熱咽喉中酸

作寒作熱手拳不伸掌痛引肘腋

少府

在手小指本節後陷者中直勞宮灸一壯主

煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌中熱手拳不伸

神門

一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中灸三壯

主瘧心煩甚欲得冷水寒則欲處熱中咽乾不嗜食

心痛數噫恐悸少氣不足喘逆身熱

狂悲哭嘔血上氣遺溺手及臂寒

少陰郄

在掌後脉中去腕五分灸三壯主十二癇

失音不能言悽悽寒欬吐血氣驚心痛

通里

手少陰絡在腕後一寸灸三壯主熱病先不樂數日熱

熱則卒心中懊憹數欠頻伸悲恐頭眩痛面赤而熱無

汗及癲心下悸臂臑肘痛實則支痛

虛則不能言苦嘔喉痹少氣遺溺

靈道

在掌後一寸半或云一寸灸三壯主心

痛悲恐相引瘈瘲臂肘攣暴瘖不能言

少海

一名曲節在肘內廉節後陷者中動應手灸五壯主寒

熱齒齲痛狂易瘧背振寒引肘腋痛瘈攣一云穴在臂側

曲肘內橫文頭屈手向頭而取

之陷者中主腋下瘰癧不宜灸

極泉

在腋下筋間動脉入胸手少陰脉氣所發灸五壯主心

痛乾嘔煩滿是動則病嗌乾心痛渴而欲飲爲臂厥是

主心所生病者目黃脅痛臑臂內後

廉痛掌中熱痛甄權千金楊操同

黃帝問曰手少陰之脉獨無俞何也岐伯對曰少陰心

脉也是五藏六府之大主也精神之舍也其藏堅固邪

不能容容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪

之在于心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故獨

無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰其外經脉病而

藏不病故獨取其經于掌後兌骨之端出第三卷中

遊從仁至所丨九穴字少肩日肉通肩外俞川中俞六終顴成七宮奇二穴入靜住番明腕補共一穴共十三穴左石六二十穴

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出於少澤少澤者金也

一名小吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流於前谷前谷者水也

在手小指外側本節前陷者中手太陽脉之所留也爲榮春三月宜灸之

注於後谿後谿者木也

在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之所注也爲腧夏三月宜灸之

過於腕骨

在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脉之所過也爲原

行于陽谷陽谷者火也

在手外側腕中兊骨之下陷者中手太陽脉所行也爲經

入於小海小海者土也

在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少澤

一名小吉在手小指之端去爪甲下一分陷者中灸一壯主振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂內廉及脇痛欬瘛瘲口乾項痛不可顧瘧寒熱

前谷

在手小指外側本節前陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引癲疾耳鳴寒熱頷腫不可顧喉痺勞癉小便赤難欬嗽臂瘛肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛眩淫濼肩甲小指痛肩不可舉頭項痛咽腫不可咽鼻不利目中白翳目痛泣出甚者如脫痛瘛

後谿

在手小指外側本節後陷者中灸一壯主振寒寒熱肩臑肘臂痛頭眩痛不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛爛眥生翳鼽衄發聾臂重痛肘攣痂疥胸滿引臑泣出驚頸項強身寒耳鳴痛瘧寒熱頸頷腫狂互引癲疾數發

腕骨

在手外側腕前起骨下陷者中灸三壯主熱病汗不出脇痛不得息頸頷腫寒熱耳鳴無聞躬狂易痓互引瘛偏枯臂腕痛肘屈不得伸風頭痛泣出肩臂臑項痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰慄瘛瘲

陽谷

在手外側腕中兊骨之下陷者中灸三壯一云在腕上側兩筋間陷者中主狂癲疾熱病汗不出脇痛不得息

頸頷腫寒熱耳聾鳴牙上齒齲痛肩痛不能自帶衣臂腕外側痛不舉風眩驚手腕痛痓風汗出至腰項急不可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痂疥瘛瘲頭眩目痛瘧脇痛不得息

養老

手太陽郄在踝骨上一空在後一寸陷者中灸三壯主肩痛欲折臑如拔手不能自上下

支正

手太陽絡在腕後五寸別走少陰者灸三壯主驚恐振寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生肬小者痂疥風瘧

小海

在肘內大骨外去肘端半寸陷者中屈肘乃得之灸三壯一云屈手向頭而取之不宜灸主寒熱齒齲痛風眩頭痛狂易瘲肘癰背脊振寒項痛小肘腋腫痛引少腹中四肢不舉

天窗

一名窗籠在曲頰下扶突後動應手陷者中手太陽脉氣所發灸三壯主耳聾無聞頰痛喉痛暴瘖不能言肩痛引項汗出灸偏耳鳴

秉風

在俠天髎外肩上小髃後手太陽陽明手足少陽之會舉臂取之灸五壯主肩痛不能舉

天宗

在秉風後大骨下陷者中手太陽脉氣所發灸三壯主胸脅支滿搶心欬逆肩重肘臂痛不可舉

臑俞

俠肩髎後大骨下胛上廉陷者中手足太陽陽維蹻脉之會舉臂取之灸三壯主寒熱肩腫引胛中痛臂痠寒熱頸歷適肩痛不可舉臂

睛明

一名淚孔在目內眥手足太陽陽明之會灸三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛目䀮䀮無所見眥癢痛淫膚白翳甄權千金楊操同子不宜灸

心包人心脉也兩傍一十六穴（通按本經原九穴此外天池一穴入膽只入穴兼左右共十六穴也）

甲乙經

心出于中衝中衝者木也

在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脉之所出也為井冬三月宜灸之

流于勞宮勞宮者火也

一名五里在掌中央動脉手心主脉之所留也為榮春三月宜灸之

注於太陵太陵者土也

在掌後兩筋間陷者中手心主脉之所注也為輸夏三月宜灸之

行于間使間使者金也

在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脉之所行也為經

入於曲澤曲澤者水也

在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

中衝

在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛

勞宮

一作五里在掌中動脉灸三壯主熱病煩滿而欲嘔三日以往不得汗怵惕胸脅痛不可反側欬滿溺赤

大便血衂不止嘔血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲慮嘔噦欷善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚小兒口中腥臭胸脅支滿黃疸目黃

大陵

在掌後兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘攣腋腫驚善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胸中熱狂言不樂太息喉痹嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胸痛而手攣不伸及腋偏枯不仁手瘈偏小筋急嘔血疥欲嘔耳鳴

內關

手心主絡在掌後去腕二寸灸三壯主面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣腋腫實則心暴痛虛則煩心惕惕不能動失智心澹澹善驚恐心悲

間使

謹按原本部七二十右穴左十共五此四穴脉加在三二十共六故七七十脉穴在十原二此四穴背發承入一穴二貫故穴十三也

在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病面赤目黃頭心言喉胷中澹澹善動如熱頭身風熱嘔吐怵惕寒中少氣掌中熱肘攣腋腫卒心中痛瘈瘲互相引肘內廉痛心敖敖然胷痺引背時寒喜驚瘂不能語咽中硬頭大炙瘥

郄門

手心主郄去腕五寸灸五壯主心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足

曲澤

在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心痛卒咳逆心下澹然喜驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔血肘瘈善搖頭顏清汗出不過肩傷寒病溫

天泉

一名天濕在曲腋下二寸舉腋取之灸三壯主足不收痛不可以行心痛胷中痛脅支滿痛膺背甲間兩臂內廉痛癭瘲千金楊操同

腎人腎者藏也兩傍五十四穴并二十三單穴共七十七穴

甲乙經

腎出于涌泉涌泉者木也

一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脉之所出也為井冬三月宜灸之

流于然谷然谷者火也

一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脉之所留也為滎春三月宜灸之

注於太谿太谿者土也

在足內踝後跟骨上動脉陷者中足少陰脉之所注也為輸夏三月宜灸之

行於復溜復溜者金也

一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中足少陰脉之所行也為經

入於陰谷陰谷者水也

在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

涌泉

一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中灸三壯主腰痛大便難少腹中痛小便不利癃甄權云在脚心底宛宛中白肉際主熱中少氣厥寒灸之熱去頭痛煩心心痛不嗜食欬而短氣喉痺熱痛脊脅相引忽忽喜忘足厥喘逆足下清至膝陰痺股脹頭項痛眼眩男子如蠱女子如妊身體腰背如解不欲食大痛痂陰眩痛善中不得溺腹脅下支滿閉癃陰痿後時少腹痛四肢不眊實則身頭痛汗不出目䀮䀮然無所見怒欲殺人暴痛引覆下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發如不食喘呼少腰痛引嗌足厥痛肩背頭痛時肢舊人熱

千咽中五痛不可內食轉筋風入腹中伏梁胷脅支滿下之五指端盡痛足不得踐地癲疾痛不能言

然谷

一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中灸三壯主不嗜食心如懸哀而亂善怒嗌內腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸吸不足以息心痛如錐刺厥心痛與背相引善瘛如從後觸其心偃僂者腎心痛也厥心痛如錐針刺其心心痛甚者脾心痛也胷中寒心痛時厥心至上重下足不能安地少腹脹上搶心胷脅支滿欬盛有血喉痺癃石水女子不字陰暴出淋漏男子精溢不能久立寒熱消渴黃疸足一寒一熱舌縱煩滿小兒臍風口不開善驚援厥癲疾洞泄

太谿

在足內踝後跟骨上動脉陷者中灸三壯主瘧咳逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱腎脹病汗不出默默嗜臥溺黃少腹熱嗌中痛腹脹內腫涎下煩心心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也霍亂出

狂不自知消痺善噫氣走喉咽而不能言手足清尿黃
大便難嗌中腫痛唾血口中熱如膠胞中有大痛寒積
與陰相引如痛苦況泄上下出泄胸中滿痛
乳腫潰欬逆上氣喉咽鳴有聲厥氣上逆

大鍾

在足跟後衝中走太陽足少陰絡灸三壯主實則閉癃
悽悽腰脊強痛嗜臥口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶驚
少氣不足以息腹滿大便難時上走胸中鳴脹滿口舌
乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒驚恐不樂欬
嗽中鳴欬唾
血大腸結

照海

陰蹻脈所生在足內踝下灸三壯主熱痛煩心足寒青
多汗先取然谷後取太谿大指上動脈皆先補之目痛
引眥少腹偏痛傴瘛瘲嗜臥驚善悲不樂如墮
狀汗不出面塵黑病飢不欲食卒疝少腹痛病在左取
右右取左立已陰暴起疝女子不下月水婦人淋瀝陰
挺出四肢淫濼心悶久瘧及諸淋目中赤痛偏枯不能

得行大風默默不知所痛視
如見星溺黃少腹熱咽乾

水泉

足少陰郄去太谿下一寸在內踝下灸五壯主
月經不來來而多心下痛目䀮䀮不可遠視

復溜

一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中灸五壯
主腰痛引脊內廉嗌乾腹痛坐起目䀮䀮善怒多言
痿熱少氣足蹠寒不能自溫腹脹切痛引心心如懸陰
厥腳腨後廉急不可前卻腸澼便膿血足跗上痛舌卷
不能言善吹足痿不收痛溺青赤白黃黑青取井赤取
榮黃取輸白取經黑取合血痔泄後重腹痛如淋狀及
火氣涎出鼻孔中痛腹中雷鳴骨寒熱無所安汗
出不休心風四肢腫氣在橫骨風逆四肢腫乳難

交信

穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間足陰蹻
之郄後三壯主氣癃㿉疝陰急股引腨內廉骨痛

築賓

在足內踝上腨分中灸五壯
主大疝絕子狂癲疾嘔吐

陰谷

在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝
而得之灸三壯主舌縱涎下煩悶脊內廉痛溺難陰痿
不用少腹急引陰及腳內廉痛婦人漏血腹脹滿
不得息小便黃男子如蠱女子如阻寒熱腹偏腫

俞府

在巨骨下去璇璣旁各二寸陷者中足少陰脈氣所發
仰臥而取之灸五壯主欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿
不得飲食

彧中

在俞府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰臥而
取之灸五壯主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得
安

神藏

在彧中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取
之灸五壯主胸滿欬逆喘不得息嘔吐煩滿不得飲食

靈墟

在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取
之灸五壯主胸脅支滿痛引胸不得息悶亂煩滿不得
飲食

神封

在靈墟下一寸六分陷者中仰而取之灸五
壯主胸脅支滿不得息欬逆乳癰洒淅惡寒

步郎

在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取
之灸三壯主胸脅支滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得

痛痺

幽門

一名上門在巨闕傍半寸陷者中衝脉足少陰之會灸五壯主胷脅背相引痛心下溷溷嘔吐多唾飲食不下善噦支滿不能食數欬善忘泄有膿血嘔沫吐涎少腹堅善唾女子心痛逆氣善吐食不下

通谷

在幽門下一寸陷者中衝脉足少陰之會灸五壯主失欠口喎僻不端食飲善嘔不得言一云舌下腫難以言舌緩喎戾不端

陰都

一名食宮在通谷下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主身寒熱瘧病心滿氣逆

石關

在陰都下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主痓脊強口不可開多唾大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛

商曲

在石關下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主腹中積聚時切痛

肓俞

在商曲下一寸直臍旁五分衝脉足少陰之會灸五壯主心大堅大腸寒中大便乾腹中切痛

中注

在肓俞下五分衝脉足少陰之會灸五壯主少腹有熱大便難

四滿

一名髓府在中注下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主臍下積聚疝瘕胞中有血腸澼泄切痛振寒作腹石水腎痛

氣穴

一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主月水不通奔氣上下引腰脊痛

大赫

一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主女子赤淫男子精溢陰上縮

橫骨

一名下極在大赫下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主少腹滿小便難陰下縱卵中痛

鳩尾

一名尾翳一名髑骬在臆前蔽骨下五分任脉之別不可灸刺一云灸五壯主心中寒脹滿不得息息賁時唾血血瘀熱病胷中痛不得臥心痛不可按善噦心疝太息面赤心背相引而痛數噫喘息胷滿欬嘔腹痛皮瘙痒喉痺食不下甄權云宜針不宜灸

巨闕

在鳩尾下一寸任脉氣所發灸五壯主心痛不可按煩心熱病胷中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿瘈瘲病心痛滿不得息息賁時唾血心腹脹滿噫煩熱善嘔膈中不通利霍亂發狂妄言怒恐惡火善罵詈狐疝驚悸少氣胷脅支滿瘈瘲引少腹痛短氣煩滿嘔吐心脹

上管

在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸足陽明手太陽任脉之會灸五壯主寒中傷飽食飲不化腹脹心腹胷脅支滿脉虛則生百病甄權云主心風驚悸不能食心下有膈嘔血目眩頭眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎不得反側腹中滿暴痛汗出

中管

一名太倉在上管下一寸手太陽少陽足陽明所生任脉之會灸七壯主腹脹不通心大堅胃脹霍亂出泄不

通按陰交在臍下一寸甄權云在陰之下似屬會陰非陰交也并斷引子亦可從當以此爲是

自知先取太谿後取太倉之原主胸脅下堅痛腹脹不通寒中傷飽食飲不化頭熱鼽血目黃振寒噫煩滿眠怪傷憂損思氣積注甄權云主因讀書得賁豚氣積聚腹中脹暴滿心痛身寒難以俛仰衝疝冒死不知人心腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蛕咬也鼻閒焦臭大便難小腸有熱尿赤黃痛溫汗不出有血溢小

建里

在中管下一寸灸五壯主心痛上搶心不欲食支痛斥臑甄權云主腹脹逆氣上并霍亂

下管

在建里下一寸是太陰任脈之會灸五壯主飲食不化入腹還出六腑之穀氣不轉甄權云主小便赤腹堅硬孕婦不可灸

水分

在下管下一寸臍上一寸任脈氣所發灸三壯主痓脊強裏急腹中拘急痛甄權云主水病腹腫孕婦不可灸

臍中

禁刺穴也一名氣舍灸三壯主水腹大臍平突絕理不治絕子灸令人有子臍痛繞臍痛衝胃不得息甄權云主水腫鼓脹腸鳴狀如雷聲時上衝心口灸七壯至四百壯

陰交

一名少關一名橫戶在臍下一寸任脈衝脈少陰之會灸五壯主水脹水氣行皮中甄權云穴在陰莖下附底弁充中主驚不得眠善齘水氣上下五藏遊氣也陰疝引睪女子手腳拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰痒賁豚上腹腹堅痛引陰中不得小便兩丸騫孕婦不可灸

氣海

一名脖胦一名下肓在臍下一寸半任脈氣所發灸五壯主少腹疝臥善驚甄權云主下焦小便赤氣痛狀如

乃覺孕婦不可灸

石門

一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸任脈氣所發灸三壯女子禁不可灸主臍疝繞臍痛三焦脹水腹大及水氣行皮中心腹中卒痛而汗出氣癃小便黃氣滿虛則遺溺身寒熱吐逆溺難腹滿疝積乳餘疾絕子陰痒賁豚上腹腹痛口强不能言莖腫先引寢後引少腹腹痛少腹上堅痛下引陰中不得小便兩丸騫甄權云主婦人因產惡露不止

關元

一名次門在臍下三寸任脈足三陰之會灸七壯主寒熱石水痛引脅下脹頭眩痛身盡熱氣癃尿黃甄權云主小便處寫狀如散火轉胞不得尿少腹滿引脅下頭脹痛身盡熱賁豚寒熱入少腹時欲嘔傷中溺血小便數腰背臍痛下引陰腹中急欲奏後泄不止暴疝痛少腹大熱身所傷血出多反中風寒若有所墮墜

四肢解㑊不收名曰體解女子絕子衃血在內不下

中極

一名氣原一名玉泉在臍下四寸任脈足三陰之會灸三壯女子禁中央腹熱痛婦人子門不端少腹苦寒陰痒及痛經閉不通乳餘疾絕子內不足賁豚上搶心甚則不能息忽忽少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引脅下痛少腹與脊相控暴痛時窘之後經閉不通小便不利丈夫失精孕婦不可灸

曲骨

在横骨上中極下一寸毛際陷者中動應手任脈足厥陰之會灸三壯主膀胱小便難脬屈轉脬不得尿婦人赤白淫陰中乾痛惡合陰陽水脹滿溺溢瘍疾不啞沫

會陰

一名屏翳在大便前小便後兩陰間任脈別絡俠督脈首衝脈之會灸三壯主痔小便難竅中熱實則腹皮痛

虛則痒搔疥與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不
得大小便女子血不通男子陰端寒上衝心中狼狼

廉泉

一名本池在頷下結喉上舌本下陰維任脈之會灸三
壯主舌下腫難以言舌縱涎出欬逆少氣喘息嘔沫噤
齗上氣
胷滿

天突

一名玉戶在頸結喉下五寸中央宛宛中陰維任脈之
會灸三壯主欬上氣喘暴瘖不能言及舌下俠青絡脈
頭有大氣喉痹咽中乾急不能息喉中鳴翕翕寒熱頸
腫肩痛胷滿腹皮熱衄氣鯁心痛癮疹頭痛面皮赤熱
身肉盡
不仁

璇璣

在天突下一寸中央陷者中任脈氣所發仰頭
取之灸五壯主胷滿痛喉痹咽癰水漿不下

華蓋

在璇璣下一寸陷者中任脈氣所發仰頭取之灸
五壯主胷脅支滿痛引胷中欬逆上氣喘不能言

紫宮

在華蓋下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之灸
五壯主胷脅支滿痹痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂

一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脈氣所發灸
五壯主胷中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心

亶中

一名元兒在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中任脈
氣所發仰而取之灸五壯主胷痹心痛煩滿欬逆喘噫
短氣不得
息不能言

中庭

在足外踝後跟骨上陷者中灸三壯主痓脊強頭眩痛
腳如結踹如裂厥心痛與背相引善瘛如從後觸其心
傴僂者胃心痛也寒熱癲疾目䀮䀮衄瘧多汗腰痛
不能俛仰目如脫項如拔脊強大風頭多汗腰尻腹痛
踹跟腫上齒痛脊背尻重不欲起聞食臭惡聞人音狂
易女子字難若胞衣不出泄風從頭至足癎瘈口閉不
得開每大便腹暴滿
按之不下噫悲喘

付陽

足陽蹻之郄在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間灸
三壯主痿厥風頭重頞痛樞股腨外廉骨痛瘈瘲痹
不仁振寒時有
熱四肢不舉

飛揚

一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡灸三壯主身懈
寒少氣熱甚惡人心惕然取飛揚及絕骨跗上臨泣淫
濼脛痠熱病汗不出皆主之下部寒體重逆氣頭眩痛
痓反折瘧實則腹背痛虛則鼽衄不渴間日作狂癲疾

體痛頸項痛惡節汗出而步失
履寒腹不仁踹中痛痔篡痛

承山

一名魚腹一名肉柱在兌踹腸下分肉間陷者中灸五
壯主寒熱篡反出癲疾瘈瘲鼽衄腰背痛腳腨酸重戰
慄不能久立踹如裂腳跟急腫痛足
攣少腹痛引喉咽大便難腹痛

承筋

一名腨腸一名直腸在腨中央陷者中足太陽脈氣所
發灸三壯主大腸實則腰背痛寒痹轉筋頭眩痛氣虛
則鼻衄癲疾腰痛濈然汗出令人欲食欲走寒熱篡後
出痔瘧腳腨痠重戰慄不能久立腳急腫痛跗筋足攣
少腹痛引喉嗌大便難瘈瘲
痛腰背相引霍亂脛痹不仁

合陽

在膝約紋中央下二寸灸五壯主痹厥癲疾不嗢沫痹
瘲拘急與腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱

通谷
在足小指外側本節前陷者中灸三壯主身疼痛善驚互引鼻衄癲疾寒熱目䀮䀮善欬喘逆狂疾不嘔失瘧善嘔頭眩項痛煩滿振寒瘖瘂

束骨
在足小指外側本節後陷者中灸三壯主身痛狂善行癲疾寒熱腰痛如折痓驚互引腳如結踹如裂暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可顧髀樞痛泄腸澼瘧從䯒起

京骨
在足外側大骨下赤白肉際陷者中灸三壯主瘧寒熱善驚頭重足寒不欲食腳攣癲疾狂妄行自齧頰偏枯腰髀樞痛善搖頭鼽衄頭痛目白眥跟尻瘛瘲頭項痛注上搶心目赤眥爛無所見痛從內眥始腹脹滿頸項強腰背不可俛仰眩欬身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絕骨寫之灸心痛與肩背相引如從

外臺秘要　卷三十九卷　畜　經餘居

後觸其心傷壞者腎心痛也瘧日反白多鼻不通利涕黃便血

申脈
陽蹻所出也在足外踝下陷者中容爪甲灸二壯主腰痛不能舉足少坐若下車躓地脛中矯矯然痠熱頸掖下腫痿疾互引僵仆 寒逆跳夭行蹷蹻音

金門
足太陽郄一名關梁在足外踝下灸三壯主尸厥暴死霍亂轉筋癲疾不嘔沫馬癇 外踝下一作外踝下一寸

僕參
一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽陽蹻脈所會灸三壯主腰痛不可舉足跟中踝後痛痹痿癲疾僵仆轉筋尸厥吐霍亂馬癇

崑崙

在亶中下一寸六分陷者中任脈氣所發灸三壯主胸脅支滿膈塞飲食不下嘔吐食後還出甄權千金楊操同

膀胱人膀胱者腎之腑也兩傍一百二十穴

并二十二單穴及膏肓附穴共二百四十四穴

甲乙經

膀胱出于至陰至陰者金也
在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于通谷通谷者水也
在足小指外側本節前陷者中足太陽脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注於束骨束骨者木也

外臺秘要　卷三十九卷　畜　經餘居

在足小指外側本節後陷者中足太陽脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

過於京骨
在足外側大骨下赤白肉際陷者中足太陽脈之所過也爲原

行於崑崙崑崙者火也
在足外踝後跟骨上陷者中足太陽脈之所行也爲經

入於委中委中者土也
在膕中央動脈足太陽脈之所入也爲合秋三月宜灸之甄權千金楊操同

至陰
在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主頭重鼻衄及瘛瘲汗不出心煩足下熱不欲近衣項痛目翳及小便不利瘧疾寒熱痛風寒從足小指起

藏瘀
壷

委中
在膕中央動脈灸三壯主腰痛俠脊至頭沈沈然目眩腫瘧頭痛寒從背起先寒後熱渴不止汗乃出痎疾反折熱痛俠脊痛痔篡痛遺溺筋急身熱少腹堅腫少腹時熱小便難尻股寒髀樞痛外引季脅內控八髎與血
不上

通按[illegible]一云屈伸

委陽
在足太陽之前少陽之後出于膕中外廉兩筋間承扶下六寸此足太陽之絡灸三壯一云屈身取之主胸滿彭彭然實則閉癃腋下腫痛虛則遺溺脚急兢兢然筋痛不得小便痛引腹腹痛不得俯仰

通按展膝一作屈膝

浮郄
在委陽上一寸展膝得之灸三壯主不得臥

殷門
在肉郄下六寸灸三壯主腰痛得俛不得仰仰則痛得之舉重惡血歸之

承扶
一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰上衝紋中一云股陰下衝紋中灸三壯主腰脊尻臀股陰寒大痛虛則血動實則熱痛痔篡痛尻脽中腫大便直出陰胞有寒小便不利

通按[illegible]

附分
在第二椎下附項內廉兩傍各三寸手足太陽之會灸五壯主背痛引頸

魄戶
在第三椎下兩傍各三寸足太陽脈氣所發正坐取之灸五壯主肩膊間急懷厥惡寒項背痛引頸咳逆上氣嘔吐煩滿喘不能引氣

通按背俞穴大當作[illegible]今附在後

神堂
在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發灸五壯主肩痛胸腹滿洒淅脊背急強

譩譆
在肩髆內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手按之痛病者言譩譆足太陽脈氣所發灸五壯主腋拘攣暴脈急引脅痛內引心肺從項至脊以下十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱痓互引身熱欬逆上氣虛喘喘逆鼽衄肩甲內廉痛不可俛仰䏚季脅引少腹而脹痛小兒食晦頭痛引顖瘖瘈風

通按開肩一云正坐

膈關
在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發開肩取之灸五壯主背痛惡寒脊強俛仰難食不下嘔吐多涎

魂門

在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主胃脅脹滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住

陽綱
在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

意舍
在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主腹滿臚脹大便泄消渴身熱面目黃

胃倉
在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主臚脹水腫食飲不下多寒不能俛仰

謹按秩邊穴一作在二十顀下

胃門

在第十三椎下兩傍各三寸又肋間
灸三十壯主心下大堅婦人乳餘疾

志室

在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所
發正坐取之灸三壯主腰痛脊急脅下滿少腹堅急

胞肓

在第十九椎下兩旁各三寸陷者中足太陽脈氣所發
伏而取之灸三壯主腰脊痛惡寒少腹滿堅癃閉下重
不得小便以手按之則欲小便而不得出肩上熱
手足小指外側及脛踝後皆熱若脈陷取委中央

秩邊

在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所
發伏而取之灸三壯主腰脚髀寒俛仰急難陰痛下重
不得
小便

攢竹

一名員在一名始光一名夜光一名明光在眉頭陷者
中足太陽脈氣所發灸三壯主風頭痛鼻鼽衄眉頭痛
善嚏目如欲脫汗出惡寒面赤頰中痛項椎不可左右
顧目系急瘈瘲癲疾互引反折戴眼及眩狂不得臥意
中頰目眩眩不明惡風
寒癲疾發目上插痔痛

曲差

一名鼻衝俠神庭一寸半在髮際足太陽脈氣所發正
頭取之灸五壯主頭痛身熱鼻窒而息不利煩滿汗不
出

五處

在督脈傍去上星一寸半足太陽脈氣所發
灸三壯主痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重寒熱

承光

在五處後二寸足太陽脈氣所發不可灸主熱
病汗不出而苦嘔煩心目生白翳遠視不明

通天

一名天白承光後一寸半足太陽脈氣所發灸二壯主
頭痛重偃仆鼻窒鼽衄不得通喘僻多涕鼽衄有瘡

絡却

一名強陽一名腦蓋反行在通天後一寸半足太陽脈
氣所發灸三壯主青盲無所見癲疾僵仆目妄見恍惚
不樂狂
走瘛瘲

玉枕

在絡却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨入髮
際三寸足太陽脈氣所發灸三壯主頭項痛惡風汗不
出悽厥惡寒嘔吐目內系急痛引頞頭重項痛寒熱骨
痛頭眩目痛頭半寒目痛不能視項似拔不可左右顧
癲疾不嘔
沫互引

天柱

在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發灸
三壯主寒熱暴拘攣癇眩足不任目䀮䀮赤痛痓厥頭
痛項先痛腰脊為應眩頭痛重目如脫項如拔狂見目
上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言
小兒
驚癇

大杼

在項第一椎下兩傍各一寸半陷者中足太陽手少陽
之會灸七壯主癲疾不嘔沫痎瘧頸項痛不可以俛仰
頭痛振寒瘈瘲氣實脅滿傷寒汗不出腰背痛痓脊強
喉痺大氣滿喘胸中鬱鬱身熱眩目𥉂𥉂項強急寒熱
僵仆不能久立煩
滿裏急身不安席

風門

一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半督脈足太陽
之會灸五壯主風頭眩痛鼻鼽不利時嚏清涕自出

肺俞
在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣嘔沫喘氣相追逐胸滿背脊急息䀹㽲振慄脉鼓氣膈胸中有熱支滿不嗜食汗不出腰背痛肺脹癲疾憎風時振寒不能言得寒益甚身熱狂欲自殺目妄見瘈瘲泣出死不知人

心俞
在第五椎下兩傍各一寸半灸三壯主寒熱心痛循循然與背相引而痛胸中邑邑不得息欬唾血多涎煩中善噎飲食不下嘔逆汗不出如瘧狀目䀮䀮淚出悲傷瘖瘂心脹

膈俞
在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主僂悽振寒數欠伸欬而嘔膈寒食飲不下寒熱皮肉骨痛少氣不得臥胸滿支兩脅膈上兢兢脅痛腹䐜胃管暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚嘿嘿然嗜臥怠惰不欲動身常濕心痛周痺身皆痛痙大風汗出癲狂

肝俞
在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主欬而脅滿急不得息不可反側腋脅下與臍相引筋急而痛反折目上視眩中循循然眉頭痛驚狂衄少腹滿目䀮䀮生白翳欬引胸痛筋寒熱唾血短氣鼻酸痓筋痛急互相引筋脹痓狂

膽俞
在第十椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發正坐郎取之灸三壯主胸滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下

脾俞
在第十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取胃俞後取季脅黃癉善欠脅下滿欲嘔身重不動脾痛熱痓大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食脾脹痛

胃俞
在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胃中寒脹食多身羸瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胸脅支滿嘔吐脊急痛筋攣食不下

三焦俞
在第十三椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主頭痛飲食不下腹鳴䐜脹欲嘔時注泄

腎俞
在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腰痛不可俛仰反側熱痓寒熱食多身羸瘦兩脅引痛心下焦痛心如懸下引臍少腹急痛熱面黑目䀮䀮喘欬少氣溺濁赤骨寒熱便難腎脹風頭痛如破足寒如水頭重身熱振慄腹中四肢淫濼欲嘔腹鼓大寒中洞泄食不化骨寒熱引背不得息

大腸俞

在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸轉氣按之如覆杯食飲不下善噎腸中鳴腹䐜而腫暴泄腰痛是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣虛有餘則熱腫虛則寒慄

小腸俞
在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主少腹痛熱控睾引腰脊疝痛上衝心腰脊強溺難黃赤口乾大小便難淋脊

膀胱俞
在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主熱痓互引汗不出反折尻臀內痛似瘅瘧狀腹脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息痿重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起

中膂內俞
在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊起肉灸三壯主腰痛不可以俛仰寒熱痓反折互引腹脹腋攣背中快快

[illegible]

引脅痛內引心從項始數脊椎俠脊如痛按之應手灸立已

白環俞 在第二十一椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發不可灸主腰脊以下至足不仁小便黃

上窌 在第一空腰髁下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善傴睪跳騫寒熱熱病汗不出瘧女子絕子陰挺出不禁白瀝

次窌 在第二空俠脊陷者中灸三壯主腰痛怏怏然不可以俛仰腰以下至足不仁脊腰背寒先取缺盆後取尾骶與八窌女子赤白瀝心下積脹

中窌 在第三空俠脊陷者中灸三壯主厥陰所結腰痛大便難飧泄尻中寒女子赤淫時白氣癃月事少男子癃小溺底

外臺秘要 三十九卷 [illegible] 經餘居

下窌 在第四空俠脊陷者中灸三壯主腰痛引少腹痛女子下蒼汁不禁赤瀝陰中痒痛引少腹控䏚不可以俛仰腹腸鳴溏泄

會陽 一名利機在陰尾骨兩傍督脉氣所發灸五壯主五藏腹中有寒泄注腸澼便血

素窌 一名面王在鼻柱端督脉氣所發不宜灸主鼽衄涕出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

神庭

[illegible]

在入髮際五分直鼻督脉足太陽陽明之會灸[illegible]頭腦中寒鼻鼽目泣出癲疾嘔沫風眩善嘔煩[illegible]熱頭痛喘喝目不能視

上星 在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆督脉氣所發灸五壯主風眩善嘔頰清額青瘠鼻鼽熱病汗不出目睛痛不能視面胕腫癲疾凡云上星主之者皆先取譩譆後取天牖風池甄權云不宜多灸

顖會 在上星後一寸陷者中督脉氣所發灸五壯主痓風眩善嘔項清頭痛顏青癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫

前頂 在顖會後一寸五分骨陷中督脉氣所發灸五壯主風眩目瞑惡風寒面赤腫小兒驚癇

外臺秘要 三十九卷 [illegible] 經餘居

百會 一名三陽五會在前頂後一寸半項中央旋毛中陷容指督脉足太陽之會灸五壯主痎瘧癲疾不嘔沫耳鳴痓項上痛風頭重目如脫不可左右顧

後頂 一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脉氣所發灸五壯主風眩目眩顱上痛䀮䀮不明惡風寒眩偏頭痛癲疾瘈瘲狂走項直頸痛

强間 通按一作灸七壯 一名大羽在後項後一寸半督脉氣所發灸五壯主頭痛如針刺不可以動項如拔不可左右顧癲疾狂走瘈瘲搖頭口喎戾頸强

腦戶

通按瘂門禁針禁灸灸令人瘖針中瘂令人立死瘂之

一名匝風一名合顱在枕骨上強間後一寸半錯脉足太陽之會不可灸主目赤痛不可視面赤頰頭重項目不明風眩腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風疼疾瘦眩狂邪瘲口噤羊鳴舌本出血瘖不能言瘂盲不晌寒熱

風府

一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督脉陽維之會不可灸之主頸痛項急不得傾側目眩暈不得喘息舌急難言狂易多言不休狂走欲自殺目反妄見暴瘖不得言喉嗌痛足不仁

瘖門

一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中入繫舌本督脉陽維之會仰頭取之不可灸令人瘖主項強舌緩瘖不能言脉傍去上星一寸五分灸三壯此以寫諸陽氣熱衄善嘔風頭痛汗不出寒熱痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重

大椎

在第一椎上陷者中三陽督脉之會灸九壯主寒熱以年爲壯數傷寒熱盛煩嘔

陶道

在項大椎節下間督脉足太陽之會俛而取之灸五壯主頭重目瞑悽厥寒熱項強難以反顧汗不出

身柱

在第三椎節下間督脉氣所發俛而取之灸五壯主癲疾怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼瘈瘲

神道

在第五椎節下間督脉氣所發俛而取之灸三壯主身熱頭痛進退往來痎瘧恍惚悲愁

至陽

在第七椎節下間督脉氣所發俛而取之灸三壯主寒熱解㑊淫濼脛酸四肢重痛少氣難言

大也

通按瘂門…

筋縮

在第九椎節下間督脉氣所發俛而取之灸三壯主小兒驚癇瘈瘲狂走癲疾脊急強目轉上插

脊中

在第十一椎節下間督脉氣所發不可灸之主腹滿不能食腰脊強不得俛仰黃疸

懸樞

在第十三椎節下間督脉氣所發灸三壯主腹中積上下行水穀不化下利腰脊強

命門

一名屬累在第十四椎節下間督脉氣所發伏而取之灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出瘈瘲裏急腰腹相引痛

腰俞

一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰户在第二十一椎節下間灸三壯主腰痛引少腹控眇不可俛仰以月死生爲數發針在左取右在右取左立已腰以下至足清不仁不可以坐起尻不舉溫瘧痎瘧女子閉溺赤脊強互引反折子下赤白

長強

一名氣之陰郄督脉絡別在脊骶端少陰所結灸三壯主瘈瘲實則脊急強癃疾發如在者而皮敦敦厚者不瘈瘲虛則頭重洞泄癃閉大小便難痔病尻重難起居寒熱痓反折心痛氣短小便黃閉小兒癇瘈瘲脊強互相引

膏肓俞

主無所不療諸羸瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂惑妄誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩膂去表肋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩甲中各一處至六百

壯多至千壯當覺下礱礱然流水狀亦當有所下出若停痰宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前取穴灸之求穴大較以右手從左肩上住指頭所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久坐伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩甲骨使相離不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小有常定不爾則前却失其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息以自補養令得平復其穴近第五椎相準

論曰昔者和緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不能及即此穴是也人不能求得此穴所以宿痾難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈出第三十卷中

三焦人三焦者腑也兩傍五十八穴

甲乙經

三焦出於關衝關衝者金也

在手小指次指之端去爪甲如韭葉手少陽脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流於腋門腋門者水也

在手小指次指之間陷者中手少陽脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注於中渚中渚者木也

在手小指次指本節後陷者中手少陽脈之所注也爲腧夏三月宜灸之

過於陽池

一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脈之所過也爲原

行於支溝支溝者火也

在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脈之所行也爲經

入于天井天井者土也

在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也爲合秋三月宜灸之甄權千金翼

關衝

在手小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主喉痹舌卷口乾頭痛心背表痛不可及頭在左取右右取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭眩額痛面黑肩痛不可顧霍亂寒熱耳聾鳴甄權云不宜灸

腋門

在手小指次指間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾瘛瘲頭痛目澀暴變耳聾鳴眩寒厥手臂痛下齒齲則上齒痛善驚妄言面赤

中渚

在手小指次指本節後間陷者中灸三壯主熱病汗不出頭痛耳鳴目痛寒熱嗌外腫肘臂痛手上類類也五指瘈不可屈伸頭眩耳聾兩顳顬痛身面癢項痛目眥瞑見喉痹

陽池

一名別陽在手表腕上陷者中灸三壯主寒熱瘧肩痛不能自舉汗不出頸腫

外關

手少陽絡在腕後二寸陷者中灸三壯主肘中濯濯臂內廉痛不可及頭耳焞焞渾渾聾無所聞口僻噤

支溝

在腕後三寸兩骨之間陷者中灸三壯主熱病汗不出互引頸嗌外腫肩臂酸痛脅腋急痛四肢不舉痂疥項不可顧霍亂馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛支滿逆氣汗出口噤不可開暴瘖不能言男子脊急目赤咳面赤熱

會宗

手少陽郄在腕後三寸空中灸三壯主肌肉痛耳聾羊癇

胳中會眾亦在顧後二寸半中眦後空推前骨陷中耳切無有客也一至在陝後三寸絡中一寸兩三陽絡又在支溝上一寸會宗故本易東也依爲明者會之

三陽絡 在臂上大交脈支溝上一寸灸九壯主嗜臥身體不能動搖大溫內傷不足

四瀆 在肘前五寸外廉陷者中灸三壯主卒氣聾齒痛

天井 在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之灸三壯主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁大風默默然不知所痛嗜臥善驚瘈瘲肓聲心痛肩肉麻痒食瀉發心痛悲傷不樂癲痺吐舌沫出羊鳴戾頸

清冷淵 在肘上二寸伸肘舉臂取之灸二壯主頭痛振寒肩不舉不得帶衣

消濼 在肩下臂外開腋斜肘分下行灸三壯主寒熱痺頭痛項背急

和窌 在耳前兌髮下動脈手足少陽之會灸三壯主頭重頷痛引耳中聵聵嘈嘈

聽會 在耳門前陷者中張口得之動脈應手手少陽脈氣所發灸三壯主寒熱喘喝目視不能視目泣出頭痛耳中顛颼風齒齲痛

聽宮 在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽之會灸三壯主耳聾填填如無聞聵憹嘈嘈若蟬鳴鶗鴂鳴驚狂瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出

角孫 在耳郭中間上開口有空是也灸二壯主齒牙不可嚼齲腫

瘈脈 一名資脈在耳本雞足青絡灸三壯主小兒癇瘈吐泄驚恐失精視瞻不明眵䁾

翳風 在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會灸三壯主聾僻不正失欠脫頷口噤不開痓不能言

天牖 道按　聖濟天牖不宜灸

在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脈氣所發灸三壯主肩背痛寒熱歷適頸有大氣暴逆氣脈昏耳目不用頭頷痛淚出鼻不知香臭風眩痺三焦病腹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則爲水音則爲脹瘖蓋

天容 在耳下曲頰後手太陽脈氣所發灸三壯主寒熱新積胷痛不得息胷中痛陽氣大逆上滿於胷中憤瞋肩息大氣逆喘鳴坐伏病咽壁不得息欬逆上氣唾沫肩痛不可挾頸項癰腫不能言耳聾嘈嘈無所聞疚瘈痛

顴窌 一名兌骨在面頄骨下廉兌骨端陷者中手少陽太陽之會主口僻面赤目赤目黃口不能嚼齗腫脣癰

肩井 道按　聖濟肩井在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按之當中指下陷中是所主病與此不同

在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索

天窌 在肩缺盆中上毖骨之際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主肩肘中痛引頸寒熱缺盆痛汗不出胷中熱滿

肩貞

在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒熱項歷適耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛手臂小不舉

肩外俞

在肩甲上廉去脊三寸陷者中灸三壯主肩甲中痛熱而寒至肘

肩中俞

在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸三壯主寒熱厥目不明欬上氣唾血

曲垣

在肩中央曲甲陷者中按之痛應手灸十壯主肩痛周痺

缺盆

一名天蓋在肩上橫骨陷者中灸三壯主寒熱歷適實中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痺欬嗽血經準千金楊操同

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事

趙子孟 校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十九卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第四十卷目錄 蟲獸傷觸人及六畜疾二十二門

熊虎傷人瘡方七首

辨蛇一首

禁蛇法三首

辟蛇法三首

蛇齧人方一十四首

蛇螫方六首

蛇毒方三首

青蝰蛇螫方二首

虺蛇螫方一十首

虺蛇螫方四首

衆蛇螫方七首

蜘蛛咬方六首

蜂螫方一十首

蜈蚣螫方八首

蠍螫方二十七首

蠼螋尿方二十二首

惡蛇方三首

蜃螫方二十二首

射工方一十九首

溪毒方二十一首
沙蝨毒方六首
犬咬人方九首
狂犬咬人方二十二首
猪嚙人方二首
馬咋踏人方四首
剝死馬馬骨傷人方三首
馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首
馬汗及毛入人瘡方六首
驢馬諸疾方三十一首

牛狗疾方六首
牛觝觸腸出方一首
油衣粘及松脂著人衣并蟲蝕氊罽法五首

愚按上貼氣編自下有欽衍盟目有二一在角淡上近家心被中一

唐王燾先生外臺秘要方第四十卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等　上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

熊虎傷人瘡方七首

肘後療熊虎爪牙所傷毒痛方

燒青布以熏瘡口毒即出仍煮葛根汁令濃以洗瘡日十度并擣葛根爲散煮葛汁以服方寸匕日五甚者夜二文仲備急姚方小品刪繁古今錄驗並同千金方治虎咬

又方

嚼粟塗之姚方文仲備急古今錄驗千金同

又方

煮生鐵令有味以洗瘡姚方文仲備急古今錄驗千金同

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣今人將入山草中自宜先作禁以防之可不俟備而後療也其經術云到山下先閉氣二十五息所在山神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出收取虎兩目塞吾下部中乃吐肺氣上自通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山虎

狂無名指二節中

逃按蛇附蛇

走不可得見若卒逢之者因正而立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中大喚咄曰虎北斗君使汝去虎卽走止宿亦先四向如此

又方

雄黃　硫黃　紫石

右三物擣末以絳囊盛之帶以防用本方無硫黃

集驗療熊虎傷人瘡方

取蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲之餘滓以敷瘡上

傳急入山辟虎法

燒牛角羊角虎不敢近人文仲肘後千金並同出第八卷中

辨蛇一首

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蝰蒼虺白頸大蜴六月中竹狩文蝮黑甲赤目黃口反鉤白蝰三角此皆蛇毒之猛烈者中人不卽療多死第一有禁第二則藥今凡俗知禁者少縱常按師術已致困斃唯宜勤事諸藥但或經行草路何由皆齎方書則應備具所製之藥并佩帶之自隨天下小物能使人空致性命者莫此之甚可不防慎之乎文仲備急同出第八卷中

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法隱居效驗

有人被蛇螫者從身不得自來但有報人至前使之坐問被螫何處卽而巳地依左右手掐頭指內第一節曲文頭側上仍心想口暗誦曰

嗡蛇頭掐蛇目望蛇鄉踏蛇足訖則放前人去待極遠然後緩放所掐處卽差

必效禁蛇法

五月五日從門東剌向南三步九跡四方取氣訖重向南方取氣卽切切誦後咒文四十九遍於後任所行用其遮吒呵迦吒脩禁吒喫卻吒蛇毒死喫卻嚴

蛇毒殲若欲誦咒時須在月建上立喚被螫人當前立定然後背足行七步仍頓足廻身向被螫人立掐指二所如了乃誦咒七遍卽放所患者歸可一炊久放掐目也若不解咒蛇致死乃放掐目誦云吾庭前者木百尺無枝鳳皇在上食斯速出放汝去攝汝毒命寧汝急急如律令出第五卷中

古今錄驗禁蛇醫方高元廣大李參軍述

咒曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時於其處爲某色蛇螫其處陰咒云你是巳功曹我是亥明府你若不攝毒吾當掐你口閉氣隨想掐蛇口

退按參驗鈃莊蛇雉鴆日喙未詳

蛇口在食指第二節白肉際交以手大指甲掐之各

自以其手屈食指掐之閉氣急掐若螫右手右手掐

左手左手掐螫當中兩手盡掐急忘任放手廢屈手

刺去血即便差 出第四十五卷中

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃

爲上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他

人中者便摩以療之帶五蛄黃丸良以丸有蜈蚣故也入

入山伐船有大赤足蜈蚣置管中繫腰又有黿龜噉蛇帶

其尾亦好鴆日象彌佳禁法中亦有單行輕易者今疏其

數條然皆須受而後行不爾到山卑口住立存五蛇一頭

乃閉氣以物屈刺之因左廻兩步思作蜈蚣數千以衣身

便行無所畏也 張文仲備急同

集驗入山草辟衆蛇方

乾薑 生麝香 雄黃

右三味等分擣以小絳囊盛男左女右帶佩則蛇逆者

辟人爲蛇所中便以療之如無麝香以射罔和帶之療

諸毒良 肘後千金文仲備急古今錄驗同出第九卷中

千金療入山辟衆蛇方

嘗燒羖羊角令煙出蛇則去矣 肘後同出第二十六卷中

蛇嚙人方一十四首

廣濟療毒蛇嚙方

取慈孤草擣以薄之即差其草似燕尾者是大効 出第五卷中

肘後蛇嚙毒腫方

乾薑末敷之燥復易之 備急文仲千金同

又方

灸嚙處三五壯則毒不能行

又方

擣射罔塗腫上血出乃差 備急文仲千金同

又方

猪屎燒令焦末藍一把水三升煮取二升投屎攪和

以洗之差

文仲療蛇嚙方

擣雄黃末以敷之日三四度差

又方

取梳裏垢如指大長二寸以屎和敷之

又方

灸梳使汗出以熨嚙口即驗 備急千金同

又方

取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差 千金同

必効療蛇咬方

五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向桑下覓莧莢先知處記之至五月五日中時先手摸桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口嚼取莧莢嚼使熟以唾塗手熟揩令遍五月七日滿齋如後七日內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

又方

燒桑刀麝香少許和刀上以烙齧處令皮破即差

又方

生薑蛇膽乾為末敷嚙處孔中數易之其蠍有生子首妙

又方

麝香 雄黃二 半夏 巴豆

右四味等分為末敷之

又方

先以唾塗咬處熟挼生大豆葉封之

蛇螫方六首

肘後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方

取大小蒜各一升合擣以熱湯淋取汁灌瘡中 然同

崔氏療被蛇螫驗方

生椒三兩 好豉四兩

右二味以人唾和擣令熱用薄傷處須臾即差

又方

取獨顆蒜截兩頭著螫處一頭大作艾炷灸之如此即愈未愈更灸以差為度

又方

取狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹煻火炮令熱用冷即易之

又方

取醋草熟擣以敷螫處仍將蒜頭裹之數易其醋草似初生短嫩苜蓿苗是

又方

取遠志嚼令碎以敷之并內一片子於所螫瘡處孔中數易之 在肘第五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方

雄黃 麝香 乾薑

右三味各等分擣研以蜜和為膏敷毒螫處良瓦合中旋有蛇處取雄黃燒令氣散及蛇並走不住

選須獨狼牙即狼牙巫獨草者

又方

取獨狼牙擣碎月猪脂和以敷毒上立差

又方

取荆葉以袋盛薄瘡腫處即差止 肘後同

青蜂蛇螫方二首

小品療竹中青蜂蛇螫人方

雄黃 乾薑

右二味各等分擣篩以射罔和之著小竹管中帶之行有急便用敷瘡兼療諸蛇毒 千金同肘後有麝香為三味

肘後青蜂蛇論此蛇正綠色喜緣木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然自不甚嚙人嚙人必死那可屢肆其毒此蛇大者不過四五尺世人皆呼為青條蛇其尾二三寸色異者名熇尾最烈療之方

破烏雞熱敷之

蝮蛇螫方一十首

肘後療蝮蛇螫人方

桂心 栝樓

右二味等分為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蝮蛇嚙即敷之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用 文仲同

又方

急掘地作坎埋所螫處堅築其上毒則出土中須臾痛緩乃出徐徐以藥療之

又方

擣小蒜絞之飲其汁以滓封瘡上

又方

取猪耳中垢著傷瘡中當黃汁出差牛耳中垢亦可用之良

又方

嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽唾上

備急療蝮蛇螫人方

燒蜈蚣末敷瘡上良 肘後同

又方

蠟及蜜等分於鐺中消令和以無節竹筒著瘡上以蠟蜜灌竹筒令下入瘡中差無蜜唯蠟用之亦得

又方

急尿瘡中乃拔刀向日閉氣三步以刀掘地作小坑以熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之取少泥塗瘡上 肘後同

文仲療蝮蛇螫人方

細辛　雄黃

右二味等分以內瘡中日三四敷之并療諸蛇及虎傷

瘡良

又云蝮蛇形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭腹貼相著是也東間諸山甚多其毒最烈草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來嚙人東人呼為千歲蝮或中之必死然其嚙人畢即跳上林木作聲云斫木斫木者但營棺其判不救若云博叔博叔者猶可急療之吳音呼藥為叔故也

虺蛇螫方四首

古今錄驗療虺蛇毒方

擣葵根以敷之

肘後療虺蛇眾蛇螫人方

以頭垢敷瘡中張文仲備急同

又方

以兩刀於水中相摩良久飲其汁痛即止備急張文仲同

又方

擣葎草以敷之立愈神良

眾蛇螫方七首

集驗療眾蛇螫人方

取竿莧菜擣飲汁一升滓以少水和塗瘡上又擣冬瓜根以敷之肘後千金同

又方

取常思葉擣取汁飲一升以滓敷瘡上又以鬼目葉擣之止痛肘後云擣鬼針草敷上並出第九卷中

又仲療眾蛇螫方

預乾薑薄瘡上不過三四差又煮吳茱萸湯以漬瘡上立差集驗同

又方

擣生蓼絞汁飲之少少以滓薄瘡上又採藍青薄之

又方

擣大蒜塗之以少鹽豉合擣尤佳備急集驗古今錄驗同

又方

以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口嗍所螫處取毒數嗍去之毒盡即不復痛口嗍當小腫無苦狀備急同

又云此眾蛇者非前件三種也謂赤蝗音淹黃頷之類復當其土種不盡知其名水中黑色名公蠣山中一種亦相似並不聞螫人有鉤就尾如鉤能倒牽人獸入水後而食之又南方有吻蛇人忽傷之不死終身伺覓其主雖百人衆

中亦並來取之叩逐去百里乃免耳又有蛇長七八尺蛇毒中人必死卽削取船柂煮漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王字者有靈或有角形者此是欲變為龍也凡青蜂中人立死蝮中人一日死虺毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一法宜審按之（並出第八卷中）

蜘蛛咬方六首

廣濟療蜘蛛咬方

取生鐵衣以醋研取汁塗之差（肘後同）

又蜘蛛咬作瘡煩療不差方

取蘿摩草擣如泥封之日二三毒化作膿膿出頻着勿停

又方

棗葉 栢葉（各五月五日採陰乾） 生鐵衣

鵝糞沙

右四味各等分擣散以生麻油和如泥先灸咬處塗之差（並出第五卷中）

千金療蜘蛛咬人方

以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差（肘後同此出第二十六卷中）

備急療蜘蛛咬人方

取羊桃葉擣敷之立愈（肘後同）

又方

以蒜切作兩斷以揩之又以蒜摩地取泥塗之（文仲同並出第八卷中）

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方

取人溺新者洗之差（備急文仲必効劉紫同）

又方

斫榖木取白汁塗之桑汁亦良（備急文仲小品古今錄驗同）

又方

煮蜂房洗之又燒灰末以膏和塗之（千金同本方云燒牟角灰苦酒和塗之）

又方

刮齒垢塗之（備急文仲千金同）

千金治蜂螫方

蜜五合 蠟二兩 豬脂五合

右三味和煎如膏候冷以塗之甚良（一云猪稍稍食之）

又方

以淨醋沃地取泥塗之

又方

以尿泥塗之

又方

取蛇皮以醬塗之炙令熱以貼螫處効又以醬汁塗蛇皮炙以封之且効 並出第二十六卷中

必効療蜂螫方

擣青蒿封之亦可嚼用之 肘後同

又方

近用薄荷挼貼之大効蜀中用驗 並出第六卷中

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方

割雞冠取血塗之差 備急文仲删繁必効同

又方

嚼鹽塗之効又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去 備急小品文仲古今錄驗同

又方

嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底土揩之良 小品備急文仲必効古今錄驗同

又方

挼蛇銜草封之佳

備急療蜈蚣螫人方

挼藍汁以漬之即差蜈蚣不甚齧人甚亦微殊輕於蜂當時小痛易歇朧為所中幸可依此療之藥家皆用赤足者令赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈故也 張文仲肘後同

又方

取屋中土以水和敷之 小品同

崔氏療蜈蚣螫人方

趁雄雞令走以雞嘴氣阿之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方

取錫炙令熱以熨之不越十度即差 出第十卷中

蠍螫人二十七首

廣濟療蠍螫毒方

擣蒜塗之 崔氏備急同

又方

半夏以水研塗之亦止

又方

咒曰一名蕎枝一名薄之傍他籬落螫他婦兒毒氣急去不出他道你愚癡急急如律令 並出第五卷中

集驗療蠍蟲螫人方

余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆無効有人見令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖便痛即以冷水漬小暖即易之餘處冷水浸故布以搨之此實大驗 肘後備急千金必効文仲同

又方

螫有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥傅之溫則易雌者用當屋及溝下泥塗之若不值天雨可用新汲水從屋上淋下於下取泥傅之

又方

畫地作十字取上土水服五分匕 並出第一卷中

千金療蠍毒方

取齒中殘飯傅之又以猪脂封之又以射罔封之

又方

硇砂和水塗上愈 救急同

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫慎之慎之治亦難差

又方

嚼茱萸以封之立愈

又方

生烏頭末唾和塗之良

崔氏療蠍螫人方

取人參嚼以傅痛處立差又以黃丹塗之差

又方

深削桂心醋磨塗之立定

又方

滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之 並出第五卷中

備急療蠍螫人方

蜀葵花 石榴花 艾心

右三味等分並以五月五日午時取陰乾合搗和水塗螫處立定花取未開者 張文仲同

又方

溫湯漬之 肘後崔氏同

又方

挼馬莧菜封之差 肘後備急文仲同

又方

嚼乾薑塗之差 肘後備急文仲同並出第八卷中

必効療獸咬人方

溫酒以漬之又擣鼓作餅如錢大貼螫處以艾灸七壯問被咬人云是物遺報云蠍蠍郎語云汝所苦語

訖卽私向一處識一兎還安舊勿使其人知趣更問
差未遣報云差訖卽痛止神効
古今錄驗療蠍螫人方
取苦李子人嚼以封之卽差
又方
挼蛇銜取汁以傅之差
又方
以木梳率取此螫處卽以木梳合之便差神驗
又方
挼鬼針草取汁傅之卽差

又方
五月五日取莧務熱擣以遍塗手至後日中時然後
洗手若有人被螫以手摩索應手卽差
又禁蠍螫人法
呪曰緊灰鉤計梨乎俱尚蘇娑訶於五月五日桑木正
北陰中莧莢日正午時先七步至莧莢北右膝著地
立左膝手摘取莧莢子摘取著口中熟嚼吐著手內
與五葉草莧莢等相和若無子直取二葉相和於手
內左轉挼之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍
止所挼葉令汁出染手其葉還依舊置莧莢處勿反
顧之一日一夜不得洗手亦不用禁污手內亦不得
人知作此法不得人見被螫者口問云何處卽陰呪
七遍男以左手摩螫處口云左去若猶小疼痛者男
掐左手無名指第一節內側文頭陰呪指之女指以
右手指以右手摩螫處其莧莢私取移種於桑北五
葉卒處處有之耳
又張文仲言以此蠍毒陰蛇卽非蜂蜈蚣之輩自有小小可
忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲遍用諸藥
塗傅不能應時有効遂依角法以意用竹依作小角留一
節長三四寸孔徑四五分若指上可取細竹作之繞令搭

得螫處指用大角角之氣漏不嗍故角不厭大大卽嗍急
差速作五四枚鐺內熟煮取以角螫處冷卽換初被螫先
以針刺螫處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口
二三分以角之此神驗不可以口嗍毒入腹殺人蘇公云
灸卽差以熱角嗍之無火灸也並出第四十五卷中
蠼螋尿方二十二首
千金療蠼螋蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處疹痛
如芒刺亦如刺蟲所螫處後起細瘖瘰作聚如茱萸子狀
四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯
熱劇者連起盡腰脇胷也療之法初得之便磨犀角塗之

道按礬前日白也

上其姦瘡如火丹法余以武德中六月得此病經五六月覺心悶不佳以他法療之不愈有友人教畫地作蠼螋形以刀細細畫取蠼螋腹中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感難曉其由矣

又方

羖羊鬚燒灰臘月豬脂和以封之差

又療蠼螋尿方

熟嚼梨葉以封之乾復易之

又方

取馬鞭草爛擣以封之乾復易差

又療蠼螋尿繞腰欲死方

取敗蒲席煮汁塗之

又方

萹豆葉擣塗之並出第十三卷中

深師療蠼螋尿方

取鷰巢中土以苦酒和敷之

又方

以雞子和白礬敷之使淫為瘡以大蒜磨研書墨塗之一方以胡粉塗之一方以豬膏塗之又燒蒲灰蒡之並出第二十九卷中

集驗療蠼螋尿瘡方

燒鹿角擣末以苦酒和敷之已有汁者燒道邊弊蒲蓆灰以敷之深師千金并翼文仲同

又方

槐白皮半斤切　苦酒二升

右二味漬半日刮去瘡處以洗日五六遍末赤小豆和苦酒敷之燥即易之小兒以水和敷之甚良千金并翼文仲深師同

又方

嚼大麥以敷之日三千金同

又方

豬脂和燕巢中土敷之千金同並出第九卷中

千金翼療蠼螋尿瘡方

取茱萸東引根下土以酯和塗之

又療表裹相當一名俠瘙瘡方

取豬牙車骨年久者捶破燒令脂出及熱塗之千金同

又方

取棘木根若皮燒灰敷之乾者以豬膏和敷并主小兒禿及諸惡瘡深師同出第二十四卷中

崔氏療蠼螋尿瘡瘡習習然黃水出者方

取韭擣取汁以塗之

又方

煮甘草湯洗之

又方

嚼桂塗之

又方

絞馬屎汁洗之

又方

嚼麻子塗之

又方

令患人於日裏立側近作沸湯微取以淋患人影令當所患瘡處六七度仍遣人蒸蝸蒜以㨾患人影中患處以巾餘㨾氣即眞㨾患人瘡上愈 並出第五卷中

救急蠼螋尿方

取鷰窠和釅醋塗之大良 出第五卷中

惡蚝方三首

必効療惡蚝已洪腫者并差方

取楝木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒溫浸洗瘡冷即易再三差

又惡蚝已洪爛者方

乾薑　水銀　豬脂 臘月者佳

右三味搗令相得即置九向罐中燒以竹筒籠上熏所腫處先破兩處然後熏即差

又方

取胡葱於塘火中煨令軟取出以兩腦手挼令破以搨瘡上以痛定為度 李熊夫多服神効 並出第十六卷中

蠆螫方二首

肘後論云此蠆字作蠆字所謂蜂蠆作於懷袖賁育為之驚恐言其小而有毒起乎不意也世人呼蝘蜓為蠆子而未嘗中人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒書家

呼蝘蜓為守宮本草云守宮即是蜥蜴如東方朔言則兩種物矣今蜥蜴及蛇醫母並不螫人蜥蜴有五色具者亦云是龍不可殺之令人震死今又有一小烏蟲子尾有毒世人呼為甲蟲而尾似車發兩尾復言此蟲是蠆未詳其正矣

又療蠆螫人方

擣常思草絞取汁以洗瘡 出第八卷中

古今錄驗蠆螫人方

取屋霤下土水和敷之立愈 出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行及入水中此蟲口中有横骨狀如角弩即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛目可暮劇困者三日則齒間血出不療則死其人中有四種初覺即遍身視之其一種正如黑子而皮徒四邊突赤以衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突起如石癤狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善齊

好生金犀角麝香並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方

急周繞遍去此瘡邊一寸輒灸一處百壯瘡上亦百壯大良 肘後同

又療射工毒方

白雞屎白者二七枚以水和塗瘡上 姚文仲備急千金肘後同並出第九卷中

肘後初見此瘡便宜療之方

便水磨犀角塗之燥後塗亦取細屑和麝香塗之一方云服一方寸匕

又方

以白梅皮裹豉母蟲吞至六七枚勿住 本方云取水上浮走豉母蟲一枚置口中便差

又射工毒蟲正黑狀如大蜚生齒髮而形有雌雄雄者口邊有兩横角角能屈伸有一長角横在口前弩檐臨其角端曲如上弩以氣為矢因水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其土氣不凝氣蒸休休然人有識處掘而取帶之溪邊行亦往往得此若中毒仍為屑與服夏月在水中則不可見乃言此蟲含沙射人影便病欲度水先以石投之則口邊角弩發矢若中此毒體覺不快視有瘡處便療之療之亦不異於溪毒

又方

取皂莢一梃長一尺二寸者搥碎以苦酒一升煎如餳去滓敷毒上 文仲備急同

又方

取馬齒莧擣飲汁一升滓以薄瘡上日四五遍良 文仲備急同

集驗療射工毒中人寒熱發瘡偏在一處有異於常方

取赤莧合莖葉擣絞取汁服一升日再三服 千金備急文仲必効刪繁肘後同姚云服七合日四五服

又方

犀角　升麻　烏翣根各二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊久盡更作千金同

又方

取生茱萸莖葉一虎口斷去前後取握中者熟擣以水二升煎取八合頓服之千金同

又療射工中人瘡有三種一種瘡正黑如黶子皮周邊悉赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或晡間寒熱一種如火灼熛起此者最急數日殺人此病令人寒熱方

烏翣根二兩　升麻二兩

右二味切以水三升煮取一升適寒溫頓服之滓薄瘡上肘後千金文仲備急同古今錄驗云烏翣根用葉出第一卷中

千金療射工初中未有瘡但惜寒凜凜及其成瘡似蠼螋尿亦似瘭疽狀方

取芥子擣熟苦酒和厚塗瘡上半日痛便止古今錄驗同

又方

取狼牙葉冬取根枝擣之令熟薄所中處又飲四五合汁

又云山中草木上石蛭著人則穿齧肌肉行人肉中浸淫

石蛭蛭介聲一余作石也出山水陸溫草本土下同

墳起方

灸斷其道即愈

又凡入山路行草木中常以臘月猪膏塗脚足指間趺上及著鞋處蛭不敢著人

又江南毒氣惡核似射工暴腫生瘡五香散方

甲香　犀角屑　鱉甲炙令黃　薰陸香

升麻　烏翣根　吳茱萸　沉香

丁香各三分　黃連　羚羊角屑　牡蠣熬

甘草炙　黃芩各四分　黃蘗六分

右十五味為散水服方寸匕日三服又以雞子白和塗上乾易之以水和少許洗上忌莧菜猪肉海藻出第二十六卷中

救急療射工毒方

取葫蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方

取蜈蚣大者一枚炙擣末以苦酒和敷瘡上痛便止千金同

溪毒方二十一首

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一名中灑一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭

微痛目眶疼心中煩懊四肢拔焮腰背骨節皆強痾急兩膝疼或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日則腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不痒不令人覺視之乃知耳不即療過六七日下部膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒注下不禁八九日良醫所不能療之覺得之急當早視下部若有瘡正赤如截肉者爲陽毒最急若瘡如蠡魚齒者爲陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水當作數斗湯以小蒜五升㕮咀投湯中莫令太熱熱即無力去滓消息適寒溫以浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作他病療之 文仲千金翼備急同

又療中水毒方

取梅若桃葉擣絞取汁三升許爲二服或乾以水絞取汁極佳 集驗文仲備急千金同姚云小兒不能飲以汁敷乳頭與之

又方

取常思草擣絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部中日三差 文仲備急同

又方

擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝 文仲千金翼備急同

又方

取蓼一把擣以酒一升和絞服之不過三服 文仲千金翼備急云肘後用葉

又方

取大莓蓮根

右一味擣作屑服之亦可投水擣絞汁飲一二升并導下部生蟲者夏月常行多齎此屑欲入水浴先以少屑投水上流便無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中大佳 文仲千金翼備急同

又今東間諸山州縣人無不病溪毒無春月多得亦如京部傷寒之狀呼爲溪溫未必皆是射工輩爾亦盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便急耳方家療此用藥與傷寒溫疾相

相似今後疏其單療於此方

東向三兩步郎以手左一攪取水將蒜一把熟擣以酒漬之去滓可乾兩杯當吐得吐便差此方甚妙

備急療溪毒方

取五加根燒末以酒若漿服方寸匕 肘後文仲備急同

又方

燒鮀魚皮以飲服方寸匕立差

又方

荊葉擣汁飲之佳 肘後同

又方

謹按膠月鼓處上下有缺文

擣茱姑以塗之嚴背諸處茱姑生東間細葉如蒜狀

又方

自蒜一枚擣以酒和服半升得吐即差又名烏韭山中甚多

又若下部生瘡已決洞者方

取秫米一升鹽五升水一石煮作糜坐中即愈文仲備急同肘後並同

又方

取桃葉艾葉擣爛以水漬之縱取濃汁去滓著盤中坐有白蟲出差文仲備急同肘後云取桃皮葉熟煮

又方

燒皂莢擣末以綿裹導之

又方

以鹽和皂莢末擣之綿裹導之

又方

末牡丹屑以飲服方寸匕日三

又其土俗有療之術方

初覺便取溪蒜著苓桃葉剉一觔蒸使遍熱出布席上解衣卧上厚覆衣被大汗良久出拭之勿見風則差已五六日悉毒入腹不可救爾應先服藥肘後諸

邇按溪蒜埋理俱未足

山有大木名埋檀枝葉上似梨冬不凋剝取白皮皮重疊如紙撓破煮服一升日夜六七過無生者預取乾之亦單用茜根白蘘荷根藍青汁並佳若卒無根皮亦可單用藍汁可服之亦可都合煮取汁漬之若患腹中痛恐轉成蠱敵人腹藏者取豬脂二升熬令爍水一斗絞取汁稍稍服之並出第八卷中

千金療溪毒方

取大蒜十枚合皮安熱灰中炮令熱刀切斷頭以拄所著毒處文仲備急崔氏方

又方

雄黃 朱砂 常山各等分

右三味五月五日午時使童子擣合之出第二十六卷中

張文仲療溪毒方

取蓼擣取汁服一二升又以塗周匝差

又方

取雄牛膝根一把擣水酒共一升漬絞取汁飲之日三雄牛膝莖白紫色者是出第十卷中

沙蝨毒方六首

肘後中沙蝨毒論云山水間多有沙蝨其蟲甚細不可見人入水浴及汲水澡浴此蟲在水中著人及陰雨日行草

謹按爍爍二字疑誤

中即著人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺過三日之後令人百節強疼痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人凡在山澗水源浴畢熟以巾拭身中數過又以故帛拭之一過乃敷粉也今東間水無不有此洗浴畢以巾拭爍爍如芒毛針刺熟看見處仍以竹葉抄拂去之比見嶺南人初有此者即以茅葉刮去乃小傷皮膚爲佳乃數塗苦苣菜汁差已深者用針挑取得蟲子正如疥蟲著爪上映光方見行動也挑不得便就上灸三四炷則蟲死病除若止兩三處不能爲害多處不可盡挑灸若猶覺惛惛是其已大深便應依

土俗作方術出之并作諸藥湯以俗皆得一二升沙出沙出都盡乃止若無方術痛欲審酒取醉亦佳如其無則依此方爲瘃并雜用前中溪毒射工法急救七日中宜差不差則仍變成溪毒如莼葉大長四五寸初著腹脅腫如刺則破雞搨之蟲出食雞或三四數遍取盡乃止兼須服麝香犀角護其內作此瘃之彼土有中之者不少呼此病爲蚲呼故切沙蟲吳音名沙作蝨蔭如身長尾蓋者言此蟲能招呼溪氣東間山行無處不有其蟲著人肉不痛不即覺者久久便生子在人皮中稍攻人則爲瘦山行宜竹管盛鹽數視體足見者以鹽塗之便脫雖少石灰尤良亦斷血

謹按蚲讀如[illegible]字疑誤

而碎木溫

又瘃沙蝨毒方

以少許射香傳瘡上過五日不差當用巴豆湯服之一日輒以巴豆一枚二日二枚計爲數并去皮心以水三升煮取一升盡服之未差即更可作服之 文仲備急同

又方

斑貓二枚熬一枚研末服之燒一枚令煙絕末著瘡中 千金文仲備急同

又方

取麝香大蒜合擣以羊脂和著筒中帶之行大良 千金同

刪繁瘃沙蝨方

以鹽五合以水一斗煮一沸以漬洗瘡 出第十卷中

必效瘃沙蝨方

初著有赤點如米以鹽和麝香塗之差

犬咬人方九首

肘後犬咬人方

取竈中熱灰以粉上畢裹縛之 千金同

又方

乾薑末服二方寸匕薤汁服半升亦良

集驗療凡犬咬人方

以苦酒和灰塗之良千金同

千金療凡犬咬人方

燒犬尾灰敷之日二又燒自死蛇灰末敷瘡中

又方

燒東南枝白皮一握以水一升煮取五合服之

又方

莨菪子七枚以水服之日一度差止

又方

梅子末以酒服之

又方

以臘月鼠一枚以豬脂煎如膏去滓候凝以塗之

古今錄驗療凡犬咬人方

先以水洗瘡任血出勿止之洗勿住取血自止以帛裹之即差

狂犬咬人方二十二首

千金論曰凡春末夏初犬多發狂必誡小弱持杖預以防之而不免者莫出於灸百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心神中醒然方知咬已即狂是以深須知此此病至重世人皆輕之不以為意坐之死者每年常有之臣昔初學醫未以為業有人遭此將以問臣臣了不知報答以是經臣手而死者非一由此銳意學之一解以來療者皆愈方知世無良醫枉死者半此言匪虛故將來學者非必此法餘一一方皆須沉思留作心意勤學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知說極自誤也因方申此一言言不盡意耳

又療狂犬咬人方

蛇脯一枚去頭炙擣末服五分七日二

又方

服青布汁三升

又方

飲驢尿一二升良

又方

擣莨菪根和鹽以敷之日三度

肘後療猘犬咬人方

先嗍去惡血乃須灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百日乃止忌酒古今錄驗同千金文仲備急小品同

還按千金作壯也

又方

擣地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煑汁飲之過百日乃止日末服方寸匕日三兼敷瘡上千金同

又方

擣薤絞取汁敷之又服一升日三須瘡差乃止亦治已差後發者千金同

又方

以豆醬清塗瘡日三四差千金同

小品療狂犬咬人方

刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕已發狂如猘犬者服此藥即愈肘後同

又方

頭髮猬皮燒作灰末等分和水飲一盃若或已自赤口噤者可折齒灌之肘後千金同

又方

擣地黃汁飲之并塗瘡上過百日止肘後同

又療不差毒攻人須駈喚已作犬聲者方還按喚音黃多言動也

髑髏骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活止凡狂犬咋人七日輙應一發過三七日不發則免也要過百日乃爲大免每至七日即當擣薤一作韮汁飲二三升又當終身禁食犬肉蠶蛹若食此發則不可救之瘡未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及諸冷食但於飯下蒸生魚及就膩器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

又若重發者療之方

生食蝦蟆膾絕良亦可燒炙食之不必令其人知初得嚙便爲此則不發集驗文仲千金備急肘後同姚剝作膾吞蒜虀下也

又方

擣生薑汁一升以來服之佳

崔氏療狂犬咬人方

凡被狂犬咬即急嗍去血急吐之勿錯嚥之然後擣杏人和大蟲牙捻作餅子貼瘡上頓灸二七壯從此以後每日灸一兩壯貼杏人餅子灸之須要滿百日乃止百日內必莫使有差加無大蟲牙可單用杏人亦得狂狗咬人每至七日即合一發值至七日即須擣韭汁服一大合日再服之縱非至七日值一日兩日服一兩合大妙如冬月無可取韭根擣汁服之又三兩日取杏人一合擣碎熟研濾取汁和大蟲牙齒無牙齒骨亦可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合

以和杏人酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取所咬犬腦以塗瘡大佳取大蟲牙齒末或大蟲脂塗之便佳

又方

以大蟲骨灰和杏人膏以塗之甚良

又急療狂犬齧人無問深淺者方

初被咬便以冷水洗令血斷封裹著如其瘡大及深宜放流水中浸之血斷依法封裹更不用餘裹忌風千萬不畏凡初被咬即覓一切物與喫後不發也 出第八卷中

必効療狂犬咬方

梔子皮燒灰 石硫黃末

右二味擣為末敷瘡日一易 救急同

又方

取蚯蚓糞水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方

驢屎汁飲一升即差

又方

杏人去尖切 豆豉各一兩 韭根一握淨洗

右三味擣為餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作艾炷以灸餅上熱徹即差

又方

虎骨 石灰

右二味以臘月豬脂和作餅子暴乾擣末以敷之良 並出第六卷中

豬齧人方二首

千金療豬齧人方

鍊松脂貼上

又方

屋霤中泥以敷之 並出第二十六卷中

馬咋踏人方四首

肘後療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

灸瘡中及腫上即差

又方

取婦人月經敷之最良 姚云神効

集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

割雞冠血點所齧瘡中日三若父馬用雌雞母馬用雄雞 肘後同

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方

取馬鞭稍三尺鼠屎二七枚燒末以猪膏和塗之立

愈備急小品集驗必効古今錄驗同出第二十六卷中肘後云取馬鞭梢二寸

剌死馬馬骨傷人方三首

肘後療剌死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

取死馬腹中屎以塗之即差集驗千金備急古今錄驗小品同

集驗療剌死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

絞飲其矢汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今錄驗療剌死馬馬骨傷人手毒欲攻死方

服人屎汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方

以熱桑灰汁更番漬之常日為之冷即易數日乃愈

若痛止而腫不消煮炙石令熱以熨之灸瘡上亦佳

集驗千金同

又方

擣豚子以水絞取汁飲一升日三服

又方

酒漬馬目毒公少少飲之

小品療馬骨所刺及馬血入攻人瘡中毒痛欲死方

人糞泥之又擣馬莧敷之出第十卷中

刪繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方

馬糞乾者止一物粉瘡孔上揜瘡口也

又方

雄黃　乾薑

右二味等分擣末內瘡口中即差

又方

大小蒜擣熬煖用敷瘡上

又方

以熱湯數淋瘡上即差並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首

肘後療人體上先有瘡而乘馬馬汗及馬毛入瘡中或但

為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以豬膏和敷之備急千金集驗同

又方

以水漬瘡數易水漬之千金備急同

又方

以石灰敷上千金備急同

集驗療人先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡及拂略著致

令腫痛方

大飲醇酒取醉即愈肘後千金同出第八卷中

千金療馬汗入人瘡方

燒雞毛末以酒服方寸匕（集驗同）

又方

煮沸湯及熱以漬之冷復易之（小品同出第二十六卷中）

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最爲貴致遠之勞賢愚所要或在戎漠或居村落忽患急黃黑汗等諸疾將息水草之宜人間之要犬之君子所附卷末傳以意焉凡騎馬遠行初到先與空剉草刷畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并必致馬病也（出第九卷中）

肘後療馬熱蟲顙黑汗鼻中有膿脛水草不進方

黃瓜樓根　貝母　桔梗　大青

梔子仁　吳藍　款冬花　大黃

白鮮皮　黃芩　鬱金（各二大兩）　黃蘗

馬牙消（各四大兩）

右十三味擣篩患相當及常要啖重者藥三大兩地黃半斤豉二合蔓菁油四合和合齋前啖至晚飼大效

又蟲顙重者方

葶藶子（一合熬令紫色擣如泥）　桑白皮（一大握）　大棗（二十枚擘）

右三味以水二升煮取一升去滓入葶藶合調勻適寒溫灌口隔日又灌重者不過再差

又療馬脊瘡方

黃丹敷之避風即差

又療馬𥟃骨脹方

取四十九隻羊蹄燒之熨骨上冷即易之如無羊蹄楊柳枝指麤者炙熨之不論數差

又療馬後冷方

豉葱薑（各一兩）水五升煮取半和酒灌之

又療馬目暈方

霜後乾楮葉細爲末日兩度管吹眼中差

又療馬疥方

大豆熬焦和生油麻擣敷之醋泔淨洗

又方

樗根末和油麻塗之先以皂莢水或泔淨洗之洗了塗令中間空少許放蟲出不得多塗恐瘡大

又方

巴豆（去皮心）　膩粉

右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日看更驗

備急療驢馬蟲顙方

生地黃汁（一升）　桑根白皮（五兩）　紫菀（三兩）　射干（二兩）

麻黃（一兩）　葱白（一斤）　蒜（二合）　蜜（一合）

右八味切以水一斗五升煮取八升去滓內[illegible]
豆攪調作兩度灌之當灌無取早朝食時飲水三分與
一分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與
之其藥更加地黄及葱白豉以水三五升煮取多少
依前加麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭
勿使藥汁射肺則藥汁不出若藥入即不得用全扇
每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌
之若神強頻日灌之若輕者三兩度灌之即差灌後三
兩日伺候看鼻中膿絕鼻斷即差如不斷用後法桑白
皮一斤細切以水三升煮取一升去滓每旦灌鼻孔中

灌時入研麝香一豆大佳

又馬盡方

大黄 黄芩 鬱金 當歸
芍藥 紫菀 芎藭 白术
牛膝 細辛各一兩

右十味合擣末用湯調方寸匕以灌之

又療馬急黄黑汗方

割上斷訖取陳久瓠瓜頭水漬汁灌口如不足用大
黄當歸各一兩鹽半升以水三升煎取半分兩度灌
口如不定破開使骨縫血即止[illegible]

又療馬起臥胞轉并腸結並用此方

細辛 防風 芍藥各一兩 鹽一升

右四味切以水五升煮取二升半去滓分二度灌後
前灌方

芒硝 鬱金 寒水石 大青各一兩

右四味切以水五升煮取二升去滓以油酒各半升和
調分二度灌口前後同

又療馬心黄并肺熱方

大黄 黄芩 芍藥 細辛各一兩

右四味切以水五升煮取二升半油半升酒半升調和

分為三度灌口如不定鹽半升水一升半溫如人肌和
鹽灌後即定

又春冬灌馬方

大黄 鬱金 黄芩 細辛
芍藥 桔梗 升麻 麻黄
大青 茵陳 白术 芒硝
寒水石 朴硝各一兩

右十四味擣為散若春灌即和雞子油量水多少攪調
灌口若冬灌即切以煎之訖冷和油及酒灌口

又療馬蟲頓十年以上灌鼻一兩度無不差方

臣按背膽牛膽皆指牛膽此方云膽是指牛膽皆可用也

膽清和膽半合攪令調分兩度灌鼻每一灌停一兩
日將息不得傷多多即傷馬故錄之令知（肘後同）
又療馬蟲顙方候馬鼻沫出梁腫起即不可療
硇砂（二錢研許）　棗（一顆）　猪脂（臘月者二雞子許）
右二味先研硇砂令極細為末然後煮猪脂及硇砂煎
沸停如人肌高仰馬鼻以灌之一炊久若患一鼻減
藥之半兩鼻患兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻
後一二日更有熏法如後貫君子別擣蔡蘆殼稍草乾
臁葶藶子別擣各等分為末相和以麻撚如燭燒一頭
內馬鼻中令煙入效仍仰馬頭令稍高

又療馬騾胞轉欲死方
擣蒜內小便孔中深五寸立差又用小兒尿和水灌
口立差
又方
騎走上坡用木腹下來去擦以手內大孔中探却糞
大效探法剪却指甲以油塗手恐損破腸也（肘後同）
又方
但以鹽四升人尿和灌口
又方
擣蒜三升啖之小馬分半

又療馬患月怜方
取兒微熱接揩之立差兒微如地菌夏月得濕多聚
生糞中見日消黑者是
又療馬食著地膽等蟲瓶困脹悶立死方
取桑根入地一尺者去黃皮剉之以水煎取濃汁急
灌口止妻勝茸草
又療馬嗽方
取麻子一斗飼之立定若脛及色焦與喫即光澤（肘後
同）
又馬跙蹄方

於馬蹶下當馬前腳闊一尺許掘渠深一尺許取石
如雞子許大滿中填貫令馬立其上兩日即差（肘後同）
又馬每月一兩度灌油鹽永不著黃方
以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之
又馬脊瘡方
取馬通汁及熱遍瘡上塗之
又療馬疥方
雲花草（一兩狀如粟黃而堅實）　藜蘆（二兩）　附子（一枚用二兩陳者）
右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時
令水乾後傅藥不過五六遍無不差韓五家盛談効驗

但苦不識雲花 出第九卷十

又療馬筋瘙方

硇砂 藜蘆 梔子 葶藶子各半兩

雄黃 石硫黃 黃蘗 巴豆

烏麻各少許 蜜 猪膏各半兩

右十味擣為末蜜猪膏和藥如泥傅瘙方

又方

取一杯酒醉并黍米等相和令調塗布上重裹上用麻緶纏數先以鹼漿汁洗病拭乾塗藥日再差止

牛狗疾方六首

肘後療牛疫病方

取獺屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良

又療牛馬六畜水穀疫病方

取酒和麝香少許和灌之

又療六畜脊瘡焦痂方

以麫糊封之即落

又療牛脹方

以猪脂和小兒屎灌口差

又療牛喫苜蓿草誤喫地膽蟲肚脹欲死方

以研大麻子灌口差吹生葱亦佳

救急療犬疥方

蛇皮燒灰和粥與喫差 出第九卷中

牛觝腸出方一首

救急療牛觝觸腸出方

硇砂一大兩 乾薑一小兩

右二味為末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處乾用桑榖葉為末以敷之即却入大良神妙 出第九卷中

油衣粘及松脂著人衣蟲蝕氊罽法五首

救急油衣粘法

以黃土泥水和如煎餅麪表裏塗之陰乾一宿以水

濯去之不粘也

又氊被蟲蝕方

取吳茱萸擣末和麪作糊塗氊罽兩頭蒸吳茱萸汁刷之其蟲永斷

又氊被蟲蝕方

刈取青蒿有子者暴乾鋪氊中卷之令遍置閣上十年不蝕

又松脂著人手足及衣氊罽洗不去法

以嚼杏人洗之立去除采色衣物等若車脂及油膩等米研煮作飲洗之即不損非紫碧綠 一云車脂膩粟以水洗之

煎以溫水洗之極驗

又方

煮水便和皂莢洗之以溫洗亦佳以鹽和湯洗之平

復不損色並試有功雖是小事亦爲切要以附之服

餌之末　出第九卷中

熙寧二年五月二日准　中書劄子奉

聖旨鏤版施行

朝奉郎守國子博士同校正醫書騎都尉賜緋魚袋臣高保衡

朝奉郎守尚書屯田郎中同校正醫書騎都尉臣孫奇

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億

朝散右　諫議大夫參知政事護　軍開國侯食邑

一千一百戶賜紫金魚袋臣王　安石

推忠佐理功臣正奉大夫行右諫議大夫參知政事上柱國南

陽郡開國侯食邑一千戶賜紫金魚袋臣趙　抃

推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尚書左僕射兼門下侍郎同中書

門下平章事集賢殿大學士上柱國魯國公食邑一萬二千百戶食實封參阡捌伯戶臣曾　公亮

推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尚書右僕射兼門下侍郎同中書

門下平章事昭文館大學士監修國史兼譯經潤文使上柱國[illegible]國公食邑[illegible]

食實封[illegible]

重訂唐王燾先生外臺秘要方第四十卷終

類證普濟本事方十卷

（宋）許叔微撰

清乾隆十五年芸暉堂鈔本

類證普濟本事方十卷（浙江巡撫採進本）

宋許叔微撰。叔微字知可，或曰揚州人，或曰毗陵人。惟曾敏行獨醒雜志作眞州人。二人同時，當不誤也。紹興二年進士。醫家謂之許學士。宋代詞臣率以學士爲通稱，不知所歷何官也。是書載經驗諸方，兼記醫案，故以本事爲名。朱國楨湧幢小品載叔微嘗獲鄉薦，春闈不利而歸，舟次平望，夢白衣人勸學醫，遂得盧扁之妙。凡有病者，診候與藥，不取其直。晚歲取平生已試之方，并記其事實，以爲本事方。取本事詩之例以名之云云。卽指此書。然考獨醒雜志，叔微雖有夢見神人事，而學醫則在其前，不知國楨何本也。叔微於診治之術，最爲精詣。故姚寬西溪叢語稱許叔微精於醫，載其論肺蟲上行一條，以爲微論。其書屬詞簡雅，不諧於俗，故明以來不甚傳布。此本從宋槧鈔出，其中凡丸字皆作圓，猶是漢張機傷寒論金匱要略舊例也。國楨又記叔微所著尚有擬傷寒歌三卷，凡百篇；又有治法八十一篇，及仲景脈法三十六圖，翼傷寒論二卷，辨類五卷。今皆未見傳本，疑其散佚矣。

類證普濟本事方目錄

許學士 親述

第一卷
治藥制度總例
治中風肝胆筋骨諸風病
真珠圓
獨活湯并論證
星附散
二生散
稀涎散
勝金圓
拒風丹并論證
續斷圓
署預圓
獨活散
地黄酒
防風湯
竹瀝湯
防己湯
木瓜煎并論證
地黄圓
羚羊角湯
烏頭圓并論證
鐵彈圓
黑神圓
定風餅子
伏神散
鱉甲圓
防風湯
人參散
治肝虚發熱方
第二卷
治心小腸脾胃諸病
遠志圓
伏神散
寧志膏
驚氣圓
辰砂遠志圓
茯苓圓
火府丹
七珍散
鞠朮圓
白朮湯
二神圓
温脾散
治肺腎經病
棗膏圓
五味子圓
葶藶圓
紫金丹
細辛湯
升麻湯
五靈圓并論證
香茸圓又二方
椒附散并論證
麋茸圓并論證
地黄圓
青鹽圓
補益虚勞方
人參圓
五味子圓
黑錫圓
雙和圓
八仙
石斛散
治頭痛頭暈方
川芎散
鈎藤散
玉真散
治氣虚頭痛方又二方
白芷圓
白附子散
羚羊角散
養正丹
黑龍圓
第三卷

治風寒温痺白虎瀝節走注諸病
續斷圓　增損續斷圓
粥法并論證　薏苡人散
芎附散　麝香圓
麻黄散　茵芋圓
牛蒡子散　草麻法
栢葉散　緑靈散
趂痛圓　烏頭圓并論證
治風痰停飲痰癖欬
化痰圓　三生圓
旋覆花湯　檳榔圓
乾姜圓　芫花圓并論證
紫蘇散　訶子湯
貝母湯
治積聚凝滯五噎鬲氣
緾金湯　枳殻湯散
訶子圓　硇砂圓
紫金丹　感應圓
枳殻散　鬲氣圓
薫鬲圓
治膀胱疝氣小腸精漏諸病
念珠圓　硇砂圓
金鈴圓　治小便難小腸脹方
茴香散并論證　金鎖丹
清心圓　猪苓圓
第四卷
治反胃嘔吐
附子散　鯽魚散
枇杷散　白术散
竹茹湯　青金丹
香靈圓　訶子圓
麴蘗圓并論證　陳麴圓
木香圓　温脾湯
治虛熱風壅喉閉清利頭目諸病
乾姜圓　白术散
靈砂丹并論證　木香散
五味子散
利鬲湯　川芎散
芎辛圓　通鬲湯圓
門冬圓　千金地黄圓
人參散　清氣散
柴胡散　地仙散
治腫滿水氣蠱脹諸病
葶藶圓　実脾散

羌活散　大棗湯
茯苓散　又方
知母湯并論證
治腎臟風及足膝腰腿脚氣諸病
腎風攻注脚膝方并論證　烏頭圓
虎骨酒　拱柳湯
地黃圓　續斷圓
續骨丹　茵芋圓
薏苡仁圓并證論　鹿茸圓
藥棊子
第五卷
治腸風痔漏臟毒下血諸病
玉屑圓并論證　蒜連圓
槐花散　椿皮圓
腸痔下血二方　黃芪圓
鱉甲圓　又方
治衄血吐血咯血諸病
茜梅圓　三黃散
又方　治鼻衄方
天門冬圓　黃芪圓
扁豆散　神傳膏并論證
治眼目頭面口齒鼻舌脣耳諸病
羊肝圓　又方
又方并論證　菊花散
地黃圓并論證　治頭風冷淚二方并證
犀角升麻湯并論證　治鼻塞腦冷方
鼻赤酒瘡方二方　木舌腫脹方
口生瘡方　魚骨鯁方
玄參散　紅綿散
黃芪圓　地黃湯
黃芪湯
第六卷
治欬虛汗消渴諸方
杏酥飲　柏子仁圓
牡蠣散　防風湯二方
消渴方　神效散并論證
腎氣圓并論證　三痛圓
治金瘡癰疽打撲諸瘡破傷風諸病
地黃散　劉寄奴散并論證
芸薹散二方　水仙散
拱柳散　地黃膏并論證
柞木散　歛瘡內消方
七寶散又方　太白膏
國老膏　黃芪散

生犀散
內托散
玉真散
第七卷
諸疰飛尸鬼疰
制諸虫方
白薇湯
枳實散
枳殼煮散
桂枝散
治頭面昏痛
治諸雜病
諸病證 計一十一件
第八卷
治傷寒時疫
桂枝湯
桂枝加附子湯 并證
大柴胡湯 并論證
黃芪建中加當歸湯 并證
破陰丹 并證
海蛤散
白虎加人參湯
黃芪圓
癰疽發背 共三方
雄硃散 并論證
倉公散
葛根湯
薏苡仁圓
芎葛湯
麻黃湯 并論
桂枝加厚朴杏子湯
白虎加蒼朮湯 并論
蜜兌法
小柴胡加地黃湯 并證
真武湯
肉豆蔻湯
良姜湯
滑石湯
茵蔯蒿湯
第九卷
治傷寒
結胸灸法
桂枝麻黃湯證
破陰丹證 方在前
麻黃湯證 方在前
太陽陽明合病證
葛根湯 并證
玉元散
五勝散
玉女散
陰毒沉困候
第十卷
治婦人諸疾
四物湯
內補圓
白朮散
下死胎方
通經圓
又方
桂枝湯證論 方在前
瓜蒂散 并證
鵲石散
抵當圓
補脾湯 并證
小柴胡湯 并證
小承氣湯證
陰毒形證
退陰散
陰毒漸深候
還陽散
辨少陰脉緊證
枳殼散
木香圓
紫蘇飲
紫石英圓
地黃圓 并證二方

琥珀散　桃人煎并證
佛手散　崩中下血二方
愈風散并證　交加散
治諸癜淋方　半夏散
蒲黄散　護胎二方
芎羌散　麻蘇粥法
當歸散　大棗湯
鹿屑湯　療死胎不下并胞衣方
治小兒諸病
小兒形證　睡驚圓
麥門冬散　白朮散
調中圓　芎朴圓
消積圓　捻金散
扁銀圓　醒脾圓又方
人參散　蚵蚾圓
龍齒散

類證普濟本事方目錄終

類證普濟本事方卷第一

治中風肝胆筋骨諸風

治肝經因虛內受風邪卧則魂散而不守狀若驚悸

真珠圓

真珠母三分研細同碾　當歸　熟地黃各一兩半
人參　酸棗仁　柏子仁各一兩
犀角　伏神　沉香
龍齒各半錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十丸金銀薄荷湯下日午夜卧服

獨活湯

獨活黑者　羌活　人參　防風
前胡　華陰細辛　五味子　沙參
白茯苓　半夏　酸棗仁　甘草各一兩

右為粗末每服四大錢水一盞半生姜三片烏梅半箇全煎至七分去滓不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每卧則魂魄飛揚覺身在床而神魂離体驚悸多魘通夕無寐更數醫而不效予為診之視詢曰醫作何病治董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝經因虛邪氣襲之肝藏魂者也游魂為变平人肝不受邪故則魂歸于肝神靜而得寐今肝有邪魂

不得歸是以魂揚若離体也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉疴去体矣願求藥法予曰公且持此說與衆醫言所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方書無與病相合對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方大抵以真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第一龍齒與肝同類故也龍齒虎睛今人例以鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各有類也東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎血也屬肺而藏魄龍能變化故魂而游不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已

治中風雖能言口不喎斜而手足嚲曳脉虛浮而數風中腑也蓋風中脉則口眼喎斜風中腑則肢体癈風中臟則性命危凡風中府宜汗而解

星附散

天南星薄切　白茯苓　川烏　人参

白附子　白僵蚕　没藥

黑附子　半夏薄切姜以上各汁浸透等分

右為粗末每服二錢水酒各一盞同煎至八分去滓熱服二三服汗出差頃在桐廬有人患此證三投此藥得汗手足能舉

治体虛有風外受虛温身如在空中

二生散

生附子　生天南星各等分

右二味㕮咀每服四大錢水一盞半生姜十片煨火煎至八分去滓服戊午年予在新安有此疾張醫博子發授此方三服愈

治中風忽然昏若醉形体昏悶四肢不收風涎潮于上鬲氣閉不通宜急救

稀涎散

猪牙皂角四挺肥實不蛀者去黑皮

晉礬光明者一兩

右細末研勻輕者半錢重者三字匕温水調灌下不大嘔吐但微微冷涎出一二升便得惺惺次緩而調治不可便大段亦恐過傷人孫兆方

治中風同前證

勝金圓

生薄荷半兩　猪牙皂角二兩搥碎水一升二味一處挪引汁熳火熬成膏

瓜蒂末一兩　藜蘆末一兩

硃砂半兩研

右將硃末一分與二味研勻用膏子搜和丸如龍眼大以餘硃為衣温酒化一丸甚者二丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金

虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如鋸牙關緊急或閉
不行湯藥不能入命在須臾執以無吐法可乎但不
當用銀粉藥恐損脾壞人四肢耳予常用此三方每
有驗

治一切風

拒風丹

川芎四兩　防風一兩半　天麻一兩

甘艸　細辛三錢半　畢撥半兩

右細末煉蜜和杵每服作三十丸每日服一粒細嚼
荊芥湯或溫酒下尋常些小傷風頭痛鼻塞項強筋
急皆可服予家常合老幼所須之藥

世言中氣者雖不見于方書然暴喜傷陽暴怒傷陰
憂愁不意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞
牙關緊急若概作風中候用藥非止不相當多致殺
人元祐庚午母氏親遭此禍至今飲恨母氏平時食
素氣血羸弱因先子捐館憂惱忽一日氣厥牙噤涎
潮有一里醫使作中風以大通丸三粒下之大下數
行一夕而去予常痛恨每見此證急化蘇合香丸四
五粒灌之便醒然後隨其虛實寒熱而調治之無不
愈者經云無故而瘖脉不至不治自已謂氣暴逆也
氣復則已審如是雖不服藥亦可　范子默記崇寧
中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共
灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地倉百會
肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依而
用之無不立效

元符中一宗人得疾逾年不差謁醫于王思和繹思
和具脉狀云病因驚恐肝臟為邪邪來乘陽明之經
即胃是也邪盛不畏勝我者又來乘肺肺緣久病氣
弱全無聽受肝凌侮其病時復頭眩瘈瘲搐掣心胞
伏涎久之則害脾氣要當平肝氣使歸經則脾不受
尅脾為中州土主四肢一体之事脾氣正則土生金
金旺則肺安矣今疾欲作時覺氣上衝者是肝侮肺
肺不受侮故有此上衝者肝勝則復受金尅故搐搦
也以熱藥治之則風愈甚以冷藥治之則氣已虛肺
屬金々為清化便覺臟腑不調今中和溫藥抑肝補
脾漸可安愈今心忪非心忪也胃之大絡名曰虛里
絡胸鬲及兩乳間虛而有痰則動須臾時發一陣熱
者是其候也服下三方一月而愈思和名繹寓儀真
時人少知者後至都下赦名籍甚為醫官政和中度
為黃冠終藥珠侍晨

續斷湯

續斷　杜仲　細辛　白茯苓

牛膝　肉桂　防風　白芍藥各一兩

甘艸　當歸　人參　川芎々

秦艽　川獨活　熟地黃各三兩
右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚仝煎
至七分空心食前稍熱服

薯蕷圓

薯蕷　人參　沙參　遠志
防風　真珠母　紫石英水飛研　伏神
虎骨各一兩　虎睛一對二味須真者　龍齒　石菖蒲
細辛華陰者　五味子　丹參
右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸至五十
丸金銀薄荷湯下食後臨卧服

獨活散

川獨活　白朮　白茯苓　葳蕤
秦艽　栢子仁　甘草各一兩　犀角
川椒　熟地黃　枳實　白芷
官桂各半兩　人參一錢
右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚同煎
至七分不拘時服

治風在肝脾語塞脚弱大便多秘地黃酒

熟地黃四兩　附子　茵芋　羌活
防風　芎藭各一兩　石斛二兩　丹參二兩半
牛蒡根二兩半　牛膝　杜仲　桂枝各兩半
大麻子一升
右細剉入絹袋盛寬貯之用無灰酒一斗九升封漬
七日逐日空心食前飲一盞常醺勿令吐

治中風內虛脚弱語塞

防風湯

石斛一兩半　乾地黃　杜仲　丹參各一兩一分
防風　川芎　麥門冬　桂心
川獨活各一兩
右為粗末每服五錢水一大盞半棗二枚同煎八分
去滓溫服

治中風入脾肝經年四肢不遂舌強語塞

竹瀝湯

威靈仙　附子　桔梗　防風
蔓荊子　枳殼　川芎　當歸各等分
右為粗末每服四錢水一盞竹瀝半盞姜三片仝煎
至七分去滓溫服日三四忌茗

治久風邪入肝脾二經言語不轉

防己湯

漢防己　防風　桂心　附子各半兩
威靈仙　麻黃半兩
右為粗末每服四錢水一盞引子半盞煎至七分去
滓溫服日三四引子用竹瀝荊瀝地黃汁各一盞生
姜汁半盞和勻用之以上四方龐先生傳審而用之

良驗
治筋急項强不可轉仄
木瓜煎
宣州木瓜二個取盖去穰　沒藥二兩研　乳香一分研
右二味入于木瓜内盖子合了竹簽定飯上蒸三四
次爛研成膏子每服三五匙地黄酒化下生地黄汁
半盞無灰上醖二盞和之用八分一盞煖熟化膏有
人患此病自午後發黄昏時定予曰此患先必從足
起經言十二經絡各有筋惟足少陽之筋自足至項
大抵筋者肝之合也日中至黄昏天之陽陽中之陰
也又曰陽中之陰肺也自離至兊陰旺陽弱之時故
靈寶畢法云離至乾腎氣絶而蕩肝氣弱肝腎二臓
受陰氣故發于是時予授此方三服而愈同官歙丞
張揆常言其内子昔患筋攣脚不渇屈伸者踰年動
則令人持抱求竪于泗水楊吉老云此筋病宜服下
三方服一年而愈
治筋極養血地黄圓
熟地黄一錢　頑荆一分　山茱萸五分　黑狗脊炙
地膚子　白术　乾漆　蠐螬乾炒
天雄　車前子各三分　萆薢　山羊
澤瀉　牛膝
右細末煉蜜和杵如梧子大每服五十丸温酒下空
心夜卧服
治筋痺肢節束痛
羚羊角湯秋服之
羚羊角　桂枝　附子
獨活各一兩三錢半　白芍藥　防風　芎藭各一兩
右爲粗末每服三大錢水一盞半生姜三片同煎至
八分取清汁日服二三服
治寒冷濕痺留于筋脉攣縮不得轉仄
烏頭湯冬服之
大烏頭　細辛　川椒　甘艸
秦艽　附子　官桂　白芍藥各七分
乾姜　白茯苓　防風　當歸各一兩
川獨活一兩三錢半
右爲粗末每服三錢水一盞半棗二枚仝煎至八分
去滓空心食前服
凡中風用續命排風風引竹瀝諸湯及神精丹茵芋
酒之類更加以炙無不愈者然此疾積習之久非一
日所能攻皆大劑久而取效唐書載王太后中風喑
默不語醫者蒸黄芪數斛以薰之得差盖此類也今
人服三五盞求效責醫也更矣孟子曰七年之病三
年之艾久而後知耳
治一切癱瘓風

鉄弹圓

乳香　沒藥各一兩　川烏一兩半　五靈脂四兩

右先将乳香沒藥于陰凉處當風細研更用研了麝香一錢将下二味爲細末然後同前二味再碾再研滴水爲丸如彈子大磁盒收每服一丸薄荷酒磨下日用三服

黒神圓

草烏頭不去皮生　五靈脂各等分

右爲末六月六日滴水爲丸如彈子大四十歲以下分六服病甚一丸分二服薄荷酒磨下覺微麻爲度

治風客陽經邪傷腠理背脊強直口眼喎斜体熱悪寒痰厥頭痛肉瞤筋惕辛頞鼻渊及飲酒過多嘔吐涎沫頭目眩運如坐車舡常服辟五邪傷寒辟霧露癉氣與恵神志諸風不生定是餅子

天麻　川烏　南星　半夏

川姜　川芎　甘草　白茯苓等分並生

右細末生姜汁爲丸如龍眼大作餅子生硃爲衣每服一餅細嚼熱生姜湯下不拘時候澳豊閻王丞相常服預防風疾神驗

治胆虚冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶

伏神散

伏神兩　遠志　防風　細辛

白朮　前胡　人参　桂心

熟地黄　甘菊花各三分　枳殻半兩

治胆虚不得眠四肢無力

鼈甲圓

鼈甲　人参　黄芪　酸棗仁

牛膝　羌活　五味子各等分

右爲細末煉蜜杵丸如梧子大每服三四十丸酒下

治胆虚目暗喉痛唾數眼目眩冒五色所障夢見被人訟恐慎面色変青

補胆防風湯

防風一錢　人参六分　細辛五分　芎藭

甘草　伏神　獨活　前胡各八分

右爲粗末每服四大錢水一盞半棗二枚煎至八分去滓食前服

治胆虚常多畏恐不能獨卧如人捕狀頭目不利

人参散

人参　枳殻　五味子　桂心各三分

栢子仁　熟地黄各一兩　山茱萸　甘菊花

伏神　枸杞子各三分

右爲細末每服二錢温酒調服

治肝厥狀如癇疾不醒嘔吐醒後頭虚暈發熱方

麻黄　鈎藤取皮　石膏

乾葛　半夏麯　柴胡
甘草　枳殻　甘菊各等分
右為粗末毎服四錢水盞一半生姜三片棗一枚同
煎至八分去滓温服

類證普濟本事方卷之一終

類證普濟本事方卷第二

治心小腸脾胃病

治因驚言語顛錯不能服温藥宜

遠志圓

硃砂半両入藥少許全研　金箔五片　遠志　南星
白附子　白茯苓　酸棗仁　人參各半両
右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣毎服三十丸
薄荷湯下食後臨卧服

伏神散

伏神　熟地黄　白芍藥
川芎　當歸　桔梗
白茯苓　遠志　人參各等分
右為細末毎服二錢水一盞燈心棗同煎至七分不
拘時服　宋明遠教授毋七十四歳因戎馬驚疾如
上證服此二方得力

寧志膏

人參一両　酸棗仁一両　辰砂半両　乳香一分
右為細末煉蜜為丸如彈子大毎服一丸薄荷湯化
下　予族弟婦縁兵火恐驚此方與之服二十丸愈
親舊多傳去服之皆驗

治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則
精神若痴

驚氣圓

附子　南木香　白僵蚕　花蛇
橘紅　天麻　麻黄各半两　乾蝎一分
紫蘇子一两　天南星洗浄切薄片姜汁浸一夕用半两
硃砂一分留少許爲衣

右爲末入研腦麝少許同研极匀煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下温酒亦可

此予家秘方也戊申年軍中一人犯法褫衣将受刃得釋神失如痴予與一丸服訖而寐及覺病已去矣二東提轄張載揚其妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黄山沃巡檢彦其妻狂厥者踰年更十餘醫而不驗予授此方去附子加鉄粉亦不終劑而愈鉄粉非但化涎鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪太盛鉄粉能制伏之素問云陽厥怒狂治以鉄落飲金克木之意也此亦前人未嘗論及

安神鎮心治驚悸消風痰止頭眩

辰砂遠志圓

石菖蒲　遠志　人參
川芎　山芋　鉄粉
天麻　半夏麯　南星剉骰子大麩炒黄
白附子各一两生　細辛　辰砂各半两

右爲細末生姜五两取汁入水煑和丸如菉豆大別以硃爲衣乾之每服二十粒夜卧生姜湯下小兒減半服

茯苓圓

辰砂　石菖蒲　人參　白茯苓
遠志　伏神　南星牛胆製各等分
真鉄粉　半夏麯

右爲細末生姜四两取汁和水煑糊丸如梧子大別用硃爲衣乾之每服十粒加至二十粒夜卧生姜湯下上二方堅官都君子嘗用以療心疾良驗

治心驚熱小便澁及治五淋

火府丹

生乾地黄二两　木通　黄芩各一两

右爲細末煉蜜杵丸如梧子大每服三十丸木通煎湯下此藥治淋澁臍下滿痛

壬戌年一卒病渴日飲斗水不食者三月心中煩悶時已十月予謂心經有伏熱與此藥數服五十粒温水下越二日不覺来謝云當日一服渴止又次日三服飲食如故此本治淋用以治渴信知用藥要在变通也

開胃養氣進飲食七珍散

人參　白术　黄芪蜜水拌炙　山芋　甘草
粟米微炒　白茯苓各一两

右為粗末每服二錢水一盞姜棗仝煎至七分如故
不思飲食加白扁豆一兩蒸用名八珍散
予製此方溫平不熱每有傷寒瘧疾中暑得差之後
用此以調脾胃日三四服十日外飲食倍常

治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛

麯朮圓

神麯十兩微炒　白朮五兩土炒　乾姜
官桂　川椒　吳茱萸各二兩

右爲細末薄糊丸如梧子大每服三五十丸生姜湯
下食前稍空服有飲加半夏麯二兩癸丑亥中予作
數劑自服飲食倍進

和氣調中進飲食白朮湯

白朮　厚朴　桂心
桔梗　乾姜　人參
當歸　茯苓　甘草各等分

右為粗末每服四錢水一盞半棗二枚煎至八分去
滓不拘時服應老方

治腰腎虛弱全不進食

二神圓

破故帋四兩炒　肉荳蔻二兩生

右爲細末用大肥棗四十九枚生姜四兩切片同煑
棗爛去姜取棗剥去皮核肉用研爲膏入藥和杵丸
如梧子大每服三十丸鹽湯下有人全不進食服補
脾藥皆不效予授此方服之頓然能食此病不可全
作脾虛蓋腎氣怯弱真元衰劣自是不能消化飲食
譬如鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不熟
其何能化黄魯直常記服兔絲子淘淨酒浸曝乾日
炒數匙以酒下十日外飲啖如湯沃雪亦此理也

溫脾散

舶上茴香炒　青皮　陳皮　縮砂仁
桔梗　香白芷　厚朴各一兩　木香
白朮　香附各半兩　甘草一兩半　紅豆
良姜　麥芽　乾葛各三分

右為粗末每服一錢水一盞棗一枚煎七分食前服

治肺腎經病

肺之積名曰息賁在右脇下大如杯令人洒淅寒熱喘
欬發癰疽

棗膏圓

葶藶　陳橘皮　桔梗各等分

右先以下二味爲末入葶藶研勻煮肥棗肉和丸如
梧子大每服五七丸飲下予常患停飲久漬肺經食
已必嚏漸喘覺肺系急服此良驗

平肺氣補虛消飲五味子圓

五味子二兩　桂心　大杏仁

青皮　細辛　人參
檳榔煨各一兩　乾姜炮　附子各半兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒下或
湯下空心食前日三服
定喘急肺積葶藶圓
苦葶藶一兩一錢　當歸　肉桂　白蒺藜
乾姜　川烏頭　吳茱萸　鱉甲
大杏仁　白茯苓　人參各半兩　檳榔一兩
右爲細末煮棗肉和杵丸如梧子大每服二三十丸
姜棗湯下日三四服不拘時
治多年肺氣喘急紫金丹
信砒半錢研　豆豉蒸爛少成膏
右用膏子和砒同杵極勻丸如麻子大每服十五丸
小兒量大小與之並用臘茶　臨卧以知
爲度有一親戚婦人患十年而醫者皆不効忽有一
道人貨此藥漫贖一服是減半數服頃愈遂多金丐
得此方予屢用以救人特爲神異
治肺虛實不調鼻塞多涕咽中有涎而喘項强筋急或
痛細辛湯
細辛　半夏麴　茯苓
桔梗各四錢　桂枝三錢　甘草二錢
右爲粗末每服四錢水二盞生姜四片蜜半匙同煎
至七分溫服日三服
治肺癰吐膿血作臭氣胸背皆痛
升麻湯
川升麻　桔梗　薏苡仁　地榆
子芩　牡丹皮　芍藥各半兩　甘草三分
右剉粗末每服一兩水一升半煎五合去滓日三服
治肺嗽久不息貴五靈圓
五靈脂二兩半　木香半兩
馬兜鈴一分去殼炒　葶藶一分
右爲細末棗肉和丸如梧子大每服二十丸生姜湯
下日三服
脾惡溼腎惡燥如硫黃附子鍾乳錫丹之類皆剛劑
人用之以助陽補接真氣則可若云補腎則正腎所
惡者古人製方益腎皆滋潤之藥故仲景八味丸本
爲之腎氣丸以地黃爲主又　腎　陽之類皆正補
腎經也近世盛行香茸丸可補腎經亦有數方具後
蔡太師所服香茸圓
鹿茸　熟地黃各二兩　附子　蓯蓉
破故紙　當歸各一兩　沉香半兩　射香一錢
右爲末入麝研勻煉蜜杵丸如梧子大每服三五十
丸空心鹽湯下
又方

鹿茸二兩 沉香 人參 白芍藥
熟地黃 生地黃 茯苓 牛膝
澤瀉 大附子 當歸各一兩 射香一錢
右爲細末酒糊丸如梧子大每服五十丸鹽酒鹽湯下

又方

熟地黃五兩 兎絲子四兩別末 鹿茸三兩
附子二兩 沉香
右爲細末入麝半錢煉蜜杵丸如梧子大每服三十丸至五十丸鹽酒鹽湯下

治腎氣上攻項背不能轉移

椒附丸

大附子一枚六錢以上者炮去皮臍末之
右每末二大錢好川椒二十粒用白麪填滿水一盞半生姜七片同煎至七分去椒入鹽通口空心服
一親患項筋痛連及背皮脾不可轉移服諸風藥皆不效予嘗憶千金鑫有腎氣攻背予强證與之兩服頓差自後與人皆有端驗蓋腎氣腰自夾脊上至曹谿穴然後入泥丸宮曹谿一穴非精于搬運者不能透今逆行至此不得通用椒以引歸經則安矣蓋氣上達椒下達詩言椒聊且貽我握椒皆此意矣

治腎經虛腰不能轉仄

麋茸圓

麋茸一兩如無以鹿茸代之
兎絲子取末一兩 舶上茴香半兩
右爲末以羊腎一對法酒煑爛去膜研如泥和丸如梧子大陰乾如腎膏少入酒糊佐之每服三五十丸溫酒鹽湯下
戊戌年八月淮南大水城下浸灌者連月予忽臟腑不調腹中如水吼數日調治愈自此腰痛不可屈折雖頮面亦相妨服遍藥不效如是凡三月予後思之此必水氣陰盛腎經感此而得乃灸腎俞三七壯服此藥差

治腎虛或時脚腫兼治脾圓

地黃圓

熟地黃二兩半 肉茯苓 白茯苓
澤瀉各三兩 桂枝 附子各半兩
五味子 黃芪獨莖者一兩
右爲細末煉蜜杵丸如梧子大每服四五十丸空心酒下食前再服

治腎虛足膝無力

青鹽圓

茴香三兩 兎絲子末四兩 乾山藥三兩 青鹽一兩
右將兎絲洗淘無灰酒浸日中煎七日冬天近火煨之晒乾別末將餘藥末和勻酒糊丸如梧子大每服

三五十丸鹽酒鹽湯下予頃常服數年力壯食加有
一婦人足弱曳因服此藥履地如故
補益虛勞方
治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充悅肌膚進美飲食
宜五味子圓
五味子　川巴戟　肉蓯蓉　人參
兔絲子　熟地黃　覆盆子　白朮
益智仁炒　骨碎補洗去毛
牡蠣以上各等分
右爲細末煉蜜杵丸如梧子大焙乾爲每服三十丸空
心食前米飲下日二三服此藥補氣止汗
平補五臟虛羸六府怯弱充肌膚進飲食
人參圓
人參　山芋　白朮　白茯苓
石斛　黃芪取頭末　五味子各一兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸空心食前
飲下久服不熱尤宜少年
補血益氣治虛勞少力
雙和散
黃芪　熟地黃　當歸　川芎各一兩
白芍藥二兩　官桂　甘草各三分
右爲粗末每服四大錢水一盞半生姜三片肥棗一
枚煎至八分去滓服予製此方止是建中四物二方
而已每傷寒瘧疾中暑大病之後虛勞氣乏者以此
調治皆驗不熱不冷溫而有補
黑錫圓此丹陽慈濟貞方
黑錫　硫黃各三兩　舶上茴香　附子
胡蘆巴　破故紙　川楝肉　肉豆蔻各一兩
巴戟　木香　沉香各半
右將砂子研細餘藥末研勻入碾自朝至暮以黑光
色爲度酒糊丸如梧子大陰乾布袋內揉令光瑩如
丈夫元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷夜夢
鬼交覺來盜汗面無精光肌體燥澁耳內虛鳴腰疼
痛心氣虛神不寧飲食無味日漸瘦悴膀胱久冷夜
多小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶
下及陰毒傷寒面青舌卷陰縮難言四肢厥冷不省
人事急用棗湯吞下一二百丸即使回陽命無不活
但是一切冷疾鹽酒鹽湯空心吞下三四十丸婦人艾
醋湯下此藥大能調治昇降陰陽安和五臟洒
陳六腑補損益虛向陽返陰功驗神聖
治虛勞羸瘦乏力不食倦怠多驚畏
石斛散
石斛四錢　牛膝　柏子仁　五味子
遠志　木香　杏仁　肉蓯蓉

訶子　陳橘皮　人參　柴胡炒
熟地黄各三錢　白茯苓　甘草二錢　神曲
麥芽六錢半　乾姜一錢半
右為細末每服二錢米飲調下食前日三服
治虛損補精髓壯筋骨益心智安魂魄令人悦澤駐顏
輕身延年益壽閉固天癸
八仙丹
伏火硃砂　真磁石　赤石脂　代赭石
石中黄　禹餘糧五味並用醋淬
乳香　没藥各一兩
右為細末勻研極細糯米濃飲丸如梧子大或如豆
大每服一粒空心鹽湯下有人年幾七旬夢漏羸弱
氣歎〻然虛損得此方服之忽然强壯精氣固閉飲
食如故予常製自服良驗
治頭痛頭暈方
治風眩頭暈川芎散
山茱萸一兩　山藥　甘菊花
人參　伏神　小川芎各半兩
右細末每服二錢酒調下不拘時候日三服不可悞
用野菊麗先生方
治肝厥頭暈清頭目鈎藤散
鈎藤　陳皮　半夏　麥門冬
茯苓　伏神　人參　甘菊花
防風各半兩　甘草一分　石膏一兩
右為粗末每服四錢水一盞半生姜七片煎至八分
去滓溫服
治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脉舉
之則弦按之石堅宜玉真圓
硫黄二兩　石膏煆通赤研　半夏湯洗各一兩　硝石一分半
右為細末研勻生姜汁糊丸如梧子大陰乾每服二
十丸姜湯或米飲下更灸關元穴百壯
良方中黄丸子亦佳素問云頭痛巔疾下虛上實過
在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招搖目瞑耳聾下實
上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故
腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈狗蒙者
如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之状也故
肝虛頭暈腎厥巔痛不同如此治肝厥鈎藤散在前
治氣虛頭疼
大附子一枚剜心全蝎二個入在内以取者附子末
同鍾乳粉一分麩少許水和裹炮熟都碾為末以焦
黄為末度蔥茶調下一錢或半錢甚效
又方
大川芎二個剉切四片　大附子一只和皮生為末
右以水和附子末如麫劑裹芎作四處如附子末少

入少麵裹單以針穿數孔子用真腦麝薫有穴處內
香再捻合穴子如未覺內有香即再薫一炷細雜灰
用銚子內熱灰炮熟末之每服半錢葱茶調下不拘
時候右泗鹽揚吉老二方神良
又方
好川芎半兩為末每服二錢臈茶清調下甚捷曾有
婦人產後頭痛一服愈
治氣虛頭暈白芷圓
白芷　石斛　乾姜各一兩半　細辛
五味子　厚朴　肉桂　防風
茯苓　甘草　陳皮各一兩　白朮一兩一分
右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸清米飲下
不飢不飽服鄉人邵致遠年八十有三有此疾得此
方數服即愈揚吉老傳
治風寒客于頭中偏痛無時久之牽引兩目遂致失明宜
白附子散
白附子一兩　麻黃不去節　川芎　南星各半兩
全蝎五個　硃砂　麝香各一分
右為細末酒調一字服之去枕少時此方見必用方
庚寅年一族人患頭痛不可忍一服即差
治一切頭旋本因体虛風邪乘于陽經上注于頭面遂入
于腦亦因痰水在于胸鬲之上犯大寒使陽氣不行痰
水結聚上衝于頭目令頭旋
羚羊角散
羚羊角　茯神各一兩　芎藭　防風
半夏湯泡洗　白芷　甘草各半兩　枳殼
附子各一分
右為粗末每服四錢水一盞半生姜半分煎至
七分去滓不拘時溫服
治虛風頭旋吐涎不已養正丹
黑鉛　水銀　硫黃　硃砂各一兩
右用建盞一隻火上鎔化成汁次下水銀用柳枝條
打勻取下放少時下二味末打勻令冷取下研為粉
用米飲丸或用棗肉丸如梧子大每服三十丸鹽湯
下此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已
治一切中風頭痛黑龍圓
天南星洗　川烏各半斤黑豆蒸三次
石膏半　麻黃　乾薄荷四兩
藁本　白芷各二兩　京墨一兩半
右為細末煉蜜杵丸彈子大每服一丸薄荷茶湯嚼
下
類證普濟本事方卷之二終

類證普濟本事方卷第三

風寒濕痺白虎𧏖節走注諸病

治風溼四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無力筋脉緩急宜續斷圓 郗君予方

川續斷　萆薢　當歸切微炒

附子　防風　天麻各一兩

乳香半兩　沒藥半兩　川芎三分

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸或酒或飲下空心食前服

治營衛澁少寒溼從之痺滯關節不利而痛者增損續斷圓 王吉老方

川續斷　薏苡仁　牡丹皮　桂心

山芋　白茯苓　黃芪　山茱萸

石斛　麥門冬各一兩　乾地黃三兩　人參

防風夭　白朮炮　鹿角膠各七錢

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒溫下空心食前服

治風寒溼痺麻木不仁粥法

川烏生為末

右用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用慢火熬熟稀薄不要稠下薑汁一茶匙許蜜三大匙攪勻空心啜之溫為佳如是中溼更入薏苡仁末二錢增米作一中碗服

此粥大治手足四肢不遂痛重不能舉者有此證預服防之左氏云風淫末疾謂四肢為四末也脾主四肢風邪客于肝則淫脾脾為肝尅故疾主末穀氣引風溼之藥經入脾經故四肢得安此湯劇極有力予常製此方以授人服者良驗

治溼傷腎腎不養肝肝自生風遂成風溼流注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛入左指中

薏苡仁散

薏苡仁一兩　當歸　小川芎　乾薑

甘草　官桂　防風　茵芋

人參　羌活　白朮　麻黃

獨活各半兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

治五種痺腿步碍閒發作不定此脾胃虛衛氣不溫分肉為風寒溼所著

芎附散

小川芎　附子　黃芪　白朮

防風　熟地黃　當歸　桂心

柴胡　甘草各等分

右為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎七分去滓食前日三服常服不生壅熱兼消積冷

治白虎瀝節諸風疼痛游走無定狀如虫嚙晝靜夜劇及一切手足不得疼痛

麝香圓

川烏大八角者三個生用　全蝎二十一個生
黑豆二十一粒生用　地龍半兩生

右為細末入麝半字同研勻糯米糊為丸如菉豆大每服七服甚者十丸夜卧令膈空溫酒下微出冷汗一身便差

予得此方凡是瀝節及不測疼痛一二服便差在歙州日有一貴家婦人徧身走注疼痛至夜則發如虫嚙其肌多作鬼邪治予曰此正瀝節病也三服愈

瀝節宜發汗麻黃散

麻黃一兩一分　羌活一兩　黃芩三分
細辛真華陰者　黃芪各半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服接續三四服有汗慎風

治瀝節腫滿疼痛茵芋圓

茵芋　硃砂　薏苡仁各一分
牽牛子一兩半　郁李仁半兩

右細末煉蜜杵丸如梧子大輕粉滚為衣每服十丸至十五至三十丸五更初溫水下到晚未利可二三服快利為度白粥將息

治風熱成瘫節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱或大便閉即作

牛蒡子散

牛蒡子三兩　新豆豉炒　羌活各一兩
生地黃二兩半　黃芪一兩半

右為細末湯調二錢空心食前日三服此病多胸膈生痰久則赤腫附著肢節久久不退遂成厲風此孫真人所預戒也宜早治之

治厲風手指攣曲節間疼不可忍漸至斷落

萆麻法

萆麻去殼　黃連剉如豆各二兩

右以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後用萆麻子一粒擘破面東以浸藥水吞下平旦服漸加至四五粒微利不妨水少更添忌動風物累用得效神良

治厲風柏葉丸

柏葉　麻黃　山梔子　枳殼
羌活　羊肝石　白蒺藜　升麻
子芩　防風　牛蒡子　荊芥
茺蔚子　大黃各半兩　苦參一兩　烏蛇一條

右為細末每服二錢溫水調下日七八服龐老方

治風毒瘡如大風疾綠靈散

用桑葉洗熟蒸日乾為末水調二錢服日四五丸時

出經驗

治走注癧節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

趂痛圓

草烏頭三兩半去皮尖 熟地黄 南星 半夏麴

白僵蚕 烏藥各半兩並日乾

右為細末酒糊丸如梧子大日乾每服五七粒空心夜卧温酒下如跌撲痛用姜汁和酒研十數粒搭之如卒中倒地姜汁茶清研五六丸灌下立醒大智禅師方

治宿患風痺徧身黑色肌体如木皮膚粗澁及四肢麻痺宜服烏頭圓

草烏頭一觔入竹籮子内以水浸用瓦子于籮内就水中灘洗如打菱角法直候灘洗去大皮及尖腔趂令乾用麻油四兩塩四兩入銚内炒令深黄色傾出油只留塩并烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈破心内如米一點白恰好也如白多再炒趂熱杵羅為末用醋糊丸如梧子大乾之每服三十丸空心晚食前温酒下真州資福文雅白老元祐間有此疾服此數年肌体黑䵟頓除脚力强健視聽不衰有一宗人徧身紫黑䵟風身如墨服踰年体悦澤教予服之亦得一年許諸風疹瘡瘍皆除然性差熱雖製去毒要之五七日作烏頭粥啜之為佳法用預章集中者

治風痰停飲痰癖𤸷

治停痰宿飲化痰圓

半夏湯洗七次别末 人參 白茯苓 白术

桔梗切作小片姜汁浸各一兩 枳實 香附子 前胡

甘草

右細末用半夏姜汁煑糊丸如梧子大每服三四十丸姜湯下

治中脘風痰涎飲瞑眩嘔吐酸水頭疼悪心三生圓

半夏二兩 南星 白附子各一兩

右並生為末滴水丸如梧子大以生麺衮衣陰乾每服十丸至二十丸生姜湯下

治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虗冷所致其脉沉弦細遲旋覆花湯

旋覆花 細辛 橘皮 桂心

人参 甘草 桔梗 白芍藥

半夏各半兩 赤茯苓三分

右為粗末每服四錢水一盞半生姜七片煎八分去滓温服

治心下停飲冷痰頭目運眩睡卧多涎

檳榔丸

枎榔三分　丁香　半夏一兩
細辛　乾姜　人參各半兩
右細末姜汁煮糊丸如梧子大每服二三十丸姜湯
下日三服
治酒癖停飲吐酸水乾姜　聖惠方
乾姜　葛根　枳殼
橘紅　前胡各半兩　白术
半夏麯　山茰肉　甘草各一分
右細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸用飲下甲寅
年服上二方有效
治積聚停飲痰水生虫久則成反胃及変為胃癰其說
在靈樞巢氏病源
芫花圓
芫花醋製乾秤一兩　乾漆　狼牙根　桔梗炒黄
藜蘆炒　枎榔各半兩　巴豆十粒去殼炒微黑
右、為細末醋糊丸如赤豆大每服二三丸加至五六
丸食前姜湯下
此方常服化痰消堅殺虫予患飲癖三十年暮年多
嘈雜痰飲來潮即吐有時急飲半杯即止蓋合此證
也因讀巢氏病源論酒瘕云飲酒多而食穀少積久
漸瘦其病常思酒不得酒即吐多睡不復能食是胃
中有虫使然名為酒瘕此藥治之要知須禁酒即易

治不禁無益也予平生有二疾一則臟腑下血二則
鬲中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時
夜坐為文左向伏几案是以飲食多墜向左邊中夜
以後稍困乏必飲兩三杯既卧就枕又向左邊側睡
氣壯盛時殊不覺三五年後覺酒止從左邊下漉漉
有聲脇痛飲食殊減十數日必嘔數升酸水暑月止
是右邊身有汗漐漐常潤左邊痛處絶燥遍訪名醫
及海上方服之少有驗間或中病止得月餘復作其
補則如天雄附子礬石其利則如牽牛甘遂大戟備
嘗之矣予後揣度之已成癖囊如潦水之有科臼不
盈科不行水盈科而行也清者可行濁者依前停留
蓋下無路以決之也是以積之六七日必吐而去稍
寬數日必復作脾土也惡濕而水則流濕莫若燥脾
以勝濕崇土以填科臼則疾自去矣予是悉屏諸藥
一味服蒼术三月而疾除自此一向服數年不吐不
嘔胸鬲寬飲啖如故暑月汗周身而身涼飲亦當中
下前此飲渚其肝目亦多昏眩其後燈下能書細字
皆蒼术之力也其法蒼术一觔去皮切末之用生麻
油半兩水二盞研濾取汁大棗十五枚爛煮去皮核
研以麻汁勻研成稀膏搜和入臼熟杵丸如梧子大
乾之每日空腹用溫湯吞下五十丸加至一百丸二
百丸忌桃李雀鴿初服時必鬲微燥且以茅术製之

覺燥其進山梔散一服久之不燥矣予服半年以後
止用燥烈味極辛者削去皮不浸極有力亦自然不
燥也山梔散用山梔子一味乾之爲末沸湯點服故
知久坐不可伏向一邊時或運動亦消息之法

治肺氣風寒作欬紫蘇散
紫蘇　桑白皮　青皮　五味子
杏仁　麻黄　甘草各等分
右爲粗末每服二錢水一盞煎至七分温服

利鬲去涎思食止欬訶子湯
訶子煨去核　青皮　麥門冬各半兩
檳榔四個　半夏三分　甘草一分
右爲粗末每服四錢水二盞生姜七片同煎至七分
去滓温日三服

治諸欬久不差貝母湯
貝母一兩去心姜製半日焙　黄芩生用　乾姜生各一兩　陳皮
五味子各一兩　桑白皮　半夏　柴胡
桂心各半兩　木香　甘草各一分
右爲粗末每服五錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎
之生姜七片同煎至七分去滓熱服　黄師文云戊
申冬有蔣姓者其妻積年欬製此方授之一服差以
此治諸欬悉皆愈

積滯凝聚五噎鬲氣
大抵治積或以所惡者攻之以所喜者誘之則易愈如
硇砂水銀治肉積神曲麥芽治酒積水蛭䖟虫治血積
木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄黄膩粉治涎積
礞石巴豆治食積各從其類也若用群隊之藥分其勢
則難取效擭似宗所謂譬猶獵不知兔廣絡原野冀一
人獲之術亦踈矣須是認得分明是何積聚然後增減
用藥不尒又有所損嗣宗自謂不著書在臨時變通也

治五種積氣及五噎胸鬲不快停飲宿痰
缠金丹
丁香　木香　沉香　檳榔
官桂　胡椒　硇砂研　白丁香各一分
肉豆蔻　飛礬各一分　馬兜鈴炒　南星
五靈脂　瓜蔞根　半夏各半兩　硃砂三分留半爲衣
右爲細末入二味研藥和勻生姜汁煮糊丸如梧子
大每服三丸生姜湯下或乾嚼蘿蔔下

治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣
枳殼散
枳殼　白术各半兩　香附子一兩　檳榔三錢
右爲細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候罷
老方

治伏積注氣發則喘悶
訶子圓

訶子　白茯苓　挑仁　枳殼
桂心　檳榔　鼈甲　桔梗
白芍藥　川芎　川烏　人参
橘紅各等分

右細末煉蜜杵丸如梧子大酒下二十丸熟水亦可

治一切積聚有飲心痛硇砂圓

硇砂　荆三稜別末　乾姜　香白芷
巴豆去油各半兩　大黃別末　乾漆各一兩　木香
青皮　胡椒各一分　檳榔　肉豆蔻各一個

右為細末釅醋二升煎巴豆五七沸後下三稜大黃末同煎五十沸入硇砂同煎成稀膏稠希得所便入諸藥和匀杵丸如菉豆大年深氣塊生姜湯下四五丸食積熟水下白痢乾姜湯下赤痢甘草湯血痢當歸湯葱酒亦得

治男子婦人患食勞氣勞徧身黃腫欲變成水及久患痃癖小腸膀胱面目悉黃

紫金丹

胆礬三兩　黃蠟一兩　青州棗五十個

右于磁合内用頭醋五升先下礬棗熳火熬半日以來取出棗去皮核次下蠟一處更煮半日如膏入好臈茶末二兩同和丸如梧子大每服三十丸茶酒任下如久患腸風痔漏陳茶飲下

宗室趙彦才下血面如臈不進食蓋酒病也授此方服終劑而血止面鮮潤食亦倍常新安有一兵士亦如是與三百丸作十服而愈

治沉積感應圓

丁香　木香各半兩　乾姜一兩　百草霜二兩研
肉豆蔻二十個　巴豆七十粒取霜　杏仁一百四十粒
煮酒臈四兩　麻油一兩秋冬增半兩減臈半兩

右以二香姜蔻為細末并三味研極匀煉油臈和成劑油紙裹旋圓如菉豆大熟水下五十丸此藥近年盛行于世有數方惟此真高予家得之于王景長用之的有效

治五種積氣三焦痞塞胸膈滿悶背膂引疼心腹膨脹脇肋刺痛飲食不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中消痃癖積聚散驚憂恚氣宜服枳殼散

枳殼　京三稜　橘皮　益智仁
蓬莪朮　檳榔　肉桂各一兩
乾姜　厚朴　甘草
青皮　肉豆蔻　木香各半兩

右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚同煎至七分熱服鹽點亦得不拘時候

治氣食憂勞思慮五膈氣圓

半夏　桔梗各二兩　肉桂　枳殼各一兩半
右為細末薑汁和丸如梧子大薑湯下三十丸食後臨卧服

治胸膈悶塞作噎薰鬲丸
麥門冬　甘草各半兩　人參
桂心　細辛　川椒
遠志去心炒　附子　乾薑各二錢
右細末煉蜜為丸如雞豆大綿裹一丸含化食後日夜三服

膀胱疝氣小腸精漏

治膀胱疝氣外腎腫脹痛不可忍念珠圓
乳香　硇砂各三錢飛　黃蠟一兩
右乳香研細硇砂同研勻鎔蠟和丸分作一百單八丸以綿穿之露一夕次日蛤粉為衣旋取一丸用乳香湯吞下
頃年有人貨疝氣藥肩上担人我二字以為招目貨日數千有一國醫多金得之用之良驗

硇砂圓
木香　沉香　巴豆肉全者各一兩
青皮二兩不去皮　銅青半兩研　硇砂一分研
右上二香青皮三味細剉同巴豆熳火炒令紫色為度去巴為末入青砂二味研勻蒸餅和丸如梧子大每服七丸至十丸鹽湯吞下二三服空心食前服

治膀胱腫硬牽引疼痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出宜服金鈴圓
金鈴子肉五兩　小茴香炒　馬蘭花
兔絲子　海蛤　破故帋
海帶各三兩　木香　丁香各一兩
右細末糊丸如梧子大每服二三十丸溫酒鹽湯下空心食前服

治小便難小腸脹不急治殺人
右用葱白三觔細剉炒令熱以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

治膀胱氣痛茴香散
茴香　金鈴子肉　蓬莪朮
荊三稜各一兩　甘草半兩炙
右細末每服二錢熱酒調下強幼安云每發痛甚連日只二三服即定
頃在歙城日歙尉宋筍甫膀胱氣作疼不可忍醫者以刬刺與之疾愈甚小便不通二日矣臍下虛脹心悶予因候之見其面亦黑脈洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞氣不得通為之奈何宋尉尚手持四神丹數粒云槩者謂痛不止更服此予曰若服此定斃後無悔渠懇求治予適有五苓散一兩許分三服易其

名用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半煎八
分令接續三服中夜下小便如黑汁者一二升臍下寬
得腰望日診之脉已平矣續用硇砂丸與之數日差
大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之
所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄
之邪然後補之是以諸方多借巴豆氣者蓋謂此也

治遺精夢漏關鎖不固金鎖丹亦名茴香圓

舶上茴香　胡蘆巴　破故紙
白龍骨各一兩　木香一兩半　胡桃肉三七個研
羊石子三對切開鹽半兩淹炙熟研如膏

右五味為末下二味同研成膏和酒浸蒸餅杵熟丸
如梧子大每服三五十丸空心溫湯下

治經絡熱夢漏心忪恍惚鬲熱清心圓

好黄柏皮

右為細末用生腦子一錢同研勻煉蜜丸梧子大每
服十丸至十五丸濃煎麥門冬湯下大智禪師方夢
遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也

豬苓圓

右用半夏一兩破如豆大用木豬苓四兩先將一半
炒半夏黄色不令焦地上出火毒半日取半夏為末
糊丸如梧子大候乾更用前豬苓末二兩炒微裂同
用不泄沙瓶養之空心溫酒鹽湯下三四十丸常服
于申未間冷酒下

此藥治夢遺有數種下部虛憊精不禁者宜服茴香
丸年壯氣盛久節淫慾經絡壅滯者宜服清心丸有
情慾動中經所謂所願不得名曰白淫尤良方茯苓
散正如瓶中煎湯氣盛盈溢者如瓶中沸湯而溢慾
動心邪者如瓶之傾側而出虛憊不禁者如瓶中有
罅而漏不可一槩用藥也又有一說經曰腎氣閉即
精泄素問云腎者作强之官伎巧出焉又曰腎氣藏
精蓋腎能摂精氣以生育人倫者也或斂或散皆主
于腎令也腎氣閉則一身之精氣無所管摂故妄行
而出不時也豬苓圓一方正謂此設此古方也今盛
行于時而人多莫測其用藥之意蓋半夏有利性而
豬苓導水蓋腎導氣使通之意也予藥囊中常貯此
藥緩急以與人三五服皆隨手而驗林監丞庇民亦
數服而愈

類證普濟本事方卷之三終

類證普濟本事方巻第四

反胃嘔吐

治反胃附子散

附子一枚極大者坐于磚上四面着火漸漸逼熱淬入生姜自然汁中再用火逼再淬約盡姜汁半碗搗乾末之每服二錢水一盞粟米少許同煎七分不過三服

鯽魚散

大鯽魚一個去腸留胆納綠礬末填滿縫口以炭火炙令黃色乾爲末每服一錢米飲調下日三服

定嘔吐利膈枇杷散

枇杷葉去毛　人參各一錢　茯苓半兩

茅根二兩切　半夏一錢切

右細剉每服四錢水一盞半生姜七片慢火煎至七分去滓入檳榔末半錢和匀服之龐老方

食後多吐欲作反胃白术散

澤瀉　白术　茯苓各等分

右爲細末每服一錢湯調溫服

治胃熱嘔吐竹茹湯

乾葛三兩　甘草三錢　半夏三錢姜汁半盞漿水一升煮耗半

右粗末每服五錢水二盞姜三片竹茹一團大棗一枚同煎至一盞去滓溫服有熱者手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘孫兆竹茹湯政相當耳急治藥與之即時愈良方槐花散亦相類

治霍乱吐瀉不止及轉筋諸藥不效者一丸治一人青金丹

硫黃一兩研　水銀八錢

右二味銚子内炒柳木篦子不住攪匀更以柳枝蘸冷醋頻頻洒候如鐵色法如青金塊方成刮下再研如粉留小半爲散餘以粽子尖三個醋約半盞研稀糊得所成膏和丸如雞豆大硃砂爲衣每服一丸煎丁香湯磨化下熱服如服散子丁香湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨下日二三服

治嘔吐不止香靈圓

丁香　好辰砂研各六錢　五靈脂四錢

右香脂先細末後入砂再研匀狗胆或猪胆爲丸如雞豆大每服一丸生姜橘皮湯磨下

臟腑瀉滑及諸痢

治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效訶子圓

訶子皮　川姜　肉豆蔻　龍骨

木香　赤石脂　附子各等分

右細末糊丸如梧子大每服四十丸米飲下

治脾胃中風濕臟腑泄滑麴藭丸

芎藭　神曲　白朮　附子各等分

右爲細末用糊丸如梧子大每服三五十丸米飲下

左氏述楚子圍蕭〻將潰無社告申叔展曰有麥麴乎有山麴乎麴藭者芎藭也意欲令逃水中以避禍是知芎藭能除濕予嘗加朮附以製方治脾濕而泄者萬無不中此藥亦治飧泄素問曰春傷于風夏必飧泄飧泄者食穀不化蓋春木旺時肝生風邪淫于脾經至夏飲冷當風故多飧泄此藥尤宜

磨積止泄痢治心腹中冷痛陳麴丸

陳麴一兩半　乾姜　官桂　白朮

當歸　厚朴　人參　甘草各半兩

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸或酒或淡醋湯下空心食前日二服發時不時增數

治冷氣下瀉木香圓

木香半兩　川烏一兩生

右爲細末醋糊丸如梧子大陳皮醋湯下三五十丸

治痼冷在腸胃間連年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不效宜先取去然後調治易差不可畏虛以養病也宜

温脾湯

厚朴　乾姜　甘草　桂心

附子生各二兩　大黃生四錢研切湯一盞漬半日搦去滓煎

右細剉水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去滓澄去脚不要晚十分三服溫之自夜至曉令盡不快食前更以乾姜丸佐之

乾姜圓

乾姜　巴豆去心炒黃研　大黃　人參各一兩

右除巴豆餘爲末同研煉蜜丸如梧子大服前湯時用湯吞下一丸米飲亦可

有人因憂愁中傷食結積在腸胃故發吐利自後至暑月稍傷則發暴下數日不已玉函云下利至隔年月日不期而發者此爲有積宜下之止用温脾湯尤佳如難取可佐以乾姜丸後服白朮散

右細末入麝少許勻陳米飲下二錢佛智和尚傳云在閩人嘗合以濟人治血痢尤奇

治腎泄五味子散

五味子二兩　吳茱萸半兩細粒緑色者

右二味用炒香熟爲度細末每服二錢陳米飲下頃年有一親識每五更初欲曉時必溏痢一次如是數月有人云此名腎泄腎感陰氣而然得此方服而愈

虛熱風壅喉閉清利頭目

治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯

雞蘇葉　荊芥穗　防風　桔梗

人參　牛蒡子隔紙炒　甘草各一兩
右細末每服一錢沸湯調服如咽痛口瘡甚者加姜
蚕一兩國醫都君子方
治風盛鬲壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒間緊急
作偏頭疼川芎散
川芎　柴胡　半夏麴
甘草炙　甘菊　細辛
人參　前胡　防風各半兩
右為粗末每四錢水一盞生姜四片薄荷五葉同煎
至七分去滓溫服
治頭痛面赤煩悶咽乾上鬲風痰頭目暈昏百節疼痛
背項拘急芎辛丸
川芎　防風　僵蚕　獨活各一兩
桔梗三兩　天麻四兩　細辛　白附子
羌活　甘草各半兩　薄荷　荊芥各一兩
右細末煉蜜丸如梧子大每服一丸茶酒吞下食後
白朮散
白朮　木香　附　人參各等分
右細末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚煎六分
溫服
治積痢靈砂丹
硇砂一分　硃砂一分并研極細

右用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同于銀石器
內重湯煮一伏時候巴豆紫色爲度去二七粒止將
一七粒與前末二味同再研極勻再溶蠟匱藥每旋
丸菉豆大每服三丸至五丸水瀉生姜湯下白痢艾
湯赤白烏梅湯服時須極空腹服畢一時不可吃食
臨卧尤佳次食淡粥一日瘧疾乳香湯下面東服不
發日晚間服
此藥不動氣服之瀉者止痢者斷疼者愈有積者內
化亦不動臟腑大凡痢有沉積者不先去積雖安暫
安後亦爲害記陳侍郎涇仲庚戌秋過儀真求診初
不覺其有疾及診視則肝脉沉弦附骨取則牢予曰
病在左脇有血積必發痛陳曰誠如是前此守九江
被召冒暑涉長江暨抵行朝血痢已數日矣急欲登
對醫者以剛劑燥之雖得止數日臍下一塊大如杯
不旬日如碗大發則不可忍故急請公祠以歸爲之
奈何予曰積痢不可强止非抵當丸不可渠疑而不
肯服次年竟以此終
治鬲年痢不止木香散
木香用黃連半兩各剉炒　炙甘草一兩
罌粟殼剉同姜汁半兩炒
治上焦虛熱肺脘咽鬲有氣如烟搶上通鬲丸
黃連　茯苓　人參各三兩

硃砂一分　真腦子少許

右細末研匀煉蜜杵丸如梧子大煎水下三五丸日二三服

治經心有熱門冬丸

參門冬一兩　川黃連半兩

右細末煉蜜丸如梧子大食後熟水下二三十丸

治心熱千金地黃丸

川黃連四兩粗末　生地黃半觔研取汁連滓二味拌勻日乾

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後麥冬湯下

治邪熱客于經絡肌熱痰欬五心煩熱頭目昏痛夜多盜汗補和真氣解勞倦婦人血熱虛勞骨蒸此藥並皆治宜服人參散

人參　白朮　白茯苓　柴胡

半夏麯　當歸　赤芍藥　乾葛

甘草各一兩　子芩半兩

右為細末每服三錢水一盞生姜四片棗二枚煎至八分不拘時候帶熱服但是有勞熱証皆可服熱退即止大抵透肌解熱乾葛第一柴胡次之所以升麻葛根湯為解肌之冠也

調營衛順三焦治風壅消痰涎退煩熱清氣散

前胡　柴胡　川芎　枳殼

白朮　青皮　羌活　獨活

甘草　茯苓　人參各等分

右為末每服二錢水一盞荊芥一穗煎七分服此方取毒散中去桔梗加白朮青皮增損亦有理用之良驗

治邪入經絡体瘦肌熱推陳致新解利傷寒時疾中暍伏暑柴胡散

柴胡四兩　甘草一兩

右為末每服二錢水一盞同煎至八分食後熱服此藥冬月可以潤心肺止咳欬除壅熱春夏可以禦傷寒時氣解暑上居常不可缺兼之長幼皆可服倉卒可以便得

治骨蒸肌熱解一切虛煩躁生津液地仙散

地骨皮洗　防風各一兩　甘草一分

右為末每服二錢水一盞生姜三片竹葉七片煎至七分服信效方增人參半兩鷄蘇葉一兩甘草添一分

腫滿水氣蠱脹

治腹中有濕熱氣自下作腫如新卧起之狀而足微腫病在腎腎少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣急咳欬喘息有音每就卧則右脇有氣上衝肩腋與缺盆相牽引不快少思飲食

葶藶圓

甜葶藶半兩　郁李仁湯去皮尖熬紫色秤三分二味別研如膏

白术半兩　牽牛子半兩一半生一半熟　桑白皮
赤茯苓　漢防己　羌活
陳橘皮　澤瀉以上各等分
右為末與上二味同研煉蜜和入臼內治之丸如梧子大初服十丸空心晚食前日二服生姜橘皮湯下不知加至二三十丸以知為度

治脾元虛浮腫寔脾散
大附子一個　草果　乾姜各二兩
甘草一兩　大腹連皮六個　木瓜一個去瓤切片
右用水于砂器中同煑一半以乾姜劈開心內不白為度不得全令水乾恐近底焦取出剉焙為末每空心日午用沸湯點服

治水氣羌活散
羌活　蘿蔔子各等分
右同炒香熟去蘿蔔子不用末之温酒調下二錢一日一服二日二服三日三服取效嘉興籌張昌時方

治四肢腫滿大棗湯
白术三兩㕮咀每服半兩水一盞半大棗三枚拍破同煎至九分去滓温服日三四服不拘時候

治腫滿小便不利茯苓散
郁李仁四錢　檳榔二個　赤茯苓
白术　甘遂切作炒各一錢　橘皮一錢半
右細末每服一錢姜棗湯下

又方
厚朴半兩　牽牛子二兩炒取末二兩
右細末每服二錢姜棗湯調下

治遊風攻頭面或四肢作腫塊知母湯
知母一兩　麻黃　黃芪　甘草
羌活　白术　枳殼各半兩
右粗末每服四錢水一盞半牛蒡子百粒研碎煎至七分溫日三四服覺冷不用牛蒡子

有一達官其母年七十中風拘攣平日止是附子之類扶養一日面浮腫手背亦腫尋常有一國醫供藥診之是水病欲下大戟牽牛以導之其家大驚憂惶召予議之予曰素問一種面腫曰風足脛腫曰水此服附子太過正虛風生熱之證咽必噎塞膈中不利誠言予乃進升麻牛蒡丸參湯徙以知母湯三日即便愈

常見一醫書中論水蟲三病臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不甚腫者為蠱有一中表婦人患蠱病予謂不可下當寔脾不然之卒後入棺木腹與棺蓋平治蠱宜石中黃丸
腎臟風及足膝腰腿脚氣等疾

連枝甘遂一兩　木鱉子二個一雄一雌去殼
右爲末猪猪腰子二個批開藥末一錢摻勻濕紙裹
數重慢火煨熟放温五更初細嚼米飲下
積水多則利多少則少也宜軟飯將息若患一脚切
看左右如左脚用左邊腰子右用右邊者藥不上一
錢壬子年在毘陵有姓馬人嗜酒久不見因詢其親
云宿患腎臟風今一足發腫如瓠自腰以下鉅細通
爲一律痛不可忍卧欲轉側則兩人扶持方可動或
者欲以鈹刀決之予曰未可予有藥當以贈如上
法服之辰巳間下脹如水晶者數升卽時痛止腫退
一月後尚拄拐而行予再以赤烏散令擦貼其膝方
愈後十年過毘陵率其子列拜以謝云向脚疾至今
不復作雖積年腎臓風并已失去今健步自若矣

治腎臟風上攻下疰生瘡并癬烏頭圓
川烏二兩　草烏一兩二味以黑豆半升煮透去皮臍切碎日乾
天麻　地龍去土秤　白附子各半兩
右爲細末酒糊丸如梧子大每服二三十丸空心食
前鹽酒鹽湯下

去風補血益氣壯筋骨强脚力虎骨酒
虎脛骨真者　萆薢　仙靈脾
薏苡仁　牛膝　熟地黄各二兩
右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百
日婦人去牛膝

治腰脚疼痛攣急不得屈伸及腿膝冷麻虎骨酒
虎骨一具及脛骨二莖用酥塗炙黄槌碎同無灰酒
三斗密封七日空心晩食温之隨意飲

治脚氣拔柳湯
拔柳末三錢　生姜三片　紫蘇七葉　陳橘三枚
右以水一大盞煎七分去滓熱服
少府監韓正彥暴得疾手足不舉諸醫以爲風鍼灸
臂腿不知痛孫兆作脚氣與此藥乃愈

益氣補血肝元祛風濕壯脚膝地黄丸
熟地黄一兩　牛膝　石斛各三分　肉蓯蓉
茵芋　附子　薏苡仁　桂心
防風　川芎　五味子各半兩
右爲末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒下空
心食前服

治肝腎風虚氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流疰下
經行止艱難小便餘瀝此藥補五臟内傷調中益精凉
血堅强筋骨益智輕身耐老思仙續斷圓
思仙骨五兩即杜仲也　五加皮　防風　薏苡仁
羌活　川續斷　牛膝各三兩　萆薢四兩
生地黄五兩
右細末好酒三升化青鹽三兩用大木瓜半斤去皮

子以鹽酒煮木瓜成膏和杵丸如梧子大每服三四十丸空心食前溫酒鹽湯下膏子少益以酒糊

治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行續骨丹

天麻（明淨大者酒浸一日） 白附子 牛膝 木鱉子（各半兩）
烏頭（一分炮） 川羌活 地龍（去土一分） 的乳
真沒藥（各二錢） 硃砂（一錢）

右以生天南星末一兩無灰酒煑糊丸如鷄豆大硃砂為衣薄荷湯磨一丸食前服

治風氣積滯成脚氣常覺微腫發則痛茵芋圓

茵芋（炒） 郁李仁（各一兩）
牽牛子（三兩取末一兩半）

右細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸五更姜棗湯下未知加至三十丸日三快為度白粥補

治腰脚走注疼痛此是脚氣宜薏苡仁圓

薏苡仁 茵芋 白芍藥 牛膝
川芎 丹參 防風 獨活（各半兩）
熟地黃 側子（一個） 桂心 橘紅（各一兩）

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒下食前日三服木瓜湯下亦可

今人謂之脚氣者黃帝謂之緩風溫痺也千金云頑弱名緩風疼痛為溫痺大抵此疾不可以三五便效須久服得力唐張文仲云風有一百二十四種氣有八十種惟脚氣頭風上氣嘗須服藥不絕其餘則隨他發動臨時消息但有風氣之人春末夏初及秋暮得通泄則不困劇所謂泄通者如麻黃牽牛郁李仁之類是已不必苦駛利藥也

治腎虛腰痛鹿茸丸

鹿茸不拘多少切作片子酥炙黃末之酒和糊丸如梧子大空心食前鹽湯下三五十丸

治腿腰痛氣滯藥棊子

右牽牛不拘多少用新瓦入火煿得通紅便以牽牛頓在瓦上自然一半生一半熟不得撥動取末一兩入細研硫黃一分同研勻分三分每用白麵一匙水和捍開切作棊子五更初以水一盞煑熟連湯溫送下住即已不住隔日再作予嘗有此疾每發止一服痛止病源曰腿腰痛者或墮傷腰是以痛

類證普濟本事方卷第五

腸風下血痔漏臓毒

治腸風瀉血久不止玉屑散

槐根白皮去粗皮　苦楝根去皮各三兩　椿根白皮四兩三味于九月後二月前取軟者日乾

天南星　半夏各半兩並生　威靈仙一兩

寒食麪三兩

右爲末滴水丸如梧子大乾之每服三十丸水八分一盞煎沸下丸子煮令浮以匙抄起溫之送下不嚼空心食前服

頃年有一人下血幾盈斗然疲薾諸藥皆不效予曰此正腸風令服玉屑丸三服止予苦痔三十年蓄下血藥方近五十餘品其間或驗或否或始驗而久不應者或初不效棄之再服有驗者未易立談大抵此疾品類不同對病則易愈如下清血色鮮者腸風也血濁而色黯者臓毒也肛門射如血線者虫痔也亦有一種下部虚陽氣不升血隨氣而降者仲景云脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虚寒虚相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精此下部虚而下脱者也若得革脉却宜服溫補藥虫痔宜薰千金用蝟皮艾者佳予嘗作頤得力

治臓毒蒜連圓

鷹爪黄連末用獨蒜一個煨香爛熟研和入臼治熟如梧子大每服三四十丸陳米飲下

治腸風臓毒槐花散

槐花炒　柏葉爛杵焙　荊芥穗　枳殻

右修事了方稱等分細末用清米飲調下二錢空心食前服

巢氏病源論腸癖爲痔久因飽食過度房室勞損血氣流溢滲入大腸衝發于下時便清血腹中刺痛病名脉痔又論脾毒腸風本緣營衛虚弱風氣進襲因熱乘之使血氣流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血

椿皮圓

臭椿花刮去粗皮焙乾四兩　蒼朮　枳殻各二兩

右細末醋糊丸如梧子大空心食前米飲下三四十丸

治腸痔在腹内有鼠妳下血方

白蕪荑　貫衆　狼牙根　椿東引根白皮

槐東引根白皮　蝟皮炙焦各一分　雄黄　白鱔頭一個炙焦

右細末臘月猪脂和一丸彈子大綿裹内下部日三易

治痔有鼠乳結核作渴疼痛方

皂角醋炙　黄芪　荊芥　槐子

穿山甲　木香　露蜂房炒焦　蝟皮

鱉甲醋炙　桔梗　芍藥　大黄半兩

右細末煉蜜丸如梧子大每服二三十丸溫湯下食
前日三服未知加至四五十丸
治遠年腸風痔漏黃芪圓
黃芪　枳殼　威靈仙各二兩　續斷炒
槐角子　枯礬　當歸炒　乾姜
附子　生地黃　連翹炒各半兩
右細末煉蜜丸如梧子大米飲下三十圓晁推官方
治腸痔鱉甲散
鱉甲　蝟皮炙焦　穿山甲炙焦　白礬枯
附子　猪牙皂各半兩炙焦存性二分　麝香一分研
右細末研勻蒸餅丸如梧子大米飲下二十丸食前
一日三服
又方
槐花炒　白礬枯各一兩　附子五錢
右細末蒸餅丸如梧子大每服二十丸米飲下食前
一日三服以上二方龐老傳
衂血吐血咯血方
治衂血無時茵梅圓
茵梅根　艾葉各一兩　烏梅肉焙乾半兩
右細末煉蜜丸如梧子大烏梅湯下三十丸
經云天暑地熱經水沸溢蓋血妄行陽勝陰也鞠運
若茂之當若此疾予授此方令服後愈三黃散亦得

三黃散
大黃　黃連　黃芩各半兩
右細末每服二錢新水調下蜜水亦可
又方山梔子不拘多少燒存性末之搐入鼻中立驗
蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄衂血甚已
死入殮血尚未止偶一道人過門聞其家哭詢問其
由道人云是曾服丹或燒煉藥予有藥用之即活囊
間出此藥半錢匕吹入鼻中立止良久得活并傳此方
治鼻衂過多昏冒欲死
梅師方
右用香墨研濃點入鼻中
潤肺安血止嗽治吐血咯血天門冬圓
天門冬一兩　甘草　杏仁　貝母
白茯苓　阿膠各半兩
右細末煉蜜丸如彈子大嚥津含化一丸日夜可十
丸不拘時候
因嗽咯血成勞眼睛疼四肢倦脚無力黃芪散
黃芪　麥門冬　熟地黃
桔梗各半兩　甘草一分　白芍藥半兩
右粗末每服四錢水一盞半姜三片煎七分去滓溫
服日三服
治久嗽咯血成肺痿多吐白涎胸膈滿悶不食扁豆散

白扁豆　生薑各半兩　枇杷葉去毛　半夏
人參　白朮各一分　白茅根三分
右細剉水三升煎至一升去滓下梹榔末一錢和勻
分四服不拘時候
治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏
剪草一觔婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又
如細辛每用一觔淨洗為末入生蜜一觔和為膏以
器盛之不得犯鐵器九蒸九曬日一蒸曬病人五更
起面東坐不得語用匙抄藥如粥服每服四匙良久
用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可大熱或吐或
下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血
妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人書以此
方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿令服藥
次日將服之為屋土墜器中不可服再合既成又將服
為猫覆器又不得食又再作未就而是人卒矣此藥
之異如此若小血妄行一啜而愈或云是陸農師夫
人鄉人艾宇先嘗覩說此事渠後作大觀本草亦收
入集中但人未識不苦信耳

鎮肝明目羊肝圓
、服目頭面口齒鼻舌唇耳諸疾
羖羊肝一具新瓦盆中焙乾更焙之肝若大止用一半　羌活
甘菊花　栢子仁　細辛　官桂　白朮

五味子各半兩　黃連三分
右細末煉蜜丸如梧子大空心食前溫水下三四十丸

又方
白羯羊肝只用子肝一片薄切新瓦上焙乾　乾熟地黃　兔絲子
車前子　麥門冬　蕤仁　決明子
澤瀉　地膚子去殼　防風　黃芩
白茯苓　五味子　枸杞子　茺蔚子
杏仁大者炒　細辛華陰者佳　苦葶藶　桂心
青葙子各一兩
右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸溫水下日
三服不拘時候

益血鎮肝明目沒藥地黃圓
熟地黃一兩半　黃連　決明子各一兩
沒藥　甘菊花　防風
桂心　羌活　光明硃砂各半兩
右細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸熟水下食後
日三服
讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯苦目痛就張湛求
方湛戲之曰古方宋陽子少得其術以授魯東門伯
次授左丘明遂世世相傳及以漢杜子夏晉左太沖
凡此諸賢並有目疾得此方云損讀書一減思慮二
專內視三簡外觀四旦起晚五夜早眠六凡六物熬

以神火下以氣蔟蘊于胸中七日然後納諸方寸匕
修之一時近能數其目睫遠視尺箠之餘長服不已
動見墻壁之外非止明目并可延年審如是而行之
不可謂之朝戲亦奇方也

治頭風冷淚龎安常二方

甘菊　決明子各三分　白朮　羌活
川芎　細辛　白芷　荊芥穗各半兩

右細末每服一錢溫湯調下食後日三服

又方

川芎　甘菊　細辛
白朮　白芷各一分

右細末鷄丸如黍米大夜臥納一丸目中一時辰換
一丸

荀牧仲頃年嘗謂予曰有人視一物為兩物醫者作
肝氣有餘故見一為二教服補肝藥皆不驗此何疾
也予曰孫真人云目之系上屬于腦後出于腦中邪
中于頭因逢身之虛其入深則隨目系于腦入於腦
則轉〻則目系急〻則目眩以轉邪中其睛所中者
不相比則睛散睛散則歧故見兩物也令服驅風入
腦藥得愈

王檢正希皐昔患鼻額間痛或麻痺不仁如是者數
年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不可忍口難言語
飲食亦相妨左額與頰上常如糊急手觸之則痛予
作足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故
有此證或者以排風小續命透冰丹之類與之皆不
效予製此升麻犀角湯贈之服數日而愈

上等犀角一兩一分　真川升麻一兩　防風　羌活各三分
川芎　白附子　甘草一分　白芷
黃芩各半兩

右粗末每服四大錢水一盞半煎至八分去滓通口
服食後臨臥日三四服

足陽明胃也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃
之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有也六經
之中血氣俱多腐熟飲食故食之毒聚于胃故此方
以犀角為主解飲食之毒也陽明經絡環唇挾口起
于鼻交頞中循頰車上耳前過客〻人循髮際至額
顱故王公所患皆此一經絡也故以升麻佐之餘藥
皆滌風熱耳升麻黃芩專入胃經揹通醫者自能曉也

治鼻塞清涕出腦冷所致

通草　辛夷各半兩　細辛　甘遂
桂心　芎藭　附子各一兩

右細末蜜丸綿裹納鼻中塞密封勿令氣泄丸如大
麻子稍加微覺小痛擣姜為丸即愈

此千金方也治腦冷所致此疾亦有腦熱者亦有肺

寒者素問云膽移熱于腦則辛頞鼻淵又曰泣涕
者腦也腦滲爲涕又曰肺之液爲涕其來各有自矣
當審詳之鼻淵者濁涕不止清濁亦自異
治肺風鼻赤瘡
老山梔爲末溶黃蠟等分和丸彈子大空心茶酒嚼
下半月效忌酒炙煿
又方
右用枇杷葉去毛焙乾末之茶調下一二錢日三服
治心脾壅熱生木舌腫脹
玄參　升麻　大黃　犀角各三分
甘草半兩
右細末每服三錢水一盞煎至五分温服不拘時候
治口生瘡方
升麻一兩一分　黃連三分
右細末綿裹含汁咽
治魚骨鯁久不出方
右以皂角末少許吹入鼻中得鯁出多秘此方
治玄癰腫痛不下食玄參散
玄參一兩　升麻　射干
大黃各半兩　甘草一分
右細末每服三錢水一盞煎至七分放温時時含嚥
良驗

治聤耳出膿紅綿散
白礬煅成白灰每用一錢入胭脂一字研勻用綿杖
纏去耳中膿及黃水盡即用別綿杖引藥入耳中令
到底摻之即乾如壯盛之人積入上攻耳出膿水不
差用無憂散雄黃丸瀉三五行即差
治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳內風吹更四肢
抽掣痛黃芪圓
黃芪獨莖者去蘆一兩　白蒺藜炒瓦擇搗去細碎刺　羌活去蘆各一兩
黑附子大者一個　羯羊腎一對焙乾
右細末酒糊丸如梧子大每服三四十丸空心晚食
前煨葱鹽湯下
治男子二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心
中不意則覺重虛鳴疼痛
地黃丸
生地黃一兩半　桑白皮一兩　磁石搗碎水淘三二十次去盡赤汁爲度二兩
枳殼　羌活　防風
黃芩　木通　甘草各半兩
右粗末每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服
不拘時服
治口乾煩躁生津液思食黃芪湯
黃芪　熟地黃　白芍藥　五味子
麥門冬各三分　白茯苓一分　甘草半兩

右粗末每服三錢水一盞半姜棗烏梅同煎去滓服

類證普濟本事方巻第六

諸嗽虚汗消渴

治嗽杏酥飲

杏仁 款冬花 前胡 半夏製

五味子 麻黃 柴胡 桑白皮

人參 桔梗各等分

右細末每服三錢水一盞半生姜五片同煎七分適口服

戢陽氣止盗汗進飲食退經絡熱栢子仁圓

新栢子人研 半夏麴各二兩 牡蠣甘鍋子內火煅用醋淬七次焙乾

人參 麻黃根慢火炙拭去汗 吳白朮

五味子各一兩 淨麩半兩火炒

右八味為末棗肉丸如梧子大空心米飲下三五十丸日二服得効減一服好即住作散調亦可

治虚勞盗汗不止牡蠣散

牡蠣煅 麻黃根 黃芪各等分

右細末每服二錢水一盞煎至七分溫服

治風虚多汗惡風防風湯

防風五分 澤瀉 牡蠣炒 桂枝各三分

右細末每服二錢食後酒調下

又方

白朮 防風各一兩 牡蠣三分炒如粉

右細末酒調二錢服忠風加防風一倍氣加朮面腫
加牡蠣
治消渴方
浮石　船上青黛各等分　麝少許
右細末每服一錢温湯調下
治渴疾飲水不止神效散
白浮石　蛤粉　蟬殼各等分
右細末用鯽魚胆七個調三錢服不拘時候神効右
方驗録論消渴有三種一者渴而飲水多小便數脂
似麩片甜者渴消病也二者喫食多不甚渴小便少
似有油而數者消中病也三者渴飲水不能多便腿
腫脚先瘦小陰痿弱小便数此腎消病也特忌房労
千金云消渴病所慎者有三一飲酒二房室三鹹食
及麵能慎此須不服薬亦自可消渴之人愈與未愈
常須慮患大癰必于骨節間忽發癰疽而卒予親見
友人邵任道患渴數年果以癰疽而卒唐祠部李郎
中論消渴者腎虚所致每發則小便甜堅者多不知
其疾故古今亦缺而不言洪範言稼穡作甘以物理
推之淋餳醋酒作脯法須臾即皆甜也能足明人食
之後滋味皆甜流在膀胱若腰間腎氣盛則上蒸精
氣氣則下入骨髓其次以爲脂膏其次以爲血肉也
其餘則爲小便故小便色黄血之餘也臊氣者五臟

之氣鹹潤者則下味也腰腎既虚冷則不能蒸于穀
氣則盡下爲小便故味甘不変其色清冷則肌膚枯
槁也由如乳母穀氣上泄皆爲乳汁消渴病者下泄
爲小便皆精氣不実于内則小便数瘦弱也又肺爲
五臓華蓋若下有煖氣蒸則肺潤若下冷極則陽氣
不能升故肺乾則渴易于否卦乾上坤下陽但陰而
不降陰無陽而不升上下不交故成否也譬如釜中
有水以火煖之其釜若以板覆之則煖氣上騰故板
能潤也若無火力水氣則不能上此板終不潤能也
火力者則是腰腎强盛也常須煖補腎氣飲食得火
力則潤上而易消亦免于渴也故張仲景云宜服腎
氣八味丸此疾與脚氣雖同爲腎虚所致其脚氣始
發於二三月盛于五六月衰于七八月凡消渴始發
于七八月盛于十一月十二月衰于二三月其何故
也夫脚氣壅疾也消渴宣疾也春夏陽氣上升故壅
疾發則宣疾愈秋冬陽氣下降故宣疾發則壅疾愈
也審此二者疾可理也猶如善爲政者寛以濟猛猛
以濟寛随事制度爾仲景云足太陽者是膀胱之經
也膀胱者腎之府小便数此爲氣盛氣盛則消穀大
便硬衰則爲消渴也男子消渴飲一斗小便亦得一
斗宜八味腎氣圓
乾地黄半斤　山薬四両　茯苓　牡丹皮

附子　桂心各三兩　澤瀉四兩　山茱萸五兩
右細末煉蜜丸如桐子大酒下二三十丸忌猪肉冷
水羌薑胡荽千金地黃丸亦佳在中部心熱中
治消渴三消丸
好黄連去鬚細末不計多少剉冬瓜肉研裂自然汁
和成餅子陰乾再為末再用汁浸和如七次即用冬
瓜汁為丸梧子大每服三四十丸以冬瓜汁煎大麥
仁湯送下尋常止一服
金瘡癰疽打撲諸瘡破傷風
治金瘡止血除陰疼痛辟風續筋骨生肌肉地黄散
地黄苗　地菘　青蒿　蒼耳苗
生艾汁三合　赤芍藥各五兩入水取汁　石灰三斤
右五月五七月七午時修合以前藥汁拌石灰陰乾
入黄丹三兩更杵羅細凡有金瘡傷折出血用藥封
包不可動着十日差不腫不膿
斂金瘡口止疼痛劉寄奴散
劉寄奴一味為末摻金瘡口裹
宋高祖劉裕微時伐狄見大蛇長數丈射之傷明日
復至聞有杵臼聲往覘之見青衣童子數人于榛中
搗藥問其故答曰我王為劉寄奴所射合藥傅之帝
曰王神何不殺答曰寄奴王者不死不可殺帝叱之
皆散收藥而反每遇金瘡傅之良驗寄奴高祖小字
也此藥非止治金瘡治湯火瘡至妙經驗方云劉寄
奴為末先以糯米漿雞翎掃傷著處後摻藥末在上
並不痛亦無痕大凡湯著急用鹽末摻之護肉不壞
然後以藥末傅之
治從高墮下墜損惡血在骨節間疼痛芸薹散
荊芥　藕節各二兩陰乾　芸薹子
川芒消　馬齒莧各一兩陰乾
右細末用蘇枋木半兩酒一大盞煎至七分調下二
錢服不拘時候
治腕折傷筋損骨疼痛不可忍
生地黄一斤切　藏瓜薑糟一斤　生薑四兩切
右都炒令匀熱以布裹罨傷處冷則易之
治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙散
未展荷葉陰乾一味為末食前以童子熱小便一小
盞調下三錢以利下惡血為度一方用大乾荷葉五
片燒令煙盡細研作一服如上服之
長肉止痛生肌檳榔散
檳榔　黄連　木香各等分
右為細末薄貼瘡上神效
曾有人傷折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見
龜告言曰勿相害吾有奇方可療于夢中授前腕折
生地黄三物方

治打撲傷損及一切癰腫未破令內消方

生地黃研如泥　木香細末

右以地黃膏隨腫大小攤于帋上摻木香末一層又再攤地黃貼腫上不過三五度即愈

元祐中宗人許元公納省試卷過興國寺橋値徹雨地滑墜馬右臂臼脫路中一人云急與接入臼中血潰臼中最難治也僕者如其說神已昏已不覺痛也遂僦卧轎舁去至景德須臾親戚集議所醫或云非録事巷田馬騎不能了此疾急鞭馬召至則已日暮矣田秉燭視其面色云尚可治此疾料理費力先議所酬方敢用藥此公去省試止司日又是右臂正妨作字今須作兩等商量如旬日內安全如舊不妨就試作一等價如至期未能就試則減數別作一等價悉如其說遂用藥封其腫處云中夜方省達旦已痛止矣翌日至悉去其封藥損處已白其瘀血青黯已移在臂臼之上如是數日易之其腫黯直至肩背于是用藥下之和黑血一二升三五日如舊臂亦不痛遂得赴試可謂妙醫矣元公云若非外方遺此厄徹田生吾終作折臂鬼矣故知墮損手足臼脫急須接入不爾終成蘆節也

宣和中有一國醫忽承快行宣押就一佛刹醫內人限日令便行鞭馬至則寂未有人須臾卧轎中扶下一內人又一快行送至奉旨取軍令狀限日下安痊醫診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由惶恐無地良久有二三老內人至下轎環而泣之方得其實云因鞦韆自空而下墜死醫者云打撲傷損自屬外科欲中明又恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥篋中有蘇合香丸急取半兩于火上焙去腦麝用酒半觔研化灌之至三更方呻吟五更下惡血數升調理數日得痊予謂正當下蘇合香丸蓋從高墜下必挾驚悸血氣錯亂此藥非特逐瘀血而又醒氣醫偶用之遂見功效此藥居家不可闕也氣厥鬼邪施傳屍心痛時疾之類皆治良方載甚詳須自合為佳爾

王遼發背方序云元祐三年夏四月官京師疽發于背召國醫治之逾月勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑茄膿血盡潰膚理皆紅亦不復痛始別以藥附之日一易焉易時旋剪去黑爛惡肉月餘瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫病疽者七人予獨生比雖司命事然固有料理不知其方遂至不幸者以人意論之可為慨然于是撰次前後所得良方摸板以施庶幾古人濟衆之意紹聖三年三月題

治諸般癰疽發背柞木散

柞木葉四兩乾　乾荷葉　金罌粟萱草也
甘草節　地榆各一兩
右同剉搗為麄散每服半兩水二碗煎至一碗分兩
服早晚各一併滓再煎一服膿血者自乾未成者自
消忌飲食毒
斂瘡內消方
黄明膠一兩水半升消了入黄丹一兩再煑三五沸
又放温冷乃以鷄毛掃在瘡口上如未成者即塗腫
處自消也
治癰疽上痛拔毒七寶散
乾荷葉心當中如錢片不計多少為粗末每用三匙
水二碗半熳火煎一碗半放温淋洗揩乾以太白膏傅
洗遇明一方
荷葉一兩藁本半兩為末如前用
太白膏
寒水石水飛過用臘月猪脂調成膏隨瘡大小用薄
紙攤貼之
國老膏
横紋甘草一觔擘開搥碎用水一斗浸二宿夏浸一
宿入細夾絹濾去滓入銀石器內熳火熬成膏分作
三服每發以温酒半升調下量年齒老少分作數服
治發背自潰黄芪散

綿黄芪細者洗焙一兩　甘草半兩
皂角針一兩揀紅紫者麩炒黄
右細末每服一大錢酒一盞乳香一塊煎至七分去
滓服
托裏排膿生犀散
皂角針不計多少粗大紫色者佳
右藏瓶中塩泥固濟炭火燒過存性放冷出碾為細
末每服一錢温酒調下暑月用陳米飲下
清心內固黄芪圓
綿黄芪　人參各半兩
右細末入真生龍腦一錢研細用生藕汁和圓菉豆
大每服三十丸温熟水下加至四十丸日三服
治一切瘡毒內托散
菉豆粉一兩研細　通明乳香一分熳火于銀石器中炒
手指攪使乾可丝急傾出在紙上用扇扇冷研令
極細用
右同研勻凡一切惡瘡應係雞名癰腫每用二錢至
三錢食後臨卧濃煎甘草湯調下如打撲及諸般內
損用温酒調下食後空心服此小即內消大損則敗
血從大便出矣
治發背癰疽方
車螯殼一兩箇泥固濟火煅為末瓜蔞一箇燈心五

十莖蜜一大匙用酒一升煎下三味微熱調末二大
錢服不過二服止痛去毒

治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍宜用此藥紝即膿
出巴豆一個去皮膜不去心油盐豉十四個口中含
去皮令軟同研爛入真麝少許如雞丸入少稀糊捏
作餅子或如鼠糞尖或圓子臨時看瘡口紝之只以
帋捏子送入藥使不用帋撚子須臾必痛忍之良久
膿遂出

治發背方

草決明生用一升搗碎生甘草一兩亦碎水三升煮
取一升温分二服大抵血滯則生瘡肝為宿血之藏
而決明和肝氣不損元氣也

治破傷風及打撲傷損玉真散

天南星湯洗七次　防風各等分

右細末如破傷以藥敷貼瘡口然後以温酒調下一
錢如牙關急緊角弓反張用藥二錢童子小便調下
或因鬬傷相打内有傷損之人以藥二錢湯酒調下
打傷至死但心頭微温以童子小便調下二錢并三
服可救二人性命

類證普濟本事方卷之六終

類證普濟本事方卷第七

諸虫飛尸鬼疰

制諸虫方

白蕪荑　檳榔各一兩

右細末蒸餅如梧子大每服十五丸至二十丸温
湯下

制諸虫解勞悅澤肌膚去勞熱

檳榔一兩半　龍膽一兩　乾漆半兩

右細末煉蜜丸如梧子大每服十圓至十五圓熟水
吞下

治寸白虫方

黑鉛灰炒四錢一服先吃豬肉脯少許一時來即用
砂糖濃水半盞調灰五更服虫盡下白粥將息一日
良方療寸白用錫少蕪荑檳榔者極佳
予宣和中每覺心中多嘈雜意謂飲作又疑是虫漫
依良方所說服翌日下虫二條一長二尺五寸頭扁
濶尾尖銳每寸作一節斑斑如錦紋一條皆寸斷矣
千金謂勞則生熱熱則生虫心虫曰蛔脾虫寸白腎
虫如寸截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蚕五虫皆能殺
人惟肺虫為急肺虫居肺葉之内蝕人肺系故成瘵
疾咯血断嘶藥所不到治之為難有人說道藏諸虫
皆頭向下行惟自初一至初五以前頭向上行故用

藥者多取月朏以前盖謂此也
治飛尸者游走皮膚穿藏府每發刺痛变作無常遁尸
者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭
便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風
雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發絞切遇寒冷便
作注尸者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣致变
輒成大惡宜用此方
　忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之丸如鷄子大一枚
　日三太乙精神丹蘇合香丸治此第一
因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣而成之变動不已似冷似
熱風觸則發雄朱散

雄黃　朱砂　桔梗　羌活
當歸　升麻　川烏　龍骨齒
犀角　芍藥　鬼箭炒　白僵蚕炒
川芎　南星炮　山梔子　陳皮
木香　白术　龍頭骨酥炙　紫蘇子炒
莽草　枳殻　檳榔二個　黃芩以上各七分
麻黃　蜈蚣二條酒炙　乾蝎炒一分

右細末每服二錢酒調下日三服
頃在嶽城日嘗修合神精丹一料庚申予家一婦人
夢中見二倉頭一在前在後手中持一物前者云到
也在後應云到也擊一下爆然有聲遂魘覺後心一
點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一證
取三粒令服之遂至府過所少頃歸已無病矣云服
藥竟痛止神醒如常矣日後相識稍有邪氣與一二
服無不應驗方在千金治中風之要藥但近世少得青
磁石為難合耳
人平居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉
不能開口啞不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移
時方寤此由出汗過多血少氣併於血陽獨上而不下
氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時
方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜白微湯倉公散

白微　當歸各一兩　人參半兩　甘草一分

右粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

倉公散

瓜蒂末　藜蘆　雄黃　礬石炒

右各等分細末少許吹入鼻中
　腹脇疼痛方
治男子疼痛枳實散

枳實一兩　白芍藥炒黃　雀腦芎　人參各半兩

右細末姜棗湯調下二錢酒亦可食前日三服
治脇肋下痛不美食葛根湯

葛根半兩　桔梗　防風　枳殼
白芍藥　甘草　訶子　川芎

白术各一分

右爲粗末每服四錢水一盞半姜棗同煎至七分去滓温服日三四服

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊急腰脚重滞兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊膂攣急此藥大治脇痛枳殼散

枳殼　細辛　桔梗　防風

川芎各四兩　葛根一兩半　甘草二兩

右粗末每服四錢水一盞半姜三片煎至七分去滓空心食前温服

治脇痛如前兼去手足枯悴薏苡仁圓

薏苡仁一兩　石斛用細者三分　附子半兩　牛膝

生地黄各一分　細辛　人参　枳殼

柏子仁　川芎　當歸各半兩　甘草

桃仁各一分

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒呑下空心食前日再三服丸子可食前煮散可食後相兼服爲佳

治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已桂枝散

枳殼一兩小者　桂枝半兩

右細末每服二錢姜棗湯調下

治脇下疼痛不可忍兼治脚弱芎葛湯

川芎　乾葛　桂枝　細辛

枳殼　人参　芍藥　麻黄

防風各半兩　甘草各一分

右粗末每服五錢水二盞姜三片同煎至七分去滓温服日三服有汗避風

沈存中良方載項在建康醫者王琪言諸氣唯膀胱氣脇下痛最難治謂神保丸能治之熙寧中病項筋痛諸醫皆作風治之數月不差乃流入背膂久之又注右臂攣痛甚苦憶琪語有此一證乃合服之一服而差再發又一服差神保有丸具本方

治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛湊心其積屬肝在右脇下故病發則右邊手足頭面昏痛不思飲食止頭冷

乾姜一兩　麻黄三分　側子一個　川芎

防風　枳實　芍藥　桂枝

羌活　甘草　當歸各四兩

右粗末每服四錢水一盞半姜三片同煎至七分去滓通口服日三四服有汗避風

雜病

雄黄治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云合醫方合五毒之藥用黄堥置不胆丹砂雄黄礜石磁石其中燒之三日三夜其烟上者以雞羽取之

以往劍惡肉破骨則盡出楊大年常等記其事族人楊
嵎年少時有瘍生于頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出
膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方弥年不差人語之
依鄭法製藥成注之瘡中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈
後更安寧信古方攻病之速也黃螢即瓦合也

崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味
隨人所食多少擣取汁搜麵作餺飥或作冷淘良久當
利出虫長一尺許頭似壁宮後不復患劉禹錫傳信方
正元十年通事舍人崔杭女患心痛垂氣絶遂作地黃
冷淘食之便吐一物可方一寸以來如蝦蟇狀無目足
等微似有口蓋為此物所食自此頓愈麵中忌用鹽

唐峽州王及郎中充西路安撫使判官乘騾入駱谷及
宿有痔病因此大作其狀如胡瓜貫于腸頭熱如溏灰
火至驛僵仆主驛吏云此病某曾患來須灸即差用柳
枝濃煎湯先洗瘡便以艾炷灸其上連灸三五壯忽覺
一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉
後遂失胡瓜登騾而馳

服桑枝法桑枝一小升細切炒香以水三大升煎取二
升一日服盡無時圖經云桑枝平不冷不熱可以常服
療体中風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣
嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口
乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子政和間

予嘗病兩臂痛服諸藥不效依此作數劑臂痛尋愈

治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異用黃連末一兩
白羊子肝一具去膜同于砂盆內研令極細衆手為丸
如梧子大每服以溫水下三十圓連作五劑但是諸眼
目疾及障翳青盲皆治忌豬肉冷水唐崔承元者因官
治一死囚出活之因後數年以病自致死一旦崔為內
障所苦喪明逾年後半夜嘆息獨坐忽聞階除悉窣之
聲崔問為誰徐曰是昔蒙活者囚今故報恩至此遂以
此方告之言訖而沒崔依此合服不數月眼復明

江左常有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲
滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食々多則覺膊
內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸
藥不拘草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口
商人戲曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日
成痂遂愈然不知何疾也

唐鄭相公予為海南節度七十有五越地卑濕傷于內
外衆疾俱作陽氣衰絶乳石補益之藥一日端不應元
和七年有訶陵國舶主李摩訶献此方經七八日而覺
應驗自後常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳
之其方用破故帋十兩揀洗為末用胡桃肉去皮二十
兩研如泥即入前末更以好煉蜜和匀如飴盛瓷器中
旦日以溫酒化藥一匙服之不飲酒溫熟水化下弥久

則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血番
人呼為補骨脂圓
江陵府節度使進稀莶方元臣有弟訢年三十一中風
床枕五年百毉不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌
稀莶圓必愈其藥久生沃壤五月間収洗去土摘其葉
及枝頭九蒸九曬不必大燥但取蒸為度杵為末煉蜜
丸如梧子大空心溫酒或米飲下二十丸至三十丸所
患忽加不必憂至四十丸必復如故五十丸當復丁壯
奉宣府毉集汎詳録又知益州張詠進表云臣因換龍興
觀掘得一碑内說修養氣術并藥方二件依方差人訪
問採覔其草頭有異金稜紫線素根紫荄對節而生蜀
號火炊草葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之效
臣自吃至百服眼目清明後至千服髭鬢烏黑筋力校
健矣効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜
馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴七十患
偏風口眼喎斜時時吐涎臣與十服亦便差今合一百
劑差職員史元奏進
唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜
半痞絶脇有塊大如石且死困塞不知人三日家人號
哭滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊
散用杉木節一大升桔葉一升無葉以皮代之大腹檳
榔七箇合子碎之童子小便三大升共煑之一升半分
二服若一服得快利停後服以前三死皆死矣會有救
者皆得不死恐他人不幸有類予病故傳
崔給事頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按
毬子其軍將以杖相格承勢不能止因傷李相拇指并
爪甲劈裂遽索金瘡藥裹之强坐頻索酒飲至數杯已
過量而面色愈青忍痛不止有軍吏言取葱新折者便
入溏灰火煨葱熱剝皮劈開其間有涕取罨損處仍多
煨取續續易熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛
凡十數度易用熱葱并涕裹縛遂畢席笑語
驢尿治反胃外臺載昔幼年曾患此疾每食餅及羹粥
等須臾吐出正觀中許奉御兄弟及柴蔣等時稱多毉
奉勑令治罄竭其術竟不能療漸至羸憊死在朝夕忽
有一衛士云服驢小便極驗日服二合後惟吐一半晡
時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏
知大内中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒
服時不可過多盛取極熱服二合病深七日以來服之
良驗
葛洪云鬼疰者是五尸之一疰又挾諸鬼邪為害其病
變動乃有三十六種至九十九種大約使人寒熱淋瀝
沉沉默默不的知所苦無處不惡累年積月漸就沉滯
以至于死傳與傍人乃至滅門覺如是候者急治獺肝
一具陰乾杵末水服方寸匕日三未知再作肘後云此

方神良宣和間天慶觀一法師行考訟極精嚴時一婦
人投狀述患人為祟所附須臾召至附語云非我為禍
別是一鬼亦因病衰為祟耳渠今已成形在患人肺中
為蟲食其肺系故令吐血聲嘶師掠之云此蟲還有畏
忌否久而無語再掠之良久云容某說惟畏獺爪屑為
末以酒服之則去矣患家如其言得愈此乃予目所見
也究其患亦相似獺爪者殆獺肝之類歟

類證普濟本事方卷之七終

類證普濟本事方卷第八

傷寒時疫

治太陽中風陽脉浮陰脉弱發熱汗出惡寒鼻鳴乾嘔

桂枝湯 今傷風古方謂之中風

桂枝　芍藥一兩半　甘草一兩炙

右粗末炒五錢水一盞半生姜三片棗一枚同煎至
七分去滓溫服若二三月病宜陽旦湯

治太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘麻黃湯

麻黃去節百沸湯泡去黃汁焙乾一兩半　桂枝一兩　甘草半兩

右粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服加
減法並依活人書仲景論傷寒一則桂枝二則麻黃
三則青龍桂枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見
寒脉傷寒見風脉三者如鼎立人皆能言之而不曉
前人處方用藥之意故堅者多不用無足怪也且脉
浮而緩者中風也故嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱
仲景以桂枝對之浮緊而濇者傷寒也故頭痛發熱
身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘仲景以麻黃對
之至于中風脉緊傷寒脉浮緩仲景皆以青龍對之
何也予常深究三者若證候與脉相對用之無不應
手而愈何以言之風傷衛之氣也寒傷營之血也榮
行脉中衛行脉外風傷衛則風邪干陽氣陽氣未固
發越而為汗是以自汗而表虛故仲景用桂枝以發

其邪芍藥以治其血蓋中風則病在脉之外其病稍輕雖同曰發汗特解肌之藥耳故仲景于桂枝證云令遍身漐漐微似有汗者佳不可似水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反動榮血邪氣乘虛而襲之故病不除也寒傷營則寒邪入陰血而營行脉中者也寒邪居脉中非特營受病邪自内作則并與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱齒乾以煩冤仲景以麻黄發其汗又以桂枝甘草助其發散欲滌除内外之邪營衛之病爾大抵二藥皆發汗而桂枝則發其衛之邪麻黄并營衛治之亦自有深淺也何以驗之仲景桂枝第十九證云病常自汗出者此為營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣和諧故爾營行脉中衛行脉外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯又第四十七證云發熱汗出者此為營弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者營和而衛不和又第一卷云寸口脉浮而緊浮者為風緊者為寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒脉浮緊者營衛俱病也麻黄湯中并用桂枝此仲景之意也至于青龍雖治傷風見寒脉傷寒見風脉之病然仲景云汗出惡風者不可服之服之厥逆便有筋惕肉瞤之證故青龍一證尤難用須是形證諦當然後可行故王寔大夫證治上用桂枝麻黄各半湯慎之也

桂枝加附子湯

前方桂枝湯内附子半兩如前入姜棗同煎

有一士人得太陽病因發汗汗不止惡風小便澁足攣曲而不伸予診其脉浮而大浮為風大為虛予曰在仲景方中有兩證大同而小異一則小便難一則小便數用藥稍差有千里之失仲景第七證云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子第十六證云傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯以攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆一則漏風小便難一則有汗小便數或惡風或惡寒病各不同也予用第七證桂枝加附子湯三啜而汗止佐以甘草芍藥足使得伸其第十六證治法見本方

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝去皮　芍藥各一兩　甘草六錢三字

厚朴六錢三字

右剉如麻豆大抄五錢大水一盞半生薑五片肥棗二枚擘破同煎至八分溫服覆取微汗

戊申正月有一武臣為寇所執置舟中艎板下數日得脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂作傷寒自汗而鬲不利一醫作傷寒而下之一醫作解衣中邪而

汗之難治數日漸覺昏困上喘息高醫者愴惶失措予診之曰太陽病下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥者暖喘定再啜漐漐微汗至晚身凉而脉已和矣醫曰某平生不曾用仲景方不知其神捷如是予曰仲景之法豈誑後人也哉人自寡學無以發明耳

大柴胡湯

柴胡二兩　黄芩　芍藥各三分　半夏六錢三字

枳實二枚炒　大黄半兩伊尹湯液論大柴胡同姜棗共八味今監本無脫之也

右粗末炒五錢水一盞半生薑五片肥棗一枚煎至八分去滓温服以利為度未利又服

嘗記有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不除予曰脉洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除大黄蕩滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黄恐不名大柴胡須是酒洗生用為有力昔後周姚僧坦名醫也帝因發熱欲服大黄藥僧坦乃是快藥至尊年高不宜輕用帝不從服之遂至不起及元帝有疾諸醫皆謂至尊至貴不可輕服宜用平藥僧坦曰脉洪而實必有宿食不用大黄必無差理元帝從之果下宿食乃愈合用與不用必心上明得諦當然後可又記有人患傷寒身熱目痛鼻乾不得卧大便不通尺寸脉俱大已數日矣一夕汗出予謂速以大柴胡下之醫駭曰陽明自汗津液已漏法當行蜜兑何苦須用大黄藥予謂曰子只知抱穩若用大柴胡此仲景不傳之妙公安能知之耶予力爭之竟用大柴胡二服而愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若更下之豈不表裏俱虚又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發于陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈盛舉斯二者則其他疑惑處不可勝數此仲景之書世人罕讀也予以謂不然仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏凡稱急者有三處謂緩覺汗多未至津液乾燥便速下之則為經捷免致用蜜兑也若胸中識得了了方可無疑若未能了了誤用之反不若蜜兑為穩也

又記一鄉人傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒醫者用巴豆藥下之雖得溏利病宛然如舊予視之陽明熱結在裏非大柴胡承氣等不可巴豆止去積安能蕩滌邪熱蘊毒耶亟進大柴胡等三服得汗而解嘗謂仲景百十三方為圓者有五理中陷胸抵當烏梅麻人是以理中陷胸抵當皆大彈子煑化而服與湯散無異至于麻人治脾約烏梅治濕䘌皆用小圓以達下部其他逐邪毒破堅癖導瘀血潤燥屎之類皆憑

湯劑未闕用巴豆小圓藥以下邪氣也既下而病不除不免重以大黃朴硝下之安能無損也哉

治濕温多汗白虎加蒼术湯

知母六兩　甘草二兩炙　石膏一斤

蒼术三兩　粳米三兩

右剉如麻豆大每服四大錢水一盞半煎至八分去滓取六分清汁温服

癸丑年故人王　季夏得疾胸項多汗兩足逆冷　語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脉關前濡關後數予曰當作濕温治蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕温先以白虎加人參湯次以白虎加蒼术湯頭痛漸退足漸温汗漸止三日愈此病名賊也誤用藥有死之理有醫難曰何名賊邪予曰難經論五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝者為賊邪從所勝者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經又云濕温之脉陽濡而弱陰小而急濡弱見于陽部濕氣搏暑也小急見于陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕温濕是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漐漐未嘗乾每服此藥二三盞即便愈

黃芪建中加當歸湯

黃芪　當歸各半兩　白芍藥三兩

肉桂一兩一分　甘草一兩

右粗末每服五錢生姜三片棗一枚水一盞半同煎至八分去滓取清汁七分日三服夜二服尺脉尚遲再作一劑

昔有鄉人邱生者病傷寒予為診視發熱頭疼煩渴脉雖浮數而無力尺以下遲而弱予曰雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者營氣不足血氣微少未可發汗予于建中湯加當歸黃芪令飲翌日脉尚爾其家煎迫日夜督發汗藥若不遜矣予忍之但只用建中調營而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜第二服發狂須臾稍定略睡已中汗矣信知此事是難是難仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表裡虛實待其時日若不循次第暫時得安虧損五藏以促壽限何足貴也南史記范雲初為陳武帝屬官武帝有九錫之命在旦夕矣雲忽感傷寒之疾恐不得與慶事召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便差甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死可猶況二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲于上頃刻汗解裡以溫粉翌日愈雲甚喜文伯

曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日便欲速効乎每見病家不耐病未三四日晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事故予書此為醫者之戒

蜜兑法

必用方中製度甚詳

有一士人家病者二人皆旬日矣一則身熱發汗大便不通小便如經神昏如睡診其脉長大而虛予用承氣湯下之而愈一則陽明自汗大便不通小便利津少口乾燥其脉亦大而虛予作蜜兑三易之下燥屎得溏利而解其家問曰皆陽明大便不通何治之異予曰二陽雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五藏為無津液也然則傷寒大證相似與證稍有不可要在變通仔細斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通不相侔者于一時之中又有淺深故此不可不謹

治陰中伏陽破陰丹

硫黃　水銀各一兩　陳皮　青皮去皮各半兩末

右先將硫黃銚子內鎔次下水銀用鐵杖子打勻令無星傾入黑茶盞內研細入二味勻研用厚麪糊圓如桐子大每服三十圓如煩躁冷鹽湯下如陰證艾湯下

頃年鄉人李信道得疾六脉沉不見深按至骨則弱緊而有力頭疼身溫煩躁指末皆冷中滿惡心更兩醫矣醫者不識止供調氣藥予因診視曰此陰中伏陽也仲景法中無此證世人患此者多若用熱藥以助之則為陰邪隔絕不能導引真陽返生客熱用冷藥則所伏真火愈見消爍須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得汗而解予授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不半時煩躁狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定略睡已中汗自昏達旦方止身凉而病除

治婦人室女傷寒發熱或發寒熱經水適來或適斷晝則明了夜則譫語如見鬼狀亦治產後惡露方來忽爾斷絕小柴胡加地黃湯

柴胡一兩一分　人參　半夏湯洗七次

黃芩　甘草　生地黃各半兩

右粗末每用五錢水二盞生薑五片棗二枚同煎至八分去滓溫服

辛亥中寓居毘陵學官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇夜則如有鬼物所憑六七日忽昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢極危召予視予曰得病之初曾值月經來否其家云月經方來病作而經遂止得一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日來

涎生不省人事予曰此熱入血室證也仲景云婦人中風發熱惡寒月經適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以刦劑與之遂致胸膈不利涎潮上管喘急息高昏冒不知人當先化其涎後當除其熱予急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次投以小柴胡加地黃湯三服而熱除不汗而自解矣

又記一婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥涵養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡用已遲不可行也無已則有一焉刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈或者問曰熱入血室何為而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫言而見鬼復入胆中則血結于胸也何以言之婦人平居水當養于木血當養于肝也方未受孕則下行之以為月既妊娠則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳皆血也今邪逐血併歸肝經聚于胆中結于乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也活人書海蛤散治結胸今具于後

婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近海蛤散

海蛤　滑石　甘草各一兩　芒硝半兩

右為末每服二錢鷄子清調下小腸通利則胸膈血散胆中血聚則小腸壅小腸壅胆中血不流行宜此方小便血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方疑非仲景然其言須有理姑存之

治太陽病汗過不解頭眩筋惕肉瞤真武湯

茯苓　芍藥各三分　附子一枚

白朮半兩加減法從本方

右粗末抄五錢生姜五片水一盞半煎八分去滓溫服日三服

鄉里有姓京者以鬻純為業子年三十初得病身微汗脉弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫者又進驚風藥予曰强汗之過也仲景云脉微弱汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心圓竹葉湯數日遂愈

白虎加人參湯

方在活人書第六十五證

有人病初嘔吐俄為醫者下之已七八日矣而內外發熱予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八

日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯此正相當也蓋始吐者熱在胃脘而脉至今虛大三投湯而愈仲景既稱傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯又云脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之國朝林億校正謂仲景于此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒中暍表裏發熱故後二證或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之有一種脉浮無汗其表不解全是麻黄與葛根證安可用白虎也林但見所稱表裏不同便謂之差互是亦不思之過也

治傷寒汗後吃噫肉豆蔻湯

肉豆蔻一个 石蓮肉少 茴香各一分

丁香半分 人參半兩 枇杷葉五片拭去毛炙

右剉細用水四盞生姜十片煎二盞去滓空心溫分二服

良姜湯

橘皮 良姜 桂枝 當歸各一分

麻黄半兩 杏仁廿个 甘草一分 梹榔三个別末

右粗末用水四盞姜十片棗三個同煎至二分去滓下梹榔末更煎三沸通口服一盞未已再作一劑

龐老云傷寒吃噫不止是陰陽氣升降欲作汗升之不止故胃氣上逆為吃噫無休止用此方

又方

枳殼半兩 木香一錢

右細末每服一錢白湯調下未知再與

治傷寒衄血滑石湯

以滑石末不拘多少飯圓如桐子大每服十圓微嚼破新水嚥下立止只用藥末一大錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服

湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不拘多少乃得止且溫服和藥以調其榮衛纔見血鮮急以此藥止之

桂枝湯方在前

有人病發熱惡寒自汗脉浮而微弱三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首今人全不用若惜仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡風淅淅惡寒翕翕發熱宜桂枝湯此脉與證仲景說得甚分明止是人看不透所以不敢用仲景云假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也此謂元受病不然也又曰陽微則惡寒陰弱則發熱醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所病而然也大抵陰不足陽往從

之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白如何憚而不行桂枝哉

治胃中有熱有濕有宿穀相搏發黃茵蔯蒿湯

茵蔯蒿 嫩者一兩半 大黃 三分 梔子 小者十枚

右粗末每服一錢水一盞半煎至八分去滓調五苓散二錢服以知為度

治頭中寒濕發黃疸瓜蒂散

瓜蒂 二七個 赤小豆 秫米 各二七粒

右細末如大豆大一枚許納鼻中縮鼻令入當出黃水慎不可吹入

庚戌年避地維揚界有一家病傷寒七八日身體洞黃鼻目皆痛兩髀及項頭腰脊强急大便溏小便如金予曰脉緊且數脾元受濕暑熱蘊蓄于太陽之經宿穀相搏欝蒸而不得散故使頭面有汗至頸以下無之若病中氣冷寸口近掌無脉則不療急用茵蔯湯調五苓散與之數服差

又記一家病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如經予診之脉大而虛鼻塞且煩予曰非濕熱宿穀相搏此乃頭中寒濕茵蔯五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈仲景無藥方此方見外臺删繁證云治天行熱蓋通貫臟腑沉鼓骨髓之間或為黃疸宜瓜蒂散蓋此方也

又記一舟梢病傷寒發黃鼻中酸痛身與目如金小便赤而數大便如經或者欲行茵蔯五苓予曰非其治也小便和大便如常知病不在臟腑今眼睛疼鼻頞痛是病在清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹為逆亦用瓜蒂散先食水次搐之鼻中黃水盡乃愈

類證普濟本事方卷八終

類證普濟本事方卷第九

傷寒

治結胸發熱灸法

巴豆十四枚　黄連七寸連皮用

右搗細用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以温湯浸手帕拭之恐生瘡也

治傷寒發狂或棄衣奔走踰墻上屋鵲石散

黄連　寒水石各等分

右細末每服二錢濃煎甘草汁放冷調服

桂枝麻黄各半湯在前

常記一親戚病傷寒身熱頭疼無汗大便不通已四五日予訊問之見醫者治大黄朴硝等欲下之予曰子姑待之予爲視之脉浮緩卧密室中自稱其惡風予曰表證如此雖大便不通數日腹亦不脹別無所苦何遽便下大抵仲景法須表證罷方可下不爾邪乘虚而入不爲結胸必爲熱病也予作桂枝麻黄各半湯繼之以小柴胡漐漐汗出大便亦通而解仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之當先解表乃可下之若表已解而內不消大滿大堅實有燥屎自可徐下之雖四五日不能爲禍也若不宜下而便攻之內虚熱入協熱遂利煩燥之變不可勝數輕者困篤重者必死矣元本正文重叠雜亂予刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥屎或大便堅秘須是脉不浮不惡風表證罷乃可下大便不通雖四五日不能爲害若不顧表而便下遂爲協熱利也

治蓄血抵當圓

水蛭五枚炙　虻虫五枚去翅足炒　桃人六枚　大黄三分去皮

右爲末煉蜜和作一圓以水一盞煎至七分頓服晬時當下血不下再作之

有人病傷寒七八日脉微而沉身黄發狂小腹脹滿臍下冷小便利予曰仲景云太陽病身黄脉沉結小腹硬小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也投以抵當圓下黑血數升狂止得汗解經云血在上則忘在下則狂太陽膀胱隨經而蓄于膀胱故臍下膨脹由闌門滲入大腸若大便黑者此其證也

破陰丹方在前

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰證也急服金液破陰來復等丹其脉遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰而見陽脉有可生之理仲景所謂陰病見陽脉者生也仍灸氣海丹田百壯手足温陽回得汗而解或問滑沉之狀如何便有生理予

曰仲景云翕奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翕為正陽陰陽和合故名曰滑古人論滑脉雖云往來前却流利展轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字极難曉翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翕而合俄降而下奄為奄忽之間仲景云滑脉可謂諦當矣然其言皆有法故讀書難曉

治傷寒汗後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和宜服補脾湯

人參　乾薑　白朮

甘草　陳橘皮去白　青橘皮去白各等分

右細末每服三錢水一盞煎數沸熱服入盐點亦得

又記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得寧真勞復也予診曰劳心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神營衛失度當補其子益其脾解發其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡得解或者難曰虚則補其母今補其子何也予曰子不知虚劳之異乎難經曰虚則補其母實則瀉其子此虚當補其母人所共知也千金曰心劳甚者補脾氣以益之脾王則感于心矣此劳則當補其子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虚則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺体受蔭同義方治其劳則補其助我者與荀子所謂未有子富而父貧同義此治虚與劳所以異也

治中暍白虎湯方在本論中

有人頭疼身熱心煩燥渴診其脉大而虚予授以白虎湯數服愈仲景云脉虚身熱得之傷暑又云其脉弦細芤遲何也素問云寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脉虚弱所謂弦細芤遲者皆虚脉也仲景以弦為陰朱肱亦曰仲景脉微弱則皆虚脉可知

麻黄湯方在前

有人病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證也當汗之以麻黄湯或人問曰傷寒大抵因虚故邪得以入之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪之所湊其氣必虚留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虚及邪居中則反為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虚實能明此四字則仲景三百九十七法可坐而定也何以言之有表實有表虚有裏實有裏虚有表裏俱實有表裏俱虚予于表裏虚實歌中常論其事矣仲景麻黄湯之類為表實而設也桂枝湯之類為表虚而設也若裏實則承氣之類是也裏虚則四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虚下之則愈也表裏俱虚所謂陽虚陰盛汗之則愈也常讀華佗傳有府吏倪尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同

他曰尋當下之証當發汗或雖其異他曰尋外寔証
內寔故治之異

小柴胡湯

柴胡二兩　黃芩　人參
甘草各三分　半夏六錢一字洗七次

右粗末每服五錢水一盞半姜五片棗二枚同煎至八分去滓溫日三服加減法活人書所載甚詳記有人患傷寒五六日頭汗自出頭以下無汗手足冷心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰證予診其脉浮而緊予曰此證誠可疑然大便結非虛結也安得為陰脉雖沉緊為少陰證多是自利未有秘結者予謂此正半在裏半在表投以小柴胡得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脉細者此為陽微結必有表復有裏也脉沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在外半在裏也脉雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解此疾症候同故得屎而解也有人難曰仲景云病人脉陰陽俱緊反汗者亡陽也此屬少陰今云陰不得有汗何也今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰症予曰此一段正是仲景議論處意謂四肢冷脉沉緊腹滿全似少陰然大便硬頭汗出不得為少陰盖頭者三陽同聚若三陰止胸而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脉法云心者火也名少陰其頭無汗者可治有汗者死心為手少陰腎為足少陰相與為上下惟以意逆者斯可得之

治太陽陽明合病麻黃湯方在前

有人病傷寒脉浮而長喘而胸滿身熱頭痛腰脊强鼻乾不得眠予曰太陽陽明合病症仲景法中有三證下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胸滿者麻黃湯也治以麻黃得解有人問傷寒傳入之序自太陽陽明少陽太陰少陰厥陰所傳有次第何哉予曰仲景本論無說古今亦無言者惟龐安常謂陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪陰主殺故足少陽木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木為賊邪予以謂不然足少陰水傳厥陰木安得為賊邪盖牽强傳會失之穿鑿何不觀素問陰陽離合論云太陽根起于至陰名曰陰中之陽陽明根起于厲兌名曰陰中之陽少陽根起于竅陰名曰陰中之少陽太陽根起于隱白名曰陰中之太陰少陰根起于湧泉名曰陰中之少陰厥陰根起于大敦名曰陰中之絕陰故其次序正與此合大抵傷寒

始因中風寒得之于陰是以止傳足經者皆陰中之陽陰中之陰也不特此也以六氣在天者考之厥陰爲初之氣少陰爲二之氣太陰爲三之氣少陽爲四之氣陽明爲五之氣太陽爲終之氣此順也逆而言之太陽而後陽明陽明而後少陽少陽而後太陰太陰而後少陰少陰而後厥陰傷寒爲病逆而非順故以是爲序也

小承氣湯方具仲景本論

有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下利大便不通三日矣非煩非燥非寒非痛終夜不得卧但心中無曉會處或時發一聲如歎息狀之醫者不曉是何症予診之曰此懊憹怫鬱二症俱作也胃中有燥屎承氣湯下燥屎二十餘枚得利而解張仲景云陽明病下之心下懊憹微煩胃中有燥屎者可攻又云病者小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不得卧者有燥屎也承氣湯主之素問云胃不和則卧不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大便堅者必譫語此所以有時發譫語也非燥非煩非寒非痛所謂心中懊憹也聲如嘆息而時發一聲所謂外氣怫鬱也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也　又有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走予曰此誠惡候得此者十中九死仲景雖有證而無治法但云脉弦者生濇者死〻已經吐下難于用藥謾且救之若大便得通而脉弦者庶幾可治也與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脉且微弦半月愈或人問曰下之而脉弦者生此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱譫語承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋衣領及捻物者肝熱也此症在玉函列于陽明部蓋陽明胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脉則肝平而胃不受尅此所以有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奥者守一書者吾未見其能也

又記有人病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或者見下利便以譫語爲鄭聲爲陰虚證予曰此小承氣症衆皆駭曰下利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云下利而譫語者有燥屎也屬小承氣湯而得解予嘗讀素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰何謂反治岐伯曰寒因寒用通因通用王冰注云大熱内結注瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下之結散利止則寒因寒用也正合乎此

治項背強葛根湯

葛根一兩　麻黄三分　桂枝
甘草　芍藥各半兩
右粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服覆
汗為度
有人患傷寒無汗惡風項既屈而且强予曰項强兀
兀葛根湯證或人問曰何謂兀兀予曰兀兀者如兀
足疾屈而强也謝復古謂病人羸弱須兇兀而起譔
也蓋仲景論中極有難曉處振振欲擗地心中懊憹
外氣怫鬱鬱冒不仁鬲內拒痛如此之類甚多
熙寧中邦守宋迪因其猶子感傷寒之初不能辨其
病證見其煩渴而汗多以京藥解治之至于再三遂
成陰毒六日卒乃痛悼之遂著陰毒形證訣三篇

始得陰毒

陰毒本因腎氣虛寒因欲事或食冷物後傷風內既
伏陰外又感寒或先感外寒而伏內陰內外皆陰則
陽氣不守遂頭痛腰重腹痛眼睛疼身体倦怠而不
甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精
神恍惚如有所失二三日間或可起行不甚覺重診
之則六脉俱沉細而疾尺部短小寸口或大　大脉俱
浮大或沉取之大而不甚疾者非陰疾也　若服凉藥
過多則渴轉甚燥轉急有此病證者急服還陽退陰
二藥惟補氣和氣而已宜服正元散退陰散五勝散
即安陰症不宜發汗如氣正脉大身熱而未差用藥
出汗無妨

正元散治傷寒如覺傷寒吹著四肢頭目百骨節疼痛
急煎此藥服如人行五里再服或連進三服出汗立差
若患陰毒傷寒入退陰散半錢同煎或傷冷傷食頭昏
氣滿及心腹諸疾服之無有不見効
麻黄去節　陳皮　大黄生　甘草
乾薑　肉桂　芍藥　附子
茱萸　半夏洗各等分
右麻黄加一半茱萸减一半同為末服一大錢水一
盞生姜三片棗一枚煎至七分熱呷如出汗以衣被
蓋覆切須候汗乾去衣被如是陰毒不可用麻黄免
更出汗

退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重連進
三服小小傷冷每服一字入正元散內同煎入鹽一捻
陰毒傷寒欬逆煎一服細細熱呷便止
川烏　乾姜各等分
右為細末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水
一盞鹽一捻煎半盞去滓溫服

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦欬嗽鼻
塞不思飲食兼治傷寒夾冷氣并慢陰毒神効方
白术　甘草　五味子

石青各四兩　乾姜三兩半
右為末每服二錢水八分盞入塩少許同煎至六分
通口服如冷氣相夹入姜棗煎或治陰毒病入艾少
許同煎
陰毒漸深候
積陰感于下則微陽消于上故其候沉重四肢逆冷
腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬燥渴虛汗
不止或時狂言指甲白色青黑六脉沉細而一應七
至以來有此症者速宜于氣海或關元二穴灸三二
百壯以手足和煖為効仍服金液丹來甦丹玉女散
還陽散退陰散
玉女散治陰毒氣攻上腹痛四肢逆冷惡候並治之
川烏去皮臍冷水浸七日後薄切曝乾紙袋盛有患
者取碾末一大錢入塩一小錢水一盞半煎至七分
通口服壓下陰毒所注如猪血相似未已良久再進
一服
還陽散治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛
用硫黄末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一
起更看緊慢再服汗出差
陰毒沉困候
沉困之候與前漸深之候皆同而更加困重六脉附
骨取之方有接之即無一息八至已上或可救也至
此則藥餌難為工矣但于劑中灼艾如半棗大三百
壯以來手足不和緩者不可治也偶復和緩則以前
硫黄及熱藥助之若陰氣散陽氣來即漸減熱藥而
和之治以取差也
辨少陰脉緊證
記有人患傷寒六七日心煩昏睡多吐小便白色自
汗予診之寸口尺中俱緊予曰寒中少陰之絡是以
脉緊仲景云病人脉緊而汗出者亡陽也屬少陰法
當咽痛而復下利蓋謂此也有難之曰脉訣緊脉屬
七表仲景以緊脉屬少陰緊脉屬陽耶屬陰耶予曰仲
景云寸口脉俱緊者清邪中於上焦濁邪中于下焦
又云陰陽俱緊者口中出氣唇口乾燥踡卧足冷鼻
中涕出舌上胎滑勿妄治也又云緊則為寒又云諸
緊為寒又云曾為人所難緊脉從何而來師云假令
亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊假令咳者坐飲冷水
故令脉緊假令下利以胃虛故令脉緊又云寸口脉
微尺脉緊其人虛損多汗由是觀之則是寒邪之氣
入人經絡所致皆虛寒之脉也其在陽經則浮而緊
在陰經則沉而緊故仲景云浮緊者名為傷寒又曰
陽明脉浮而緊者必潮熱此在陽則浮而緊也在陰
則沉而緊故仲景云寸口脉微尺脉緊其人虛損多
汗則陰常在絕不見陽又云少陰脉緊至七八日自

下利脉暴微手足反温脉緊反去者此欲解也此在陰則沉而緊也仲景云浮為在表沉為在裏數為在府沉為在藏欲知表裏藏府先以浮沉遲數為定然後兼于脉而別陰陽也故論傷寒當以仲景脉法為准傷寒必本仲景猶兵家之本孫吳葬書之本郭氏三命之本珞琭壬課之本心境捨是而之他是猶捨規矩而求方圓捨律呂而合五音必乖謬矣予常作傷寒歌百篇其首篇[五]傷寒脉證總論篇第一皆本仲景今謹錄于後

浮大數動滑陽脉陰病見陽生可得沉濇弦微弱屬陰陽病見陰終死厄 仲景云脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死 陰陽交互最難明輕重斟量當別白 脉須有陰陽須看輕重以分表裏在下文 輕手脉浮為在表表實浮而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常淅淅 傷寒先要辨表裏虛實此四者為急仲景浮為在表沉為在裏然表正有虛有實浮而有力者表實也故無汗不惡風浮而無力者表虛也故自汗惡風 重手脉沉為在裏ゝ實脉沉來亦實重手無力大而虛此是裡虛裡審的 裡正亦有虛實脉沉而有力者裏實也故腹滿大便不通沉而無力者裏虛也或泄利或陰証之類此八句辨表裏虛實盡矣 風則虛浮寒堅牢水停水蓄必沉潛動則為病數為熱飲病應須脉急弦太過之脉為可怯不及之脉亦如然 仲景云風則虛浮寒則牢堅沉潛水入支飲急弦動則為痛數則熱煩太過可怯不及亦然邪不空見中必有奸 營衛太盛名高章高章相搏名曰綱營衛微時名卑惵卑惵相搏損名揚營衛既和名緩遲緩遲名沉此最良九種脉中辨病正長沙之脉妙難量 仲景云寸口衛氣盛名曰高營氣盛名曰章高章相搏名曰綱衛氣弱名曰惵營氣弱名曰卑惵卑相搏名曰損衛氣和名曰緩營氣和名曰遲緩遲相搏名曰沉大抵仲景論傷寒症候自是一家 瞥瞥如有羹上肥此脉定知陽氣微縈縈來者蛛絲細却是體中陰氣衰脉如瀉漆之絕者病人亡血更何疑 仲景云瞥瞥如羹上肥者陽氣微也脉縈縈如蛛絲細者陽氣衰也脉綿綿如瀉漆之絕者亡血也陽氣衰千金作陰氣 陽結藹藹如車蓋陰結循竿亦象之 仲景云藹藹如車蓋者陽結也如循竿者陰結也 陽盛則促來一止陰盛則結緩而遲 此謂促雖一脉也仲景云脉來緩時一止名曰結脉來數時一止名曰促脉陽盛則促陰盛則結 縱橫逆順宜審察殘賊災怪要須知 仲景云脉有相乘有縱有橫有逆有順何謂也曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也又問曰脉有殘賊何謂也師曰脉有弦緊浮滑沉濇名殘賊能為諸脉作病也

又問曰脉有眞性何謂也答曰藏時脉兼令乃發爲眞
性脉靜人病內虛故人安脉病曰行尸仲景曰脉病人
不病曰行尸以無王氣卒仆不知人病脉不病名曰內
虛以無穀神雖困無苦右手氣口當主氣主血人迎左
其位氣口緊盛食必傷人迎緊盛風邪熾左爲人迎右
爲氣口人迎緊盛傷于風氣口緊盛傷于食數爲在府
遲爲藏浮爲在表沉爲裏仲景云浮爲在表沉爲在裏
數爲在府遲爲在藏 脉浮而緩風傷衛浮緊堅濇寒傷
營脉微大忌令人吐欲下猶防虛且細仲景云脉微不
可吐虛細不可下沉微氣弱汗爲難三者要須當審記
孫用和云陰虛脉沉微而氣弱者不可汗下吐汗三候

脉有不可行者當審之陽加于陰有汗正在左手沉微
却應未素問云陽加于陰爲之汗趺陽胃脉定死生仲
景云趺陽脉者凡十有一太谿腎脉爲根蒂傷寒必診
太谿趺陽者謂人以腎脉胃脉爲主仲景譏世人握手
不及足者死 脉來六至或七至邪氣漸深須用意浮大
晝加病屬陽沉細夜加分陰位九至以上來短促狀若
湧泉無入氣更加懸絕漸無根命絕天根當死矣孫用
和云脉至七至六至以上浮大晝加病更及八至精神
消神氣亂必有散脫精神之候須忌急爲治療又加之
九至十至雖和扁亦難治如八至九至加以懸絕治者
無根也如泉之湧脉無入氣天眞絕必死也病人三部

脉調勻大小浮沉遲速類此是陰陽氣已和勿藥自然
應有喜仲景云寸口關上尺中三處大小浮沉遲速同等
雖有寒熱不解此脉已和爲必愈
發熱惡寒近似傷寒者有五種脉浮而數其人發熱而
惡寒者傷寒之候也脉浮而緊其人發熱惡寒或有痛
處是欲爲癰瘍也脉浮按之反濇其人發熱惡寒或膈
實而嘔吐此是傷食也脉浮而滑其人發熱不背寒或
頭眩而嘔吐此是風痰之症也脉浮而弦其人發熱而
惡寒或思凡食此是欲作瘧疾也能辨其脉又驗其證
斯無誤也

類證普濟本事方卷之九終

類證普濟本事方卷第十

治婦人諸疾

治婦人營衛氣虛挾風冷胸脇𦡶脹腹中疞痛經水愆期或多或少崩傷漏下腰腿痛重面色青黃嗜臥無力安胎止痛補虛益血四物湯

當歸　熟地黃　白芍藥　芎藭各等分

右粗末每服四錢水一盞半至八分去滓溫服不以時候

滑胎枳殼散

商州枳殼二兩　甘草一兩

右細末每服二錢百沸湯點服空心食前日三服凡懷孕六七月以上即服令兒易生初生胎小微黑百日以後肉漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣為衆方之冠

治妊娠衝任脉虛補血安胎內補圓

熟地黃二兩　當歸一兩微炒

右細末煉蜜和丸如梧子大每服三四十丸溫酒下

上三方諸集皆載之在人用之如何耳大率婦人妊娠惟在抑陽助陰素問云陰搏陽別為有子之兆関前為陽関後為陰尺中之脉按之搏手不絕者妊子也婦人平居陽氣微盛無害及其妊子則方閉經隧以養胎若陽盛搏之經脉妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥惟惡群隊若陰陽交雜別生他病惟是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故耳枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及

治婦人有孕傷食木香圓

木香二錢　京三稜　白茯苓　人參各三錢

右細末麵糊丸菉豆大每服三十丸熟水下

治妊娠氣不和調飲食白术散

白术　乾紫蘇各一兩　白芷微炒一錢　人參三錢

川芎　訶子皮　青皮各半兩　甘草一錢

右細末每服二錢水一盞姜三片煎七分不拘時候溫服

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生適在五味陰之五宮傷在五味若妊子飲食不節生冷毒物恣性食啖致脾胃之疾故妊娠傷食難得藥惟此二方穩捷

治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日下紫蘇飲

紫蘇莖葉一兩　大腹皮　人參　川芎

陳橘皮　白芍藥各半兩　當歸三錢　甘草一分

右細剉分作三服每服用水一盞半生姜四片葱白

七寸煎至七分去滓空心服

曾有婦人累日産不下服徧催生藥不驗予曰此必坐草太早心中懷一恐懼氣結而然非胎不順也素問云恐則氣下蓋恐則精却々則上焦閉々則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服便産及婦人六七月子懸者予用此數數有驗不十服胎便近下

下死胎方

桂末二錢麝香當門子一個同研溫酒服須臾如手推下此之用水銀等此藥不損血氣趙和叔傳

治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服是藥少得有効蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當知其陰陽調其血氣使不相乘以平為福宜紫石英圓

紫石英　禹餘糧燒淬　人參　龍骨
川烏頭炮　桂心　桑寄生　杜仲
五味子　遠志　澤瀉　當歸
石斛　茯苓　乾姜各一兩　川椒
牡蠣　甘草各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大飲下三十至五十丸空心食前

治婦人室女月後不通疼痛或成血瘕通經圓

桂心　青皮去白　大黄炮　乾薑
川椒　蓬莪朮　川烏　乾漆
當歸　桃仁各等分

右細末將四錢用米醋熬成膏和餘六錢末成劑臼中治之圓如梧子大晒乾每服二十丸用淡醋湯下加至三十丸溫酒亦得空心食前服

嶽州學丞張攢頃年緣事在淮勤院有王醫者以學職直宿日與之稔熟口傳此方渠甚秘之予後得此方以治婦人疾不可勝數且欲廣行不敢自秘尋常血氣凝滯疼痛數服便効有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見其寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視曰三部無寒邪但脉弦疾法長而上魚際宜服抑陰等藥予製此地黄圓

生地黄二兩　柴胡　秦艽　黄芩各半兩
赤芍藥一兩

右細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸烏梅湯吞下不拘時候日三服

昔宋褚澄療師尼寡婦別製方蓋有謂也此二種鰥居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒

乍熱全類溫瘧久則爲勞常讀史記倉公傳載濟北
王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也倉
公曰病得之欲男子不可得也何以知男子欲而不可
得診其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精爲
主婦人以血爲主男子精盛則思室婦人血盛則懷
胎夫肝攝血者也厥陰弦出寸口又上魚際則陰血
盛可知故知褚澄之言信有謂也矣

治婦人經水不調每行數日不止兼有白帶漸漸瘦悴
飲食少味累年無子地黃圓

熟地黃一兩　山茱萸　白蕪荑　乾姜
白芍藥酒微炒　代赭石醋淬各一兩
厚朴　白僵蚕

右細末煉蜜末丸如梧子大每服四五十丸空心酒
下日三服

此厖老方婦人有白帶是第一等病令人不產育宜
速治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦人所以專爲帶下醫
也

治婦人月經壅滯每發心腹臍疞痛不可忍及治產後
惡露不快血上搶心迷悶不省氣絶欲死琥珀散

京三稜　蓬莪术　赤芍藥　劉寄奴
牡丹皮　官桂　熟地黃　菊花
真蒲黃　當歸乾秤以上各一兩

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同
煮豆爛爲度焙乾入後五味同爲末每服二錢溫酒
調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡
索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣病只一服産
後血衝心二服便下常服尤佳予前後救人急切不
少此藥易合宜多合以救人

治婦人血瘕血積經候不通桃人圓

桃人去皮尖麩炒黃　大黃　川朴硝各一兩　䖟虫半兩炒黑

右四味末之以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一
升五合下大黃桃人䖟虫等不住手攪欲下元下朴
硝更不住手攪良久出之丸如梧子大前一日不用
吃飯食五更初用溫酒吞下五圓日午取下如赤豆
汁鷄肝蝦蟇如未下再作血鮮紅即止續以調氣血
藥補之

此出千金方頃年在毘陵有一貴人妻患小便不通
臍腹脹不可忍衆醫皆作淋治如八正散之類數種
治皆不退痛愈甚予診之曰此血瘕也非瞑眩藥不
可去予用此藥更初後至日午痛大作不可忍遂卧
少頃下血塊如拳者數枚小便如黑汁者一二升痛
止得愈此藥治病的切然猛烈太峻氣虛血弱者更
斟酌與之

治婦人妊孕六七月因事築磕著胎或子死腹中惡露

下痛爽不已口噤欲絶用此藥探之若不損則痛止子
母俱安若胎損立便逐下此藥催生神效佛手散
當歸　川芎各等分
右粗末每服三錢水一小盞煎令泣泣欲乾投酒一
大盞止一沸去滓溫服口噤灌之如人行五七里再
進不過三二服便生有一方云此藥治傷胎去血多
崩中去血多金瘡去血多拔齒去血多昏暈欲倒者
去水煎服
治崩中下血方
黃芩為細末每服一錢燒秤鎚酒調下崩中藥多是
用止血及補血藥此治陽乘陰前所謂天暑地熱經
水沸溢者
治下血不止或成五色崩漏方
香附子舂去皮毛中斷之略炒為末每服二錢用清
米飲調下此方徐朝奉傳其內人有是疾服遍藥不
效後獲此方遂愈須久服為佳亦治產後腹痛大是
婦人仙藥常服益血調氣
治產後中風口噤牙關緊急手足瘛瘲愈風散
荊芥穗輕焙過一兩細末每服二錢溫酒調下
經驗產室皆有之陳選方中用舉卿古拜二味蓋切
腳隱語以秘之也此藥委有奇效神聖之功大抵產
室但無風為佳不可衣被帳褥太暖太暖即汗出汗
出則腠理開易于中風便昏冒記有一婦人產後遮
護太密閣內更生火睡久及醒則昏昏如醉不省人
事其家驚惶醫用此藥佐以交加散祝云服之必睡
睡中必以左手搔頭覺必醒矣果如其言
交加散治婦人營衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血
少結聚為瘕產後中風
生地黃五兩研取汁　生姜五兩研取汁
右交互用汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之尋常腹
痛酒調下三錢產後尤不可缺
治婦人諸般淋
苦杖根俗呼為杜牛膝多取淨洗碎之以一合用水
五盞煎一盞去滓用麝香乳香少許研調下
鄞縣武尉耿夢得其內人患沙石淋者十三年矣每
漩痛楚不可忍溺器中小便下沙石剝剝有聲百方
不效偶有此方啜之一夕而愈目所見也
半夏散
半夏末如豆大許竹管吹入鼻中立惺
治產後出血太多虛煩發渴蒲黃散
真蒲黃末二錢飲下渴燥甚新汲水下
治妊娠時氣身太熱令子不落護胎方
伏龍肝為末水調塗臍下二寸乾則易差即止又取
井中泥塗心下乾則易之

又方

浮萍乾　川朴硝　蛤粉　大黃研徹炒

藍根各一兩

右為末水調封臍上安胎解煩熱極妙

婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風邪襲之耳素問云徇蒙招搖目眩耳鳴上虛下實過在足少陽厥陰甚則歸肝蓋此謂也予常處此方以授人比他藥捷而效名芎羌散

川芎一兩　當歸三錢　羌活　旋覆花

蔓荊子　細辛華陰者　石膏　藁本

荊芥穗　半夏麴炙　防風　熟地黃

甘草各半兩

右為末每服一錢水一大盞姜三片同煎至七分去滓溫服不拘時

婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗則大便秘故難于用藥惟麻子蘇子粥最佳且穩

紫蘇子大麻子二味各半合淨洗研極細用水再研取汁一盞分二次煮粥啜之不惟產後可服大抵老人諸虛人風秘皆得力常有一貴人母年八十四忽然腹滿頭疼惡心不下食占醫者數人議皆拱補脾進食治風清利頭目藥數日病愈甚全不進食其家憂惶予辨之予說之曰藥皆誤矣此症止是老人風秘臟腑壅滯聚于胸中則腹脹惡心不喜食又上至于巔則頭痛神不清也若得臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結屎如胡椒者十餘後漸得通利不用藥而自愈

治婦人天癸以過期經脉不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云十損七益謂女子十七數盡而經脉不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜此當歸散

當歸　川芎　白芍藥　黃芩各剉炒各一兩

白术半兩　山茱萸兩半

右細末每服二錢酒調下空心食前日三服次冷去黃芩加桂一兩

治婦人臟燥大棗湯

甘草三兩　小麥一升　大棗十枚

右㕮咀以水六升煮三升去滓溫分三服亦補脾氣

鄉里有一婦人數此無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈數次者大棗湯予急令治藥盡劑而愈古方識病製方種種妙絕如此試而後知

治姙娠熱病胎死腹中鹿角屑湯

鹿角屑一兩水一碗葱白五莖豆豉半合同煎至六

治婦人生産數日不下及胞衣死胎不下者方
用草麻七粒去殼研如泥塗足心纔下便急洗去此
崔元亮海上方人但未知耳政和中一鄉人内子産
二日不下予令浸試之一塗俄頃便下自後常用極
驗

小兒病方

候小兒脉當以大指按三部一息六七至爲平和十至
爲發熱五至爲內寒脉緊爲風癇沉緩爲傷食促急爲
虚驚弦急爲氣和沉細爲冷浮爲風大小不勻爲惡候
爲鬼祟浮大數爲風爲熱伏結爲物聚單細爲疳勞凡
腹痛多啼呕而脉洪者爲有虫浮而遲潮熱者胃寒也
温之則愈予嘗作歌以紀之歌曰小兒脉緊風癇候沉
緩傷食多吐呕弦急因知氣不和急促虚驚神不守冷
則沉細風則浮牢是大便應秘久腹痛之候緊而弦脉
亂不治安可救変蒸之時脉必変不治自然無過謬單
細疳勞洪有虫大小不勻爲悪候脉浮而遲有潮熱此
必胃寒來内冠濕兩浮大不可斷仔細斟量宜審究嬰
孩未可脉方者俗醫多看虎口中紋顔色與四肢冷熱
驗之亦有可取予又以二歌紀之虎口色歌曰紫色紅
傷寒青驚白色疳黑時因中惡黄即因脾端冷熱症歌
曰鼻冷定知是瘡疹耳冷應知風是症通身皆熱是傷
寒上熱下冷傷食病若能以色脉驗之參酌所得亦過
半矣

治小兒一切驚疳食積風癇之疾癒驚圓
史君子（五十個先去殻） 香墨（棗大一塊） 金銀箔各五片 膩粉二錢
右先研史君子墨細次入金銀箔乳鉢內同研次入
膩粉并麝香少許研令極細勻稀糊丸如梧子大陰
乾每服一丸薄荷湯磨下一歲以下半丸一名青金
丹鄉里一士人家貨此真日得數十錢已百餘年矣

治小兒呕吐脉數有熱麥門冬散
麥門冬 半夏麹 人參 茯苓各二錢
甘草一錢
右細末每服二錢水一盞姜三片煎五分去滓温日
二三服

治小兒呕吐脉遲細有寒白朮散
白朮 人參各三錢 半夏麹二錢
茯苓 乾姜 甘草各一錢
右細末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分
去滓温服日二三服

治小兒久傷脾胃腹脹調中圓
乾姜 桔紅 白朮 茯苓
木香 縮砂人 官桂 良姜各等分

此頁元本缺

惟慢脾風因吐瀉脾胃受風爲難治難得藥近世多用生附子及青州白丸子金液丹合用之如醒脾丸皆要藥也

治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癇醒脾圓

厚朴　白朮　舩上硫黄　天麻各半両

全蝎　防風　人參　官桂各一分

右爲末酒浸蒸餅和丸如鷄豆大每服一丸搥研温米飲下

又方

全蝎二個青薄荷葉包煨　白朮焙面大二塊

麻黄長五寸十個去節

右細末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下量大小加減服

治脾風多困人參散

人參　冬瓜仁各半両　天南星一両切片用漿水姜汁煑存性

右細末每服一錢水半盞煎二三分温服

治小兒胎虛氣虛吐利生風昏困嗜臥或潮搐蠍梢圓

全蠍微炒　白附子炮裂各半両

通明硫黄一両　半夏一両切片姜汁製炒乾

右爲末姜汁糊丸如麻子大每服三十粒荊芥湯下

更看大小加減服

治小兒拗哭龍齒散

龍齒　蟬殼　釣藤有鈎子者

羌活　茯苓　人參各等分

右為末每服一大錢水一大盞煎六分去滓溫晝熱服

乾隆十五年歲次庚午芸暉堂照宋本録

類證普濟本事方卷之十終

内外傷辨三卷

（金）李杲撰

明刻本

內外傷辨惑論三卷 江蘇巡撫採進本

金李杲撰。杲字明之、自號東垣老人、眞定人。嘗以納貲得官監濟源稅。案元硯堅作東垣老人傳、稱杲以辛亥年卒、年七十二。則當生於世宗大定二十年庚子。金亡時年五十五、入元十七年乃終。故舊本亦或題元人、而元史亦載入方技傳也。初杲母嬰疾、爲衆醫雜治而死、迄莫知爲何證。杲自傷不知醫理、遂捐千金從易州張元素學。盡得其法、而名乃出於元素上、卓爲醫家大宗。是編發明內傷之證、有類外感。辨別陰陽寒熱有餘不足、而大旨總以脾胃爲主。故特製補中益氣湯、專治飲食勞倦虛人感冒。法取補土生金、升清降濁、得陰陽生化之旨。其闡發醫理、至爲深微。前有自序、題丁未歲。序中稱此論束之高閣十六年。以長歷推之、其書蓋出於金哀宗之正大九年辛卯也。

內外傷辨序

僕幼自受難素於易水張元素先生講誦既久稍有所得中年以來更事頗多諸所診治坦然不惑曾撰內外傷辨惑論一篇以證世人用藥之悞陵谷變遷忽成老境神志既惰懶於語言此論束之高閣十六年矣昆崙范尊師曲相獎借屢以活人爲言謂此書果行使天下之人不致夭折是亦仁人君子濟人利物之事就令著述不已精力衰耗書成而死不愈於無益而生乎予敬受其言僶力疾就成之雖未爲完備聊答尊師慈憫之志師宋文正公之後也丁未歲重九日東垣老人李杲明之題

內外傷辨序

內外傷辨目錄

卷上

辨陰證陽證　辨脉

辨寒熱　辨外感八風之邪

辨手心手背　辨口鼻

辨氣少氣盛　辨頭痛

辨筋骨四肢　辨外傷不惡食

辨渴與不渴

辨勞役受病表虛不作表實治之

辨證與中熱頗相似

卷中

飲食勞倦論

補中益氣湯　立方本指

硃砂安神丸

四時用藥加減法

除風濕羌活湯　通氣防風湯

羌活勝濕湯　升陽順氣湯

升陽補氣湯

暑傷胃氣論

清暑益氣湯　參术調中湯

升陽散火湯　當歸補血湯
硃砂凉膈丸　黄連清膈丸
門冬清肺飲　人參清鎮丸
皂角化痰丸　白术和胃丸
肺之脾胃虚方
升陽益胃湯　雙和散
寛中進食丸　厚朴温中湯
腎之脾胃虚方
沈香温胃丸　神聖復氣湯

卷下

辨內傷飲食用藥所宜所禁
易張先生枳术丸
橘皮枳术丸　麴糵枳术丸
木香枳术丸　木香化滯湯
半夏枳术丸　丁香爛飯丸
草豆蔻丸　三黄枳實丸
除濕益氣丸　上二黄丸
枳實導滯丸　枳實梔子大黄湯
白术丸　木香見睍丸
三稜消積丸　備急大黄丸
神應丸　益胃散
飲食自倍腸胃乃傷分而治之
論酒客病
葛花解酲湯　除濕散
五苓散
臨病制方
隨時用藥
吐法宜用辨上部有脉下部無脉
瓜蔕散
重明木鬱則達之之理

說病形有餘不足當補當瀉之理

內外傷辨卷上

東垣 李杲 撰

新安 吳勉學 校

辨陰證陽證

曰甚哉陰陽之證不可不詳也徧觀內經中所說變化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然夫元氣穀氣榮氣清氣衛氣生發諸陽上升之氣此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣皆絕於外故經言五臟之氣已絕於外者

是六腑之元氣病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是五臟六腑眞氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉其中變化皆由中氣不足乃能生發耳後有脾胃以受勞役之疾飲食又復失節耽病日久事息心安飽食太甚病乃大作概其外傷風寒六淫客邪皆有餘之病當瀉不當補飲食失節中氣不足之病當補不當瀉舉世醫者皆以飲食失節勞役所傷中氣不足當補之證認作外感風寒有餘客邪之病重瀉其表使榮衛之氣外絕其死只在旬日之間所謂差之毫釐謬以千里可不詳辨乎按陰陽應象論云天之邪氣感則害人五臟是八益之邪乃風邪傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨蓋有形質之物受病也繫在下焦肝腎是也肝腎者地之氣難經解云肝腎之氣已絕於內以其肝主筋腎主骨故風邪感則筋骨疼痛筋骨之絕則肝腎之本亦絕矣乃有餘之證也又云水穀之寒熱感則害人六腑是七損之病乃內傷飲食也黃帝鍼經解云適飲食不節勞役所傷濕從下受之謂脾胃之氣不足而反下行極則衝脉之火逆而上是無形質之元氣受病也繫在上焦心肺是也心肺者天之氣故難經解

云心肺之氣已絕於外以其心主榮肺主衛榮者血也脉者血之府神之所居也衛者元氣七神之別名衛護周身在於皮毛之間也肺絕則皮毛先絕神無所依故內傷飲食則亦惡風寒是榮衛失守皮膚間無陽以滋養不能任風寒也皮毛之絕則心肺之本亦絕矣蓋胃氣不升元氣不生無滋養心肺乃不足之證也計受病之人飲食失節勞役所傷因而飽食內傷者極多外傷者間而有之世俗不知往往將元氣不足之證便作外傷風寒表實之證而反瀉心肺是重絕其表也安得不死乎古人所謂實實虛虛醫

殺之耳若曰不然請以衆人之耳聞目見者證之向者壬辰改元京師戒嚴迨三月下旬受敵者凡半月解圍之後都人之不受病者萬無一二既病而死者繼踵而不絕都門十有二所每日各門所送多者二千少者不下一千似此者幾三月此百萬人豈俱感風寒外傷者耶大抵人在圍城中飲食不節乃勞役所傷不待言而知由其朝饑暮飽起居不時寒溫失所動經三兩月胃氣虧之久矣一旦飽食大過感而傷人而又調治失宜其死也無疑矣非惟大梁爲然遠在貞祐興定間如東平如太原如鳳翔解圍之後

病傷而死無不然者余在大梁凡所親見有表發者有以巴豆推之者有以承氣湯下之者俄而變結胸發黃又以陷胸湯丸及茵蔯湯下之無不死者蓋初非傷寒以調治差悞變而似眞傷寒之證皆藥之罪也往者不可追來者猶可及輙以平生已試之効著内外傷辯論一篇推明前哲之餘論歷舉近世之變故庶幾同志者審其或中觸類而長之免後人之橫夭耳僭易之罪將何所逃乎

辯脉

古人以脉上辯内外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口爲外傷氣口脉大於人迎爲内傷此辯固是但其說有所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度内傷飲食及飲食不節勞役不節皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脉按之洪大而有力中見手少陰心火之脉丁與壬合内顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大於氣口一倍或兩倍三倍内傷飲食則右寸氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在

少陰則兩倍太陰則三倍此内傷飲食之脉若飲食不節勞役過甚則心脉變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺經云侮所不勝寡於畏者是也故氣口脉急大而澀數時一代而澀也澀者肺之本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝木挾心火而反尅肺金也若不甚勞役惟右關脾脉大而數謂獨大於五脉數中顯緩時一代也如飲食不節寒溫失所則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟内顯脾脉之大數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沉而滑經云脉滑

者有宿食也以此辯之豈不明白易見乎但恐山野間辛無醫者何以診候故復說病證以辯之

辯寒熱

外傷寒邪之證與飲食失節勞役形質之病及内傷飲食俱有寒熱舉世盡將内傷飲食失節勞役不足之病作外傷寒邪表實有餘之證反瀉其表枉死者豈勝言哉皆由不别其寒熱耳今細爲分解之外傷寒邪發熱惡寒寒熱併作其熱也翕翕發熱又爲之拂拂發熱發於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在表也是寒邪犯高之高者也皮膚毛腠者陽之分也是

衛之元氣所滋養之分也以寒邪乘之鬱遏陽分陽不得伸故發熱也其面赤鼻氣壅塞不通心中煩悶稍似袒裸露其皮膚已不能禁其寒矣其表上虛熱止此而已其惡寒也雖重衣下幕逼近烈火終不能禦其寒一時一日增加愈甚必待傳入裏作下證乃罷其寒熱齊作無有間斷也其内傷飲食不節或勞役所傷亦有頭痛項强腰痛與太陽表證微有相似餘皆不同論中辯之矣内傷不足之病表上無陽不能禁風寒也此則常常有之其躁熱發於腎間者間而有之與外中寒邪略不相似其惡風寒也蓋脾胃不足榮氣下流而乘腎肝此痿厥氣逆之漸也若胃氣平常飲食入胃其榮氣上行以舒於心肺以滋養上焦之皮膚腠理之元氣也既下流其心肺無所稟受皮膚間無陽失其榮衛之外護故陽分皮毛之間虛弱但見風見寒或居陰寒處無日陽處便惡之也此常常有之無間斷者也但避風寒及温煖處或添衣蓋温養其皮膚所惡風寒便不見矣是熱也非表傷寒邪皮毛間發熱也乃腎間受脾胃下流之濕氣閉塞其下致陰火上衝作蒸蒸而躁熱上徹頭頂傍徹皮毛渾身躁熱作須待袒衣露居近寒涼處即已

或熱極而汗出而亦解彼外傷惡寒發熱豈有汗出者乎若得汗則病愈矣以此辨之豈不如黑白之易見乎當内虛而傷之者躁熱也或因口吸風寒之氣鬱其陰火使咽膈不通其吸入之氣欲入爲膈上衝脉之火所拒使陰氣不得入其胃中之氣爲外風寒所遏而不得伸令人口開目瞪極則聲發於外氣不能上下塞於咽中而氣欲絶又或因噦因嘔因吐而躁熱發必有所因方有此證其表虛惡風寒之證復見矣表虛之弱爲陰火所乘躁發須臾而過其表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常有之其躁

熱則間而有之此二者不齊躁作寒已寒作躁已非如外傷之寒熱齊作無有間斷也百病俱有身熱又謂之肌熱又謂之皮膚間熱以手捫之方知者是也乃肌體有形之熱也亦須皆待陰陽旣和汗出則愈矣愼不可於此上辨之以其虛實內外病皆有之故難辨耳只依此說病人自覺發熱惡寒之熱及躁作之熱上辨之爲準則矣

辨外感八風之邪或有飲食勞役所傷之重者三二日間特與外傷者相似其餘證有特異名者若不將兩證重別分解猶恐將內傷不足之

證誤作有餘外感風邪雖辭理有重複處但欲病者易辯醫者易治耳

外感八風之邪乃有餘證也內傷飲食不節勞役所傷皆不足之病也其內傷亦惡風自汗若在溫暖無風處則不惡矣與外傷鼻流清涕頭痛自汗頗相似細分之特異耳外感風邪其惡風自汗頭痛鼻流清涕常常有之一日一時增加愈甚直至傳入裏作下證乃罷語聲重濁高厲有力鼻息壅塞而不通能食腹中和口知味大小便如常筋骨疼痛不能動搖便著牀枕非扶不起其內傷與飲食不節勞役所傷然亦惡風居露地中遇大漫風起却不惡也惟門窗隙中些小賊風來必大惡也與傷風傷寒俱不同矣況鼻流清涕頭痛自汗間而有之鼻中氣短少氣不足以息語則氣短而怯弱妨食或食不下或不欲食三者互有之腹中不和或腹中急而不能伸口不知五穀之味小便頻數而不渴初勞役得病食少小便赤黃大便常難或澀或結或虛坐只見些小白膿時有下氣或泄黃如糜或溏泄色白或結而不通若心下痞或胷中閉塞如刀劚之痛二者亦互作不併出也有時胃脘當心而痛上支兩脇痛必臍下相火之勢

如巨川之水不可遏而上行使陽明之經逆行亂於胷中其氣無止息甚則高喘熱傷元氣令四肢不收無氣以動而懶倦嗜卧以其外感風寒俱無此證故易爲分辨耳

辨手心手背

內傷及勞役飲食不節病手心熱手背不熱外傷風寒則手背熱手心不熱此辨至甚皎然

辨口鼻

若飲食勞役所傷其外證必顯在口必口失穀味必腹中不和必不欲言縱勉强對答聲必怯弱口沃沫

多唾鼻中淸涕或有或無即陰證也外傷風寒則其外證必顯在鼻鼻氣不利聲重濁不淸利其言壅塞盛有力而口中必和傷寒則面赤鼻壅塞而乾傷風則鼻流淸涕而已內經云鼻者肺之候肺氣通於天外傷風寒則鼻爲之不利口者坤土也脾氣通於口飲食失節勞役所傷口不知穀味亦不知五味又云傷食惡食傷食明矣

辨氣少氣盛

外傷風寒者故其氣壅盛而有餘內傷飲食勞役者其口鼻中皆氣短促不足以息何以分之蓋外傷風

寒者心肺元氣初無減損又添邪氣助之使鼻氣壅塞不利面赤不通其鼻中氣不能出併從口出但發一言必前輕而後重其言高其聲壯厲而有力是傷寒則鼻乾無涕面壅色赤其言前輕後重其聲壯厲而有力者乃有餘之驗也傷風則決然鼻流淸涕其聲嗄其言響如從甕中出亦前輕而後重高揭而有力皆氣盛有餘之驗也內傷飲食勞役者心肺之氣先損爲熱所傷熱既傷氣四肢無力以動故口鼻中皆短氣少氣上喘懶語人有所問十不欲對其一縱勉强答之其氣亦怯其聲亦低是其氣短少不足之驗也明白如此雖婦人女子亦能辨之豈有醫者反不能辨之乎

辨頭痛

內證頭痛有時而作有時而止外證頭痛常常有之直須傳入裏實方罷此又內外證之不同者也

辨筋骨四肢

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四肢沈困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既爲熱所乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也若外傷風寒是腎肝之氣已絕於內腎主骨爲寒肝

主筋爲風自古腎肝之病同一治以其遞相維持也故經言膽主筋膀胱主骨是也或中風或傷寒得病之日便著牀枕非扶不起筋骨爲之疼痛不能動搖乃形質之傷經云寒傷形又云寒則筋攣骨痛此之謂也

辨外傷不惡食若勞役飲食失節寒溫不適此三者皆惡食

仲景傷寒論云中風能食傷寒不能食二者皆口中和而不惡食若勞役所傷及飲食失節寒溫不適三者俱惡食口不知五味亦不知五穀之味只此一辯

足以分内外有餘不足二證也傷寒證雖不能食而不惡食口中和知五味亦知穀味盡無内證則心氣和脾氣通知五穀之味矣

辯渴與不渴

外感風寒之邪三日已外穀消水去邪氣傳裏始有渴也内傷飲食失節勞役久病者必不渴是邪氣在血脉中有餘故也初勞役形質飲食失節傷之重者必有渴以其心火熾上尅於肺金故渴也又當以此辯之雖渴欲飲冷水者當徐徐少與之不可縱意而飲恐水多峻下則胃氣愈弱輕則爲脹重則傳變諸

疾必反覆悶亂百脉不安夜加增劇不得安卧不可不預度也

辯勞役受病表虛不作表實治之

或因勞役動作腎間陰火沸騰事閑之際或於陰涼處解脱衣裳更有新沐浴於背陰處坐卧其陰火下行還歸腎間皮膚腠理極虛無陽但風來爲寒涼所遏表虛不任其風寒自認外感風寒求醫解表以重絶元氣取禍如反掌苟幸而免者致虛勞氣血皆弱不能完復且表虛之人爲風寒所遏亦是虛邪犯表始病一二日之間特與外中賊邪有餘之證頗相似處故致疑惑請醫者只於氣少氣盛上辯之其外傷賊邪必語聲前輕後重高厲而有力若是勞役所傷飲食不節表虛不足之病必短氣氣促上氣高喘懶語其聲困弱而無力至易見也若毫釐之誤則千里之謬已上者辯證别有治法用藥正論故作此説分解於後

辯證與中熱頗相似

復有一節乘天氣大熱之時在於路途中勞役得之或在田野間勞形得之更或有身體薄弱食少勞役過甚又有修善常齋之人胃氣久虛而因勞役得之

者皆與陽明中熱白虎湯證相似必肌體捫摸之壯熱必躁熱悶亂大惡熱渴而飲水以勞役過甚之故亦身疼痛始受病之時特與中熱外得有餘之證相似若悞與白虎湯旬日必死此證脾胃大虛元氣不足口鼻中氣皆短促而上喘至日轉以後是陽明得時之際病必少減若是外中熱之病必到日晡之際大作譫語其熱增加大渴飲水煩悶不止其勞役不足者皆無此證尤易爲分解若有難決疑似之證必當待一二日求醫治療必不至錯誤矣

内外傷辯卷上

東垣 李 杲 撰
新安 吳勉學 校

飲食勞倦論

古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內經悉言人以胃氣爲本蓋人受水穀之氣以生所謂淸氣榮氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃爲水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也苟飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐勞役過度而損耗元氣旣脾胃虛衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不能兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎肝陰火得以乘其土位故脾胃之證始得之則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高而喘身煩熱爲頭痛爲渴而脈洪大脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是生長之令不行則無陽以護其榮衛不任風寒乃生寒熱皆脾胃

之氣不足所致也然而與外感風寒所得之證頗同而理異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷外爲有餘有餘者瀉之傷內爲不足不足者補之汗之下之吐之剋之皆瀉也溫之和之調之養之皆補也內傷不足之病苟誤認作外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也難經云實實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳然則奈何曰惟當以甘溫之劑補其中升其陽甘寒以瀉其火則愈內經曰勞者溫之損者溫之蓋溫能除大熱大忌苦寒之藥瀉胃土耳今立補中益氣湯

補中益氣湯

黃耆勞役病熱甚者一錢 甘草炙已上各五分 人參去蘆
升麻 柴胡 橘皮
當歸身酒洗 白朮已上各三分

右件㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤早飯後溫服如傷之重者二服而愈量輕重治之

立方本指

夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃耆最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而閉腠理不令自

汗損其元氣上喘氣短人參以補之心火乘脾須炙甘草之甘以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛并太虛腹中急縮者宜多用之經云急者緩之白术苦甘溫除胃中熱利腰臍間血胃中清氣在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脉之縮急二味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胷中爲清濁相干用去白陳皮以理之又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛爲用口乾嗌乾加乾葛脾胃氣虛不能升浮爲陰火傷其生發之氣榮血大虧榮

氣不營陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減心包與心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也故加辛甘微温之劑生陽氣陽生則陰長或曰甘温何能生血曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃蘖以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以硃砂安神丸鎮固之則愈

硃砂安神丸

硃砂 五錢另研水飛爲衣　甘草 五錢五分　黃連 去鬚淨酒洗六錢

當歸 去蘆二錢五分　生地黃 一錢五分

内經曰熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱爲君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血爲臣以當歸補其血不足硃砂納浮溜之火而安神明也

右件除硃砂外四味共爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大以硃砂爲衣每服十五丸或二十丸津唾嚥下食後或溫水涼水少許送下亦得此近而奇偶制之緩也

四時用藥加減法

内經曰胃爲水穀之海又云腸胃爲市無物不包無物不入寒熱溫涼皆有之其爲病也不一故隨時證於補中益氣湯中權立四時加減法于後

○以手捫之而肌表熱者表證也只服補中益氣湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也

○若更煩亂如腹中或周身有刺痛皆血澀不足加當歸身 五分或一錢

○如精神短少加人參 五分 五味子 二十箇

○頭痛加蔓荊子 三分 痛甚加川芎 五分

○頂痛腦痛加藁本五分細辛三分諸頭痛并用此四味足矣

○如頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏五分生薑三分

○耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活一錢防風藁本已上各七分甘草五分通其經血加黃芩黃連已上各三分消其腫人參五分黃耆七分益元氣而瀉火邪另作一服與之

○嗌痛頷腫脉洪大面赤者加黃芩甘草已上各三分桔梗七分

○口乾嗌乾者加葛根五分升引胃氣上行以潤之

○如夏月咳嗽者加五味子二十五個麥門冬去心五分

○如冬月咳嗽加不去根節麻黃五分

○如秋涼亦加

○如春月天溫只加佛耳草款冬花已上各五分

○若久病痰嗽肺中伏火去人參以防痰嗽增益耳

食不下乃胷中胃上有寒或氣澀滯加青皮木香已上各三分陳皮五分此三味為定法

○如冬月加益智仁草豆蔻仁已上各五分

○如夏月少加黃芩黃連已上各五分

○如秋月加檳榔草豆蔻白豆蔻縮砂已上各五分

○如春初猶寒少加辛熱之劑以補春氣之不足為風藥之佐益智草豆蔻可也

○心下痞夯悶者加芍藥黃連已上各一錢

○如痞腹脹加枳實木香縮砂仁已上各三分厚朴七分如天寒少加乾薑或中桂桂心也

○心下痞覺中寒加附子黃連已上各一錢不能食而心下痞加生薑陳皮已上各一錢能食而心下痞加黃連五分枳實三分脉緩有痰而痞加半夏黃連已上各一錢脉弦四肢滿便難而心下痞加黃連五分柴胡七分甘草三分

○腹中痛者加白芍藥五分甘草三分如惡寒覺冷痛加中桂五分

○如夏月腹中痛不惡寒不惡熱者加黃芩甘草已上各五分芍藥一錢以治時熱也

○腹痛在寒涼時加半夏益智草豆蔻之類

○如腹中痛惡寒而脉弦者是木來尅土也小建中湯主之蓋芍藥味酸於土中瀉木為君如脉沉細腹中痛是水來侮土以理中湯主之乾薑辛熱於土中瀉水以為主也如脉緩體重節痛腹脹自利

米穀不化是濕勝以平胃散主之蒼朮苦辛溫爲
濕爲主也
○脇下痛或脇下縮急俱加柴胡三分甚則五分甘草三分
○臍下痛者加真熟地黃五分如不已者乃大寒也
加肉桂五分徧閱內經中悉言小腹痛皆寒非傷
寒厥陰之證也乃下焦血結膀胱仲景以抵當湯
并抵當丸主之
○小便遺失肺金虛也宜安卧養氣以黃耆人參之
類補之不愈則是有熱也黃蘗生地黃已上各五分切
禁勞役如卧而多驚小便淋溲者邪在少陽厥陰
宜太陽經所加之藥更添柴胡五分如淋加澤瀉
五分此下焦風寒合病也經云腎肝之病同一治
爲俱在下焦非風藥行經則不可乃受客邪之濕
熱也宜升舉發散以除之
○大便秘澀加當歸一錢大黃酒洗煨五分或一錢如有不大
便者煎成正藥先用清者一口調玄明粉五分或一錢
如大便行則止此病不宜大下之必變凶證也
○脚膝痿軟行步乏力或痛乃腎肝伏熱少加黃蘗
五分空心服不已更加漢防已五分脉緩顯沈困
怠惰無力者加蒼朮人參澤瀉白朮茯苓五味子

已上各五分
○如風濕相搏一身盡痛以除風濕羌活湯主之

除風濕羌活湯

羌活七分 防風 升麻
柴胡已上各五分 藁本 蒼朮已上各一錢

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去
柤大溫服之空心食前
○所以然者爲風藥已能勝濕故另作一服與之
○肩背痛汗出小便數而少風熱乘肺肺氣鬱甚也
當瀉風熱則愈通氣防風湯主之

通氣防風湯

防風 羌活 陳皮
人參 甘草已上各五分 藁本
青皮已上各三分 白豆蔻 黃蘗已上各二分
升麻 柴胡 黃耆已上各一錢

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤溫服食
後
○如面白脫色氣短者不可服
○肩背痛不可回顧者此手太陽氣鬱而不行以風
藥散之脊痛項强腰似折項似拔此足太陽經不

通行以羌活勝濕湯主之

羌活勝濕湯

羌活　獨活已上各一錢　藁本

防風　甘草炙　川芎已上各五分

蔓荊子三分

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤大温服空心食前

○如身重腰沉沉然經中有寒濕也加酒洗漢防已五分輕者附子五分重者川烏五分

升陽順氣湯

治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒饑則常如飽不喜食冷物

黄耆一兩　半夏三錢湯洗七次　草豆蔻二錢

神麴一錢五分炒　升麻　柴胡

當歸身　陳皮已上各一錢　甘草炙

黄蘗五分已上各　人參三分去蘆

脾胃不足之證須用升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽之氣以滋春氣之和也又引黄耆人參甘草甘温之氣味上行充實腠理使陽氣得衛外而爲固也凡治脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也

右件㕮咀每服三錢水二盞生薑三片煎至一盞去柤温服食前

升陽補氣湯

治飲食不時饑飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不能寒熱早飯後轉增昏悶須要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作及五心煩熱

厚朴五分薑製　升麻　羌活　白芍藥

獨活　防風　甘草炙　澤瀉已上各一錢

生地黄一錢五分　柴胡二錢五分

右件爲粗末每服五錢水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去柤大温服食前

○如腹脹及窄狹加厚朴

○如腹中似硬加砂仁三分

暑傷胃氣論

刺志論云氣虚身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論云有所遠行勞倦逢大熱而渴則陽氣内伐内伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不能勝火則骨枯而髓虚足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也

此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉痛或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而少大便溏而頻或痢出黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脉中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之名之曰清暑益氣湯主之

清暑益氣湯

黃耆（汗少者減五分） 蒼朮（泔浸去皮已上各一錢五分） 升麻（一錢）

人參（去蘆） 白朮 橘皮

神麴（炒） 澤瀉（已上各五分） 甘草（炙）

黃檗（酒浸） 當歸身 麥門冬（去心）

青皮（去白） 葛根（已上各三分） 五味子（九箇）

內經云陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃耆人參甘草補中益氣爲君甘草橘皮當歸身甘辛微溫養胃氣和血脉爲臣蒼朮白朮澤瀉滲利除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則濕不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃檗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷庚金爲佐也

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食遠

○此病皆因飲食失節勞倦所傷日漸因循損其脾胃乘暑天而作病也

○如汗大泄者津脫也急止之加五味子（十枚） 炒黃檗（五分） 知母（三分） 此按而收之也

○如濕熱乘其腎肝行步不正脚膝痿弱兩脚欹側已中痿邪加酒洗黃檗知母（已上各五分） 令兩足湧出

氣力矣

○如大便澀滯隔一二日不見者致食少乃血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃（已上各五分） 桃仁泥麻仁泥（已上各一錢） 以潤之

夫脾胃虛弱之人遇六七月霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣更逢濕旺助熱爲邪西北二方寒清絕矣人重感之則骨乏無力其形如夢寐間朦朦如煙霧中不知身所有也聖人立法夏月宜補者補天眞元氣非補熱火也夏食寒者是也故以人參之甘補氣麥門冬苦寒瀉熱補水之源五味子之酸清肅燥

金名曰生脉散孫真人云五月常服五味子以補五臟之氣亦此意也

參术調中湯

瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

白术五分　黄耆四分　桑白皮

甘草炙　人參已上各三分　麥門冬去心

青皮去白　陳皮去白　地骨皮

白茯苓已上各二分　五味子二十箇

内經云火位之主其瀉以甘以黄耆甘温瀉熱補氣桑白皮苦微寒瀉肺火定喘故以爲君肺欲收急食酸以收之以五味子之酸收耗散之氣止咳嗽脾胃不足以甘補之故用白术人參炙甘草苦甘温補脾緩中爲臣地骨皮苦微寒善解肌熱茯苓甘平降肺火麥門冬甘微寒保肺氣爲佐青皮陳皮去白苦辛温散胷中滯氣爲使也

右件㕮咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤大温服早飯後忌多語言勞役

升陽散火湯

治男子婦人四肢發困熱肌熱筋骨間熱表熱如火燎於肌膚捫之烙手夫四肢屬脾脾者土也熱

伏地中此病多因血虚而得之也又有胃虚過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

升麻　葛根　獨活

羌活　白芍藥　人參已上各五錢

甘草炙　柴胡已上各三錢　防風二錢五分

甘草生二錢

右件㕮咀如麻豆大每服秤五錢水二盞煎至一盞去柤大温服無時忌寒涼之物

當歸補血湯

治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虚重按全無内經曰脉虚血虚又云血虚發熱證象白虎惟脉不長實有辨耳悞服白虎湯必死此病得之於饑困勞役

黄耆一兩　當歸二錢酒洗

右件㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤温服空心食前

硃砂涼膈丸

治上焦虚熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黄連　山梔子已上各一兩　人參

茯苓已上各五錢　硃砂三錢別研　腦子五分別研

右爲細末研勻煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣熟水送下五七丸日進三服食後

黄連清膈丸

治心肺間有熱及經中熱

麥門冬去心一兩　黄連去鬚五錢　鼠尾黄芩淨刮三錢

右爲細末煉蜜爲丸如菉豆大每服三十丸温水送下食後

門冬清肺飲

治脾胃虚弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

紫苑茸一錢五分　黄耆　白芍藥

甘草已上各一錢　人參去蘆　麥門冬已上各五分

當歸身三分　五味子三箇

右㕮咀分作二服每服水二盞煎至一盞去柤温服食後

○局方中大阿膠丸亦宜用

人參清鎮丸

治熱止嗽消痰定喘

柴胡　人參已上各一兩五錢　生黄芩

半夏　甘草炙已上各七錢五分　青黛六錢

天門冬去心三錢　陳皮去白　五味子去核二錢

右件爲細末水糊爲丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温白湯送下食後

○局方中人參清肺湯亦宜用

皂角化痰丸

治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠粘嗌塞吐逆不思飲食或時昏憒

皂角木白皮酥炙　白附子炮　半夏湯洗七次

天南星炮　白礬枯　赤茯苓去皮

人參已上各一兩　枳殼炒二兩

右爲細末生薑汁麪糊爲丸如梧桐子大每服三

十丸温水送下食後

白术和胃丸

治病久厭厭不能食而臟腑或結或溏此胃氣虚弱也常服則和中理氣消痰去濕和脾胃進飲食

白术一兩二錢　半夏湯洗七次　厚朴姜製已上各一兩

陳皮去白八錢　人參七錢　甘草炙三錢

枳實麩炒　檳榔已上各二錢五分　木香一錢

右件爲細末生薑汁浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三十丸温水送下食遠

肺之脾胃虚方

脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益氣名之曰升陽益胃湯

升陽益胃湯

黃耆二兩　半夏洗此一味脉澁者用　人參去蘆
甘草炙已上各一兩　獨活　防風以秋旺故以辛溫瀉之
白芍藥何故秋旺用人參白术芍藥之類反補肺為脾胃虛則肺最受邪故因時而補易為力也
羌活已上各五錢　橘皮四錢　茯苓小便利不渴者勿用
柴胡　澤瀉不淋勿用　白术已上各三錢
黃連一錢

右㕮咀每服秤三錢水三盞生薑五片棗二枚煎至一盞去柤溫服早飯後或加至五錢

○服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉

○若喜食一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也

○可以小役形體使胃與藥得轉運升發慎勿太勞役使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者也

雙和散

補血益氣治虛勞少力

白芍藥二兩五錢　黃耆　熟地黃
川芎　當歸已上各一兩　甘草炙
官桂已上各七錢五分

右為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎至七分去柤溫服

○大病之後虛勞氣乏者以此調治不熱不冷溫而有補

寬中進食丸

滋形氣喜飲食

大麥蘖一兩　半夏　猪苓去黑皮已上各七錢
草豆蔻仁　神麯炒已上各五錢　枳實麩炒四錢
橘皮　白术　白茯苓
澤瀉已上各二錢　縮砂仁一錢五分　乾生薑
甘草炙　人參　青皮已上各一錢

木香五分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三十

丸溫米飲送下食後

厚朴溫中湯

治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作疼

痛

厚朴薑製　橘皮去白已上各一兩　甘草炙

草豆蔻仁　茯苓去皮　木香已上各五錢

乾薑七分

戊火已衰不能運化又加客寒聚爲滿痛散爲辛熱

佐以苦甘以淡泄之氣溫胃和痛自止矣

右爲粗散每服五錢七水二盞生薑三片煎至一

盞去柤溫服食前忌一切冷物

腎之脾胃虛方

沉香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臟腑

積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手

足厥逆便利無度又治下焦陽虛臍腹冷痛及療

傷寒陰濕形氣沉困自汗

附子炮去皮臍　巴戟酒浸去心　乾薑炮

茴香炮已上各一兩　官桂七錢　沉香

甘草炙　當歸　吳茱萸洗去苦炒

人參　白朮　白芍藥

白茯苓去皮　良薑　木香已上各五錢

丁香三錢

右爲細末用好醋打麪糊爲丸如梧桐子大每服

五七十丸熱米飲送下空心食前日進三服忌一

切生冷物

凡脾胃之證調治差悞或妄下之末傳寒中復遇時

寒則四肢厥逆而心胃絞痛冷汗出舉痛論云寒氣

客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死

不知人氣復則生矣夫六氣之勝皆能爲病惟寒毒

最重陰主殺故也聖人以辛熱散之復其陽氣故曰

寒邪客之得炅則痛立止此之謂也

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之子能令母

實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胸膈閉

塞疼痛善嚏口中涎目中泣鼻流濁涕不止或息

肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作

陣痛目中流火視物䀮䀮耳鳴耳聾頭并口鼻或

惡風寒喜日陽夜臥不安常覺痰塞膈咽不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗出前陰冷行步欹側起居艱難掌中熱風痺麻木小便數而晝多夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛面如靧色食少大便不調心煩霍亂逆氣裏急而腹痛皮色白後出餘氣復不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大痛此寒水來復火土之讎也

乾薑（炮為末一錢三分）　柴胡（剉如豆大）　羌活（剉已上各一錢）

甘草（剉）　藁本（已上各八分）　升麻（剉）

半夏（湯洗七次已上各七分）　當歸身（酒洗剉）　防風（剉如豆大）

郁李仁（湯浸去皮研如泥入藥同煎）　人參（已上各五分）

附子（炮去皮臍二分）　白葵花（五朵去心細剪入）

右件藥都作一服水五盞煎至二盞入

草豆蔻仁（麵裹燒熟去皮乾）　黃耆（已上各一錢）

橘皮（五分）

在內再煎至一盞再入下項藥

枳殼（五分）　黃蘗（酒洗）　黃連（酒洗已上各三分）

生地黃（湯洗二分）

已上四味預一日另用新水浸又以

川芎（細末）　蔓荊子（已上各三分）　華細辛（二分）

預一日用新水半大盞分作二處浸此三味并黃蘗等煎正藥作一大盞不去柤入此浸者藥再上火煎至一大盞去柤稍熱服空心

○又能治齒頰嚙唇嚙舌舌根强硬等證如神宜食羊肉及厚滋味大抵腎并膀胱經中有寒元氣不足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時分服

治法已試驗者學者當以意求其的觸類而長之則不可勝用矣予病脾胃久衰視聽半失此陰乘陽而上氣短精神不足且脉弦皆陽氣衰弱伏匿於陰中

故耳癸卯歲六七月間霖雨陰寒逾月不止時人多病泄痢乃濕多成五泄故也一日體重肢節疼痛大便泄并下者三而小便閉塞默思內經有云在下者引而竭之是先利小便也又治諸瀉而小便不利者先分利之又云治濕不利小便非其治也法當利其小便必用淡滲之劑以利之是其法也噫聖人之法雖布在方策其不盡者可以意求今客邪寒濕之勝自外入裏而甚暴若以淡滲之劑利之病雖即已是降之又降復益其陰而重竭其陽也則陽氣愈削而

精神愈短矣陰重强而陽重衰也茲以升陽之藥是爲宜耳羌活獨活升麻各一錢防風半錢炙甘草半錢同㕮咀水四盞煎至一盞去柤熱服一服乃愈大法云寒濕之勝助風以平之又曰下者舉之此得陽氣升騰故愈是因曲而爲之直也夫聖人之法可以類推舉一則可以知百矣

內外傷辯卷中

內外傷辯卷下

東垣 李杲 撰
新安 吳勉學 校

辯內傷飲食用藥所宜所禁

內傷飲食付藥者受藥者皆以爲瑣末細事是以所當重者爲輕利害非細殊不思胃氣者榮氣也衛氣也穀氣也清氣也資少陽生發之氣也人之真氣衰旺皆在飲食入胃胃和則穀氣上升穀氣者升騰之氣也乃足少陽膽手少陽元氣始發生長萬化之別名也飲食一傷若消導藥的對其所傷之物則胃氣愈旺五穀之精華上騰乃淸氣爲天者也精氣神氣皆强盛七神衛護生氣不乏增益大旺氣血周流則百病不能侵雖有大風苛毒弗能害也此一藥之用其利溥哉易水張先生嘗戒不可用峻利食藥食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始開便言空快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其峻利藥必有情性病去之後脾胃安得不損乎脾胃旣損是眞氣元氣敗壞促人之壽當時說下一藥枳實一兩麩炒黃色爲度白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯爲丸以白朮苦甘溫其甘溫補脾胃之元氣其苦

味除胃中之濕熱利腰膝間血故先補脾胃之弱過於枳實尅化之藥一倍枳實味苦寒泄心下痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯爲丸之理老年味之始得可謂神奇矣荷葉之一物中央空虛象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽也甲膽者風也生化萬物之根蔕也左傳云履端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少

陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水土之下出於穢汚之中而不爲穢汚所染挺然獨立其色靑形乃空淸而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎其主意用此一味爲引用可謂遠識深慮合於道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣而補令胃厚再不至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃以辛熱之物酒肉之類自覺不快覓藥於醫者此風習以爲常醫者亦不問所傷即付之以集香丸巴豆大熱藥之類下之大便下則物去遺留食

之熱性藥之熱性重傷元氣七神不識經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人眞氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之物隨藥下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋骨肉血脉無所依倚便爲虛損之證論言及此令人寒心夫辛辣氣薄之藥無故不可亂服非止牽牛而已至眞要大論云五味入胃各先逐其所喜攻攻者尅伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者眞氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈奪人尤甚飲食所

傷腸胃受邪當以苦味泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有夫牽牛不可用者有五此其一也況胃主血爲物所傷物者有形之物也皆是血病血病瀉氣此其二也且飲食傷於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣此其三也食傷腸胃當塞因塞用又寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉眞氣犯大禁四也殊不知針經第一卷第一篇有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必死誤補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死誤補亦死其死也陰氣有

餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也爲牽牛之類朝損暮損其元氣消耗此乃暗裏折人壽數犯大禁五也良可哀歎故特著此論并方庶令四海聞而行之不至夭橫耳此老夫之用心也胃氣豈可不養復明養胃之理故經曰安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉道乃行故血不可不養胃不可不溫血溫胃和榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟脩以奉養五臟者

也內傷飲食固非細事苟安服食藥而輕生損命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜清大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之伯岐曰調此者飲食衣服亦欲適寒溫寒無凄愴暑無出汗飲食者熱無灼灼寒無滄滄寒溫中適故氣將持乃不致邪僻也詳說見於本經條下是必有因用豈可用俱寒俱熱之食藥致損者與內經云內傷者其氣口脉反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐者必如但食不納惡心欲吐者不問一倍二倍不當正與瓜蔕散吐之但以指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脉問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又謂之寒因寒用泄而下降乃應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因塞用因曲而爲之直何爲曲乃傷胃氣是也何爲直而升發胃氣是也因治其飲食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因曲而爲之直也若依分經用藥其所傷之物寒熱溫涼生硬柔軟所傷不一難立定法只隨所傷之物不同各立法治臨時加減用之其用藥又當問病人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食而食之耶不可服破氣藥若乘饑困而食之耶

當益胃氣或爲人所勉勸強食之宜損血而益氣也診其脉候傷在何臟方可與對病之藥豈可妄泄天眞生氣以輕喪身寶乎且如先食熱物而不傷繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熱食寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合而與之則榮衛之氣必得周流更有或先飲酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與氷如此不等皆當驗其節次所傷之物約量寒熱之劑分數各各對證而與之無不取驗自忖所定方藥未敢便爲能盡藥性之理

姑用指迷辯或耳隨證立方備陳於後

易水張先生枳朮丸

治痞消食强胃

白朮二兩　枳實麩炒黃色去穰一兩

右同爲極細末荷葉裹炒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸多用白湯下無時白朮者本意不取其食速化但令人胃氣强實不復傷也

橘皮枳朮丸

治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮　枳實麩炒去穰已上各一兩　白朮二兩

右件爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸熟水送下食遠

○夫内傷用藥之大法所貴服之强人胃氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不傷此能用食藥者也此藥久久益胃氣令人不復致傷也

麴糵枳朮丸

治爲人所勉勸强食之致心腹滿悶不快

枳實麩炒去穰　大麥糵麪炒　神麴炒已上各一兩　白朮二兩

右爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸用溫水下食遠

木香枳朮丸

破滯氣消飲食開胃進

木香　枳實麩炒去穰已上各一兩　白朮二兩

右爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸溫水送下食遠

木香化滯湯

治因憂氣食濕麪結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

半夏一兩　草豆蔻仁　甘草炙已上各五錢

柴胡四錢　木香　橘皮已上各三錢

枳實麩炒去穰　當歸梢已上各二錢　紅花五分

右件剉如麻豆大每服五錢水二大盞生薑五片煎至一盞去柤稍熱服食遠忌酒濕麪

半夏枳朮丸

治因冷食内傷

半夏湯洗七次焙乾　枳實麩炒已上各一兩　白朮二兩

右同爲極細末荷葉燒飯爲丸如菉豆大每服五十丸溫水送下添服不妨熱湯浸蒸餅爲丸亦可

○如食傷寒熱不調每服加上二黃丸十丸白湯送下

○更作一方加澤瀉一兩爲丸有小便淋者

丁香爛飯丸

治飲食所傷

丁香　京三稜　廣茂炮

木香已上各一錢　甘草炙　甘松去土

縮砂仁　丁香皮　益智仁已上各三錢

香附子五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三十丸白湯送下或細嚼亦不可拘時候

○治卒心胃痛甚效

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通

草豆蔻麪裹煨去皮取仁　枳實麩炒黃色　白朮已上各一兩

大麥蘗麪炒黃色　半夏湯洗七次日乾　黃芩刮去皮生

神麴炒黃色已上各五錢　乾生薑　橘皮

青皮已上各二錢　炒鹽五分

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸白湯下量所傷多少加減服之

○如冬月用別作一藥不用黃芩歲火不及又傷冷物加以溫劑是其治也然有熱藥傷者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知也

三黃枳朮丸

治傷肉食濕麪辛辣厚味之物塡塞悶亂不快

黃芩二兩　黃連酒洗　大黃濕紙裹煨

神麴炒　橘皮　白朮已上各一兩

枳實麩炒五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大一倍每服五十丸白湯送下量所傷服之

除濕益氣丸

治傷濕麪心腹滿悶肢體沉重

枳實麩炒黃色　神麴炒黃色　黃芩生用

白朮已上各一兩　蘿蔔子炒熟去秤取五錢　紅花三分是三錢分十也

右同爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆大每服五十丸白湯送下量所傷多少服之

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩　黃連去鬚酒浸一兩　升麻

柴胡已上各三錢　甘草二錢

一方加

枳實麩炒去穰五錢

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五七十丸白湯送下量所傷服之

枳實導滯丸

治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶亂不安

大黃一兩　枳實麩炒去穰　神麴炒已上各五錢

茯苓去皮　黃芩去腐　黃連揀淨

白朮已上各三錢　澤瀉二錢

右件爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸溫水送下食遠量虛實加減服之

枳實梔子大黃湯

治大病差後傷食勞復

枳實一兩麩炒去穰　梔子三枚半肥者　豆豉一兩二錢五分綿裹

右以清漿水二盞空煮退八分內枳實梔子煮取八分下豉再煮五六沸去柤溫服覆令汗出

○若有宿食內大黃如薄碁子五六枚同煎

○食膏粱之物過多煩熱悶亂者亦宜服之

白朮丸

治傷豆粉濕麪油膩之物

枳實炒黃一兩一錢　白朮　半夏湯浸

神麴炒黃已上各一兩　橘皮去穰七錢　黃芩五錢

白礬枯三分

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯送下量所傷加減服素食多用乾薑故加黃芩以瀉之

木香見晛丸

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

神麴炒黃色　京三稜煨已上各一兩　石三稜去皮煨

草豆蔻麪裹煨熟取仁　香附子炒香已上各五錢　升麻

柴胡已上各三錢　木香二錢　巴豆霜五分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆一倍大每服三十丸溫白湯下量所傷多少服之

三稜消積丸

治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜炮　廣茂炒　炒麴已上各七錢

青橘皮　巴豆和皮米炒黑焦去米　茴香炒

陳橘皮已上各五錢　丁皮　益智已上各三錢

右件爲細末醋打麪糊爲丸如梧桐子大每服十

丸加至二十丸溫生薑湯下食前量虛實加減如
更衣止後服之

備急大黃丸

療心腹諸卒暴百病

大黃　巴豆去皮　乾生薑已上各一兩

右須要精新好藥擣羅蜜和更擣一千杵丸如小豆大每服三丸老少量之

○若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以暖水若酒服之或不下捧頭起令下嚥須臾差未更與三丸以腹中鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之令入尤妙忌蘆筍豬肉冷水肥膩之物易張先生又名獨行丸蓋急劑也

神應丸

治因一切冷物冷水及湩乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

黃蠟二兩　巴豆　杏仁

百草霜　乾薑已上各五錢　丁香

木香已上各二錢

右先將黃蠟用好醋煑去柤穢將巴豆杏仁同炒

黑煙盡研如泥將黃蠟再上火入小油半兩溶開入在杏仁巴豆泥子內同攪旋下丁香木香等藥末研勻搓作挺子油紙裹了旋丸用每服三五十丸溫米飲送下食前日進三服

○如脉緩體重自利乃濕氣勝也以五苓散平胃散加炒麴相合而服之名之曰對金飲子

益胃散

治服寒藥過多或脾胃虛弱胃脘痛

陳皮　黃耆已上各七錢　益智仁六錢

白豆蔻仁　澤瀉　乾生薑

姜黃已上各三錢　縮砂仁　甘草

厚朴　人參已上各二錢

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前

○如脉弦惡寒腹痛乃中氣弱也以仲景小建中湯加黃耆錢氏異功散加芍藥選而用之

○如渴甚者以白朮散加葛根倍之

飲食自倍腸胃乃傷分而治之

痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此混言之也分之為二飲也食也又經云因而大飲則氣逆因而飽食筋脉橫解則腸澼為痔飲者

無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下分消其濕解酲湯五苓散之類主之食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫若消導丁香爛飯丸枳朮丸之類主之稍重則攻化三稜消積丸木香見晛丸之類主之尤重者則或吐或下瓜蔕散備急丸之類主之以平爲期蓋脾已傷又以藥傷使營運之氣減削食愈難消故五常政論云大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法聖人垂此嚴戒是爲萬世福也如能慎言語節飲

食所謂治未病也

論酒客病

夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之況亦損腎水眞陰及有形陰血俱爲不足如此則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神無依折人長命不然則虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久久爲黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其濕葛花解酲湯主之

葛花解酲湯

白豆蔻仁　縮砂仁　葛花已上各五錢
乾生薑　神麴炒黃　澤瀉
白朮已上各二錢　橘皮去白　豬苓去皮
人參去蘆　白茯苓已上各一錢五分　木香五分
蓮花青皮去穰三分

右爲極細末秤和勻每服三錢七白湯調下但得

微汗酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天年

除濕散

治傷馬乳并牛羊酪水一切冷物

神麴一兩炒黃　茯苓七錢　車前子炒香
澤瀉已上各五錢　半夏湯洗　乾生薑已上各三錢
甘草炙　紅花已上各二錢

右同爲極細末每服三錢七白湯調下食前

五苓散

治傷寒温熱病表裡未解頭痛發熱口燥咽乾煩
渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩
渴不止者宜服之又治霍亂吐利燥渴引飲之證

澤瀉一兩五錢　猪苓　茯苓
白朮已上各一兩五錢　桂一兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不計時候服訖多
飲熱湯有汗出即愈

○又治瘀熱在裏身熱黄疸濃煎茵陳蒿湯調下食
前服之

○如疸發渴及中暑引飲亦可用水調服之

臨病制方

至真要論云濕淫所勝治以苦温佐以甘辛以汗爲
故而止以淡泄之得其法者分輕重而制方金匱要
略云腰已上腫者發汗乃愈腰已下腫者當利小便
由是大病差後腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之
又云治濕不利小便非其治也制五苓散以利之孫
眞人療膚革腫以五皮散乃述類象形之故也水熱
穴論云上爲喘呼下爲腫滿不得卧者標本俱病制
神秘湯以去之活人書云均是水氣乾嘔微利發熱
而咳爲表有水小青龍湯加芫花主之身體涼表證
罷咳而脇下痛爲裏有水十棗湯主之亦是仲景方
也易張先生云仲景藥爲萬世法號羣方之祖治雜
病若神後之醫家宗内經法學仲景心可以爲師矣

隨時用藥

○治傷冷飲者以五苓散每服三錢或四錢匕加生
薑煎服之

○治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送下半夏枳朮丸
服之

○治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺夯悶身
重飲食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前
斟酌服之

○假令所傷前後不同以三分爲率熱物二分傷生
冷硬物一分用寒藥三黄丸二停用熱藥木香見
晛丸一停合而服之又如傷生冷物二分傷熱物
一分用熱藥木香見晛丸二停用寒藥三黄丸一
停合而服之

○假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥木香
見晛丸治之須少加三黄丸謂天時不可伐故加
寒藥以順時令若傷熱物只用三黄丸何謂此三
黄時藥丸也

○假令冬天大寒之時傷羊肉湯麪等熱物當用三黃丸治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也為引用又為時藥經云必先歲氣無伐天和此之謂也餘皆倣此

吐法宜用辨上部有脉下部無脉

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂也下部無脉此所謂木鬱也飲食過飽塡塞胷中胷中者太陰之分野經云氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐者是也

瓜蔕散

瓜蔕 赤小豆

右二味為極細末每服一錢匕溫漿水調下取吐為度若不兩手尺脉絶無不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胷中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥去之

解云盛食塡塞於胷中為之窒塞兩手寸脉當主事兩尺脉不見其理安在胷中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胷中者肺也為物所塡肺者手太陰金也金主殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金能尅木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞於上脉絶於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主之偏見於寸口食塞其上是絶五臟之源源絶則水不下流

兩尺竭絶此其理也何疑之有

重明木鬱則達之之理

或曰食盛塡塞於胷中為之窒塞也令吐以去其所傷之物物去則安胷中者太陰肺之分野木鬱者遏於厥陰肝木於下故以吐伸之以舒暢陽和風木之氣也此吐乃瀉出太陰之塞何謂木鬱請聞其說答曰此大神靈之問非演說大道不能及於此天地之間六合之內惟水與火耳火者陽也升浮之象也在天為體在地為用水者陰土也降沉之象也在地為體在天為殞殺收藏之用也其氣上下交則以成八

卦矣以醫書言之則是升浮降沉溫涼寒熱四時也以應八卦若天火在上地水在下則是天地不交陰陽不相輔也是萬物之道大易之理絕滅矣故經言獨陽不生獨陰不長天地陰陽何交會矣故曰陽本根於陰陰本根於陽若不明根源是不明道故六陽之氣生於地則曰陽本根於陰以人身言之是六腑之氣生發長散於胃土之中也既陽氣鼓舞萬象有形質之物於天爲浮散者也物極必反陽極變陰既六陽升浮之力在天其力盡是陽道終矣所以鼓舞六陰有形之陰水在天在外也上六無位必歸於下

此老陽變陰之象也是五臟之源在於天者也天者人之肺以應之故曰陰本源於陽水出高源者是也人之五臟其源在肺肺者背也背在天也故足太陽膀胱寒生長其源在申故陰寒自此而降以成秋收氣寒之漸也降至於地下以成冬藏伏諸六陽在九泉之下者也故五臟之氣生於天以人身是五臟之氣收降藏沉之源出於肺氣之上其流下行既陰氣下行沉墜萬化有形質之物皆收藏於地爲降沉者也物極必反陰極變陽既六陰降沉之力在地其力既盡是陰道終矣是老陰變陽乃初九無位是一歲

四時之氣終而復始爲上下者也莫知其紀如環無端且太陰者肺金收降之氣當居下體今反在於上抑遏厥陰風木反居於下是不得上升也故曰木鬱故令其吐出窒塞有形土化之物使太陰秋肺收於下體復其本以衰之始上升手足厥陰之木元氣以伸其舒暢上升之志得其所矣又况金能尅木以吐伐之則金衰矣金者其道當降是塞因塞用歸其本矣居於上則遏其木故以吐伸之乃瀉金以助木也徧考內經中所說木鬱則達之之義止是食傷太陰有形之物窒塞於胷中尅制厥陰木氣伏潛於下不

得舒伸於上止此耳別無異說以六淫有餘運氣中論之仲景傷寒論云懊憹煩躁不得眠不經汗下謂之實煩瓜蔕散主之曾經妄汗妄吐妄下謂之虛煩者梔子豉湯主之

老夫欲令醫者治陰陽之證補瀉不至錯誤病家雖不知醫明瞭所得之病當補當瀉之法將黃帝鍼經第一卷第五篇說形氣有餘不足當補當瀉之理錄之於前予自注者附之

黃帝曰形氣之逆順柰何岐伯荅曰形氣不足病氣有餘是邪勝也急當瀉之形氣有餘病氣不足急當

補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有餘此謂陰陽俱有餘也急瀉其邪調其虛實故曰有餘者瀉之不足者補之此之謂也故曰刺不知逆順真邪相搏滿者補之則陰陽四溢腸胃充郭肝肺內䐜陰陽相錯虛而瀉之則經脉空虛血氣枯竭腸胃㒤辟皮膚薄著毛腠夭焦子之死期故曰用鍼之要在於知調陰與陽調陰與陽精氣乃光合形與氣使神內藏故曰上工平氣中工亂脉下工絕氣危

生故曰下工不可不慎也必審五臟變化之病五脉之應經絡之實虛皮膚之柔麤而後取之也

聖人垂慈之心已詳矣不合立言老夫誠恐市井莊農山野間人不知文理故以俚語開解之云但病來潮作之時病氣精神增添者是為病氣有餘乃邪氣勝也急瀉之以寒涼酸苦之劑若病來潮作之時神氣困弱者為病氣不足乃真氣不足也急補之以辛甘溫熱之劑不問形氣有餘并形氣不足只取病氣有餘不足也不足者補之有餘者瀉之假令病氣有餘者當急瀉之以寒涼之劑為邪氣勝也病氣不足者急當補之以辛甘溫熱之劑此真氣不足也夫形氣者氣謂口鼻中氣息也形謂皮膚筋骨血脉也形勝者為有餘消瘦者為不足其氣者審口鼻中氣務役如故為氣有餘也若喘息氣促氣短或不足以息者為不足也故曰形氣也乃人之身形中氣血也當補當瀉全不在於此只在病勢潮作之時病氣增加者是邪氣勝也急當瀉之如潮作之時精神困弱語言無力及懶語者是真氣不足也急當補之若病人形氣不足病來潮作之時病氣亦不足此乃陰陽俱不足

也禁用鍼宜補之以甘藥不可以盡劑不灸弗已臍下一寸五分氣海穴是也凡用藥若不本四時以順為逆四時者是春升夏浮秋降冬沉乃天地之升浮化降沉（化者脾土中造化也）是為四時之宜也但宜補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者諸風藥是也此助春夏之升浮者也此便是瀉秋收冬藏之藥也在人之身乃肝心也但言瀉之以酸苦寒涼之劑并淡味滲泄之藥此助秋冬之降沉者也在人之身是肺腎也用藥者宜用此法度慎毋忽焉

内外傷辨卷下終

脾胃論三卷

（金）李杲撰

明刻本

脾胃論三卷（江蘇巡撫採進本）

金李杲撰。杲既著辨惑論、恐世俗不悟、復為此書。其說以土為萬物之母、故獨重脾胃。引經立論、精鑿不磨。明孫一奎醫旨緒餘云、東垣生當金元之交、中原擾攘、士失其所、人疲奔命、或以勞倦傷脾、或以憂思傷脾、或以飢飽傷脾。病有緩急、不得不以急者為先務。此真知杲者也。前有元好問序。考遺山文集有杲所著傷寒會要引一篇、備載其所治驗。元史方技傳全取之、而此序獨不見集中、意其偶有散佚歟。又有羅天益後序一篇。天益字謙父、杲晚年弟子、盡得其傳。元硯堅東垣老人傳稱杲臨終、取平日所著書、檢勘卷帙、以次相從、列於几前、囑謙父曰、此書付汝者、即其人也。

脾胃論目録

卷上

脾胃虚實傳變論

藏氣法時升降浮沈補瀉之圖

脾胃勝衰論

補脾胃瀉陰火升陽湯

肺之脾胃虚論

升陽益胃湯

君臣佐使法

分經隨病制方

通氣防風湯　羌活勝濕湯

用藥宜禁論

仲景引内經所説脾胃

卷中

氣運衰旺圖説

飲食勞倦所傷始爲熱中論

補中益氣湯

脾胃虚弱隨時爲病隨病制方

黄耆人參湯　除風濕羌活湯

調中益氣湯

長夏濕熱胃困尤甚用清暑益氣湯論

清暑益氣湯

隨時加減用藥法

腸澼下血論

涼血地黄湯

升陽除濕防風湯

脾胃虚不可妄用吐藥論

安養心神調治脾胃論

凡治病當問其所便

胃氣下溜五臟氣皆亂其爲病互相出見論

陰病治陽陽病治陰

三焦元氣衰旺

卷下

大腸小腸五臟皆屬於胃胃虚則俱病論

脾胃虚則九竅不通論

胃虚臟腑經絡皆無所受氣而俱病論

胃虚元氣不足諸病所生論

忽肥忽瘦論

天地陰陽生殺之理在升降浮沈之間論

陰陽壽夭論

五臟之氣交變論
陰陽升降論
調理脾胃治驗
治法用藥若不明升降浮沉差互反損論
清神益氣湯　半夏白朮天麻湯
人參芍藥湯　麻黃人參芍藥湯
升麻散火湯　安胃湯
清胃散　清陽湯
胃風湯
陽明病濕勝自汗論
調衛湯
濕熱成痿肺金受邪論
清燥湯　助陽和血補氣湯
升陽湯　升陽除濕湯
益胃湯　生薑和中湯
強胃湯　溫胃湯
和中丸　藿香安胃散
異功散
飲食傷脾論　五苓散
論飲酒過傷

葛花解酲湯　枳朮丸
橘皮枳朮丸　半夏枳朮丸
木香乾薑枳朮丸
木香人參生薑枳朮丸
和中丸　交泰丸
三稜消積丸　備急丸
神保丸　雄黃聖餅子
蠲飲枳實丸　感應丸
神應丸　白朮安胃散
聖餅子　當歸和血散
訶梨勒丸
脾胃損在調飲食適寒溫
胃風湯　二黃丸
白朮散　加減平胃散
散滯氣湯　通幽湯
潤腸丸　導氣除燥湯
丁香茱萸湯　草豆蔻丸
神聖復氣湯　脾胃將理法
攝養　遠欲
省言箴

目錄終

脾胃論卷上

新安　吳中珩　校

脾胃虛實傳變論

五藏別論云胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也所謂五藏者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也陰陽應象大論云谷氣通於脾六經爲川腸胃爲海九竅爲水注之氣九竅者五臟主之五臟皆得胃氣乃能通利通評虛實論云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也胃氣一虛耳目口鼻俱爲之病經脈別論云食氣入胃散精於肝淫氣於筋食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於腑腑精神明留於四臟氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以決死生飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也又云陰之所生本在五味陰之五宮傷

在五味至於五味口嗜而欲食之必自裁制勿使過焉過則傷其正也謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則骨氣以精謹道如法長有天命平人氣象論云人以水穀爲本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死所謂無胃氣者非肝不弦腎不石也歷觀諸篇而參考之則元氣之充足皆由脾胃之氣無所傷而後能滋養元氣若胃氣之本弱飲食自倍則脾胃之氣既傷而元氣亦不能充而諸病之所由生也內經之旨皎如日星猶恐後人有所未達故靈樞經中復申其說經云水穀入口其味有五各注其海津液各走其道胃者水穀之海其輸上在氣街下至三里水穀之海有餘則腹滿水穀之海不足則饑不受穀食人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀氣血之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出氣血者經隧也經隧者五臟六腑之大絡也又云五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胷中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉榮氣者必其津液注之於脈化而爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛者出其悍氣之慓疾而行於四末分肉皮膚之間而不休者也又云中焦之所出亦並胃

中出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化爲精微上注於肺脉乃化而爲血以奉生身莫貴於此聖人諄復其辭而不憚其煩者仁天下後世之心亦惓惓矣故夫飲食失節寒溫不適脾胃乃傷此因喜怒憂恐損耗元氣資助心火火與元氣不兩立火勝則乘其土位此所以病也調經篇云病生陰者得之飲食居處陰陽喜怒又云陰虛則內熱有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胷中故爲內熱脾胃一傷五亂互作其始病徧身壯熱頭痛目眩肢體沉重四肢不收怠惰嗜臥爲熱所

傷元氣不能運用故四肢困怠如此聖人著之於經謂人以胃土爲本成文演義互相發明不一而止麤工不解讀妄意施用本以活人反以害人今舉經中言病從脾胃所生及養生當實元氣者條陳之生氣通天論云蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也此因時之序故聖人傳精神服天氣而通神明失之內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之削也陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲耳閉潰潰乎若壞都故蒼天之氣貴清淨陽氣惡煩勞病從脾胃生者一也五常政大

論云陰精所奉其人壽陽精所降其人夭陰精所奉謂脾胃既和穀氣上升春夏令行故其人壽陽精所降謂脾胃不和穀氣下流收藏令行故其人夭病從脾胃生者二也六節藏象論云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也其華在唇四白其充在肌其味甘其色黃此至陰之類通於土氣凡十一藏皆取決於膽也膽者少陽春升之氣春氣升則萬化安故膽氣春升則餘藏從之膽氣不升則飧泄腸澼不一而起矣病從脾胃生者三也經云天食人以五氣地食人以五

味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生此謂之氣者上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉氣或乖錯人何以生病從脾胃生者四也豈特四者至於經綸天地之邪氣感則害人五藏六腑及形氣俱虛乃受外邪不因虛邪賊邪不能獨傷人諸病從脾胃而生明矣聖人旨意重見疊出詳盡如此且垂戒云法於陰陽和於術數食飲有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去由是言之飲食起居之際

可不慎哉

藏氣法時升降浮沉補瀉之圖

五行相生木火土金水循環無端惟脾無正行於四季之末各旺一十八日以生四臟四季者辰戌丑未是也人身形以應九野左足主立春丑位是也左手主立夏辰位是也右手主立秋未位是也右足主立冬戌位是也戌濕其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之巳土其本味鹹其兼味辛甘酸苦在人以脾應之脾胃兼化其病治之[illegible]從其宜不可定體肝肺之病在水火之間順逆傳變不同溫涼不定當求

責耳



脾胃勝衰論

胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾實而邪氣盛也又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削即食㑊也叔和云多食亦肌虛此之謂也夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時而顯火上行獨燎其面黃帝鍼經云面熱者足陽明病胃既病則脾無所稟受脾為死陰不主時也故亦從而病焉形體勞役則脾病病脾則怠惰嗜臥四肢不收大便泄瀉脾既病則其胃不能獨行津液故亦從而病焉

大抵脾胃虛弱陽氣不能生長是春夏之令不行五臟之氣不生脾病則下流乘腎土剋水則骨乏無力是為骨蝕令人骨髓空虛足不能履地是陰氣重疊此陰盛陽虛之證大法云汗之則愈下之則死若用辛甘之藥滋胃當升當浮使生長之氣旺言其汗者非正發汗也為助陽也夫胃病其脈緩脾病其脈遲且其人當臍有動氣按之牢若痛若火乘土位其脈洪緩更有身熱心中不便之證此陽氣衰弱不能生發不當於五臟中用藥法治之當從藏氣法時論中

升降浮沉補瀉法用藥耳如脉緩病怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散若脉弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉或皮毛枯槁髮脫落從黃耆建中湯脉虛而血弱於四物湯中摘一味或二味以本顯證中加之或真氣虛弱及氣短脉弱從四君子湯或渴或小便閉澁赤黃多少從五苓散去桂摘一二味加正藥中已上五藥當於本證中隨所兼見證加減假令表虛自汗春夏加黃耆秋冬加桂如腹中急縮或脉弦加防風急甚加甘草腹中窄狹或氣短者亦加之腹滿氣不轉者勿加雖氣不轉而脾胃

中氣不和者勿去但加厚朴以破滯氣然亦不可多用於甘草五分中加一分可也腹中夯悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之如肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中窄狹及縮急者去之及諸酸澁藥亦不可用腹中痛者加甘草白芍藥稼穡作甘甘者己也曲直作酸酸者甲也甲己化土此仲景妙法也腹痛兼發熱加黃芩惡寒或腹中覺寒加桂怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉加蒼朮自汗加白朮小便不利加茯苓渴亦加之氣弱者加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓縮砂仁氣復不能轉運有熱者微加黃連心煩亂亦如之小便少者加豬苓澤瀉汗多津液竭於上勿加之是津液還入胃中欲自行也不渴而小便閉塞不通加炒黃蘖知母小便澁者加炒滑石小便淋澁者加澤瀉且五苓散治渴而小便不利無惡寒者不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血證用炒黃蘖知母以除腎中燥熱竅不利而淋加澤瀉炒滑石只治竅不利者六一散中加木通亦可心臟熱者用錢氏方中導赤散中滿或但腹脹者加厚朴氣不順加橘皮氣滯加青皮一橘

皮三氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃耆以補之如腹中氣不轉者更加甘草一半腹中刺痛或周身刺痛者或裏急者腹中不寬快是也或虛坐而大便不得者皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加當歸身頭痛者加川芎苦頭痛加細辛此少陰頭痛也髮脫落及臍下痛加熟地黃子平昔調理脾胃虛弱於此五藥中加減如五臟證中互顯一二證各對證加藥無不驗然終不能使人完復後或有因而再至者亦由督任衝三脉爲邪皆胃氣虛弱之所致也法雖依證加減執方療病不依素問

法度耳是以檢討素問難經及黃帝鍼經中說脾胃不足之源乃陽氣不足陰氣有餘當從六氣不足升降浮沉法隨證用藥治之蓋脾胃不足不同餘臟無定體故也其治肝心肺腎有餘不足或補或瀉惟益脾胃之藥爲切經言至而不至是爲不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從後來者爲虛邪心與小腸來乘脾胃也脾胃脉中見浮大而弦其病或煩燥悶亂或四肢發熱或口苦舌乾咽乾飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾也病人自以爲渴醫者

治以五苓散謂止渴燥而反加渴燥乃重竭津液以至危亡經云虛則補其母當於心與小腸中以補脾胃之根蒂者甘温之藥爲之主以苦寒之藥爲之使以酸味爲之臣佐以其心苦緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫反甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也肝木旺則挾火勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或身體沉重走疰疼痛蓋濕熱相搏而風熱鬱而不得伸附著于有形也或多怒者風熱下陷于地中也或目病而生內障者脾裹血胃主血心主脉脉者血之府也或云心主血又云肝主血肝之竅開於目也或妄見妄聞起妄心夜夢亡人四肢滿閉轉筋皆肝木大盛而爲邪也或生痿或生痺或生厥或中風或生惡瘡或作腎痿或爲上熱下寒爲邪不一皆風熱不得升長而木火遏於有形中也所生受病者言肺受土火木之邪而淸肅之氣傷或胷滿少氣短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道不行也或咳嗽寒熱者濕熱乘其內也所不勝乘之者水乘木之妄行而反來侮土故腎入心爲汗入肝爲泣入脾爲涎入肺爲痰

爲嗽爲涕爲嚏爲水出鼻也一說下元土盛剋水致督任衝三脉盛火旺煎熬令水沸騰而乘脾肺故痰涎唾出於口也下行爲陰汗爲外腎冷爲足不任身爲脚下隱痛或水附木勢而上爲眼澀爲眵爲冷淚此皆由肺金之虛而寡于畏也夫脾胃不足皆爲血病是陽氣不足陰氣有餘故九竅不通諸陽氣根於陰血中陰血受火邪則陰盛陰盛則上乘陽分而陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣走空竅者也陰氣附形質者也如陰氣附於土陽氣升於天則各安其分也今所立方中有辛甘溫藥者非獨用也復有

甘苦大寒之劑亦非獨用也以火酒二製爲之使引苦甘寒藥至頂而復入於腎肝之下此所謂升降浮沉之道自耦而奇奇而至耦者也（陽分奇 陰分耦）瀉陰火以諸風藥升發陽氣以滋肝膽之用是令陽氣生上出于陰分末用辛甘溫藥接其升藥使大發散於陽分而令走九竅也經云食入于胃散精於肝淫氣於筋食入于胃濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸於肺肺朝百脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於腑且飲食入胃先行陽道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者充塞頭頂則九竅通利者若飲食不節損其

胃氣不能尅化散於肝歸於心溢於肺食入則昏冒欲睡得卧則食在一邊氣暫得舒是知升發之氣不行者此也經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入胃遽覺至臍下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺則心火上攻使口燥咽乾是陰氣大盛其理甚易知也况脾胃病則當臍有動氣按之牢若痛有是者乃脾胃虛無是則非也亦可作明辯矣

脾胃不足是火不能生土而反抗拒此至而不至是爲不及也

白朮君　人參臣　甘草佐
芍藥佐　黃連使　黃耆臣
桑白皮佐

諸風藥皆是風能勝濕也及諸甘溫藥亦可

心火亢盛乘於脾胃之位亦至而不至是爲不及也

黃連君　黃蘗臣　生地黃臣
芍藥佐　石膏佐　知母佐
黃芩佐　甘草佐

肝木妄行胷脇痛口苦舌乾往來寒熱而嘔多怒四肢滿閉淋溲便難轉筋腹中急痛此所不勝乘

之也

羌活佐　防風臣　升麻使
柴胡君　獨活佐　芍藥臣
猪苓　澤瀉佐　肉桂臣
藁本　川芎　細辛
蔓荊子　白芷　石膏
黃蘗佐　知母　滑石

肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所生受病也故咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情

慘慘而不樂皆陽氣不足陰氣有餘是體有餘而用不足也

人參君　白朮佐　白芍藥佐

橘皮臣　青皮以破滯氣　黃耆臣

桂枝佐　桔梗引用　桑白皮佐

甘草諸酸之藥皆可　木香佐　檳榔佐

五味子佐此三味除客氣

腎水反來侮土所勝者妄行也作涎及清涕唾多溺多而惡寒者是也土火復之及二脉爲邪則足不任身足下痛不能踐地骨乏無力喜睡兩丸冷腹陰陰而痛妄聞妄見腰脊背胛皆痛

乾薑君　白朮臣　蒼朮佐

附子佐炮少許　肉桂去皮少許　川烏頭臣

茯苓佐　澤瀉使　猪苓佐

夫飲食入胃陽氣上行津液與氣入於心貫於肺充實皮毛散于百脉脾禀氣于胃而澆灌四旁榮養氣血者也今飲食損胃勞倦傷脾脾胃虛則火邪乘之而生大熱當先於心分補脾之源蓋土生於火兼於脾胃中瀉火主生化之源足陽明爲十二經之海主經營之氣諸經皆禀之言陽明厥陰與何經相併而爲病酌中以用藥如權之在衡在兩則有在兩之中在斤則有在斤之中也所以言此者發明脾胃之病不可一例而推之不可一途而取之欲人知百病皆由脾胃衰而生也毫釐之失則災害立生假如時在長夏於長夏之令中立方謂正當主氣衰而客氣旺之時也後之處方者當從此法加時令藥名曰補脾胃瀉陰火升陽湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

柴胡一兩五錢　甘草炙　黃耆臣

蒼朮泔浸去黑皮切作片子日曝乾剉碎炒　羌活已上各一兩

升麻八錢　人參臣　黃芩已上各七錢

黃連去鬚酒製五錢炒爲臣爲佐

石膏少許長夏微用過時去之從權

右件㕮咀每服三錢水二盞煎至一盞去柤大溫服早飯後午飯前間日服服藥之時宜減食宜美食服藥訖忌語話一二時辰許及酒濕麪大料物之類恐大濕熱之物復助火邪而愈損元氣也亦忌冷水及寒涼淡滲之物及諸果恐陽氣不能生旺也宜溫食及薄滋味以助陽氣大抵此法此藥欲令陽氣升浮耳若滲泄淡味皆爲滋陰之味爲

大禁也雖然亦有從權而用之者如見腎火旺及督任衝三脉盛則用黃蘗知母酒洗訖火炒製加之若分兩則臨病斟酌不可久服恐助陰氣而為害也小便赤或澁當利之大便澁當行之此亦從權也得利則勿再服此雖立食禁法若可食之物一切禁之則胃氣失所養也亦當從權而食之以滋胃也

肺之脾胃虛論

脾胃之虛怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦舌乾食無味大便不調小便頻

數不嗜食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慽不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃名之曰升陽益胃湯

升陽益胃湯

黃耆二兩　半夏湯洗此一味脉澁者宜用
人參去蘆　甘草炙已上各一兩　白芍藥
防風以其秋旺故以辛溫瀉之　羌活
獨活已上各五錢　橘皮不去穰四錢
茯苓小便利不渴者勿用　澤瀉不淋勿用　柴胡
白朮已上各三錢　黃連二錢

何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補肺為脾胃虛則肺最受病故因時而補易為力也

右㕮咀每服三錢生薑五片棗二枚去核水三盞同煎至一盞去柤溫服早飯午飯之間服之禁忌如前其藥漸加至五錢止服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣也慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使胃與

藥得轉運升發慎勿大勞役使復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣少覺强壯少食果以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者也

君臣佐使法

至真要大論云有毒無毒所治為主主病者為君佐君者為臣應臣者為使一法力大者為君凡藥之所用皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣氣薄者為陽中之陰氣厚者為陽中之陽味薄者為陰中之陽味厚者為陰中之陰辛甘淡中熱者為陽中之陽辛甘淡中寒者為陽中之陰酸苦鹹之寒者為陰中之陰

酸苦鹹之熱者爲陰中之陽夫辛甘淡酸苦鹹乃味之陰陽又爲地之陰陽也溫涼寒熱乃氣之陰陽又爲天之陰陽也氣味生成而陰陽造化之機存焉一物之內氣味兼有一藥之中理性具焉主對治療由是而出假令治表實麻黃葛根表虛桂枝黃耆裏實枳實大黃裏虛人參芍藥熱者黃芩黃連寒者乾薑附子之類爲君君藥分兩最多臣藥次之使藥又次之不可令臣過於君君臣有序相與宣攝則可以禦邪除病矣如傷寒論云陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛以芍藥之酸於土中瀉木爲君飴糖炙甘草甘溫

補脾養胃爲臣水挾木勢亦來侮土故脈弦而腹痛肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水薑棗甘辛溫發散陽氣行於經脈皮毛爲使建中之名於此見焉有緩急收散升降浮沈濇滑之類非一從權立法于後

○如皮毛肌肉之不伸無大熱不能食而渴者加葛根五錢燥熱及胃氣上衝爲衝脈所逆或作逆氣而裏急者加炒黃蘗知母覺胸中熱而不渴加炒黃芩如胸中結滯氣濇或有熱病者亦各加之如食少而小便少者津液不足也勿利之益氣補胃自行矣

○如氣弱氣短者加人參只升陽之劑助陽尤勝加人參惡寒發熱而躁渴脈洪大白虎湯主之或喘者加人參如渴不止寒水石石膏各等分少少與之即錢氏方中甘露散主身大熱而小便數或上飲下洩此燥熱也氣燥加白葵花血燥加赤葵花

○如脈弦只加風藥不可用五苓散如小便行病增者此內燥津液不能停當致津液加炒黃蘗赤葵花

○如心下痞悶者加黃連一黃芩三減諸甘藥不能食心下軟而痞者甘草瀉心湯則愈痞有九種治有仲景湯五

○如喘滿者加炙厚朴

○如胃虛弱而痞者加甘草

○如喘而小便不利者加苦葶藶小便不利者加之小便利爲禁藥也

○如氣短氣弱而腹微滿者不去人參去甘草加厚朴然不若苦味泄之而不令大便行

○如腹微滿而氣不轉加之中滿者去甘草倍黃連加黃蘗更加三味五苓散少許此病雖宜升宜汗如汗多亡陽加黃芩四肢煩熱肌熱與羌活柴胡升麻葛根甘草則愈

○如鼻流清涕惡風或項背脊膂強痛羌活防風甘草等分黃耆加倍臨臥服之

○如有大熱脉洪大加苦寒劑而熱不退者加石膏

如脾胃中熱加炒黃連甘草

○凡治此病脉數者當用黃蘗或少加黃連以柴胡蒼朮黃耆甘草更加升麻得汗出則脉必下乃火鬱則發之也

○如證退而脉數不退不洪大而疾有力者多減苦藥加石膏如大便軟或泄者加桔梗食後服之此藥若誤用則其害非細用者當斟酌旋旋加之如

食少者不可用石膏石膏善能去脉數疾病退脉數不退者不可治也如不大渴亦不可用如脉弦而數者此陰氣也風藥升陽以發火鬱則脉數峻退矣已上五法加減未盡特以明大槩耳

分經隨病制方

脉經云風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之

通氣防風湯

柴胡　升麻　黃耆已上各一錢

羌活　防風　橘皮

人參　甘草已上各五分　藁本三分

青皮　白豆蔻仁　黃蘗已上各二分

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去柤溫服食後氣盛者宜服面白脫色氣短者勿服

○如小便遺失者肺氣虛也宜安臥養氣禁勞役以黃耆人參之類補之不愈當責有熱加黃蘗生地黃

○如肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之

○如脊痛項強腰似折項似拔上衝頭痛者及足太陽經之不行也以羌活勝濕湯主之

羌活勝濕湯

羌活　獨活已上各一錢　甘草炙

藁本　防風已上各五分　蔓荊子三分

川芎二分

右件㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤溫服食後如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也更加黃蘗一錢附子半錢蒼朮二錢

○如腿脚沉重無力者加酒洗漢防已半錢輕則附

子重則川烏頭少許以爲引用而行血也
○如臥而多驚小便淋溲者邪在少陽厥陰亦用太陽經藥更加柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦風寒二經合病也經云腎肝之病同一治爲俱在下焦非風藥行經不可也
○如大便後有白膿或只便白膿者因勞役氣虛傷大腸也以黃耆人參湯補之如裏急頻見者血虛也更加當歸
○如肺脹膨膨而喘咳胷高氣滿壅盛而上奔者多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許

○如甚則交兩手而瞀者眞氣大虛也若氣短加黃耆五味子人參氣盛加五味子人參黃芩荊芥穗冬月去荊芥穗加草豆蔻仁
○如嗌痛頷腫脉洪大面赤者加黃芩桔梗甘草各五分
○如耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黃芩黃連消其腫以人參黃耆益其元氣而瀉其火邪如脉緊者寒也或面白善嚏或面色惡皆寒也亦加羌活等四味當瀉足太陽不用連芩少加附子以通其脉面色惡多悲恐者更加桂附
○如便白膿少有滑頻見汙衣者氣脫加附子皮甚則加米殼
○如氣澁者只以甘藥補氣當安臥不語以養其氣

用藥宜禁論

凡治病服藥必知時禁經禁病禁藥禁夫時禁者必本四時升降之理汗下吐利之宜大法春宜吐象萬物之發生耕耨科斫使陽氣之鬱者易達也夏宜汗象萬物之浮而有餘也秋宜下象萬物之收成推陳致新而使陽氣易收也冬周密象萬物之閉藏使陽氣不動也夫四時陰陽者與萬物浮沉於生長之門

逆其根伐其本壞其眞矣又云用溫遠溫用熱遠熱用涼遠涼用寒遠寒無翼其勝也故冬不用白虎夏不用青龍春夏不服桂枝秋冬不服麻黃不失氣宜如春夏而下秋冬而汗是失天信伐天和也有病則從權過則更之經禁者足太陽膀胱經爲諸陽之首行於背表之表風寒所傷則宜汗傳入本則宜利小便若下之太早必變證百出此一禁也足陽明胃經行身之前主腹滿脹大便難宜下之益陽明化燥火津液不能停禁發汗利小便爲重損津液此二禁也

足少陽膽經行身之側在太陽陽明之間病則往來寒熱口苦胷脇痛秖宜和解且膽者無出無入又主發生之氣下則犯太陽汗則犯陽明利小便則使生發之氣反陷入陰中此三禁也三陰非胃實不當下爲三陰無傳本須胃實得下也分經用藥有所據焉病禁者如陽氣不足陰氣有餘之病則凡飲食及藥忌助陰瀉陽諸淡食及淡味之藥瀉升發以助收斂也諸苦藥皆沉瀉陽氣之散浮諸薑附官桂辛熱之藥及濕麪酒大料物之類助火而瀉元氣生冷硬物損陽氣皆所當禁也如陰火欲衰而退以三焦元氣

未盛必口淡淡如鹹物亦所當禁藥禁者如胃氣不行內亡津液而乾涸求湯飲以自救非渴也乃口乾也非溫勝也乃血病也當以辛酸益之而淡滲五苓之類則所當禁也汗多禁利小便小便多禁發汗咽痛禁發汗利小便若大便快利不得更利大便秘澁以當歸桃仁麻子仁郁李仁皂角仁和血潤腸如燥藥則所當禁者吐多不得復吐如吐而大便虛輭者此上氣壅滯以薑橘之屬宜之吐而大便不通則利大便上藥則所當禁也諸病惡瘡及小兒癍後大便實者亦當下之而薑橘之類則所當禁也又如脈弦

而服平胃散脈緩而服黃耆建中湯乃實實虛虛皆所當禁也人稟天之濕化而生胃也胃之與濕其名雖二其實一也濕能滋養于胃胃濕有餘亦當瀉濕之太過也胃之不足惟濕物能滋養仲景云胃勝思湯餅而胃虛食湯餅者往往增劇濕能助火火旺鬱而不通主大熱初病火旺不可食以助火也察其時辯其經審其病而後用藥四者不失其宜則善矣

著論處方已詳矣然恐或者不知其源而無所考據復以黃帝內經仲景所說脾胃者列于左

太陰陽明論云太陰陽明爲表裏脾胃脉也生病而

異者何也岐伯曰陰陽異位更虛更實更逆更從或從內或從外所從不同故病異名也帝曰願聞其異狀也岐伯曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛故犯賊風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不得臥上爲喘呼入五臟則䐜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼故喉主天氣咽主地氣故陽受風氣陰受濕氣陰氣從足上行上頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上故傷於風

者上先受之傷於濕者下先受之帝曰脾病而四支不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也今脾病不能爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉帝曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中央常以四時長四藏各十八日寄治不得獨主於時也脾藏者常著胃土之精也土者生萬物而法天地故上下至頭足不得主時也陰陽應象論曰人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐故喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脈去形喜

怒不節寒暑過度生乃不固玉機眞藏論曰脾太過則令人四肢不舉其不及則令人九竅不通名曰重強又通評虛實論曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也調經論曰形有餘則腹脹涇溲不利不足則四肢不用又氣交變論曰歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉萎足痿不收行善瘈脚下痛飲發中滿食減四肢不舉又云歲土不及風乃大行霍亂體重腹痛筋骨繇復肌肉瞤酸善怒又云咸病寒中復則收政嚴峻胸脇暴痛下引少腹善太息蟲食甘黃氣客於脾民食少失

味又云土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓拆之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖淫之復其眚四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四肢五常政大論上平曰備化不及曰卑監又云其動瘍涌分潰癰腫其發濡滯其病留滿否塞從木化也其病飧泄又云土太過曰敦阜其味甘鹹酸其象長夏其經足太陰陽明又曰其病腹滿四肢不舉邪傷脾也經脈別論云太陰藏搏者用心省眞五脈氣少胃氣不平三陰也宜治其下俞補陽瀉陰藏氣法時論云脾主長夏足太陰陽明主治其日戊己脾苦濕

急食苦以燥之又云病在脾愈在秋秋不愈甚於春春不死持於夏起於長夏禁溫食飽食濕地濡衣脾病者愈在庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不死持於丙丁起於戊己脾病者日昳慧日出甚下晡靜脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之甘補之又云脾病者身重善飢足痿足痿能行善瘈脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者經脈別論食氣入胃散精於肝淫氣於筋食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於府府精神明留於四藏氣歸

於權衡權衡以平氣口成寸以決死生飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也五常政大論有太過不及太過者薄所不勝乘所勝也不及者至而不至是為不及所勝妄行所生受病所不勝者乘之也仲景云人受氣於水穀以養神水穀盡而神去故云安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依又云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養衛不可不溫血溫衛和得盡天年

脾胃論卷上終

脾胃論卷中

新安 吳勉學 校

氣運衰旺圖說

天地互為體用四說 察病神機

濕胃化 熱小腸長 風膽生

皆陷下不足先補則

黃耆 人參 甘草

當歸身 柴胡 升麻

乃辛甘發散以助春夏生長之用也

土脾形 火心神 木肝血

皆大盛上乘生長之氣後瀉則

甘草梢子之甘寒瀉火形於肺逆於胃中傷氣者也

黃芩之苦寒以瀉胃中之熱喘氣上奔者也

紅花以破惡血已用黃芩大補腎水益肺之氣瀉血中火燥者也

寒膀胱藏氣 燥大腸收氣

皆大旺後瀉則

黃耆之甘溫止自汗實表虛使不受寒邪

當歸之辛溫能潤燥更加桃仁以通幽門閉塞

利其陰路除大便之難燥者也
水腎精　金肺氣
皆虛衰不足先補則
黄蘖之苦寒除濕熱為痿乘於腎救足膝無力
亦除陰汗陰痿而益精
甘草梢子黄芩補肺氣泄陰火之下行肺苦氣
上逆急食苦以泄之也
此初受熱中常治之法也非權也
權者臨病制宜之謂也
常道病則反常矣

春夏乃天之用也是地之體也
秋冬乃天之體也是地之用也
此天地之常道既病反常也
春夏天之用人亦應之
食罷四肢蹻健精氣神皆出九竅通利是也口鼻
氣息自不閙其音語聲清響如鐘
春夏地之體人亦應之
食罷皮肉筋骨血脈皆滑利屈伸柔和而骨剛力
盛用力不乏

飲食勞倦所傷始為熱中論

古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內外經悉言人以胃氣為本蓋人受水穀之氣以生所謂清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也若飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣既脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負

脾胃氣虛則下流於腎陰火得以乘其土位故脾證始得則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱為頭痛為渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而與外感風寒所得之證頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外為有餘有餘者瀉之傷其內為不足不足者補之內傷不足之病苟誤認作外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也

實實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何惟當以辛甘溫之劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣經曰勞者溫之損者溫之又云溫能除大熱大忌苦寒之藥損其脾胃脾胃之證始得則熱中今立治始得之證

補中益氣湯

黃耆（病甚勞役熱甚者一錢）　甘草（已上各五分炙）

人參（去蘆三分有嗽去之）

已上三味除濕熱煩熱之聖藥也

當歸身（二分酒焙乾或日乾以和血脉）

橘皮（不去白二分或三分以導氣又能益元氣得諸甘藥乃可若獨用瀉脾胃）

升麻（二分或三分引胃氣上騰而復其本位便是行春升之令）

柴胡（二分或三分引清氣行少陽之氣上升）

白术（三分除胃中熱利腰臍間血）

右件藥㕮咀都作一服水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去柤食遠稍熱服如傷之重者不過二服而愈若病日久者以權立加減法治之

○如腹中痛者加白芍藥（五分）炙甘草（三分）

○如惡寒冷痛者加去皮中桂（一分或三分桂心是也）

○如惡熱喜寒而腹痛者於已加白芍藥二味中更加生黃芩（三分或二分）

○如夏月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也

○如天涼時惡熱而痛於已加白芍藥甘草黃芩中更少加桂

○如天寒時腹痛去芍藥味酸而寒故也加益智（三分或二分）或加半夏（五分）生薑（三片）

○如頭痛加蔓荊子（二分或三分）

○如痛甚者加川芎（二分）

○如頂痛腦痛加藁本（三分或五分）

○如苦痛者加細辛（二分華陰者）

○諸頭痛者併用此四味足矣

○如頭上有熱則此不能治別以清空膏主之

○如臍下痛者加真熟地黃（五分）其痛立止如不已者乃大寒也更加肉桂（去皮二分或三分）內經所說少腹痛皆寒證從復法相報中來也經云大勝必大復從熱病中變而作也非傷寒厥陰之證也（仲景以抵當湯并丸主之乃血結下焦膀胱也）

○如胸中氣壅滯加青皮（二分）如氣促少氣者去之

○如身有疼痛者濕若身重者亦濕加去桂五苓散

一錢

○如風濕相搏一身盡痛加羌活防風藁本根（已上各五分）升麻蒼朮（已上各一錢）勿用五苓所以然者為風藥已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以諸風之藥損人元氣而益其病故也

○如大便秘澁加當歸梢（一錢）閉澁不行者煎成正藥先用一口調玄明粉（五分或一錢）得行則止此病不宜下下之恐變凶證也

○如久病痰嗽者去人參初病者勿去之冬月或春寒或秋涼時各宜加去根節麻黃（五分）

○如春令大溫只加佛耳草（三分）款冬花（一分）

○如夏月病嗽加五味子（三十二枚）麥門冬（去心二分或三分）

○如舌上白滑胎者是胸中有寒勿用之

○如夏月不嗽亦加人參（三分或二分）并五味子麥門冬各等分救肺受火邪也

○如病人能食而心下痞加黃連（一分或三分）

○如不能食心下痞勿加黃連

○如脇下痛或脇下急縮俱加柴胡（三分甚則五分）

右一方加減是飲食勞倦喜怒不節始病熱中則可用之若末傳為寒中則不可用也蓋甘酸適足益其病爾如黃耆人參甘草芍藥五味子之類也

今詳內經鍼經熱中寒中之證列于左

調經論云血并於陽氣并於陰乃為炅中血并於上氣并於下心煩惋善怒又云其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又云所有勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故曰內熱陰盛生內寒厥氣上逆寒氣積於胸中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留寒獨留則血凝泣血凝泣則脈不通其脈盛大以濇故曰寒中

先病熱中證者衝脈之火附二陰之裏傳之督脈督脈者第二十一顀下長強穴是也與足太陽膀胱寒氣為附經督脈其盛也如巨川之水疾如奔馬其勢不可遏太陽寒氣細細如線逆太陽寒氣上行衝頂入額下鼻尖入手太陽於胸中手太陽者丙熱氣也足膀胱者壬寒氣也壬能尅丙寒熱逆於胸中故脈盛大其手太陽小腸熱氣不能交入膀胱經者故上一經之盛氣積於胸中故其脈盛大其膀胱逆行盛之極子能令母實手陽明大腸經金即其母也故燥旺其燥氣挾子之勢故脈濇而大便不通以此言脈盛大以濇者手陽明大

腸脉也

黃帝鍼經胃病者腹䐜胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里以補之

若見此病中一證皆大寒禁用諸苦酸藥上已明之矣

脾胃虛弱隨時爲病隨病制方

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晩寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味

目中溜火而視物䀮䀮無所見小便頻數大便難而結秘胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸胷中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰背胛眼皆痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金爲熱所乘而作當先助元氣理治庚辛之不足黃耆人參湯主之

黃耆人參湯

黃耆一錢如自汗過多更加一錢　升麻六分

人參去蘆　橘皮不去白　麥門冬去心

蒼朮無汗更加五分　白朮已上各五分　黃蘗酒洗以救水之源

炒麴已上各三分　當歸身酒洗　炙甘草已上各二分

五味子九箇

右件㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食遠或空心服之忌酒濕麪大料物之類及過食冷物

○如心下痞悶加黃連二分或三分

○如胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分

○如脇下痛或縮急加柴胡二分或三分

○如頭痛目中溜火加黃連二分或三分　川芎三分

○如頭痛目不清利上壅上熱加蔓荊子川芎已上各三分藁本生地黃已上各二分　細辛一分

○如氣短精神如夢寐之間困乏無力加五味子九箇

○如大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃麻子仁泥已上各五分　桃仁三枚湯泡去皮尖另研

○如大便通行所加之藥勿再服

○如大便又不快利勿用別藥少加大黃煨五分

○如不利者非血結血秘而不通也是熱則生風其

病人必顯風證單血藥不可復加之止常服黃耆人參湯藥只用羌活防風已上各五錢二味㕮咀以水四盞煎至一盞去柤空心服之其大便必大走也一服便止

○如胷中氣滯加青皮皮用清香可愛者一分或二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之

○如氣滯大甚或補藥太過病人心下有憂滯鬱結之事更加木香縮砂仁已上各一分或二分白豆蔻仁二分與正藥同煎

○如腹痛不惡寒者加白芍藥五分黃芩二分却減五味子

夫脾胃虛弱遇六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚欹眼黑欲倒此腎水與膀胱俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則亡津液亡津液則七神無所依經云津液相成神乃自生津者庚大腸所主三伏之義爲庚金受囚也若亡津液汗大泄濕令亢甚則清肅之氣甚燥金受囚風木無可以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也孫思邈云五月常服五味子是瀉丙火補庚大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於巳癸腎水已絕於午今更逢濕旺助熱爲邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元之眞氣非補熱火也令人夏食寒是也爲熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脉脉者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二證或避暑熱納涼於深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒

身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房屋之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之潔古云動而得之爲中熱靜而得之爲中暑中暑者陰證當發散也中熱者陽證爲熱傷元氣非形體受病也若虛損脾胃有宿疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力其形如夢寐朦朦如煙

霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗眼皮瘤必搐項筋皮枯毛焦身體皆重肢節時有煩疼或一身盡痛或渴或不渴或小便黃澁此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂有不生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝爲痿厥厥者四肢如在火中爲熱厥四肢寒冷者爲寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱爲脾主四肢故也若肌肉濡漬痺而不仁傳爲肉痿證證中皆有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝胷皆厥證也痿者四肢痿軟而無力也其心煩寃不止厥者氣逆也

甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相須也於前已立黃耆人參五味子麥門冬湯中每服加白茯苓二分澤瀉四分猪苓白朮已上各一分

○如小便快利不黃澁者只加澤瀉二分與二朮上下分消其濕

○如行步不正脚膝痿弱兩足欹側者已中痿邪加酒洗黃蘗知母二分或五分令二足湧出氣力矣

○如汗大泄者津脫也急止之加五味子六枚炒黃蘗五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進則再服三里氣街以三稜鍼出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麵

○夫痿者濕熱乘腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩寃而不止也若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所増之病氣退者不用五味子澤瀉茯苓猪苓黃蘗知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃蘗二分或三分如更時令清燥之氣大行却加辛溫瀉之若濕氣勝風證不退眩運麻木不已除風濕羌活湯主之

除風濕羌活湯

羌活一兩　防風去蘆　蒼朮酒浸去皮

黃耆已上各一錢　升麻七分　炙甘草

獨活　柴胡已上各五分　川芎去頭痛

黃蘗　橘皮　藁本已上各三分

澤瀉去鬚一分　猪苓去黑皮　茯苓已上各二分

黃連去鬚一分

右㕮咀每服秤三錢或五錢水二盞煎至一盞去柤稍熱服量虛實施用如有不盡證候依加減法用之

○夫脉弦洪緩而沈按之中之下得時一澁其證四肢滿悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣膈咽不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食調中益氣湯主之

調中益氣湯

黃耆（一錢） 人參（去蘆頭有嗽者去之） 甘草

蒼朮（已上各五分） 柴胡（一味為上氣不足胃氣與脾氣下溜乃補上氣從陰引陽也）

橘皮（如腹中氣不得運轉更加一錢） 升麻（已上各二分） 木香（一分或二分）

右件剉麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去柤帶熱宿食消盡服之寧心絕思藥必神效蓋病在四肢血脉空腹在旦是也

○如時顯熱躁是下元陰火蒸蒸發也加真生地黃二分 黃檗（三分無此證則去之）

○如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常逼迫

血虛血澁也加當歸身（三分）

○如身體沉重雖小便數多亦加茯苓（二分）蒼朮（一錢）澤瀉（五分）黃檗（三分時暫從權而祛濕也不可常用兼足太陰已病其脉亦絡於心中故顯煩熱用合而煩亂）

○如胃氣不和加湯洗半夏（五分）生薑（三片）有嗽加生薑生地黃（二分以制半夏之毒）

○如痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾所作也

○如兼躁熱加黃檗生地黃（已上各二分）

○如無已上證只服前藥

右件剉如麻豆都作一服水一大盞去柤帶熱食遠服之

○如夏月須加白芍藥（三分）

○如春月腹中痛尤宜加

○如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥（五分）生黃芩（二分）

○如惡寒腹中痛加中桂（三分）去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦於芍藥湯中加之同煎

○如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾薑（二分）或加半夏（五七分以生薑少許制）

○如秋冬之月胃脉四道為衝脉所逆并脇下少陽脉二道而反上行病名曰厥逆內經曰逆氣上行

滿脉去形明七神昬絶離去其形而死矣其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥加吳茱萸五分或一錢五分湯洗去苦觀厥氣多少而用之

○如夏月有此證爲大熱也蓋此病隨四時爲寒熱溫涼也宜以酒黃連酒黃蘗酒知母各等分爲細末熱湯爲丸梧桐子大每服二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美飲食壓之使不令胃中留停直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證也當用溫平甘多辛少之藥治之是其本法也

○如時上見寒熱病四時也又或將理不如法或酒食過多或辛熱之食作病或寒冷之食作病或居大寒大熱之處益有病當臨時制宜暫用大寒大熱治法而取效此從權也不可以得效之故而久用之必致難治矣

黃帝鍼經云從下上者引而去之上氣不足推而揚之蓋上氣者心肺上焦之氣陽病在陰從陰引陽宜以入腎肝下焦之藥引甘多辛少之藥使升發脾胃之氣又從而去其邪氣于腠理皮毛也又云視前痛者常先取之是先以繆刺瀉其經絡之壅者爲血凝而不流故先去之而後治他病

長夏濕熱胃困尤甚用清暑益氣湯論

刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論云有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胷滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而數大便溏而頻或

痢出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脉中得洪緩若血氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃耆甘溫補之爲君人參橘皮當歸甘草甘微溫補中益氣爲臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛

者滋其化源以人參五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金爲佐名曰清暑益氣湯

清暑益氣湯

黃耆汗少減五分　蒼术泔浸去皮　升麻已上各一錢

人參去蘆　澤瀉　神麯炒黃

橘皮　白术已上各五分　麥門冬去心

當歸身　炙甘草已上各三分　青皮去白二分半

黃蘗酒洗去皮二分或三分　葛根二分　五味子九枚

右件同㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去楂大溫服食遠劑之多少臨病斟酌此病皆由飲食

勞倦損其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉豬苓茯苓燈心通草木通淡滲利小便之類皆從時令之旺氣以瀉脾胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立之若於無時病濕熱脾旺之證或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉眞陰竭絕腎水先損其兩目也復立變證加減法於後

○心火乘脾乃血受火邪而不能升發陽氣復於地中地者人之脾也必用當歸和血少用黃蘗以益眞陰

○脾胃不足之證須少用升麻乃足陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷少陽行春令生萬化之根蔕也更少加柴胡使諸經右遷生發陰陽之氣以滋春之和氣也

○脾虛緣心火亢甚而乘其土也其次肺氣受邪爲熱所傷必須用黃耆最多甘草次之人參又次之三者皆甘溫之陽藥也脾始虛肺氣先絕故用黃耆之甘溫以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損其元氣也上喘氣短懶語須用人參以補之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣

甘草最少恐資滿也若脾胃之急痛幷脾胃大虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用之經云急者緩之若從權必加升麻以引之恐左遷之邪堅盛卒不肯退反致項上及臀尻肉消而反行陰道故使引之以行陽道使清氣之出地右遷而上行以和陰陽之氣也若中滿者去甘草咳甚者去人參如口乾嗌乾者加乾葛

○脾胃既虛不能升浮爲陰火傷其生發之氣榮血大虧榮氣伏於地中陰火熾盛日漸煎熬血氣虧少且心包與心主血血減則心無所養致使心亂

而煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也是清氣不升濁氣不降清濁相干亂於胷中使周身氣血逆行而亂內經云從下上者引而去之故當加辛溫甘溫之劑生陽陽生則陰長已有甘溫三味之論或曰甘溫何能生血又非血藥也曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又宜少加黃檗以救腎水益甘寒瀉熱火火減則心氣得平而安也如煩亂猶不能止少加黃連以去之蓋將補腎水使腎水旺而心火自降扶持地中陽氣矣

○如氣浮心亂則以硃砂安神丸鎮固之得煩減勿再服以防瀉陽氣之反陷也如心下痞亦少加黃連氣亂於胷爲清濁相干故以橘皮理之又能助陽氣之升而散滯氣又助諸甘辛爲用也

○長夏濕土客邪大旺可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣也濕氣大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麴以消之復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

隨時加減用藥法

○濁氣在陽亂於胷中則䐜滿閉塞大便不通夏月宜少加酒洗黃檗大苦寒之味冬月宜加吳茱萸大辛苦熱之藥以從權乃隨時用藥以泄濁氣之下降也借用大寒之氣於甘味中故曰甘寒瀉熱火也亦須用發散寒氣辛溫之劑多黃檗少也

○清氣在陰者乃人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升麻柴胡助辛甘之味以引元氣之升不令發泄也

○堵塞咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不得下降者曰噎夫噎塞迎逆於咽喉胷膈之間令諸經不行

則口開目瞪氣欲絕當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本加堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣大助陰邪於外於正藥內加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮陳皮益智黃檗散寒氣泄陰火之上逆或以消痞丸合滋腎丸滋腎丸者黃檗知母微加肉桂三味是也或更以黃連別作丸二藥七八十丸空心約宿食消盡服之待少時以美食壓之不令胃中停留也

○如食少不饑加炒麴

○如食已心下痞別服橘皮枳术丸
○如脉弦四肢滿閉便難而心下痞加甘草黄連柴
胡
○如腹中氣上逆者是衝脉逆也加黄蘗三分黄連一分半以泄之
○如大便秘燥心下痞加黄連桃仁少加大黄當歸
身
○如心下痞夯悶者加白芍藥黄連
○如心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂仁
○如天寒少加乾薑或中桂

○如心下痞中寒者加附子黄連
○如心下痞嘔逆者加黄連生薑橘皮
○如冬月不加黄連少入丁香藿香葉
○如口乾嗌乾加五味子乾葛
○如脇下急或痛甚俱加柴胡甘草
○如胷中滿悶鬱鬱然加橘紅青皮木香少許
○如頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半
夏五分生薑二分或三分
○如腹中或周身間有刺痛皆血澁不足加當歸身
○如噦加五味子多益智少

○如食不下乃胷中胃上有寒或氣澁滯加青皮陳
皮木香此三味為定法
○如冬天加益智仁草豆蔻仁
○如夏月少用更加黄連
○如秋月氣澁滯食不下更加檳榔草豆蔻仁縮砂
仁或少加白豆蔻仁
○如三春之月食不下亦用青皮少陳皮多更加風
藥以退其寒覆其上
○如初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以為
風藥之佐益智草豆蔻皆可也

○如脉弦者見風動之證以風藥通之
○如脉澁覺氣澁滯者加當歸身天門冬木香青皮
陳皮有寒者加桂枝黄耆
○如胷中窒塞或氣閉悶亂者肺氣澁滯而不行宜
破滯氣青皮陳皮少加木香檳榔
○如冬月加吳茱萸人參或胷中窒塞閉悶不通者
為外寒所遏使呼出之氣不得伸故也必寸口脉
弦或微緊乃胷中大寒也若加之以舌上有白胎
滑者乃丹田有熱胷中有寒明矣丹田有熱者必
尻臀冷前陰間冷汗兩丸冷是邪氣乘其本而正

氣走於經脉中也遇寒則必作陰陰而痛以此辯丹田中伏火也加黃蘗生地黃勿誤作寒證治之

○如秋冬天氣寒涼而腹痛者加半夏或益智或草豆蔻之類

○如發熱或捫之而肌表熱者此表證也只服補中益氣湯一二服亦能得微汗則涼矣

○如脚膝痿輭行步乏力或疼痛乃腎肝中伏濕熱少加黃蘗空心服之不愈更增黃蘗加漢防已五分則脚膝中氣力如故也

○如多唾或唾白沫者胃口上停寒也加益智仁

○如少氣不足以息者服正藥二三服氣猶短促者爲膈上及表間有寒所遏當引陽氣上伸加羌活獨活藁本最少升麻多柴胡次之黃耆加倍

腸澼下血論

太陰陽明論云食飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則䐜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼夫腸澼者爲水穀與血另作一派如㶁桶湧出也今時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而主氣弱也故腸澼之病甚以涼血地黃湯主之

涼血地黃湯

黃蘗去皮剉炒　知母剉炒已上各一錢　青皮不去皮穰

梔子炒　熟地黃　當歸已上各五分

右件㕮咀都作一服用水一盞煎至七分去柤溫服

○如小便澁臍下悶或大便則後重調木香檳榔細末各五分稍熱服空心或食前

○如裏急後重又不去者當下之

○如有傳變隨證加減

○如腹中動搖有水聲而小便不調者停飲也診顯何臟之脉以去水飲藥瀉之假令脉洪大用瀉火

利小便藥之類是也

○如胃虛不能食而大渴不止者不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也與七味白朮散補之

○如發熱惡熱煩躁大渴不止肌熱不欲近衣其脉洪大按之無力者或兼目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以黃耆一兩當歸身二錢㕮咀水煎服

○如大便閉塞或裏急後重數至圊而不能便或少有白膿或少有血愼勿利之利之則必致病重反鬱結而不通也以升陽除濕防風湯舉其陽則陰

氣自降矣

升陽除濕防風湯

蒼朮（泔浸去皮淨四兩） 防風（二錢） 白朮

白茯苓 白芍藥（已上各一錢）

右件㕮咀除蒼朮另作片子水一碗半煮至二大盞內諸藥同煎至一大盞去柤稍熱服空心食前

○如此證飧泄不禁以此藥導其濕如飧泄及泄不止以風藥升陽蒼朮益胃去濕脉實䐜脹閉塞不通從權以苦多甘少藥泄之如得通復以升陽湯助其陽或便以升陽湯中加下泄藥

脾胃虛不可妄用吐藥論

六元政紀論云木鬱則達之者盖木性當動蕩軒舉是其本體今乃鬱於地中無所施爲即是風失其性人身有木鬱之證者當開通之乃可用吐法以助風木是木鬱則達之之義也又說木鬱達之者盖謂木初失其性鬱於地中今既開發行於天上是發而不鬱也是木復其性也有餘也有餘則兼其所勝脾土受邪見之於木鬱達之條下不止此一驗也又厥陰司天亦風木旺也厥陰之勝亦風木旺也俱是脾胃受邪見於上條其說一同或者不悟木鬱達之四字之義反作木鬱治之重實其實脾胃又受木制又復其木正謂補有餘而損不足也既脾胃之氣先已不足豈不因此而重絕乎再明胃中窒塞當吐氣口三倍大於人迎是食傷太陰上部有脉下部無脉其人當吐不吐則死以其下部無脉知其木鬱在下也塞道不行而肝氣下絕矣兼肺金主塞而不降爲物所隔金能剋木肝木受邪食塞胃咽故曰在下者因而越之仲景云實煩以瓜蔕散吐之如經汗下謂之虛煩又名懊憹煩躁不得眠知其木鬱也以梔子豉湯吐之昧者將膈咽不通上支兩脇腹脹胃虛不足乃

濁氣在上則生䐜脹之病吐之況胃虛必怒風木已來乘陵胃中內經以鐵酪鎮墜之豈可反吐助其風木之邪不主吐而吐其差舛如天地之懸隔大抵胃中窒塞煩悶不止者宜吐之耳

安養心神調治脾胃論

靈蘭秘典論云心者君主之官神明出焉凡怒忿悲思恐懼皆損元氣夫陰火之熾盛由心生凝滯七情不安故也心脉者神之舍心君不寧化而爲火火者七神之賊也故曰陰火太盛經營之氣不能頤養於神乃脉病也神無所養津液不行不能生血脉也心

之神真氣之別名也得血則生血生則脉旺脉者神
之舍若心生凝滯七神離形而脉中唯有火矣善治
斯疾者惟在調和脾胃使心無凝滯或生歡忻或逢
喜事或天氣暄和居温和之處或食滋味或眼前見
欲愛事則慧然如無病矣盖胃中元氣得舒伸故也

凡治病當問其所便

黄帝鍼經云中熱消癉則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則消穀令人懸心善饑臍已上皮熱腸中熱則出黄如糜臍已下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飱泄

一説腸中寒則食已窘迫腸鳴切痛大便色白腸中寒胃中熱則疾饑小腹痛脹腸中熱胃中寒則脹而且泄非獨腸中熱則泄胃中寒傳化亦泄胃欲熱飲腸欲寒飲雖好惡不同春夏先治標秋冬先治本衣服寒無悽愴暑無出汗熱無灼灼寒無悽悽寒温中適故氣將持乃不致邪僻也

此規矩法度乃常道也正理也揆度也當臨事制宜以反常合變也

胃氣下溜五臟氣皆亂其爲病互相出見論

黄帝曰何謂逆而亂岐伯曰清氣在陰濁氣在陽榮氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於胸中是爲大悗故氣亂於心則煩心密嘿俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝按手以呼亂於腸胃則爲霍亂亂於臂脛則爲四厥亂於頭則爲厥逆頭重眩仆

大法云從下上者引而去之又法云在經者宜發之

黄帝曰五亂者刺之有道乎岐伯曰有道以來有道以去審知其道是爲身寶黄帝曰願聞其道岐伯曰氣在於心者取之手少陰心主之輸神門太陵

滋以化源補以甘温瀉以甘寒以酸收之以小苦

通之以微苦辛甘輕劑同精導氣使復其本位

氣在於肺者取之手太陰滎足少陰輸魚際并太谿輸

太陰以苦甘寒乃亂於胸中之氣以分化之味去之若成痿者以導濕熱若善多涕從權治以辛熱仍引胃氣前出陽道不令濕土尅腎其穴在太谿

氣在於腸胃者取之足太陰陽明不下者取之三里章門中脘三里

因足太陰虚者於募穴中導引之於血中有一説腑輸去腑病也胃虚而致太陰無所禀者於足陽明胃之募穴中引導之如氣逆上而霍亂者取三

里氣下乃止不下復始
氣在於頭取之天柱大杼不知取足太陽榮輸通谷深束谷深
先取天柱大杼不補不瀉以導氣而已取足太陽
膀胱經中不補不瀉深取通谷束骨丁心火巳脾
土穴中以引導去之如用藥於太陽引經藥中少
加苦寒甘寒以導去之清涼為之輔佐及使
氣在於臂足取之先去血脉後取其陽明少陽之榮
輸二間三間深取之內庭陷谷深取之
視其足臂之血絡盡取之後治其痿厥皆不補不

瀉從陰深取引而上之上之者出也去也皆陰火
有餘陽氣不足伏匿於地中者血榮也當從陰引
陽先於地中升舉陽氣次瀉陰火乃導氣同精之
法
黃帝曰補瀉奈何岐伯曰徐入徐出謂之導氣補瀉
無形謂之同精是非有餘不足也亂氣之相逆也帝
曰允乎哉道明乎哉論請著之玉版命曰治亂也
陰病治陽陽病治陰
陰陽應象論云審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病
治陽定其血氣各守其鄉血實宜決之氣虛宜掣引

之
夫陰病在陽者是天外風寒之邪乘中而外入在
人之背上腑腧臟腧是人之受天外客邪亦有二
說中於陽則流於經此病始於外寒終歸外熱故
以治風寒之邪治其各臟之腧非止風寒而已六
淫濕暑燥火皆五臟所受乃筋骨血脉受邪各有
背上五臟腧以除之傷寒一說從仲景中八風者
有風論中暑者治在背上小腸腧中濕者治在胃
腧中燥者治在大腸腧此皆六淫客邪有餘之病
皆瀉在背之腑腧若病久傳變有虛有實各隨病

之傳變補瀉不定只治在背腑腧
另有上熱下寒經曰陰病在陽當從陽引陰必須
先去絡脉經隧之血若陰中火旺上騰於天致六
陽反不衰而上充者先去五臟之血絡引而下行
天氣降下則下寒之病自去矣慎勿獨瀉其六陽
此病陽亢乃陰火之邪滋之只去陰火只損血絡
經隧之邪勿悮也
陽病在陰者病從陰引陽是水穀之寒熱感則害
人六腑又曰飲食失節及勞役形質陰火乘於坤
土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋

於六腑之陽氣是五陽之氣先絕於外外者天也下流伏於坤土陰火之中皆先由喜怒悲憂恐爲五賊所傷而後胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當從胃合三里穴中推而揚之以伸元氣故曰從陰引陽若元氣愈不足治在腹上諸腑之募穴若傳在五臟爲九竅不通隨各竅之病治其各臟之募穴於腹故曰五臟不平乃六腑元氣閉塞之所生也又曰五臟不和九竅不通皆陽氣不足陰氣有餘故曰陽不勝其陰凡治腹之募皆爲元氣不足從陰引陽勿悞也若錯補四末之腧

錯瀉四末之餘錯瀉者差尤甚矣按岐伯所說況取穴於天上天上者人之背上五臟六腑之腧豈有生者乎與言及此寒心徹骨若六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病錯取穴於胃之合及諸腹之募者必危亦岐伯之言下工豈可不慎哉

三焦元氣衰旺

黄帝鍼經云上氣不足腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之傾目爲之瞑中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心悗補足外踝下留之

此三元真氣衰憊皆由脾胃先虛而氣不上行之所致也加之以喜怒悲憂恐危亡速矣

脾胃論卷中

新安　吳勉學　校

大腸小腸五臟皆屬於胃胃虛則俱病論

黃帝鍼經云手陽明大腸手太陽小腸皆屬足陽明胃小腸之穴在巨虛下廉大腸之穴在巨虛上廉此二穴皆在足陽明胃三里穴下也大腸主津小腸主液大腸小腸受胃之榮氣乃能行津液於上焦溉灌皮毛充實腠理若飲食不節胃氣不及大腸小腸無所禀受故津液涸竭焉內經云耳鳴耳聾九竅不利腸胃之所生也此胃弱不能滋養手太陽小腸手陽

明大腸故有此證然亦止從胃弱而得之故聖人混言腸胃之所生也或曰子謂混言腸胃所生亦有據乎予應之曰玉機真藏論云脾不及令人九竅不通謂脾為死陰受胃之陽氣能上升水穀之氣於肺上充皮毛散入四臟今脾無所禀不能行氣於臟腑故有此證此則脾虛九竅不通之謂也雖言脾虛亦胃之不足所致耳此不言脾不言腸胃而言五臟者又何也予謂此說與上二說無以異也蓋謂脾不受胃之禀命致五臟所主九竅不能上通天氣皆閉塞不利也故以五臟言之此三者止是胃虛所致耳然亦何止於此胃虛則五臟六腑十二經十五絡四肢皆不得營運之氣而百病生焉豈一端能盡之乎

脾胃虛則九竅不通論

真氣又名元氣乃先身生之精氣也非胃氣不能滋之胃氣者穀氣也榮氣也運氣也生氣也清氣也衛氣也陽氣也又天氣人氣地氣乃三焦之氣分而言之則異其實一也不當作異名異論而觀之飲食勞役所傷自汗小便數陰火乘土位清氣不生陽道不行乃陰血伏火況陽明胃土右燥左熱故化燥火而津液不能停且小便與汗皆亡津液津液至中宮變

化為血也脉者血之腑也血亡則七神何依百脉皆從此中變來也人之百病莫大於中風有汗則風邪客之無汗則陽氣固密腠理閉拒諸邪不能傷也或曰經言陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通又脾不及則令人九竅不通名曰重强又五臟不和則九竅不通又頭痛耳鳴九竅不通利腸胃之所生也請析而解之答曰夫脾者陰土也至陰之氣主靜而不動胃者陽土也主動而不息陽氣在於地下乃能生化萬物故五運在上六氣在下其脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口也脾受胃禀乃能熏蒸腐熟五穀者

也胃者十二經之源水穀之海也平則萬化安病則萬化危五臟之氣上通九竅五臟禀受氣於六腑六腑受氣於胃六腑者在天爲風寒暑濕燥火此無形之氣也胃氣和平榮氣上升始生濕熱溫熱者春夏也行陽二十五度六陽升散之極下而生陰陰降則下行爲秋冬行陰道爲寒涼也胃既受病不能滋養故六腑之氣已絕致陽道不行陰火上行五臟之氣各受一腑之化乃能滋養皮膚血脉筋骨故言五臟之氣已絕於外是六腑生氣先絕五臟無所禀受而氣後絕矣肺本收下又主五氣氣絕則下流與脾土

疊於下焦故曰重强胃氣既病則下溜經云濕從下受之脾爲至陰本乎地也有形之土下塡九竅之源使不能上通於天故曰五臟不和則九竅不通胃者行清氣而上即地之陽氣也積陽成天曰清陽出上竅曰清陽實四肢曰清陽發腠理者也脾胃既爲陰火所乘穀氣閉塞而下流即清氣不升九竅爲之不利胃之一腑病則十二經元氣皆不足也氣少則津液不行津液不行則血虧故筋骨皮肉血脉皆弱是氣血俱羸弱矣勞役動作飲食饑飽可不愼乎凡有此病者雖不變易他疾已損其天年更加之鍼灸用藥差悞欲不夭枉得乎

胃虛臟腑經絡皆無所受氣而俱病論

夫脾胃虛則濕土之氣溜於臍下腎與膀胱受邪膀胱主寒腎爲陰火二者俱弱潤澤之氣不行大腸者庚也燥氣也主津小腸者丙也熱氣也主液此皆屬胃胃虛則無所受氣而亦虛津液不濡睡覺口燥咽乾而皮毛不澤也甲膽風也溫也主生化周身之血氣丙小腸熱也主長養周身之陽氣亦皆禀氣於胃則能浮散也升發也胃虛則膽及小腸溫熱生長之氣俱不足伏留於有形血脉之中爲熱病爲中風其

爲病不可勝紀青赤黃白黑五腑皆滯三焦者乃下焦元氣生發之根蔕爲火乘之是六腑之氣俱衰也腑者府庫之府包含五臟及形質之物而藏焉且六腑之氣外無所主內有所受感天之風氣而生甲膽感暑氣而生丙小腸感濕化而生戊胃感燥氣而生庚大腸感寒氣而生壬膀胱感天一之氣而生三焦此實父氣無形也風寒暑濕燥火乃溫熱寒涼之別稱也行陽二十五度右遷而升浮降沉之化也其虛也皆由脾胃之弱以五臟論之心火亢甚乘其脾土曰熱中脉洪大而煩悶難經云脾病當臍有動氣按

之牢若痛動氣築築然堅牢如有積而硬若似痛也甚則亦大痛有是則脾虛病也無則非也更有一辯食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虧弱也且心火大盛左遷入於肝木之分風濕相搏一身盡痛其脉洪大而弦時緩或爲眩運戰搖或爲麻木不仁此皆風也脾病體重節痛爲痛痺爲寒痺爲諸濕痺爲痿輭失力爲大疽大癰若以辛熱助邪則爲熱病爲中風其變不可勝紀木旺運行北越左遷入地助其腎水水得子助入脾爲痰涎自入爲唾入肝爲淚入肺爲涕乘肝木而反尅脾土明矣當先於陰分補其陽

氣升騰行其陽道而走空竅次加寒水之藥降其陰火黄蘗黄連之類是也先補其陽後瀉其陰脾胃俱旺而復於中焦之本位則陰陽氣平矣火曰炎上水曰潤下今言腎主五液上至頭出於空竅俱作泣涕汗涎唾者何也曰病瞷者涎沫出於口冷汗出於身清涕出於鼻皆陽蹻陰蹻督衝四脉之邪上行腎水不任煎熬沸騰上行爲之也此奇邪爲病不繫五行陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴中奇邪之法治之

五臟外有所乇內無所受謂外主皮毛血脉肌肉筋骨及各空竅是也若胃氣一虛無所稟受則四臟經絡皆病况脾全籍胃土平和則有所受而生榮周身四臟皆旺十二神守職皮毛固密筋骨柔和九竅通利外邪不能侮也

胃虛元氣不足諸病所生論

夫飲食勞役皆自汗乃足陽明化燥火津液不能停故汗出小便數也邪之大者莫若中風風者百病之長善行而數變雖然無虛邪則風雨寒不能獨傷人必先中虛邪然後賊邪得入矣至於痿厥逆皆由汗

出而得之也且冬陽氣伏藏於水土之下如非常泄精陽氣已竭則春令從何而得萬化俱失所矣在人則飲食勞役汗下時出諸病遂生予所以諄諄如此者蓋亦欲人知所慎也

忽肥忽瘦論

黄帝鍼經云寒熱少氣血上下行夫氣虛不能寒血虛不能熱血氣俱虛不能寒熱而胃虛不能上行則肺氣無所養故少氣衛氣既虛不能寒也下行乘腎肝助火爲毒則陰分氣衰血虧故寒熱少氣血上下行者足陽明胃之脉衰則衝脉并陽明之脉上行於

以分逆行七十二度脉之火大旺逆陽明脉中血上行其血衝滿於上若火時退伏於下則血下行故言血上下行俗謂之忽肥忽瘦者是也經曰熱傷氣又曰壯火食氣故脾胃虛而火勝則必少氣不能衛護皮毛通貫上焦之氣而短少也陰分血虧陽分氣削陰陽之分周身血氣俱少不能寒熱故言寒熱也靈樞經云上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉此則胃氣平而上行也

天地陰陽生殺之理在升降浮沉之間論

陰陽應象論云天以陽生陰長地以陽殺陰藏然歲

以春爲首正正也寅引也少陽之氣始於泉下引陰升而在天地人之上即天之分百穀草木皆甲拆於此時也至立夏少陰之火熾於太虛則草木盛茂垂枝布葉乃陽之用陰之體此所謂天以陽生陰長經言歲半以前天氣主之在乎升浮也至秋而太陰之運初自天而下逐陰降而徹地則金振燥令風厲霜飛品物咸殞其枝獨在若乎毫毛至冬則少陰之氣復伏于泉下水冰地坼萬類周密陰之用陽之體也此所謂地以陽殺陰藏經言歲半已後地氣主之在乎降沉也至於春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則正氣之序也故曰履端於始序則不愆升已而降降已而升如環無端運化萬物其實一氣也設或陰陽錯綜勝復之變自此而起萬物之中人一也呼吸升降傚象天地準繩陰陽蓋胃爲水穀之海飲食入胃而精氣先輸脾歸肺上行春夏之令以滋養周身乃清氣爲天者也升已而下輸膀胱行秋冬之令爲傳化糟粕轉味而出乃濁陰爲地者也若夫順四時之氣起居有時以避寒暑飲食有節及不暴喜怒以頤神志常欲四時均平而無偏勝則安不然損傷脾眞氣下溜或下泄而久不能升是有秋冬而

無春夏乃生長之用陷于殞殺之氣而百病皆起或久升而不降亦病焉于此求之則知履端之義矣

陰陽壽夭論

五常政大論云陰精所奉其人壽陽精所降其人夭夫陰精所奉者上奉于陽謂春夏生長之氣也陽精所降者下降于陰謂秋冬收藏之氣也且如地之伏陰其精遇春而變動升騰於上即曰生發之氣升極而浮即曰蕃秀之氣此六氣右遷於天乃天之清陽也陽主生故壽天之元陽其精遇秋而退降墜於下乃爲收斂殞殺之氣降極而沉是爲閉藏之氣此五

運左遷入地乃地之濁陰也陰主殺故天根于外者名曰氣立氣止則化絕根于內者名曰神機神去則機息皆不升而降也地氣者人之脾胃也脾主五臟之氣腎主五臟之精皆上奉于天二者俱主生化以奉升浮是知春生夏長皆從胃中出也故動止飲食各得其所必清必淨不令損胃之元氣下乘腎肝及行秋冬殞殺之令則亦合于天數耳

五臟之氣交變論

五臟別論云五氣入鼻藏於心肺難經云肺主鼻鼻和則知香臭潔古云視聽明而清涼香臭辯而溫暖此內受天之氣而外利于九竅也夫三焦之竅開於喉出於鼻鼻乃肺之竅此體也其聞香臭者用也心主五臭舍於鼻蓋九竅之用皆稟長生為近心長生於酉酉者肺故知鼻為心之所用而聞香臭也耳者上通天氣腎之竅也乃腎之體而為肺之用蓋肺長生於子子乃腎之舍而肺居其中而能聽音聲也一說聲者天之陽音者天之陰在地為五律在人為喉之竅在口乃三焦之用肺與心合而為言出于口也此口心之竅開於舌為體三焦於肺為用又不可不知也肝之竅通於目離為天能耀光而見物故分別

五色也肝為之舍腎主五精鼻藏氣于心肺故曰主百脈而行陽道經云脫氣者目盲脫精者耳聾心肺有病而鼻為之不利此明耳目口鼻為清氣所奉于天而心勞胃損則受邪也

陰陽升降論

易曰兩儀生四象乃天地氣交八卦是也在人則清濁之氣皆從脾胃出榮氣榮養周身乃水穀之氣味化之也

清陽為天 清陽成天地氣上為雲天氣下為雨水穀之精氣也氣海也七神也元氣也父也

清中清者清肺以助天真

清陽出上竅 耳目鼻口之七竅是也

清中濁者榮華腠理

清陽發腠理 毛竅也

清陽實四肢 真氣充實四肢

濁陰為地 垂陰成地雲出天氣雨出地氣五穀五味之精是五味之化也血榮也維持神明也血之府會也母也

濁中清者榮養於神 降至中脘而為血故曰心主血心藏神

濁陰出下竅 前陰膀胱之竅也

濁中濁者堅強骨髓

濁陰走五臟散於五臟之血也養血脉潤皮膚肌肉筋者是也血生肉者此也
濁陰歸六腑謂毛脉合精經氣歸於腑者是也
天氣清靜光明者也藏德不止故不下也天明則日
月不明邪害空竅陽氣者閉塞地氣者冒明雲霧不
精則上應白露不下交通不表萬物命故不施不施
則名木多死惡氣不發風雨不節白露不下則菀藁
不榮賊風數至暴雨數起天地四時不相保與道相
失則未央絶滅唯聖人從之故身無苛病萬物不失
生氣不竭
此說人之不避大寒傷形大熱傷氣四時節候變

更之異氣及飲食失節妄作勞役心生好惡皆令
元氣不行氣化爲火乃失生夭折之由耳

調理脾胃治驗

治法用藥若不明升降浮沉差互反損論

予病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加之氣短精
神不足此由弦脉令虛多言之過皆陽氣衰弱不得
舒伸伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒踰
月不止時人多病泄利濕多成五泄故也一日予體
重肢節疼痛大便泄并下者三而小便閉塞思其治
法按内經標本論大小便不利無問標本先利大小
便又云在下者引而竭之亦是先利小便當又云諸
泄利小便不利先分別之又云治濕不利小便非其
治也皆當利其小便必用淡味滲泄之劑以利之是
其法也噫聖人之法雖布在方冊其不盡者可以求
責耳今客邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從
已上法度用淡滲之劑以除之病雖卽已是降之又
降是復益其陰而重竭其陽氣矣是陽氣愈削而精
神愈短矣是陰重强而陽重衰矣反助其邪之謂也
故必用升陽風藥卽差以羌活獨活柴胡升麻各一
錢防風根截半錢炙甘草根截半錢同㕮咀水四中

盞煎至一盞去柤稍熱服大法云濕寒之勝助風以
平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又法云客
者除之是因曲而爲之直也夫聖人之法可以類推
舉一而知百病者也若不達升降浮沉之理而一槩
施治其愈者幸也

戊申六月初樞判白文舉年六十二素有脾胃虛損
病目疾時作身面目睛俱黄小便或黄或白大便不
調飲食減少氣短上氣怠惰嗜卧四肢不收至六月
中目疾復作醫以瀉肝散下數行而前疾增劇予謂
大黄牽牛雖除濕熱而不能走經絡下咽不入肝經

先入胃中大寒苦寒重虛其胃瘁午其味至辛能瀉氣重虛肺本嗽大作蓋標實不去本虛愈甚加之適當暑雨之際素有黃證之人所以增劇也此當于脾胃肺之本臟瀉外經中之濕熱製清神益氣湯主之而愈

清神益氣湯

茯苓 升麻已上各二分 澤瀉

蒼术 防風已上各三分 生薑五分

此藥能走經除濕熱而不守故不瀉本臟補肺與脾胃本中氣之虛弱

青皮一分 橘皮 生甘草

白芍藥 白术已上各二分 人參五分

此藥皆能守本而不走經不走經者不滋經絡中邪守者能補臟之元氣

黃蘗一分 麥門冬 人參已上各一分

五味子三分

此藥去時令浮熱濕蒸

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱空心服

火燥之極金伏之際而寒水絕體於此時也故急救之以生脈散除其濕熱以惡其太甚肺欲收心苦緩以酸收之心火盛則甘以瀉之故人參之甘佐以五味子之酸孫思邈云夏月常服五味子以補五臟氣是也麥門冬之微苦寒能滋水之源於金之位而清肅肺氣又能除火刑金之嗽而斂其痰邪復微加黃蘗之苦寒以為守位滋水之流以鎮墜其浮氣而除兩足之痿弱也

范天騋之內素有脾胃之證時顯煩躁胸中不利大便不通初冬出外而晚歸為寒氣怫鬱悶亂大作火不得伸故也醫疑有熱治以疏風丸大便行而病不

減又疑藥力小復加七八十丸下兩行前證仍不減復添吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力不欲言心神顛倒兀兀不止目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥余謂前證乃胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣製半夏白术天麻湯主之而愈

半夏白术天麻湯

黃蘗二分 乾薑一分 天麻

蒼术 白茯苓 黃耆

澤瀉　人參已上各五分　白朮
炒麴已上各一錢　生姜湯洗七片　大麥蘖麴
橘皮已上各一錢五分
右件㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞去柤帶熱服食前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除其苗爲定風草獨不爲風所動也黃耆甘溫瀉火補元氣人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱甘苦溫甘除濕補中益氣澤苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽麴消食蕩胃中滯氣大麥蘖麴寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦大寒酒洗以主冬天少火在泉發躁也

戊申有一貧士七月中病脾胃虛弱氣促憔悴因與人參芍藥湯

人參芍藥湯

麥門冬二分　當歸身　人參已上各三分
炙甘草　白芍藥　黃耆已上各一錢
五味子五個

右件㕮咀分作二服每服用水二盞煎至一盞去柤稍熱服既愈繼而冬居曠室臥熱炕而吐血數

次予謂此人久虛弱附脇有形而有大熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱冬居曠室衣服復單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與之立愈與此甚同因與麻黃人參芍藥湯

麻黃人參芍藥湯

人參益三焦元氣不足而實其表也　麥門冬已上各三分
桂枝以補表虛　當歸身和血養血各五分
麻黃去其外寒　炙甘草補其脾　白芍藥
黃耆已上各一錢　五味子二個安其肺氣

右件㕮咀都作一服水三盞煮麻黃一味令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去柤熱服臨臥

升陽散火湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

生甘草二錢　防風二錢五分　炙甘草三錢
升麻　葛根　獨活
白芍藥　羌活　人參已上各五錢

柴胡八錢
右㕮咀每服秤半兩水三大盞煎至一盞去柤稍
熱服忌寒涼之物及冷水月餘

安胃湯

治因飲食汗出日久心中虛風虛邪令人半身不
遂見偏風痿痹之證當先除其汗慓悍之氣按而
收之

黃連去鬚揀淨　五味子去子　烏梅去核
生甘草五分已上各　熟甘草三分　升麻梢二分
右㕮咀分作二服每服水二盞煎至一盞去柤溫

服食遠忌濕麵酒五辛大料物之類

清胃散

治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍牽引頭
腦滿熱發大痛此足陽明別絡入腦也喜寒惡熱
此陽明經中熱盛而作也

眞生地黃　當歸身已上各三分　牡丹皮半錢
黃連揀淨六分如黃連不好更加二分如夏月倍之大抵黃連臨時增減無定
升麻一錢
右爲細末都作一服水一盞半煎至七分去柤放
冷服之

清陽湯

治口喎頰腮急緊胃中火盛必汗不止而小便數
也

紅花　酒黃蘗　桂枝已上各一分
生甘草　蘇木已上各五分　炙甘草一錢
葛根一錢五分　當歸身　升麻
黃耆已上各二錢
右件㕮咀都作一服酒三大盞煎至一盞二分去
柤稍熱服食前服訖以火熨摩緊結處而愈夫口
喎筋急者是筋脉血絡中大寒此藥以代燔鍼劫

刺破血以去其凝結內則泄衝脉之火熾

胃風湯

治虛風證能食麻木牙關急搐目內蠕瞤胃中有
風獨面腫

蔓荊子一分　乾生薑二分　草豆蔻
黃蘗　羌活　柴胡
藁本已上各五分　麻黃五分不去節　當歸身
蒼朮　葛根已上各一錢　香白芷一錢二分
炙甘草一錢五分　升麻二錢　棗四枚
右件剉如麻豆大分二服每服水二盞煎至一盞

去柤熱服食後

陽明病濕勝自汗論

或曰濕之與汗陰乎陽乎曰西南坤土也脾胃也人之汗猶天地之雨也陰滋其濕則為霧露為雨也陰濕寒下行之地氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚為寒中濕勝則音聲如從瓮中出濕若中水也相家有說土音如居深瓮中言其壅也遠也不出也其為濕審矣又知此二者一為陰寒也內經曰氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成痺寒矣色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形無形可見者也

調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

蘇木 紅花已上各一分 猪苓二分

麥門冬 生地黄已上各二分 半夏湯洗七个

生黄芩 生甘草 當歸梢已上各五分

羌活七分 麻黄根 黄耆已上各一錢

五味子七枚

右㕮咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服中風證必自汗汗多不得重發汗故禁麻黄而用根節也

濕熱成痿肺金受邪論

六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側以清燥湯主之

清燥湯

黄連去鬚 酒黄蘗 柴胡已上各一分

麥門冬 當歸身 生地黄

炙甘草 猪苓 麯已上各二分

人參 白茯苓 升麻已上各三分

橘皮 白朮 澤瀉已上各五分

蒼朮一錢 黄耆一錢五分 五味子九枚

右㕮咀如麻豆大每服半兩水二盞半煎至一盞去柤稍熱空心服

助陽和血補氣湯

治眼發後上熱壅白睛紅多眵淚無疼痛而癮澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅也故

眼昏花不明宜助陽和血補氣
香白芷二分 蔓荆子三分 炙甘草
當歸身酒洗 柴胡已上各五分 升麻
防風七分已上各 黄耆一錢
右㕮咀都作一服水一盞半煎至一盞去柤熱服
臨臥避風處睡忌風寒及食冷物

升陽湯

治大便一日三四次溏而不多有時泄瀉腹中鳴
小便黄
柴胡 益智仁 當歸身

橘皮已上各三分 升麻六分 甘草二錢
黄耆三錢 紅花少許
右㕮咀分作二服每服水二大盞煎至一盞去柤
稍熱服

升陽除濕湯

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便
黄四肢困弱
甘草 大麥蘖麵如胃寒腹鳴者加
陳皮 猪苓已上各三分 澤瀉
益智仁 半夏 防風

神麴 升麻 柴胡
羌活已上各五分 蒼朮一錢
右㕮咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚同煎
至一盞去柤空心服

益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰躁熱短
氣口不知味腸鳴大便微溏黄色身體昏悶口乾
不喜食冷
黄耆 甘草 半夏已上各二分
黄芩 柴胡 人參

益智仁 白朮已上各三分 當歸梢
陳皮 升麻已上各五分 蒼朮一錢
右㕮咀作一服水二大盞煎至一盞去柤稍熱服
食前忌飲食失節生冷硬物酒濕麵

生薑和中湯

治食不下口乾虛渴四肢困倦
生甘草 炙甘草已上各一分 酒黄芩
柴胡 橘皮已上各二分 升麻三分
人參 葛根 藁本
白朮已上各五分 羌活七分 蒼朮一錢

生黄芩二錢

右㕮咀作一服水二盞生薑五片棗二枚擘開同煎至一盞去柤稍熱服之食前

强胃湯

治因飲食勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春口淡無味遇夏雖熱而惡寒常如飽不喜食冷物

黄蘗　甘草已上各五分　升麻

柴胡　當歸身　陳皮已上各一錢

生薑　麯已上各一錢五分　草豆蔻二錢

半夏　人參已上各三錢　黄耆一兩

右㕮咀每服三錢水二大盞煎至一盞去柤溫服食前

温胃湯

專治服寒藥多致脾胃虚弱胃脘痛

人參　甘草　益智仁

縮砂仁　厚朴已上各二分　白豆蔻

乾生薑　澤瀉　薑黄已上各三分

黄耆　陳皮已上各七分

右件爲極細末每服三錢水一盞煎至半盞温服食前

和中丸

人參　乾生薑　橘紅已上各一錢

乾木瓜二錢　炙甘草三錢

右爲細末蒸餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸温水送下食前服

藿香安胃散

治脾胃虚弱不進飲食嘔吐不待腐熟

藿香　丁香　人參已上各二錢五分

橘紅五錢

右件四味爲細末每服二錢水一大盞生薑一片

同煎至七分和柤冷服食前

異功散

治脾胃虚冷腹鳴腹痛自利不思飲食

人參　茯苓　白术

甘草　橘皮已上各五分

右爲麤散每服五錢水二大盞生薑三片棗二枚同煎至一盞去柤温服食前先用數服以正其氣

飲食傷脾論

四十九難曰飲食勞倦則傷脾又云飲食自倍腸胃乃傷腸澼爲痔夫脾者行胃津液磨胃中之穀主五

味也胃既傷則飲食不化口不知味四肢倦困心腹痞滿兀兀欲吐而惡食或為飧泄或為腸澼此胃傷脾亦傷明矣大抵傷飲傷食其治不同傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其濕傷食者有形之物也輕則消化或損其穀此最為妙也重則方可吐下今立數方區分類析以列于後

五苓散

治煩渴飲水過多或水入即吐心中淡淡停濕在內小便不利

桂一兩　茯苓　猪苓

白朮已上各一兩五錢　澤瀉二兩五錢

右為細末每服二錢熱湯調服不拘時候服訖多飲熱湯有汗出即愈

如瘀熱在裏身發黄疸濃煎茵陳湯調下食前服之

如疸發渴及中暑引飲亦可用水調服

論飲酒過傷

夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便二者乃上下分消其濕今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黄下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱以傷元氣而復重瀉之況亦損腎水眞陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消耗折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久久為黑疸愼不可犯以葛花解酲湯主之

葛花解酲湯

治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胷膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

蓮花青皮去穰三分　木香五分　橘皮去白

人參去蘆　猪苓去黑皮　白茯苓已上各一錢五分

神麴炒黄　澤瀉　乾生薑

白朮已上各二錢　白豆蔻仁　葛花

砂仁已上各五錢

右為極細末秤和勻每服三錢匕白湯調下但得微汗酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃賴日日飲酒此方氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病也

枳朮丸

治痞消食强胃

枳實麩炒黃色去穰一兩 白朮二兩

右同爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸多用白湯下無時白朮者本意不取其食速化但令人胃氣强不復傷也

橘皮枳朮丸

治老幼元氣虛弱飲食不消臟腑不調心下痞悶

枳實麩炒去穰 橘皮已上各一兩 白朮二兩

右件爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸溫水送下食遠夫內傷用藥之大法所貴服之强人胃氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不

傷此能用食藥者也此藥久久益胃氣令不復致傷也

半夏枳朮丸

治因冷食內傷

半夏湯洗七次焙乾 枳實麩炒黃色 白朮已上各二兩

右同爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸添服不妨無定法如熱湯浸蒸餅爲丸亦可

如食傷寒熱不調每服加上三黃丸十丸白湯下

更作一方加澤瀉一兩爲丸有小便淋者用

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣消寒飲食

木香三錢 乾薑五錢炮 枳實一兩炒

白朮一兩五錢

右爲極細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服三五十丸溫水送下食前

木香人參生薑枳朮丸

開胃進食

乾生薑二錢五分 木香三錢 人參二錢五分

陳皮四錢 枳實一兩炒黃 白朮一兩五錢

右爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服三五

十丸溫水送下食前忌飽食

和中丸

治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或溏此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

木香二錢五分 枳實麩炒 炙甘草已上各三錢半

檳榔四錢五分 陳皮去白八錢 半夏湯洗七次

厚朴薑製已上各一兩 白朮一兩二錢

右爲細末生薑自然汁浸蒸餅爲丸如梧桐子大

每服三五十丸溫水送下食前或食遠

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹中除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

乾薑（炮製三分） 巴豆霜（五分） 人參（去蘆）

肉桂（去皮已上各一錢） 柴胡（去苗） 小椒（炒去汗并閉目去子）

白朮（已上各一錢五分） 厚朴（去皮剉炒秋冬加七錢）

酒煮苦楝 白茯苓 砂仁（已上各三錢）

川烏頭（炮去皮臍四錢五分）

知母（四錢一半炒一半酒洗此一味春夏所宜秋冬去之） 吳茱萸（湯洗七次五錢）

黃連（去鬚秋冬減一錢半） 皂角（水洗煨去皮弦） 紫菀（去苗已上各大錢）

右除巴豆霜另入外同為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十丸溫水送下虛實加減

三稜消積丸

治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

丁皮 益智（已上各三錢） 巴豆（炒和粳米炒焦去米）

茴香 陳皮 青橘皮（已上各五錢）

京三稜（炮） 廣茂（炮） 炒麴（已上各七錢）

右件為細末醋打麵糊為丸如梧桐子大每服十丸至二十丸溫生薑湯送下食前量虛實加減得

更衣止後服

備急丹

治心腹百病卒痛如錐刺及脹滿不快氣急並治之

錦紋川大黃（為末） 乾薑（炮為末）

巴豆（先去皮膜心研如泥霜出油用霜）

右件三味等分同一處研勻煉蜜成劑臼內杵千百下丸如大豌豆大夜臥溫水下一丸如氣實者加一丸如卒病不計時候服婦人有孕不可服如所傷飲食在胸膈間兀兀欲吐反覆悶亂以物探

吐去之

神保丸

治心膈痛腹痛血痛腎氣痛脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香 胡椒（已上各二錢五分） 巴豆（十枚去皮油心膜研）

乾蠍（七枚）

右件四味為末湯浸蒸餅為丸麻子大硃砂三錢為衣每服五丸

如心膈痛柿蒂燈心湯下

如腹痛柿蒂煨薑煎湯下

如血痛炒薑醋湯下
如腎氣痛脇下痛茴香酒下
如大便不通蜜調檳榔末一錢下
如氣噎木香湯下
如宿食不消茶酒漿飲任下

雄黃聖餅子

治一切酒食所傷心腹滿不快

雄黃五錢　巴豆一百箇去油心膜　白麵十兩重羅過

右件三味內除白麵八九兩餘藥同爲細末共麵和勻用新水和作餅子如手大以漿水煮煮至浮

於水上漉出控旋看硬軟搗作劑丸如梧桐子大捻作餅子每服五七餅子加至十餅十五餅嚼破一餅利一行二餅利二行茶酒任下食前

蠲飲枳實丸

逐飲消痰導滯清膈

枳實麩炒去穰　半夏湯洗　陳皮去白已上各二兩
黑牽牛八兩內取頭末三兩

右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後生薑湯下

感應丸

治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷因饑飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻後重遲澁久痢赤白膿血相襍米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜唾頭旋胃膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷若久有積寒喫熱藥不效者並悉治之又治久病形羸荏苒歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘久新積冷並皆治之

乾薑炮製一兩　南木香去蘆　丁香已上各一兩五錢

百草霜二兩　肉豆蔻去皮三十箇　巴豆去皮心膜油研七十箇　三百七十
杏仁一百四十箇湯浸去皮尖研膏

右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味搗爲細末却與三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩溶化作汁以重綿濾去柤更以好酒一升於銀石器內煮蠟溶滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩於銚內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩五錢同煎煮熟作汁和匱藥末成劑分作小鋌子

以油單紙裹之旋丸服耳

神應丸

治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

丁香　木香已上各二錢　巴豆

杏仁　百草霜　乾薑已上各五錢

黃蠟二兩

右先將黃蠟用好醋煮去柤穢將巴豆杏仁同炒黑煙盡研如泥將黃蠟再上火春夏入小油五錢秋冬入小油八錢溶開入在杏仁巴豆泥子內同攪旋下丁香木香等藥末研均搓作錠子油紙裹了旋丸用每服三五十丸溫米飲送下食前日三服大有神效

白朮安胃散

治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度又治男子小腸氣痛及婦人臍下虛冷并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止者

五味子　烏梅取肉炒乾已上各五錢

車前子　茯苓　白朮已上各一兩

米殼三兩去頂蒂穰醋煮一宿炒乾

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤空心溫服

聖餅子

治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

黃丹二錢　定粉　舶上硫黃

密陀僧已上各三錢　輕粉少許

右細剉為末入白麵四錢七滴水和如指尖大捻作餅子陰乾食前溫漿水磨服之大便黑色為效

當歸和血散

治腸澼下血濕毒下血

川芎四分　青皮　槐花

荊芥穗　熟地黃　白朮已上各六分

當歸身　升麻已上各一錢

右件為細末每服二三錢清米飲湯調下食前

訶梨勒丸

治休息痢晝夜無度腥臭不可近臍腹撮痛諸藥不效

訶子五錢去核楠　椿根白皮一兩　母丁香三十箇

右為細末醋麪糊丸如梧桐子大每服五十丸陳米飯湯入醋少許送下五更三日三服效

脾胃損在調飲食適寒溫

十四難曰損其脾者調其飲食適其寒溫夫脾胃大腸小腸三焦膀胱倉廩之本營之所居名曰器能化糟粕轉味而出入者也若飲食熱無灼灼寒無悽悽寒溫中適故氣將持乃不致邪僻或飲食失節寒溫不適所生之病或溏泄無度或心下痞悶腹脇䐜脹口失滋味四肢困倦皆傷於脾胃所致而然也腸胃爲市無物不受無物不入若風寒暑濕燥一氣偏勝亦能傷脾損胃觀證用藥者宜詳審焉

脾胃右關所主 其脈緩

如得

- 弦脈 風邪所傷甘草芍藥湯黃耆建中湯之類或甘酸之劑皆可用之
- 洪脈 熱邪所傷三黃丸瀉黃散調胃承氣湯或甘寒之劑皆可用之
- 緩脈 本經太過濕邪所傷平胃散加白朮茯苓五苓散或除濕滲淡之劑皆可用之
- 濇脈 燥熱所傷異功散加當歸四君子湯加熟地黃或甘溫甘潤之劑皆可用之
- 沈細脈 寒邪所傷益黃散養胃丸理中丸理中湯如寒甚加附子甘熱之劑皆可用之

前項所定方藥乃常道也如變則更之

胃風湯

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴㽲痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

人參去蘆　白茯苓去皮　芎藭
桂去麄皮　當歸去苗　白芍藥
白朮已上各等分

右爲麄散每服二錢以水一大盞入粟米數百餘粒同煎至七分去柤稍熱服空心食前小兒量力減之

三黃丸

治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下焦有熱小便赤澁大便秘結五臟俱熱即生癰癤瘡痍及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連去蘆　黃芩去蘆　大黃已上各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸用熱水吞下如臟腑壅實加服丸數小兒積熱宜服之

白朮散

治虛熱而渴

人參去蘆　白朮　木香
白茯苓去皮　藿香葉去土　甘草已上各一兩
乾葛二兩
右件爲麄末每服三錢至五錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時服如不能食而渴潔古先師倍加葛根如能食而渴白虎湯加人參服之

加減平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胷滿氣短嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃

甘草二兩剉炒　厚朴去麄皮薑製炒香　陳皮去白已上各三兩二錢
蒼朮去麄皮米泔浸五兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑三片乾棗二枚同煎至七分去柤溫服或去薑棗帶熱服空心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣
如小便赤澁加白茯苓澤瀉
如米穀不化食飲多傷加枳實
如胷中氣不快心下痞氣加枳殼木香
如脾胃困弱不思飲食加黃耆人參
如心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半
如遇夏則加炒黃芩
如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉
如遇有痰涎加半夏陳皮
凡加時除蒼朮厚朴外依例加之如一服五錢有痰用半夏五分
如嗽飲食減少脉弦細加當歸黃耆
如脉洪大緩加黃芩黃連
如大便硬加大黃三錢芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下

散滯氣湯

治因憂氣結中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食雖食不散常常有痞氣

當歸身二分　陳皮三分　柴胡四分
炙甘草一錢　半夏一錢五分　生薑五片
紅花少許

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食前忌濕麵酒

通幽湯

治幽門不通上衝吸門不開噎塞氣不得上下治在幽門閉大便難此脾胃初受熱中多有此證名之曰下脘不通

桃仁泥　紅花已上各一分　生地黄

熟地黄已上各五分　當歸身　炙甘草

升麻已上各一錢

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去租稍熱服之食前

潤腸丸

治飲食勞倦大便秘澁或乾燥閉塞不通全不思食乃風結血結皆能閉塞也潤燥和血疏風自然通利也

大黄去皮　當歸稍　羌活已上各五錢

桃仁湯浸去皮尖一兩　麻子仁去皮取仁一兩二錢五分

右除麻仁另研如泥外搗羅為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心用白湯送下

導氣除燥湯

治飲食勞倦而小便閉塞不通乃血澁致氣不通而竅澁也

滑石炒黄　茯苓去皮已上各二兩　知母細剉酒洗

澤瀉已上各三錢　黄蘗去皮四錢酒洗

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞去租稍熱服空心如急不拘時候

丁香茱萸湯

治胃虚嘔噦吐逆膈咽不通

乾生薑　黄蘗已上各二分　丁香

炙甘草　柴胡　橘皮

半夏已上各五分　升麻七分　吴茱萸

草豆蔻　黄耆　人參已上各一錢

當歸身一錢五分　蒼朮二錢

右件剉如麻豆大每服半兩水二盞煎至一盞去租稍熱服食前忌冷物

草豆蔻丸

治脾胃虚而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復其讎也經云大勝必大復故皮毛血脉分肉之間元氣已絶於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引胷中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目

時眩目不欲開腹中爲寒水反乘痰唾沃沫食入反出常痛及心胃痛脇下急縮有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絶或腸鳴此脾胃虚之極也胃中氣亂心煩不安而爲霍亂之漸膈咽不通噎塞極則有聲喘喝閉塞或日陽中或煖房內稍緩口吸風寒則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可以回顧小便溲而時躁此藥主秋冬寒涼大復氣之藥也

澤瀉一分小便數減半　柴胡二分或四分消詳癖痛多少用

神麯　薑黃已上各四分　當歸身

生甘草　熟甘草　青皮已上各六分

桃仁湯洗去皮尖七分　白殭蠶　吳茱萸湯洗去苦烈味

焙乾

陳皮　益智仁　黃耆

人參已上各八分　半夏一錢湯洗七次

草豆蔻仁一錢四分麵裹燒熟爲度去皮用仁　麥糵麵炒黃一錢五分

右件一十八味同爲細末桃仁另研如泥再同細末一處研勻湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸熟白湯送下旋斟酌多少

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胸膈閉塞疼痛善嚏口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛目中流火視物䀮䀮耳鳴耳聾頭并口鼻或惡風寒喜日陽夜臥不安常覺痰塞膈咽不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數而晝多夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛黧黑失色男子控睪牽心腹陰陰而痛面如

赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹皮色白後出餘氣腹不能努或腸鳴膝下筋急肩脾大痛此皆寒水來復火土之讎也

黑附子炮裹去皮　乾薑炮爲末已上各三分　防風剉如豆大

郁李仁湯浸去皮尖另研如泥　人參已上各五分

當歸身酒洗六分　半夏湯泡七次　升麻剉已上各七分

甘草剉　藁本已上各八分　柴胡剉如豆大

羌活剉如豆大已上一錢　白葵花三朵去心細剪入

右件藥都一服水五盞煎至二盞入

橘皮五分　草豆蔻仁麵裹燒熟去皮

黄耆已上各一錢
右件入在內再煎至一盞再入下項藥
生地黄二分酒洗　黄蘗酒浸　黄連酒浸
枳殼三分已上各
巳上四味預一日另用新水浸又以
細辛二分　川芎細末　蔓荊子三分已上各
預一日用新水半大盞分作二處浸此三味并黄蘗等煎正藥作一大盞不去柤入此浸者藥再上火煎至一大盞去柤稍熱服空心又能治嚙頰嚙脣嚙舌舌根强硬等證如神忌肉湯宜食肉不助

經絡中火邪也大抵腎并膀胱經中有寒元氣不足者皆宜服之

脾胃將理法

白粥粳米菉豆小豆鹽豉之類皆淡滲利小便且小便數不可更利況大瀉陽氣反行陰道切禁溼麵
如食之覺快勿禁
藥中不可服澤瀉猪苓茯苓燈心琥珀通草木通滑石之類皆行陰道而瀉陽道也如渴如小便不利
或閉塞不通則服得利勿再服
忌大鹹助火邪而瀉腎水眞陰及大辛味蒜韭五辣醋大料物官桂乾薑之類皆傷元氣
若服升沉之藥先一日將理次日腹空服服畢更宜
將理十日先三日尤甚不然則反害也
夫諸病四時用藥之法不問所病或溫或凉或熱或寒如春時有疾於所用藥內加清凉風藥夏月有疾加大寒之藥秋月有疾加溫氣藥冬月有疾加大熱藥是不絕生化之源也錢仲陽醫小兒深得此理內經必先歲氣毋伐天和是爲至治又曰無違時無伐化又曰無伐生生之氣皆此常道也用藥之法若反其常道而變生異證則當從權施治假令病人飲酒

或過食寒或過食熱皆可以增病如此則以權衡應變之藥豈可常用之

攝養

忌浴當風汗當風須以手摩汗孔合方許見風必無
中風中寒之疾
遇卒風暴寒衣服不能禦者則宜爭努周身之氣以
當之氣弱不能禦者病
如衣薄而氣短則添衣於無風處居止氣尚短則以
沸湯一碗熏其口鼻即不短也
如衣厚於不通風處居止而氣短則宜減衣摩汗孔

合於漫風處居止
如久居高屋或天寒陰濕所遏令氣短者亦如前法
熏之
如居周密小室或大熱而處寒涼氣短則出就風日
凡氣短皆宜食滋味湯飲令胃調和
或大熱能食而渴喜寒飲當從權以飲之然不可耽
嗜如冬寒喜熱物亦依時暫食
夜不安寢衾厚熱壅故也當急去之仍拭汗或薄而
不安即加之睡自穩也饑而睡不安則宜少食飽
而睡不安則少行坐
遇天氣變更風寒陰晦宜預避之大抵宜溫暖避風
寒省語少勞役為上

遠欲

名與身孰親身與貨孰多以隋侯之珠彈千仞之雀世必咲之何取之輕而棄之重耶殘軀六十有五耳目半失於視聽百脉沸騰而煩心身如衆派漂流瞑目則寬如浪去神氣衰於前日飲食減於曩時但應人事病皆彌甚以己之所有豈止隋侯之珠哉安於淡薄少思寡欲省語以養氣不妄作勞以養形虛心以維神壽夭得失安之於數得喪既輕血氣自然諧

和邪無所容病安增劇苟能求此亦庶幾於道可謂得其真趣矣

省言箴

氣乃神之祖精乃氣之子氣者精神之根蔕也大矣哉積氣以成精積精以全神必清必靜御之以道可以為天人矣有道者能之予何人哉切宜省言而已